
การเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

A surveillance of drinking behaviors and other health-risk
behaviours among high school students in Thailand

คณะผู้วิจัย

สังกัด

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูแลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคใต้

ร.ศ. สวัสดิ์ อภิณางค์กรชัย

คณะแพทยศาสตร์

นางอโนชา หมักทอง

คณะแพทยศาสตร์

นางสาว นิศานต์ ลำอางศรี

คณะแพทยศาสตร์

นางอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์

คณะแพทยศาสตร์

อ. ดารณี กาญจนสุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์

ผ.ศ. ถนอมศรี อินทนนท์

คณะพยาบาลศาสตร์

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร.ศ. รุจิรา ดวงสงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ร.ศ. กฤตยา แสงวงเจริญ

คณะพยาบาลศาสตร์

ร.ศ. จุฬารัตน์ ไสตะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูแลการเก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคเหนือ

ร.ศ. สิริตา ธีระวัฒน์สกุล

คณะแพทยศาสตร์

ร.ศ. จิราพร สุวรรณธีรวงูร

คณะแพทยศาสตร์

ร.ศ. กรรณิกา วิทย์สุภากร

คณะแพทยศาสตร์

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลการเก็บข้อมูลในพื้นที่

ภาคกลางและภาคตะวันออก

ร.ศ. ณัฐจาพร พิชัยณรงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร.ศ. วิศิษฐ์ ธีรพจน์กำจร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลการเก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นางสาวอุษณีย์ พึ่งปาน

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวอังคณา ชินเดช

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	i
บทนำ	1
ระเบียบวิธีวิจัย	8
ข้อมูลโรงเรียน	12
ผลการศึกษา 1	17
ลักษณะทั่วไปของนักเรียน	17
การรับรู้ต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน	19
ปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียน	19
สภาพแวดล้อมด้านการดื่มสุรา สูบบุหรี่ยี่ห้อและใช้สารเสพติดในโรงเรียน	21
นโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียนด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุรา	23
การปฏิบัติของโรงเรียนต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา สูบบุหรี่ยี่ห้อหรือใช้สารเสพติด	25
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน	27
ความรู้สึกลึกซึ้งเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย	29
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์	30
ประสบการณ์ด้านการดื่มสุรา	32
พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา	32
สถานที่ดื่ม และแหล่งที่เคยได้สุรามา	34
ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองและของนักเรียนคนอื่น	
ใน 12 เดือนที่ผ่านมา	35
ทัศนคติต่อการโฆษณาสุรา	37
ประสบการณ์การใช้สารเสพติด	41
การรู้จักและเคยเห็นสารเสพติด	41
การใช้สารเสพติดในชีวิต	42
ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ยี่ห้อ และใช้สารเสพติด	46
ทัศนคติต่อการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด	47
ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด	47
ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด	47
ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด	48
ผลการศึกษา 2 การดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	50
ก. อัตราความชุกของการดื่มสุรา	50
ข. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา	51
ค. การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่มสุรา	55
บรรณานุกรม	56
แบบสอบถาม	59

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทนำและวัตถุประสงค์

การดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ เป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขที่สำคัญที่พบมากขึ้นในวัยรุ่นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุด และทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่น การบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น โรงเรียนและสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่สำคัญในการลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดของวัยรุ่น ก่อนที่จะวางแผนโครงการเพื่อป้องกันปัญหาการดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ผู้วางแผนนโยบายควรจะต้องมีความเข้าใจในตัวปัญหาในลักษณะและขอบเขตของปัญหาในสถานศึกษาเป็นอย่างดีก่อน พฤติกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ ของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสสังคม ควรมีการสำรวจซ้ำเป็นระยะๆ สม่าเสมอ คณะผู้วิจัยจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การใช้สารเสพติด และผลกระทบจากการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย (Surveillance of drinking behaviors among high school children in Thailand) โดยโครงการนี้จะเป็นการสำรวจแบบตัดขวางซ้ำทุกสองปี (Repeated series of biannual cross-sectional surveys) เริ่มเก็บข้อมูลปีแรกในปีการศึกษา 2550 ในรายงานนี้เป็นผลการสำรวจของปีการศึกษา 2550

วิธีการศึกษา

แหล่งประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ หรือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2 โรงเรียนสายอาชีพศึกษา จากโรงเรียนในจังหวัดที่สุ่มเลือกแบ่งตามเขตการศึกษาทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานครรวม 40 จังหวัด สุ่มเลือกโรงเรียนนอกกรุงเทพฯ จังหวัดละ 5 โรง จำแนกตามประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนสายสามัญสังกัดรัฐบาลในเขตเมือง 1 โรง เขตชนบท 1 โรง โรงเรียนเอกชน 1 โรง โรงเรียนสายอาชีพด้านพาณิชยกรรม 1 โรง ด้านช่างเทคนิค 1 โรง ในกรุงเทพฯ มี 3 เขตพื้นที่การศึกษา เลือกเขตละ 4 โรง (ไม่มีโรงเรียนเขตชนบท) รวม 201 โรงทั่วประเทศ รวมเป็นโรงเรียนสายสามัญ 118 โรง โรงเรียนสายอาชีพ 83 โรง โรงเรียนสังกัดรัฐบาลในเขตเมือง 98 โรง เขตชนบท 55 โรง โรงเรียนเอกชน 48 โรง โดยในแต่ละโรงเรียนสุ่มเลือกห้องเรียนมาระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน เก็บข้อมูลจากนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน ได้จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50,033 คน เป็นชาย 22,723 คน (ร้อยละ 45.6) หญิง 27,106 คน (ร้อยละ 54.4) ไม่ระบุเพศ 204 คน อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 15.1 ปี นักเรียนร้อยละ 94.5 นับถือศาสนาพุทธ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 25 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 6,623 คน จากภาคกลาง 51 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 13,163 คน จากภาคเหนือ 40 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 10,388 คน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 12,370 คน และจากภาคใต้ 36 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 7,479 คน

เจ้าหน้าที่วิจัยของทีมีวิจัยแต่ละภาค เดินทางไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนแต่ละแห่ง โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามในห้องเรียน ใช้เวลาในการตอบประมาณ 1 คาบเรียน (30-50 นาที) การร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้เป็นไปตามความ

สมัครใจของนักเรียน แบบสอบถามเป็นแบบอ่านและตอบเอง โดยไม่ระบุชื่อของผู้ตอบ เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551

ผลการศึกษา

พฤติกรรมการดื่มสุรา

นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 40 และ 24 เคยดื่มสุรามาแล้วในชีวิต อายุเฉลี่ยที่นักเรียนเริ่มดื่มสุราเป็นครั้งแรก ประมาณ 13 ปีในผู้ชายและ 14 ปีในผู้หญิง ในจำนวนนักเรียนที่ดื่มในปัจจุบัน (30 วันที่ผ่านมา) ส่วนใหญ่จะดื่มเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น และดื่มเพียง 1-2 หน่วยต่อครั้ง นักเรียนชั้นโตกว่ามีแนวโน้มที่จะดื่มในปัจจุบัน ดื่มหนักและดื่มจนเมาบ่อยครั้งกว่านักเรียนชั้นเล็กกว่า และนักเรียนชายมีอัตราการดื่มมากกว่านักเรียนหญิงในทุกระดับชั้น อัตราความชุกของการดื่มสุราแบบแผนต่างๆ จำแนกตามเพศและชั้นปีแสดงในตารางต่อไปนี้

อัตราความชุกของการดื่มสุรา

แบบแผนการดื่ม	เพศ	ม.1	ม.3	ม.5	ปวช.2	รวม
การดื่มในชีวิต	ชาย	17.3	35.0	51.8	68.8	39.8
	หญิง	8.9	22.2	31.3	44.7	24.5
การดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา	ชาย	6.4	20.4	36.2	49.0	25.1
	หญิง	3.8	12.2	18.4	27.9	14.0
การดื่มใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	4.5	15.3	27.6	40.1	19.5
	หญิง	2.8	8.3	12.2	21.0	9.8
การดื่มหนัก (≥ 5 หน่วย/ครั้ง) ใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	1.7	7.7	14.3	20.6	10.2
	หญิง	0.8	3.2	5.4	9.1	4.1
การดื่มจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	3.9	12.7	20.3	36.8	16.4
	หญิง	1.8	5.8	7.8	16.2	6.7

สถานที่ที่นักเรียนมักจะดื่มสุรากันมากที่สุดได้แก่ ในสวน/ไร่ นา และหอพัก ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้สุรามาจากผู้เฒ่าทั้งเป็นผู้ที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 ปี นักเรียนชายระดับ ปวช.2 จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งสามารถซื้อหาสุรามาดื่มเองโดยที่ผู้ชายไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัว และมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ร้อยละ 4-16 ที่เคยซื้อสุรามาดื่มเองโดยที่ผู้ชายก็ไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัวเช่นกัน นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 13 และ 6 สามารถซื้อหาสุรามาได้จากร้านค้า ร้านอาหารบริเวณรอบโรงเรียนในรัศมีไม่เกิน 500 เมตร นักเรียนใช้เวลาเพียงประมาณ 12-14 นาทีก็สามารถหาซื้อสุราได้ โดยนักเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถหาซื้อสุรามาได้

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมาในนักเรียนเหล่านี้ได้แก่ 1) ลักษณะประชากรด้าน เพศ ระดับชั้นเรียน ศาสนา สถานที่อยู่อาศัย และผลการเรียน โดยระดับชั้นเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราสูงสุด นักเรียนหญิงมีความเสี่ยงในการดื่มน้อยกว่านักเรียนชายประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้น ม.1 นักเรียนชั้น ม.3 ม.5 และปวช.2 มีความเสี่ยงในการดื่มสุราเป็น 4-12 เท่า โดยความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นตามชั้นปี 2) การรับรู้สภาพแวดล้อมทาง

สังคมในโรงเรียน และนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ตีมีสุรามีนโยบายที่รับรู้สภาพแวดล้อมและนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียนในด้านที่สอดคล้องกับการตีมีสุรา ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ตีมีสุรามองว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ตีมีสุราน้อยกว่า และรับทราบกฎระเบียบของโรงเรียนในเชิงที่ไม่ส่งเสริมการตีมีสุราของนักเรียน โดยนักเรียนที่ตีมีสุรามีโอกาสเป็น 2-3 เท่าของนักเรียนที่ไม่ตีมีสุราที่จะมองว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ตีมีสุราหรือตีมีสุร่าอย่างหนักจำนวนมาก 3) ปัจจัยที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่สัมพันธ์กับการตีมีสุราของนักเรียนจากผลการศึกษานี้ได้แก่ การสัมผัสกับโฆษณาสุรา นักเรียนที่ตีมีสุรามีอัตราการสัมผัสโฆษณาสุร่าบ่อยครั้งกว่านักเรียนที่ไม่ตีมีและสามารถจดจำรวมทั้งมีความรู้สึกอยากลองตีมีมากกว่านักเรียนที่ไม่ตีมีสุร่าอย่างชัดเจน โดยนักเรียนที่ตีมีสุร่ามีอัตราการสัมผัสกับสื่อโฆษณาสุร่าทุกชนิดบ่อยครั้งกว่านักเรียนที่ไม่ตีมีสุร่าประมาณหนึ่งเท่าครึ่ง และมีอัตราการจำชื่อยี่ห้อสุร่าได้มากกว่านักเรียนที่ไม่ตีมีถึงเกือบสองเท่า รวมทั้งยังมีความรู้สึกอยากลองตีมีสุร่ามากกว่านักเรียนที่ไม่ตีมีประมาณสองเท่าเช่นกัน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนชายร้อยละ 42 และนักเรียนหญิงร้อยละ 36 สวมหมวกกันน็อคเวลาขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และนักเรียนชายร้อยละ 41 และนักเรียนหญิงร้อยละ 38 คาดเข็มขัดนิรภัยเวลานั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับเป็นประจำ นักเรียนร้อยละ 1.2-4 เคยขับขีรถยนต์รถจักรยานยนต์หลังจากที่เพิ่งตีมีสุร่ามา นักเรียนชายหญิงน้อยกว่าร้อยละ 10 เคยพกพา มีด ปืน หรือไม้กระบองหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ สำหรับการชกต่อย ตบตีต่อผู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล เคยถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ และเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยนักเรียนระดับ ปวช.2 ทั้งชายและหญิงมีอัตราการมีพฤติกรรมดังกล่าวสูงกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ

นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 13 เคยมีอาการซึมเศร้า หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 4.5 และ 5.2 เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจังและร้อยละ 5 และ 6 เคยวางแผนวิธีการฆ่าตัวตาย ในจำนวนนักเรียนที่เคยฆ่าตัวตายจริงๆ มีนักเรียนชายร้อยละ 16 และนักเรียนหญิงร้อยละ 6 ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 5 ครั้ง และนักเรียนชายร้อยละ 27 นักเรียนหญิงร้อยละ 19 เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆจนได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ อัตราการเคยมีอารมณ์เศร้า และการพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามชั้นปี

นักเรียนชายร้อยละ 16 และหญิงร้อยละ 7 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชาย 14.6 ปี และนักเรียนหญิง 15.5 ปี ในจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว นักเรียนชายร้อยละ 23 หญิงร้อยละ 12 ตีมีสุร่าหรือใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย อัตราการเคยตั้งครรรภ์หรือเคยทำให้คนอื่นตั้งครรรภ์สูงพอๆ กันระหว่างนักเรียนชายและหญิง (ร้อยละ 11 และร้อยละ 9) นักเรียน ปวช.2 มีอัตราการเคยมีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนสายสามัญ นักเรียนชายร้อยละ 74 และนักเรียนหญิงร้อยละ 84 เคยได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเอดส์หรือเอชไอวีในโรงเรียน

ประสบการณ์ใช้สารเสพติด

สารเสพติดที่นักเรียนชายทุกชั้นปีเคยใช้มากที่สุดคือ บุหรี่ (ร้อยละ 21) รองลงมาเรียงตามลำดับ ได้แก่ กัญชา ยานอนหลับ กระท่อม/สารผสมกระท่อม ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยาบ้า สารระเหย ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด ซึ่งมีนักเรียน

ชายร้อยละ 2-7 เคยใช้ในชีวิต สารเสพติดที่นักเรียนหญิงเคยใช้ในชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ยานอนหลับ (ร้อยละ 7) และบุหรี่ (ร้อยละ 5) ส่วนสารอื่น ๆ ที่นักเรียนหญิงเพียงร้อยละ 1-2 เคยใช้ ได้แก่ ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยาแก้ปวดประสาทร/ยาคลายเครียด และกัญชา นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าเคยใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกว่าทั้งชายและหญิง การใช้สารเสพติดแต่ละตัวใน 12 เดือนลดต่ำลงจากอัตราในชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และนักเรียนประมาณร้อยละ 60 ขึ้นไปที่เคยใช้สารเสพติดแต่ละตัวใน 12 เดือนที่ผ่านมา ยังคงใช้สารนั้นใน 30 วันที่ผ่านมาเช่นกัน

สรุป

การศึกษานี้ได้แสดงถึงอัตราความชุกของการดื่มสุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งอัตราการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่างๆ และการใช้สารเสพติด อัตราการเกิดพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง ระหว่างนักเรียนแต่ละชั้นปี และระหว่างนักเรียนสายสามัญกับนักเรียนสายอาชีพศึกษาอย่างชัดเจน ข้อมูลเหล่านี้สำคัญในการวางแผนโครงการเพื่อป้องกันการดื่มสุราของเยาวชนไทย ซึ่งควรจะต้องเป็นโครงการที่มีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับนักเรียนตามระดับชั้นปีและสายการเรียน การศึกษาลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องจะเป็นข้อมูลสำคัญของประเทศในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการดื่มสุรา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนต่อไป

1. บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่อง

การดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ เป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขที่สำคัญที่พบมากขึ้นในวัยรุ่นทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่วัยรุ่นนิยมใช้มากที่สุด จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ในปี 2545-2547 พบว่าอัตราการดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมาในนักเรียนชายเท่ากับร้อยละ 25.36, 24.21 และ 22.69 และในนักเรียนหญิงเท่ากับร้อยละ 13.61, 12.05 และ 9.44 ในปี 2545 2546 และ 2547 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ ทั้งสามปี โดยอัตราการดื่มหนักมากกว่า 5 แก้วขึ้นไปต่อครั้ง (binge drinking) และการดื่มจนเมา (drinking until intoxicated) ในระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมาในนักเรียนกลุ่มนี้ก็สูงถึงร้อยละ 13-17 ในนักเรียนชายและ 4-6 ในนักเรียนหญิง (1) การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ภาพที่คล้ายคลึงกัน การสำรวจประจำปี 2548 ของโครงการ Monitoring the Future (MTF) ซึ่งเป็นการสำรวจการใช้สารเสพติดในนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศต่อเนื่องทุกปี พบว่าสามในสี่ของนักเรียนชั้นปีที่ 10 (เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเทศไทย) และประมาณสองในห้าของนักเรียนชั้นปีที่ 8 (เท่ากับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในประเทศไทย) เคยดื่มสุรามาแล้วในชีวิต และเมื่อเด็กเหล่านี้ดื่ม พวกเขา ก็มักจะดื่มมากเช่น 4-5 หน่วยมาตรฐานต่อครั้ง โดยการสำรวจนี้ยังพบว่า นักเรียนชั้นปีที่ 8 ร้อยละ 11 นักเรียนชั้นปีที่ 10 ร้อยละ 22 และนักเรียนชั้นปีที่ 12 ร้อยละ 29 เคยดื่มหนัก (binge drinking) ในสองสัปดาห์ก่อนการสำรวจ (2)

จากการศึกษาวิจัยต่างๆ มักจะพบว่า เด็กที่เริ่มดื่มสุราเมื่ออายุน้อยจะมีโอกาสเกิดปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น รวมทั้งการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ และปัญหาทางเพศ และทำให้เกิดผลกระทบตามมามากมาย เช่น การบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น (3) จากการศึกษาในประเทศไทยก็พบว่า การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่น (4, 5)

การศึกษาเกี่ยวกับการดื่มสุราในนักเรียนนักศึกษาได้รับความสนใจมากในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การศึกษาเหล่านี้พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลายด้านกับการดื่มสุราในวัยรุ่นและภาวะความผิดปกติจากการดื่มสุรา เช่น ปัจจัยด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ความไม่มั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ เพศและเอกลักษณ์ทางเพศ ระดับชาตปัญหา แรงกดดันจากเพื่อน ครอบครัวและความสัมพันธ์ (6) เด็กวัยรุ่น (อายุระหว่าง 11-20 ปี) ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียนและสถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญในการลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทั้งปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดของวัยรุ่น

เนื่องจากผลกระทบที่มากมายของการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น ทำให้มีการทุ่มเทความพยายามในการหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามาจากการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด ก่อนที่จะวางแผนโครงการเพื่อป้องกันปัญหาการดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ผู้วางนโยบายควรจะต้องมีความเข้าใจในลักษณะและขอบเขตของปัญหาในสถานศึกษาเป็นอย่างดีก่อน พฤติกรรมการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสสังคม ข้อมูลเรื่องขนาดและลักษณะของปัญหา ณ ช่วงเวลาใดๆ จะสามารถบอกถึงสภาพของปัญหา ณ เวลานั้นๆ ได้เท่านั้น การสำรวจขนาดและลักษณะปัญหาเพียงครั้งเดียวคงจะได้ผลการศึกษา

ที่จำกัด เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ทำนายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และก้าวทันสถานการณ์ของปัญหา จึงควรมีการสำรวจซ้ำๆ เป็นประจำทุกปีในประชากรกลุ่มเดิม (7)

ถึงแม้ว่าปัญหาจากการดื่มสุราในวัยรุ่นจะได้รับความสนใจและเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเน้นในเรื่องการสำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมและครอบครัว เป็นงานวิจัยแบบตัดขวางครั้งเดียวเป็นส่วนใหญ่ มิได้มีการติดตามกลุ่มตัวอย่างระยะยาว หรือการสำรวจซ้ำๆ ในประชากรกลุ่มเดิม (8) พฤติกรรมการดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอื่นๆ ของนักเรียนเป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไป การสำรวจเพียงครั้งเดียวคงไม่สามารถให้ภาพที่คมชัดนัก ต้องมีการสำรวจซ้ำเป็นระยะ ๆ ต่อไป คณะผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยนี้ขึ้น เพื่อที่จะศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมกรรมการดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพรวมทั้งการใช้สารเสพติดในเด็กและวัยรุ่น และติดตามดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหา เพื่อทำความเข้าใจกับการดำเนินปัญหาในเด็กและวัยรุ่นไทย

การทบทวนวรรณกรรม

ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดื่มสุราในวัยรุ่นและนักเรียนนักศึกษาในประเทศต่างๆ มากมาย ซึ่งการศึกษาเหล่านี้ต่างชี้ให้เห็นว่า นักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงในการดื่มสุราแบบหนักและเกิดปัญหาจากการดื่ม เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างประเทศ ความชุกของการดื่มสุราแบบเสี่ยงหรือแบบอันตรายของนักเรียนนักศึกษาในประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย ค่อนข้างสูงพอๆ กัน ส่วนในทวีปเอเชียและแอฟริกาความชุกค่อนข้างต่ำกว่า และการศึกษาส่วนใหญ่พบปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่คล้ายคลึงกัน คือ เพศชาย เศรษฐฐานะสูง ครอบครัวที่มีระดับการศึกษาสูง และการมีประวัติเพื่อนหรือคนในครอบครัวดื่มหนัก เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการดื่มสุราในนักเรียนนักศึกษา (6)

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดของวัยรุ่นในที่นี้ หมายความว่าถึงการใช้สารเสพติดรวมทั้งสุราและบุหรี่ในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่การลองใช้ (experimental use) การใช้เป็นครั้งคราว (occasional use) การใช้ตามโอกาสหรือสถานการณ์ (situational use) เช่น ดื่มสุราเมื่อไปงานรื่นเริงกับเพื่อน หรือใช้ยาบ้า เมื่อต้องการไม่ให้ง่วงนอนเพื่อดูหนังสือสอบหรือเตรียมงาน การใช้เป็นประจำ (regular use) การติดสุราหรือสารเสพติด (alcohol or substance dependence) (ซึ่งหมายถึง การดื่มสุราหรือใช้สารเป็นประจำจนทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายจิตใจ หรือความบกพร่องต่อหน้าที่การงาน สังคมและครอบครัว ต้องเพิ่มขนาดสารขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ฤทธิ์เท่าเดิม (tolerance) และหากหยุดใช้จะมีอาการขาดยา (withdrawal state)) (9) การหยุดใช้ (abstinence) และการกลับมาใช้ซ้ำ (relapse)

การสำรวจพฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในนักเรียนนักศึกษา

เยาวชนส่วนใหญ่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาระดับต่างๆ ตั้งแต่โรงเรียน วิทยาลัย ไปจนถึงมหาวิทยาลัย ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมแห่งหนึ่งในการวางโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา Centre of Disease Control (CDC) ได้วางระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของเยาวชน (Youth Risk Behaviour Surveillance System, YRBSS) ซึ่งประกอบด้วยงานสามด้านได้แก่ 1) การสำรวจนักเรียนระดับมัธยมในโรงเรียนระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับประเทศ (school-based survey) ซึ่งทำทุกสองปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 2) การสำรวจที่บ้าน (household survey) เพื่อศึกษาเยาวชนอายุ 12-21 ปีไม่ว่าจะกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน เริ่มทำในปี พ.ศ. 2535 และ 3) การสำรวจในวิทยาลัยทั่วประเทศ (National College Health Risk Behaviour Survey,

NCHRBS) เริ่มในปี พ.ศ. 2538 วัตถุประสงค์ของ NCHRBS เพื่อที่จะติดตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพชนิดต่างๆ ของนักศึกษา โดยแบ่งพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ พฤติกรรมที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจ การใช้สุราและสารเสพติด พฤติกรรมทางเพศซึ่งทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจและการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขภาพ และการไม่ออกกำลังกาย ผลการศึกษาของโครงการนี้จัดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญตัวหนึ่งของความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ระดับชาติ 28 ข้อ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา และความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับชาติแก่นักศึกษาในวิทยาลัยต่างๆ และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ นำไปใช้เพื่อวางแผนโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพแก่นักศึกษาได้ (10)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Monitoring the Future (MTF) Study ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน และสนับสนุนโดยสถาบันสารเสพติดแห่งชาติ (National Institute of Drug Abuse, NIDA) เป็นการสำรวจแนวโน้มการใช้สารเสพติดและเจตคติต่อสารเสพติดในนักเรียนระดับ 8, 10 และ 12 ทุกปี โครงการนี้เริ่มทำตั้งแต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เป็นโครงการที่มีลักษณะต่อเนื่อง โดยนักเรียนในทั้งสามระดับชั้นจากทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลจะตอบแบบสอบถามโดยไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งถามเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดรวมทั้งสุราและบุหรี่ การรับรู้ถึงอันตรายของสารเสพติดแต่ละชนิด การไม่ยอมรับการใช้สารเสพติด และการรับรู้ถึงความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด โครงการนี้จัดเป็นหนึ่งในสามโครงการสำรวจระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ การศึกษาแบบต่อเนื่องเช่นนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนานักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป (2)

ในประเทศไทยได้มีการสำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราในประชากรทั่วไปหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น การสำรวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสุราและสารเสพติดทั่วประเทศ พ.ศ. 2544 2546 และ 2550 ของเครือข่ายองค์การวิชาการสารเสพติด (11) การสำรวจอนามัยและสวัสดิการสังคมซึ่งทำต่อเนื่องหลายครั้ง ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (12) และการสำรวจทางระบาดวิทยาของโรคจิตเวชและโรคจากการดื่มสุราของกรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2546 (13) แต่การสำรวจเหล่านี้เป็นการเก็บข้อมูลในประชากรทั่วไปในครัวเรือน มิได้มีเป้าหมายเฉพาะในการศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราเฉพาะในนักเรียนในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (14) ซึ่งดำเนินการสำรวจมาหลายครั้งแล้ว แต่เป็นการสำรวจเรื่องพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ไม่ได้เน้นเรื่องพฤติกรรมการดื่มสุราจึงไม่มีข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่มสุราที่ละเอียดพอ

ในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ดำเนินการโดยนักวิจัยจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นการศึกษาวิจัยในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 และนักเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โครงการนี้เป็นการสำรวจซ้ำทุกปี ใน 3 ปีแรกของการศึกษา สำรวจในจังหวัด 4 จังหวัดของภาคใต้คือ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนโรงเรียน 34-38 โรงเรียนต่อปี ในปี 2548 ขยายเป็น 8 จังหวัดโดยเพิ่มจังหวัดยะลา นครศรีธรรมราช ตรังและพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า อัตราการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ใน 30 วันที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ความชุกของการใช้

สารเสพติดในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในภาคใต้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี กระทั่งมและกัญชาเป็นสารเสพติดที่นักเรียนเคยใช้มากที่สุด ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย ปีที่สำรวจ การเป็นนักเรียนสายอาชีพ ระดับชั้นเรียน และผลการเรียน นักเรียนที่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดในปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ปลอดภัย การซื้อรถจักรยานยนต์/ซัปรดโดยไม่สวมหมวกกันน็อกหรือคาดเข็มขัดนิรภัย การต่อสู้ทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ และอารมณ์เศร้าและความคิดหรือความพยายามฆ่าตัวตาย มากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุราหรือไม่ใช้สารเสพติดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (1, 15)

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น


ในขณะที่เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และวิถีการดำเนินชีวิต ในระยะของพัฒนาการ เช่นในช่วงวัยรุ่นซึ่งกำลังต้องการความเป็นอิสระ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เยาวชนจำนวนหนึ่งจะสัมผัสกับการดื่มสุรา ดังนั้น การก้าวเข้าสู่สู่วัยรุ่นอาจจะเป็นปัจจัยโดยตัวของมันเองที่นอกจากจะทำให้เยาวชนเริ่มดื่มสุราแล้ว ยังอาจทำให้ดื่มอย่างอันตรายอีกด้วย จากการศึกษาวิจัยต่างๆ พบจะสรุปเหตุผลว่าทำไมวัยรุ่นจึงดื่มสุรา (3)

1. ต้องการความเสี่ยง (Risk taking) นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพัฒนาการของสมองในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นมีส่วนช่วยอธิบายพฤติกรรมของวัยรุ่น เช่น การแสวงหาสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่เป็นอันตราย ซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมถึงการดื่มสุราด้วย
2. ความคาดหวังต่อฤทธิ์ของสุรา (Expectancies) วัยรุ่นที่คาดหวังว่าการดื่มสุราจะเป็นประสบการณ์ที่สนุกเพลิดเพลินมักจะมีแนวโน้มที่จะดื่มสุรามากกว่าวัยรุ่นที่ไม่ได้คาดหวังเช่นนี้ ความเชื่อเกี่ยวกับฤทธิ์ของสุราเริ่มมีตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าโรงเรียน ก่อนอายุ 9 ปี เด็กมักจะมองผลด้านลบของสุรา และเห็นว่าการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนตามมา เมื่อเด็กอายุประมาณ 13 ปี ความคาดหวังนี้ก็กลับเปลี่ยนแปลงไป โดยจะกลายเป็นความคาดหวังทางบวกมากขึ้น วัยรุ่นที่ดื่มมากที่สุดจึงมักจะเป็นวัยรุ่นที่มองเห็นแต่ด้านดีของการดื่มสุราและฤทธิ์อันน่าตื่นเต้นของสุรา (16)
3. ความไวและความทนต่อสุรา (Sensitivity and tolerance to alcohol) ความแตกต่างระหว่างสมองของวัยรุ่นและสมองของผู้ใหญ่ช่วยอธิบายว่าทำไมวัยรุ่นจึงสามารถดื่มสุราได้ปริมาณมากกว่าผู้ใหญ่ก่อนที่จะเกิดอาการข้างเคียงตามมา เช่นง่วงนอน สูญเสียการทรงตัว หรืออาการขาดยาหรือเมาค้าง ซึ่งการที่วัยรุ่นมีความทนต่อฤทธิ์ของสุราเช่นนี้เป็นตัวอธิบายว่าทำไมจึงพบการดื่มแบบหนักมากต่อครั้ง (binge drinking) ในวัยรุ่น (17)
4. บุคลิกภาพและโรคร่วมทางจิตเวช เด็กที่เริ่มดื่มสุราตั้งแต่อายุยังน้อย (ก่อนอายุ 12 ปี) มักจะมีลักษณะบุคลิกภาพแบบก่อวุ่น (disruptive) ซุกซนวุ่นวาย (hyperactive) ก้าวร้าว (aggressive) หรือที่มักเรียกรวมว่า conduct problems หรือ antisocial และเด็กที่ซึมเศร้า แยกตัว หรือวิตกกังวลมาก ดื้อดึง (rebelliousness) มีความยากลำบากในการหลีกเลี่ยงสิ่งหรือเหตุการณ์ที่อันตราย (difficulty avoiding harm or harmful situation) และเด็กที่ชอบทำตัวขัดกับกฎระเบียบ ก็มักมีความเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาการดื่มสุรา (18) การศึกษาในประเทศไทยพบว่า พฤติกรรมต่อต้านสังคม (conduct disorder หรือ antisocial behavior) ก่อนอายุ 18 ปี เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด (best predictor) ในการเพิ่มความเสี่ยงของการติดสุราในวัยผู้ใหญ่ (19)
5. ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยทางพฤติกรรมหรือสรีระวิทยาบางตัวที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการดื่มสุราสามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ เช่นความทนต่อสุรา การเป็นลูกของผู้ติดสุรา (children of alcoholics- COAs) หรือมีญาติพี่น้องหลายคนติดสุราจะทำให้คนๆ นั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาจากสุรามากขึ้น และมีโอกาสที่จะเริ่มดื่มตั้งแต่

อายุยังน้อยและกลายเป็นผู้มีปัญหาจากการติ่มสุราได้อย่างรวดเร็ว การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ที่มีพ่อที่ติ่มสุรามีความเสี่ยงที่จะติดสุรากับเป็น 3 เท่าของผู้ที่ไม่มีพ่อติ่มสุรา (19)

6. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการติ่มสุราเป็นผลร่วมกันจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่มีผลต่อการติ่มสุราในอายุหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่มีผลต่อการติ่มสุราในอายุอื่นๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์พบว่าปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อการติ่มสุราของวัยรุ่นตอนปลายมากกว่าต่อวัยรุ่นตอนกลาง (20) ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อการติ่มสุราของวัยรุ่น ได้แก่ การติ่มสุราของพ่อแม่ ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนยุ่งเหยิง (chaotic home environment) หรือครอบครัวที่มีลักษณะก้าวร้าว รุนแรง (violence family) จะเพิ่มความเสี่ยงในการติ่มสุราในเด็ก การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม (ineffective parenting) การขาดความเอาใจใส่ดูแลและติดตามเด็ก (poor parental monitoring) มีความสัมพันธ์โดยตรงในการเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดในเด็ก (21) ซึ่งนอกจากทำให้เด็กขาดการได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้ว ยังส่งผลทางอ้อม จากการที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เวลากับเด็ก ทำให้เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มที่ใช้สารเสพติด ทำให้ได้รับอิทธิพลจากเพื่อน วัยรุ่นหญิงที่มีคูรักรอายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะมีโอกาสที่จะติ่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นๆ นอกจากนั้น อิทธิพลของสื่อต่างๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการติ่มสุราและการใช้สารเสพติดของวัยรุ่น จากงานวิจัยพบว่าวัยรุ่นที่มองว่าโฆษณาสุราดี น่าสนใจก็จะมีโอกาสที่จะมองการติ่มสุราในเชิงบวกและซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายของสุรามากกว่าวัยรุ่นที่ตอบสนองในเชิงลบด้วย (22)

อย่างไรก็ตามนอกจากจะมองในด้านปัจจัยเสี่ยง (risk factors) หรือสิ่งที่มากระตุ้น (precursor) ให้เกิดพฤติกรรมหรือปัญหาแล้ว ในปัจจุบันนักวิจัยได้ให้ความสนใจกับปัจจัยป้องกัน (protective factors) หรือสิ่งที่จะช่วยปกป้องไม่ให้เยาวชนมีพฤติกรรมการติ่มสุราหรือการใช้สารเสพติดหรือช่วยลดพฤติกรรมการใช้สารเสพติดลงได้ ปัจจัยป้องกันหรือปัจจัยที่มีผลในการลดโอกาสเสี่ยงต่อการติ่มสุราหรือการใช้สารเสพติด สามารถแบ่งเป็นระดับต่างๆ ได้ คือ 1) ปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ นิสัยส่วนตัวและลักษณะบุคลิกภาพ เด็กที่มีลักษณะอารมณ์ที่มั่นคง (stable temperament) มีทักษะในด้านการปรับตัวและการแก้ปัญหาในการเข้าสังคมที่ดีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการติ่มสุรา (23) 2) ปัจจัยด้านครอบครัว ลักษณะครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการติดตามดูแลเด็กสม่ำเสมอ ครอบครัวที่พ่อแม่พยายามไม่ใช้สารเสพติดและส่งเสริมสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (promote bonding) จะทำให้เด็กในครอบครัวนั้นมีโอกาสใช้สารเสพติดน้อยกว่าเด็กในครอบครัวที่มีลักษณะตรงข้าม (24) 3) ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนและโรงเรียน พบว่าโรงเรียนที่นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้องต่อการติ่มสุราหรือการใช้สารเสพติด เข้าใจถึงความเสี่ยงและอันตรายของการติ่มสุราหรือการใช้สารเสพติด และมีบรรทัดฐานสังคมแบบต่อต้านการใช้สารเสพติด และการออกกฎโรงเรียนที่ชัดเจนการใช้สารเสพติดจะช่วยป้องกันและลดปัญหาการสูบบุหรี่และการติ่มสุราหรือการใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆ ของนักเรียน (25) 4) ปัจจัยด้านชุมชนและสังคม การออกกฎหมายการควบคุมการจำหน่ายสุรา โดยกำหนดอายุของผู้มีสิทธิซื้อสุรา การขึ้นภาษีสุราทำให้การติ่มสุราในวัยรุ่นลดลง การให้ความรู้ทางสุขภาพแก่ชุมชน ก็ช่วยลดปัญหาการติ่มสุราและสูบบุหรี่ในวัยรุ่นด้วย (26)



ผลกระทบต่อสุขภาพจากการดื่มสุราในวัยรุ่น

วัยรุ่นที่ดื่มสุราจะมีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพได้หลายด้าน ถึงแม้จะไม่ค่อยพบปัญหาทางสุขภาพที่รุนแรงเท่ากับที่พบในผู้ใหญ่ก็ตาม แต่การศึกษาต่างๆ ก็แสดงให้เห็นว่าการดื่มสุราในวัยรุ่นจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดปัญหาต่างๆ ต่อไปนี้

1. ผลต่อสมอง การศึกษาเรื่องผลกระทบของสุราต่อสมองของวัยรุ่นทำได้ยาก เพราะสมองของเด็กยังมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอยู่ ยังไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ตาม การศึกษาในสัตว์ทดลองก็พบว่า การให้สัตว์ดื่มสุราในช่วงวัยที่สำคัญนี้ทำให้เกิดความผิดปกติของสมอง ทักชะในการคิดและความจำในระยะยาวได้ (27)
2. ผลต่อตับ ตับของวัยรุ่นที่ดื่มสุราอาจมีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์บางตัวที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตับได้ นักดื่มที่อายุน้อยที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนมีโอกาสที่เกิดความผิดปกติของเอนไซม์ตับได้ง่ายทั้งๆ ที่ดื่มเพียงไม่มาก(28)
3. ผลต่อการเจริญเติบโตและต่อมไร้ท่อ วัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและลักษณะทางเพศอย่างรวดเร็ว การดื่มสุราจะมีผลต่อความสมดุลของฮอร์โมนเหล่านี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของอวัยวะต่างๆ กระดูกและกล้ามเนื้อ (29)

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังปัญหาการดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการใช้สารเสพติดของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย คณะผู้วิจัยจึงได้ขยายโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยที่สนใจในการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมดังกล่าวในเยาวชนไทย และเพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดื่มสุรา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในเยาวชนไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เฝ้าระวังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติด และผลกระทบจากการดื่มสุรา และการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย (Surveillance of drinking behaviors among high school children in Thailand) โดยการสำรวจข้อมูลในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศซ้ำทุกสองปี ตามวัตถุประสงค์เฉพาะในการศึกษาดังต่อไปนี้

1. ความชุกของพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียน ในแต่ละปีที่ศึกษา (Prevalence of lifetime, past year and current drinkers, prevalence of abstainers)
2. แบบแผนการดื่มสุราของนักเรียน (Patterns of alcohol consumption)
3. เจตคติต่อการดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในโรงเรียน (Attitudes towards drinking and other health-risk behaviours)
4. ความชุกของพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียน ในแต่ละปีที่ศึกษา (Prevalence of lifetime, past year and current substance users, prevalence of health-risk behaviours)
5. ผลกระทบของการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดของนักเรียนในแต่ละปีที่ศึกษา (Consequences of alcohol consumption and substance use)
6. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียน (Association between various predicting factors and alcohol consumption, health-risk behaviours and substance use)

2. ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบการวิจัย (Study design)

โครงการวิจัยนี้เป็นการสำรวจแบบตัดขวางซ้ำทุกสองปี (Repeated series of cross-sectional surveys) เริ่มเก็บข้อมูลปีแรกในปีการศึกษา 2550 และสิ้นสุดระยะแรกในปีการศึกษา 2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรเป้าหมายสำหรับนำไปใช้ (Reference population)

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 ถึง ม.6) ในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในเขตชนบทและเขตเมือง ทั้งใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ของประเทศไทย

แหล่งประชากร (Source population)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ และนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี 2 โรงเรียนสายอาชีพศึกษา ซึ่งมีระดับชั้นเทียบเท่ากับ มัธยมศึกษาปีที่ 5 สายสามัญ สุ่มเลือกจังหวัดแบบอิสระจากจำนวนจังหวัดทั้งหมดในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2550 สุ่มเลือกจังหวัดดังนี้

จำนวนจังหวัดที่เก็บข้อมูลแยกรายภาคและเขตการศึกษาในปีการศึกษา 2550

เขต	ภาค	รายชื่อจังหวัด	จังหวัดที่สุ่มได้
พิเศษ		กรุงเทพมหานคร 3 เขต	กรุงเทพฯ 3 เขต
1	ปริมณฑล	นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร	นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร
5	กลางและ	กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี	กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
6	ตะวันออก	ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี	ชัยนาท อยุธยา สระบุรี
12		จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว	ชลบุรี นครนายก ระยอง สระแก้ว
2	ใต้	นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล	นราธิวาส สตูล
3		ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สุราษฎร์ธานี	ชุมพร สุราษฎร์ธานี
4		กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง	ตรัง พังงา ระนอง
7	เหนือ	กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์	นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
8		เชียงใหม่ เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา	เชียงใหม่ แพร่ แม่ฮ่องสอน พะเยา
9	ตะวันออก	ขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู	เลย หนองคาย หนองบัวลำภู
10	เฉียงเหนือ	กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ	กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ
11		ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์	ชัยภูมิ ศรีสะเกษ
รวม		76 จังหวัด	37 จังหวัด + 3 เขต

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Study sample)

ในปีการศึกษา 2550 ได้เลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5 และ ปวช. 2 ของโรงเรียนจากในแต่ละจังหวัดที่สุ่มเลือกได้ ทั้ง 37 จังหวัด และกรุงเทพฯ ทั้ง 3 เขต รวม 40 จังหวัด/เขตพื้นที่ ขั้นตอนการสุ่มเลือกตัวอย่างเป็นดังนี้

1. สุ่มเลือกโรงเรียนมาจังหวัดละ 5 โรงเรียน โดยกำหนดให้เป็นโรงเรียนสายสามัญสังกัดรัฐบาลในเขตเมือง 1 โรงเรียน เขตชนบท 1 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 1 โรงเรียน (ไม่ได้เลือกโรงเรียนเอกชนในเขตชนบท เนื่องจากในจังหวัดต่างๆ มักไม่มีโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบท) โรงเรียนสายอาชีพด้านพาณิชยกรรม 1 โรงเรียน ด้านช่างเทคนิค 1 โรงเรียน สำหรับกรุงเทพฯ เลือกเขตละ 4 โรงเรียน (ไม่มีเขตชนบท)
2. ในโรงเรียนสายสามัญแต่ละโรงเรียน ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจำนวนห้องเรียนมากกว่า 3 ห้องต่อชั้นปี สุ่มเลือกห้องเรียนของชั้น ม. 1 ม. 3 และ ม.5 ที่มีนักเรียนที่มีผลการเรียนคละมาระดับชั้นละ 3 ห้องเรียน หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีน้อยกว่า 3 ห้องเรียนต่อชั้น ได้เก็บข้อมูลจากนักเรียนทุกห้องในชั้นปี ส่วนในโรงเรียนสายอาชีพศึกษาจะเลือกนักเรียนชั้น ปวช. 2 โดยใช้หลักการเดียวกัน และเก็บข้อมูลจากนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้สุ่มเลือกไว้

วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม

1. เจ้าหน้าที่วิจัยสุ่มเลือกจังหวัดในแต่ละภาค แล้วสุ่มเลือกโรงเรียนของแต่ละจังหวัดตามเขตการศึกษา และเลือกโรงเรียนตัวอย่าง 4 หรือ 5 โรงเรียนต่อจังหวัดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จากรายชื่อโรงเรียนทั้งหมดในปีการศึกษา 2550 ของจังหวัดนั้น ซึ่งได้มาจากสำนักงานการศึกษาจังหวัด
2. เจ้าหน้าที่วิจัยติดต่อผู้ประสานงานประจำจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มเลือก เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน สุ่มเลือกห้องเรียนที่จะเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลโดยการให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนที่สุ่มเลือกได้ตอบตามแบบสอบถามแบบอ่านและตอบเอง โดยให้ตอบแบบสอบถามนี้ในห้องเรียน ในชั้นเรียนตามปกติ ใช้เวลาในการตอบทั้งสิ้นประมาณ 1 คาบเรียน (30-50 นาที) การตอบแบบสอบถามเป็นไปโดยสมัครใจ และนักเรียนไม่ต้องเขียนชื่อหรือรหัสนักเรียนลงในแบบสอบถามนี้ เจ้าหน้าที่วิจัยรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดกลับมาตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการป้อนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
3. ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ก. แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน โรงเรียนสหศึกษาหรือชายล้วน/หญิงล้วน จำนวนนักเรียน จำนวนชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนต่อชั้น จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน และจำนวนนักเรียนในห้องเรียนที่สุ่มเลือกได้ ลักษณะการรับนักเรียนเข้าเรียน (โดยการสอบแข่งขัน หรือการรับตามโควตา) มีนักเรียนประจำ/หอพักหรือไม่

ข. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบอ่านและตอบเองโดยไม่เปิดเผยชื่อ (Self-reported, anonymous questionnaire) โดยจะใช้แบบสอบถามฉบับเดียวกันซ้ำทุกปี เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีได้ แบบเก็บข้อมูลนี้รับมาจากแบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลในโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ (15) ซึ่งได้เค้าโครงมา

จากแบบสอบถามที่ใช้ในโครงการ Monitoring the Future Project (2), U.S. Youth Risk Behavior Surveillance System (30), The Core Alcohol and Drug Survey และ Harvard Alcohol Survey (7)

แบบเก็บข้อมูลนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน

1. ข้อมูลด้านลักษณะพื้นฐานของนักเรียน (Student background) ได้แก่ อายุ เพศ ชั้นเรียน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา พูดในครอบครัวลักษณะการอยู่อาศัย การร่วมกิจกรรมโรงเรียน ผลการเรียน
2. คำถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียน (Patterns of drinking) ได้แก่
-ประสบการณ์การเคยดื่มสุราในชีวิต ในหนึ่งปี และใน 30 วันที่ผ่านมา (Lifetime, past year, current drinking)
-ลักษณะการดื่มในปัจจุบัน หรือ 30 วันที่ผ่านมา (Current patterns of alcohol consumption) ในด้านปริมาณ ความถี่ การดื่มจนเมา และการดื่มหนักตั้งแต่ 5 แก้วขึ้นไปต่อครั้ง (binge drinking) และความถี่ของการดื่มสุรา ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนหรือชุมชน เช่นการดื่มในงานกีฬา งานเลี้ยงฉลอง และในร้านเครื่องดื่มต่างๆ
-ความยากง่ายและวิธีการแสวงหาและการเข้าถึงเครื่องดื่มสุรา (Availability and accessibility to alcohol)
-ผลกระทบจากการดื่มสุราทั้งจากการดื่มของตนเอง และการดื่มของนักเรียนคนอื่น ต่อร่างกาย จิตใจ การเรียน ครอบครัวและสังคม (Consequences of drinking)
3. คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การสวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัย การพกพาอาวุธ ความรู้สึกซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตาย เพศสัมพันธ์ เป็นต้น
4. คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ในตลอดชีวิตที่ผ่านมา ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา และในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
5. คำถามเกี่ยวกับเจตคติต่อการดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ในโรงเรียน ได้แก่ การรับรู้บรรทัดฐานและนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการดื่มสุรา (Perceptions of the school drinking norms and policies) การรับรู้ถึงอันตรายของการใช้สารเสพติด (perceived harm of using substances) การยอมรับพฤติกรรมการใช้สารเสพติดแต่ละชนิด (approval of using substances) และการรับรู้ถึงความยากง่ายของการแสวงหาสารเสพติดแต่ละชนิด (perceived availability)
6. คำถามเกี่ยวกับการรับรู้/สัมผัสและทัศนคติต่อสื่อโฆษณาเครื่องดื่มสุราและผลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา

การทดสอบแบบสอบถามฉบับนักเรียน

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของแบบสอบถาม จากแบบสอบถามเดิมที่ใช้ในโครงการสำรวจฯ ในภาคใต้ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการดื่มสุรามากขึ้น จึงดำเนินการทดสอบแบบสอบถาม โดยให้นักเรียนชั้น ม.1 ม.3 ม.5 และ ปวส. 2 จากโรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชั้นละ 1 ห้อง ตอบแบบสอบถามนี้ จัปเวลาที่ใช้ในการตอบ แล้วให้แสดงความคิดเห็นต่อแบบสอบถามนี้ และสัมภาษณ์นักเรียนทั้งห้องเกี่ยวกับข้อเสนอแนะต่อเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ความเข้าใจและความยากง่ายของแบบสอบถาม แล้วนำข้อคิดเห็นทั้งหมดมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปรับปรุงแบบสอบถามต่อไป ดำเนินการทดสอบแบบสอบถามในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งหมด จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนโดยเจ้าหน้าที่วิจัยทันทีที่รวบรวมแบบสอบถามหรือแบบบันทึกข้อมูลมาได้ หากมีแบบสอบถามใดที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยการไม่ตอบมากกว่าร้อยละ 30 ของข้อคำถามทั้งหมด หรือลักษณะการตอบแสดงถึงความไม่ตั้งใจตอบข้อมูลจริง เช่น กาดำเลือกเดียวกันทั้งหน้าหรือทั้งชุดของแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่วิจัยจะคัดเลือกรูปแบบสอบถามชุดนั้นออก เสร็จแล้วจะบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งเชิงพรรณนา และเชิงวิเคราะห์ เพื่อรายงาน

1. ความชุกของพฤติกรรมด้านต่างๆ ในปีนั้น ซึ่งคำนวณได้จากอัตราร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมนั้นต่อจำนวนนักเรียนตัวอย่างทั้งหมด โดยมีการปรับค่าตัวแปรและถ่วงน้ำหนักด้วยค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนนักเรียนทั้งหมดในห้องเรียนเดียวกัน จำนวนห้องเรียนในชั้นปีในโรงเรียนนั้น และจำนวนโรงเรียนประเภทนั้นในจังหวัด เป็นต้น
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการดื่มสุรา พฤติกรรมการดื่มสุรากับผลกระทบบที่เกิดขึ้น หรือระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ กับพฤติกรรมการดื่มสุรา เป็นต้น โดยใช้การวิเคราะห์ทั้งแบบ bivariate โดยใช้ Chi-square หรือ multivariate เพื่อปรับผลกระทบของตัวแปรอื่น โดยใช้ multinomial logistic regression เป็นต้น
3. เปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล (Trends) ระหว่างปี เมื่อเก็บข้อมูลหลายปีติดต่อกัน ซึ่งจากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี จะได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุราและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดของนักเรียน 4 ลักษณะ คือ
 1. การเปลี่ยนแปลงตามปี (secular trends or period effect)
 2. การเปลี่ยนแปลงตามอายุ (age effect)
 3. การเปลี่ยนแปลงตามรุ่น (cohort effect)
 4. การเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมและบทบาทหน้าที่ (environmental or role effect)

การดูแลและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

แบบเสนอโครงการวิจัยนี้จะต้องได้รับการรับรองให้ดำเนินการได้ จากคณะกรรมการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของประธานชุดโครงการ โครงการนี้เป็นการวิจัยแบบสังเกตโดยไม่มีการใส่มาตรการใดๆ (intervention) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนที่สุ่มเลือกได้สามารถปฏิเสธไม่เข้าร่วมในการศึกษาได้ หากโรงเรียนตอบรับที่จะเข้าร่วมในการศึกษา ผู้บริหารของโรงเรียนมีหน้าที่ชี้แจงให้นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนทราบโดยวาจาหรือจดหมายก็ได้ถึงการเข้าร่วมโครงการนี้ ก่อนจะให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจะชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินการของโครงการให้นักเรียนทราบก่อน การตอบแบบสอบถามของนักเรียนเป็นไปโดยความสมัครใจ โดยนักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อหรือเลขประจำตัวลงในแบบสอบถาม ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างดี การรายงานผลการศึกษาจะแสดงเป็นภาพรวมของทุกโรงเรียน หากโรงเรียนใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของโรงเรียน ทางคณะผู้วิจัยจะจัดทำรายงานเป็นสถิติรวมของโรงเรียนนั้นโดยเปรียบเทียบกับผลการศึกษาจากโรงเรียนอื่นๆ ทั้งหมด โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน

3. ข้อมูลโรงเรียน

จำนวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมในการศึกษา

โรงเรียนที่เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดจำนวน 201 โรงเรียนจาก 37 จังหวัดทั่วประเทศและ 3 เขตการศึกษาของ กรุงเทพมหานคร ได้จำนวนนักเรียนทั้งหมด 50,033 คน รวมเป็นโรงเรียนสายสามัญ 118 โรงเรียนสายอาชีพ 83 โรงเรียนสังกัดรัฐบาลในเขตเมือง 98 โรงเรียน เขตชนบท 55 โรงเรียน เอกชน 48 โรงเรียน

แบ่งตามเขตพื้นที่ได้ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 25 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 6,623 คน เป็นนักเรียนสายสามัญ 5,193 คน สายอาชีพ 1,430 คน ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 3,893 คน โรงเรียนเอกชน 2,730 คน

ภาคกลาง สุ่มเลือกได้ 10 จังหวัด 51 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 13,163 คน เป็นนักเรียนสายสามัญ 11,360 คน สายอาชีพ 1,803 คน ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 11,428 คน โรงเรียนเอกชน 1,735 คน

ภาคเหนือสุ่มเลือกได้ 8 จังหวัด 40 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 10,388 คน เป็นนักเรียนสายสามัญ 9,426 คน สายอาชีพ 962 คน ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 8,499 คน โรงเรียนเอกชน 1,889 คน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุ่มเลือกได้ 9 จังหวัด 46 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 12,370 คน เป็นนักเรียนสายสามัญ 10,201 คน สายอาชีพ 2,169 คน ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 11,533 คน โรงเรียนเอกชน 837 คน

ภาคใต้ สุ่มเลือกได้ 7 จังหวัด 36 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 7,479 คน เป็นนักเรียนสายสามัญ 6,104 คน สายอาชีพ 1,375 คน ประเภทโรงเรียนรัฐบาล 5,723 คน โรงเรียนเอกชน 1,756 คน (รายละเอียดดังแสดงในตาราง)

รวมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 จำนวน 14,283 คน ระดับชั้น ม. 3 จำนวน 14,368 คน ระดับชั้น ม.5 จำนวน 13,141 คน และระดับชั้นปวช.2 จำนวน 8,241 คน

จำนวนนักเรียนตัวอย่างรายภาค แยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

ภาค/จังหวัด	จำนวนโรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
กรุงเทพมหานคร		n=659		n=877		n=710		n=722		
1. เขตการศึกษา 1	4 โรงเรียน	137	151	133	170	117	116	150	52	1026
2. เขตการศึกษา 2	4 โรงเรียน	105	145	124	135	82	126	158	87	962
3. เขตการศึกษา 3	4 โรงเรียน	46	75	147	168	131	138	169	106	980
รวม	12 โรงเรียน	288	371	404	473	330	380	477	245	2968
ปริมณฑล		n=974		n=973		n=1007		n=708		
1. นนทบุรี	6 โรงเรียน	171	139	133	161	145	167	137	45	1098
2. นครปฐม	5 โรงเรียน	197	169	149	179	150	211	113	77	1245
3. สมุทรสาคร	5 โรงเรียน	162	136	190	156	100	232	199	137	1312
รวม	16 โรงเรียน	530	444	472	496	395	610	449	259	3655
ภาคกลาง		n=3951		n=3827		n=3582		n=1803		
1. ชัยนาท	5 โรงเรียน	164	244	211	163	118	278	136	63	1377
2. ระยอง	5 โรงเรียน	238	118	203	155	171	269	52	147	1353
3. นครนายก	7 โรงเรียน	170	142	216	252	104	181	122	56	1243
4. อุทัยฯ	5 โรงเรียน	156	249	136	263	120	274	93	104	1395
5. ชลบุรี	5 โรงเรียน	160	250	121	243	76	237	74	111	1272
6. กาญจนบุรี	4 โรงเรียน	260	124	235	133	183	217	87	2	1241
7. ราชบุรี	5 โรงเรียน	278	124	267	109	207	175	56	145	1361
8. สมุทรสงคราม	5 โรงเรียน	244	222	204	211	117	200	102	93	1393
9. สระบุรี	5 โรงเรียน	144	272	134	165	105	220	102	96	1238
10. สระแก้ว	5 โรงเรียน	173	219	179	227	90	240	96	66	1290
รวม	51 โรงเรียน	1987	1964	1906	1921	1291	2291	920	883	13163
ภาคเหนือ		n=3042		n=2993		n=2789		n=1564		
1. เชียงใหม่	5 โรงเรียน	221	171	229	189	138	251	101	95	1395
2. อุตรดิตถ์	5 โรงเรียน	186	157	161	198	87	161	80	114	1144
3.แพร่	5 โรงเรียน	252	139	230	190	192	192	111	89	1395
4. พะเยา	5 โรงเรียน	227	180	197	136	182	166	98	112	1298
5. แม่ฮ่องสอน	5 โรงเรียน	176	247	178	212	124	219	128	83	1367
6. นครสวรรค์	5 โรงเรียน	189	164	114	138	117	220	94	63	1099
7. พิจิตร	5 โรงเรียน	143	198	142	199	125	242	115	83	1247
8. เพชรบูรณ์	5 โรงเรียน	212	160	269	202	159	201	121	74	1398
รวม	40 โรงเรียน	1606	1416	1520	1464	1124	1652	848	713	10343

จำนวนนักเรียนตัวอย่างรายภาค แยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน (ต่อ)

ภาค/จังหวัด	จำนวนโรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ภาคอีสาน		n= 3493		n= 3463		n= 3225		n=2059		
1. จังหวัดศรีสะเกษ	5 โรงเรียน	179	259	129	197	112	274	135	70	1355
2. จังหวัดชัยภูมิ	5 โรงเรียน	152	283	113	248	50	437	44	136	1463
3. จังหวัดหนองบัวลำภู	6 โรงเรียน	163	238	110	241	139	328	177	83	1479
4. จังหวัดเลย	5 โรงเรียน	181	205	179	225	115	228	32	153	1318
5. จังหวัดหนองคาย	5 โรงเรียน	156	183	253	372	79	171	101	102	1417
6. จังหวัดนครพนม	5 โรงเรียน	162	240	120	272	95	230	70	80	1269
7. จังหวัดมหาสารคาม	5 โรงเรียน	162	158	163	174	165	162	148	133	1265
8. จังหวัดร้อยเอ็ด	5 โรงเรียน	245	153	275	129	156	243	79	71	1351
9. จังหวัดกาฬสินธุ์	5 โรงเรียน	133	241	90	173	85	156	179	266	1323
รวม	46 โรงเรียน	1533	1960	1432	2031	996	2229	965	1094	12240
ภาคใต้		n=2146		n=2209		n=1742		n=1363		
1. จังหวัดนราธิวาส	4 โรงเรียน	91	144	56	122	29	50	105	54	651
2. จังหวัดระนอง	5 โรงเรียน	130	163	100	196	74	128	73	87	951
3. จังหวัดตรัง	5 โรงเรียน	111	226	133	244	104	237	80	102	1237
4. จังหวัดชุมพร	5 โรงเรียน	150	169	168	206	111	175	32	107	1118
5. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	7 โรงเรียน	191	172	159	206	104	288	117	92	1329
6. จังหวัดพังงา	5 โรงเรียน	126	152	111	151	110	118	131	26	925
7. จังหวัดสตูล	5 โรงเรียน	146	175	157	200	67	147	283	74	1249
รวม	36 โรงเรียน	945	1,201	884	1,325	599	1,143	821	542	7460

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ : ไม่ระบุเพศ 3 คน, ปริมณฑล : ไม่ระบุเพศ 7 คน, ภาคเหนือ : ไม่ระบุเพศ 45 คน, ภาคอีสาน : ไม่ระบุเพศ 130 คน, ภาคใต้ : ไม่ระบุเพศ 19 คน

จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียน สายการเรียน ชั้นปีและเพศ

ตัวแปร	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
กรุงเทพมหานคร									
ประเภท									
รัฐบาล	162	264	152	277	130	206	0	0	1191
เอกชน	126	107	252	196	200	174	477	245	1777
สายการเรียน									
สามัญ	288	371	404	473	330	380	0	0	2246
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	477	245	722
ปริมณฑล									
ในเขต	261	192	248	264	228	304	262	131	1890
นอกเขต	269	252	224	232	167	306	187	128	1765
ประเภท									
รัฐบาล	371	332	377	380	302	444	323	173	2702
เอกชน	159	112	95	116	93	166	126	86	953
สายการเรียน									
สามัญ	530	444	472	496	395	610	0	0	2947
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	449	259	708
ภาคกลาง									
ในเขต	747	969	692	915	442	1062	879	823	6529
นอกเขต	1240	994	1215	1004	849	1231	41	60	6634
ประเภท									
รัฐบาล	1645	1884	1635	1855	1050	2153	749	564	11535
เอกชน	342	79	272	64	241	140	171	319	1628
สายการเรียน									
สามัญ	1987	1963	1907	1919	1291	2293	0	0	11360
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	920	883	1803
ภาคเหนือ									
ในเขต	1110	875	1073	811	790	971	779	688	7097
นอกเขต	499	544	447	653	331	678	69	25	3246
ประเภท									
รัฐบาล	1199	1211	1125	1256	906	1461	848	713	8719
เอกชน	410	208	395	208	215	188	0	0	1624
สายการเรียน									
สามัญ	1609	1419	1520	1464	1121	1649	0	0	8782
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	848	713	1561

จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียน สายการเรียน ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

ตัวแปร	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ภาคอีสาน									
ในเขต	943	1192	900	1226	558	1528	965	1094	8406
นอกเขต	590	768	532	805	438	702	0	0	3835
ประเภท									
รัฐบาล	1327	1714	1384	1983	973	2209	867	947	11404
เอกชน	206	246	48	48	23	20	98	147	836
สายการเรียน									
สามัญ	1533	1960	1432	2030	996	2230	0	0	10181
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	965	1094	2059
ภาคใต้									
ในเขต	529	698	505	762	356	705	526	229	4310
นอกเขต	416	503	379	563	243	438	295	313	3150
ประเภท									
รัฐบาล	717	899	642	967	445	869	767	401	5707
เอกชน	228	302	242	358	154	274	54	141	1753
สายการเรียน									
สามัญ	945	1201	884	1325	599	1143	0	0	6097
อาชีวะ	0	0	0	0	0	0	821	542	1363

4. ผลการศึกษา 1

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งหมด 50,033 คน เป็นชาย 22,723 คน (ร้อยละ 45.6) หญิง 27,106 คน (ร้อยละ 54.4) ไม่ระบุเพศ 204 คน สัดส่วนของนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายในทุกระดับชั้น อายุเฉลี่ยของนักเรียนเท่ากับ 15.1 ปี นักเรียนร้อยละ 94.5 นับถือศาสนาพุทธ เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเขตเมืองร้อยละ 63 เขตชนบทร้อยละ 37 และกระจายตามภาคต่างๆตามสัดส่วนของจำนวนจังหวัดที่เก็บข้อมูล ส่วนใหญ่จะพักอาศัยที่บ้าน/แฟลตของครอบครัว พักกับพ่อแม่และไม่ได้ทำงานเพื่อหารายได้ นักเรียนประมาณร้อยละ 47 มีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับเกรด 3-4 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=14283)	ม. 3 (n=14368)	ม. 5 (n=13141)	ปวช.2 (n=8241)	รวม (n=50033)
อายุ : mean±sd	12.9±0.6	14.8±0.6	16.8±0.7	17.1±0.9	15.1±1.8
median (พิสัย)	13(11-19)	15(10-21)	17(11-21)	17(11-30)	15(10-30)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(73)	(62)	(122)	(51)	(308)
เพศ : ชาย	48.4	46.2	36.3	54.5	45.6
หญิง	51.6	53.8	63.7	45.5	54.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(41)	(99)	(25)	(204)
ศาสนา : พุทธ	94.3	94.6	95.5	93.2	94.5
อิสลาม	4.2	4.1	2.9	5.2	4.0
คริสต์และอื่นๆ	1.5	1.3	1.6	1.6	1.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(44)	(28)	(93)	(22)	(187)
สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ	7.7	8.8	9.3	8.0	8.5
ปริมณฑล	4.0	3.5	3.0	7.0	4.1
ภาคกลาง	26.9	26.0	26.3	20.8	25.5
ภาคเหนือ	20.2	19.8	20.9	19.6	20.2
ภาคอีสาน	26.0	26.0	26.6	27.3	26.4
ภาคใต้	15.2	15.9	13.9	17.3	15.4
ต่างประเทศ	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(523)	(498)	(544)	(334)	(1,899)
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ	4.6	6.1	5.4	8.8	5.9
ปริมณฑล	6.8	6.8	7.7	8.6	7.3
ภาคกลาง	27.7	26.6	27.2	21.9	26.3
ภาคเหนือ	21.3	20.8	21.2	19.0	20.8
ภาคอีสาน	24.6	24.2	25.1	25.1	24.7
ภาคใต้	15.0	15.4	13.3	16.7	15.0
เขตที่ตั้ง : ในเมือง	58.1	58.6	59.9	84.1	63.0
ชนบท	41.9	41.4	40.1	15.9	37.0
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน* :					
ไทย	80.9	80.5	83.2	78.0	80.9
ไทยท้องถิ่น	39.9	40.9	42.8	40.6	41.1
จีน	1.6	2.1	2.8	1.0	1.9
มลายู/ยาวี	1.9	1.6	0.8	1.6	1.5
สปป.ลาว	1.2	1.1	1.2	1.0	1.2
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	12.9	9.1	13.0	11.4	11.6

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ	ม.1 (n=14283)	ม. 3 (n=14368)	ม. 5 (n=13141)	ปวช.2 (n=8241)	รวม (n=50033)
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	87.5	89.1	88.6	76.5	86.4
หอพักของโรงเรียน	3.1	2.8	2.9	3.1	3.0
หอพักนอกโรงเรียน	0.9	0.9	2.2	9.9	2.7
บ้านเช่า	5.7	4.7	4.3	9.0	5.6
อื่นๆ	2.8	2.5	2.1	1.4	2.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(145)	(98)	(143)	(43)	(429)
พักอยู่กับ :					
อยู่คนเดียว	1.0	0.8	1.4	3.7	1.5
พ่อ แม่	79.5	82.0	81.6	70.7	79.3
เพื่อน	2.6	2.6	3.7	11.7	4.4
ญาติพี่น้อง	13.4	11.8	11.0	12.2	12.1
อื่นๆ	3.5	2.9	2.4	1.8	2.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(102)	(74)	(139)	(31)	(346)
ผลการเรียน: เกรดเฉลี่ย					
mean±sd	3.1±0.9	2.9±0.6	2.9±0.6	2.8±0.7	2.9±0.7
เกรด 0.1-1.0	4.1	1.9	0.8	0.9	1.9
เกรด 1.1-2.0	4.9	10.3	7.4	11.1	8.4
เกรด 2.1-3.0	32.2	40.6	47.8	52.4	43.0
เกรด 3.1-4.0	58.8	47.2	44.0	35.6	46.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4,914)	(1,566)	(836)	(684)	(8,000)
ทำงานเพื่อหารายได้ :					
ไม่ทำ	79.8	77.4	76.4	67.5	76.2
ทำ	20.2	22.6	23.6	32.5	23.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(265)	(213)	(214)	(113)	(805)

* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา

4.1 การรับรู้ต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ก. ปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียน

เมื่อถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน นักเรียนชายหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งคิดว่านักเรียนในโรงเรียนของตนมีปัญหาการทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย/ทำร้ายคนอื่น ยกพวกตีกัน และทะเลาะวิวาท แต่ส่วนใหญ่คิดว่ามีปัญหานี้เหล่านี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น นักเรียนชายประมาณร้อยละ 32 และหญิงร้อยละ 36 คิดว่านักเรียนในโรงเรียนมีปัญหาการใช้ยาเสพติด ในขณะที่นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 42 และ 44 คิดว่านักเรียนในโรงเรียนของตนมีปัญหาการดื่มสุร่าอย่างหนัก โดยนักเรียนชั้น ปวช.2 มีอัตราการมองว่ามีปัญหาการใช้ยาเสพติดและการดื่มสุร่าอย่างหนักในนักเรียนในโรงเรียนของตนสูงกว่านักเรียนชั้นปีอื่นๆ และนักเรียนชั้นโตกว่ามีแนวโน้มที่จะมองว่ามีปัญหาทั้งสองด้านนี้มากกว่านักเรียนชั้นเล็กกว่าอีกด้วย (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัญหาด้านต่างๆ ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	34.8	36.7	35.1	42.2	36.9	39.5	35.2	32.0	35.2	35.4
มีเล็กน้อย	46.5	43.7	44.3	41.4	44.2	43.4	42.8	45.0	42.7	43.6
มีปานกลาง	14.9	16.1	17.0	13.9	15.5	14.8	18.6	19.3	18.1	17.7
มีปัญหามาก	3.8	3.5	3.7	2.6	3.4	2.4	3.4	3.7	4.0	3.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(95)	(71)	(54)	(48)	(268)	(59)	(90)	(67)	(19)	(235)
การใช้จ่ายยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	79.1	70.4	59.6	56.3	68.0	75.1	64.9	58.0	52.9	63.9
มีเล็กน้อย	15.0	21.9	28.5	29.1	22.6	19.6	25.9	30.3	29.6	26.1
มีปานกลาง	4.4	5.7	8.6	10.8	6.9	4.3	7.3	8.7	13.5	7.8
มีปัญหามาก	1.5	1.9	3.3	3.8	2.5	1.0	1.9	3.1	4.0	2.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(100)	(72)	(57)	(53)	(282)	(70)	(88)	(72)	(22)	(252)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	95.5	94.8	94.0	92.8	94.5	93.3	93.2	92.4	86.4	92.1
มีเล็กน้อย	3.3	4.1	4.9	5.0	4.2	5.9	6.1	6.9	12.0	7.1
มีปานกลาง	0.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.4	0.3	0.4	1.0	0.5
มีปัญหามาก	0.8	0.6	0.6	1.2	0.8	0.3	0.4	0.2	0.6	0.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(95)	(75)	(50)	(48)	(268)	(60)	(88)	(72)	(21)	(241)
ชมชื่น กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	89.8	89.0	86.5	82.3	87.4	89.5	88.9	87.3	82.9	87.7
มีเล็กน้อย	8.3	8.7	11.3	13.3	10.0	8.8	9.8	10.9	12.8	10.3
มีปานกลาง	1.1	1.5	1.3	2.5	1.5	1.3	0.8	1.4	3.0	1.4
มีปัญหามาก	0.9	0.8	0.9	2.0	1.1	0.4	0.5	0.4	1.2	0.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(105)	(71)	(55)	(52)	(283)	(63)	(88)	(72)	(21)	(244)

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนต่อปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	73.0	62.2	50.1	39.1	58.4	67.8	58.9	50.4	41.4	56.3
มีเล็กน้อย	20.7	27.2	33.4	35.6	28.2	24.4	29.0	32.1	32.3	29.1
มีปานกลาง	5.0	8.5	12.5	18.5	10.2	6.2	9.6	13.4	17.8	11.0
มีปัญหามาก	1.3	2.1	4.1	6.9	3.2	1.6	2.5	4.2	8.5	3.6
ไม่ตอบ(จำนวน)	(104)	(74)	(51)	(50)	(279)	(67)	(84)	(78)	(19)	(248)
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	51.8	43.9	38.1	44.0	45.1	42.6	35.1	30.6	34.7	35.7
มีเล็กน้อย	31.5	35.7	39.0	37.2	35.4	36.7	36.4	39.1	35.9	37.2
มีปานกลาง	12.2	14.6	16.7	13.5	14.1	14.6	19.6	21.6	19.5	18.8
มีปัญหามาก	4.5	5.9	6.2	5.3	5.4	6.2	8.9	8.7	10.0	8.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(98)	(70)	(51)	(49)	(268)	(58)	(89)	(66)	(19)	(232)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	34.1	30.5	27.2	34.3	31.7	28.2	22.4	19.2	23.0	23.1
มีเล็กน้อย	41.8	42.2	42.7	42.5	42.2	42.7	39.7	41.1	41.0	41.1
มีปานกลาง	17.4	19.6	22.0	17.2	19.0	20.0	24.7	26.7	22.8	23.8
มีปัญหามาก	6.6	7.8	8.1	6.1	7.2	9.1	13.2	12.9	13.2	12.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(97)	(75)	(56)	(51)	(279)	(58)	(88)	(79)	(18)	(243)

ข. สภาพแวดล้อมด้านการดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติดในโรงเรียน

เมื่อให้นักเรียนประมาณสัดส่วนของนักเรียนในโรงเรียนของตนที่ดื่มสุรา นักเรียนชายทั้งหมดคิดว่านักเรียนในโรงเรียนประมาณร้อยละ 26 ดื่มสุรา และเพื่อนของตนเองประมาณร้อยละ 22 ดื่มสุราด้วย ในขณะที่นักเรียนหญิงประมาณค่าเดียวกันนี้ เป็นร้อยละ 26 และ 17 ตามลำดับ โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนชั้นปวช. 2 ประมาณจำนวนนักเรียนในโรงเรียนและเพื่อนของตนเองว่าเป็นผู้ดื่มสุราเป็นสัดส่วนที่สูงมากกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ มาก แต่เมื่อให้นักเรียนประมาณว่านักเรียนในโรงเรียนและเพื่อนของตนเองสัดส่วนเท่าไรที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหาทั้งนักเรียนชายและหญิงประมาณค่าดังกล่าวต่ำลงมาก เป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 11 ในนักเรียนชาย และร้อยละ 13 และร้อยละ 9 ในนักเรียนหญิง แสดงว่านักเรียนรับรู้ว่าเป็นเพื่อนในโรงเรียนและเพื่อนของตนเองดื่มสุราแต่มีเพียงส่วนน้อยที่ดื่มจนเป็นปัญหา แต่นักเรียนจะมองว่ามีนักเรียนในโรงเรียนของตนและเพื่อนที่สูบบุหรี่จำนวนมากว่าการดื่มสุรา แต่สัดส่วนของการใช้สารเสพติดต่ำกว่ามาก (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้านการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
จำนวนร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
mean±sd	17.5±19.8	22.2±22.7	25.6±24.4	43.4±29.8	25.7±25.6	18.3±20.3	24.6±24.1	27.7±25.4	39.5±29.1	25.9±25.2
0-40 %	88.5	82.6	77.8	45.9	76.1	87.3	78.0	73.6	53.8	75.8
41-60%	8.6	11.7	13.1	24.9	13.7	9.1	13.9	15.2	22.2	14.1
>60 %	3.0	5.8	9.1	29.3	10.3	3.6	8.2	11.2	24.0	10.1
ไม่ตอบ(จำนวน)	(167)	(184)	(95)	(76)	(522)	(214)	(217)	(176)	(81)	(688)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
mean±sd	9.9±16.8	18.2±22.7	24.9±27.4	42.0±31.8	21.8±26.9	8.0±14.7	15.8±20.8	20.7±24.1	31.1±27.9	17.3±22.8
0-40 %	94.7	85.5	76.3	52.2	79.8	96.1	88.2	82.1	67.8	85.7
41-60%	3.0	8.5	11.6	19.1	9.6	2.6	7.4	9.8	17.1	8.2
>60 %	2.3	6.0	12.2	28.7	10.7	1.4	4.4	8.1	15.1	6.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(138)	(165)	(97)	(85)	(485)	(190)	(214)	(188)	(77)	(669)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
mean±sd	9.5±15.7	11.8±17.0	12.7±17.9	26.6±24.6	14.2±19.6	9.5±15.6	12.4±18.1	13.4±18.7	23.6±24.3	13.5±19.2
0-40 %	95.0	93.4	92.4	75.4	90.1	95.0	92.4	91.1	79.0	90.8
41-60%	3.4	4.8	5.3	16.0	6.7	3.5	5.0	6.1	13.0	6.1
>60 %	1.6	1.9	2.4	8.6	3.2	1.5	2.6	2.9	8.0	3.1
ไม่ตอบ(จำนวน)	(143)	(166)	(96)	(72)	(477)	(195)	(215)	(184)	(83)	(677)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
mean±sd	6.3±13.5	9.4±16.4	10.3±17.5	22.7±24.3	11.3±18.7	4.9±11.5	8.2±15.3	9.3±16.6	17.5±22.1	9.0±16.4
0-40 %	96.8	94.1	93.1	79.7	91.9	97.9	95.4	93.9	86.3	94.3
41-60%	2.3	4.1	4.6	12.9	5.4	1.5	3.1	4.1	8.6	3.7
>60 %	0.9	1.8	2.3	7.5	2.8	0.6	1.5	2.1	5.1	1.9
ไม่ตอบ(จำนวน)	(138)	(163)	(96)	(73)	(470)	(187)	(215)	(175)	(80)	(657)

ตารางที่ 3 การรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้านการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)


	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
mean±sd	22.4±24.0	25.9±25.1	25.9±25.0	47.8±31.8	29.2±27.9	19.4±21.4	25.4±25.0	26.3±25.1	38.5±29.9	25.8±25.5
0-40 %	81.5	77.7	78.2	42.4	72.0	85.6	77.6	76.9	56.6	76.7
41-60%	11.2	12.6	11.7	20.2	13.5	10.0	12.6	12.8	19.9	13.0
>60 %	7.3	9.7	10.1	37.4	14.5	4.4	9.8	10.3	23.6	10.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(144)	(160)	(94)	(79)	(477)	(190)	(219)	(171)	(81)	(661)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
mean±sd	11.0±16.9	17.5±22.1	19.4±24.2	40.5±31.3	20.5±25.6	7.8±13.8	14.3±19.6	15.4±20.7	24.2±25.8	14.2±20.3
0-40 %	94.1	86.9	83.8	54.7	82.1	96.5	90.1	88.8	76.9	89.6
41-60%	3.9	7.8	8.4	18.5	8.9	2.4	6.6	6.8	13.0	6.4
>60 %	2.1	5.3	7.8	26.8	9.1	1.1	3.3	4.5	10.1	4.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(145)	(179)	(113)	(83)	(520)	(206)	(243)	(219)	(99)	(767)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
mean±sd	5.8±12.6	7.3±13.4	8.2±13.9	19.1±21.2	9.4±15.9	5.1±11.1	7.6±13.9	8.0±13.8	14.3±19.4	8.0±14.4
0-40 %	97.4	96.8	96.5	85.6	94.7	98.1	96.4	96.2	90.0	95.9
41-60%	1.9	2.2	2.5	10.3	3.8	1.3	2.4	2.9	7.0	2.9
>60 %	0.7	1.1	1.0	4.2	1.6	0.6	1.2	0.9	3.0	1.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(130)	(161)	(90)	(69)	(450)	(180)	(217)	(171)	(81)	(649)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
mean±sd	4.1±11.4	5.7±13.3	6.6±13.6	16.0±21.1	7.5±15.4	2.9±8.9	5.1±12.2	5.0±12.0	9.7±17.1	5.1±12.3
0-40 %	97.9	97.0	96.6	87.9	95.4	98.8	97.4	97.4	93.5	97.3
41-60%	1.4	1.9	2.4	8.1	3.1	0.9	1.7	1.8	4.2	1.9
>60 %	0.7	1.2	1.0	4.1	1.6	0.4	0.9	0.8	2.2	0.9
ไม่ตอบ(จำนวน)	(120)	(150)	(90)	(68)	(428)	(171)	(209)	(169)	(81)	(630)

ค. นโยบาย ภาวะเป็ยบของโรงเรียนด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาการติ่มสุรา


นักเรียนทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่รับรู้ว่โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีการบังคับใช้ภาวะเป็ยบเกี่ยวกับการติ่มสุราและการใช้สารเสพติด เห็นได้จากคำตอบในภาพที่ 1 ซึ่งนักเรียนทุกชั้นปีมากกว่าร้อยละ 60 คิดว่โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการติ่มสุราและใช้สารเสพติดของนักเรียน มีการบังคับใช้ภาวะเป็ยบเหล่านี้ อีกทั้งห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนติ่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน และนักเรียนมากกว่าครึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งยังมองว่โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ติ่มสุรา อัตราการตอบคำถามแต่ละข้อในหมวดนี้ไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างนักเรียนแต่ละชั้นปี แต่ นักเรียนหญิงค่อนข้างจะมองเห็นว่โรงเรียนมีนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่านักเรียนชาย และที่น่าสังเกตคือ นักเรียนชายและหญิงระดับ ปวช.2 สัดส่วนมากกว่านักเรียนระดับชั้นอื่นๆ คิดว่โรงเรียนยอมให้เด็กนักเรียนติ่มสุราได้ เพียงแต่ให้ติ่มอย่างปลอดภัย ไม่ให้ติ่มจนเมาหรือเกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะรับรู้ว่โรงเรียนมีนโยบาย ภาวะเป็ยบของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ก็มีนักเรียนจำนวนไม่น้อย (ประมาณร้อยละ 20) ที่ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่โรงเรียนของตนเองมีนโยบายหรือภาวะเป็ยบเกี่ยวกับเรื่องการติ่มสุราและใช้สารเสพติดของนักเรียน (ตารางที่ 4)

ภาพที่ 1 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบ กติกาของโรงเรียน (ร้อยละ)

นักเรียนชาย



นักเรียนหญิง



ตารางที่ 4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบ กติกาของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	56.5	57.2	52.5	48.2	54.2	58.3	60.1	56.9	51.4	57.4
ไม่ใช่	25.6	23.2	28.0	24.0	25.1	28.3	27.0	31.2	30.0	29.0
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	18.0	19.6	19.5	27.8	20.7	13.4	12.9	11.9	18.6	13.6
ไม่ตอบ(จำนวน)	(73)	(47)	(38)	(45)	(203)	(51)	(57)	(69)	(24)	(201)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	9.2	11.6	12.8	26.3	14.0	6.4	7.1	8.0	20.1	8.9
ไม่ใช่	75.8	73.3	73.1	53.0	70.0	78.8	79.8	80.1	62.4	77.2
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	15.0	15.1	14.1	20.7	16.0	14.9	13.1	12.0	17.5	13.9
ไม่ตอบ(จำนวน)	(64)	(38)	(35)	(42)	(179)	(37)	(54)	(56)	(22)	(169)
โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	10.3	13.8	17.4	35.2	17.7	8.1	10.7	14.5	29.4	13.7
ไม่ใช่	73.2	68.5	66.0	43.7	64.5	74.8	71.9	67.4	47.5	67.9
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	16.5	17.7	16.6	21.2	17.8	17.1	17.3	18.2	23.1	18.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(67)	(42)	(39)	(48)	(196)	(45)	(66)	(66)	(22)	(199)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	11.1	13.1	15.2	16.3	13.6	5.1	6.7	8.4	10.0	7.2
ไม่ใช่	68.8	65.9	65.0	58.7	65.2	78.6	76.8	76.3	71.3	76.4
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	20.1	21.1	19.8	25.0	21.3	16.3	16.5	15.3	18.6	16.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(77)	(54)	(39)	(48)	(218)	(53)	(62)	(73)	(21)	(209)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	74.6	74.7	73.4	69.4	73.3	81.7	82.3	81.5	77.1	81.1
ไม่ใช่	9.6	9.8	11.1	12.3	10.5	5.5	5.9	6.9	8.3	6.4
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	15.9	15.5	15.6	18.3	16.2	12.9	11.9	11.6	14.6	12.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(84)	(53)	(40)	(48)	(225)	(52)	(73)	(71)	(25)	(221)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด										
ใช่	63.3	68.2	73.2	66.7	67.5	63.2	70.3	74.8	70.3	69.7
ไม่ใช่	15.5	12.3	10.9	13.4	13.2	12.1	10.2	8.8	9.7	10.2
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	21.2	19.5	15.9	19.9	19.3	24.7	19.6	16.4	20.1	20.1
ไม่ตอบ(จำนวน)	(91)	(58)	(40)	(49)	(238)	(71)	(85)	(85)	(25)	(266)
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	55.3	51.5	52.5	52.6	53.1	61.2	58.2	60.7	63.8	60.5
ไม่ใช่	22.8	24.8	27.0	23.9	24.5	18.6	21.0	21.8	18.1	20.2
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	21.9	23.7	20.6	23.5	22.5	20.2	20.8	17.5	18.2	19.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(76)	(59)	(43)	(43)	(221)	(72)	(84)	(78)	(28)	(262)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	63.9	61.8	58.1	61.7	61.7	65.3	63.5	62.1	67.9	64.2
ไม่ใช่	10.4	13.8	18.0	15.8	14.0	6.3	10.5	13.4	11.8	10.4
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	25.6	24.5	23.9	22.5	24.3	28.4	26.0	24.5	20.4	25.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(138)	(95)	(57)	(74)	(364)	(82)	(85)	(93)	(47)	(307)

ง. การปฏิบัติของโรงเรียนต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมการดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด

ตั้งแต่เปิดเรียนในปีการศึกษาขึ้นมา (เป็นเวลาประมาณเกือบสิบเดือนจนถึงวันเก็บข้อมูล) นักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เคยถูกตรวจค้นหรือตักเตือนจากโรงเรียนเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด โดยนักเรียนชายร้อยละ 6.2 นักเรียนหญิงร้อยละ 1.7 เคยถูกตรวจค้นพบว่า มี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง นักเรียนชายและหญิงประมาณร้อยละ 6 เคยถูกสั่งปิดงานรื่นเริงในโรงเรียนเนื่องจากพบว่าในงานนั้นมีนักเรียนดื่มสุรา นักเรียนชายร้อยละ 7.6 นักเรียนหญิงร้อยละ 2.2 เคยถูกปรับหรือลงโทษเพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด และในจำนวนนักเรียนชายที่ดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดมีนักเรียนร้อยละ 3.3 ถูกส่งต่อไปปรับการบำบัด นักเรียนทั้งชายและหญิงในระดับชั้น ปวช.2 ถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุราและการสูบบุหรี่สูงกว่านักเรียนสายสามัญ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง										
ไม่เคยเลย	97.0	94.2	93.5	88.8	93.8	98.9	98.2	98.5	97.1	98.3
เคย 1 ครั้ง	1.9	3.7	4.1	6.2	3.7	0.8	1.3	1.0	2.1	1.2
เคย 2- 3 ครั้ง	1.1	2.1	2.5	5.0	2.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(38)	(23)	(29)	(126)	(21)	(35)	(36)	(11)	(103)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	96.1	93.1	92.4	87.4	92.8	98.4	97.3	97.9	97.0	97.7
เคย 1 ครั้ง	2.6	4.4	4.8	6.9	4.4	1.1	1.7	1.4	2.0	1.5
เคย 2- 3 ครั้ง	1.3	2.5	2.8	5.7	2.8	0.6	1.0	0.8	1.0	0.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(47)	(40)	(21)	(32)	(140)	(27)	(43)	(44)	(9)	(123)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรืออย่าทำอะไรเป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนๆกำลังดื่มสุรากัน										
ไม่เคยเลย	95.2	90.4	84.8	71.1	86.9	97.2	94.3	93.0	85.5	93.4
เคย 1 ครั้ง	3.4	5.4	7.7	14.3	7.0	1.9	3.7	4.2	8.2	4.0
เคย 2- 3 ครั้ง	1.4	4.3	7.6	14.6	6.1	0.9	2.0	2.9	6.3	2.6
ไม่ตอบ(จำนวน)	(100)	(84)	(44)	(48)	(276)	(57)	(80)	(67)	(13)	(217)
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	96.4	93.7	93.7	91.6	94.1	96.6	93.3	93.5	94.4	94.4
เคย 1 ครั้ง	3.1	5.0	4.5	6.0	4.5	2.9	5.5	5.0	4.5	4.5
เคย 2- 3 ครั้ง	0.6	1.3	1.9	2.4	1.4	0.5	1.2	1.5	1.1	1.1
ไม่ตอบ(จำนวน)	(77)	(68)	(50)	(53)	(248)	(54)	(66)	(76)	(18)	(214)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(3,942)	(3,672)	(2,425)	(1,507)	(11,546)	(5,031)	(5,329)	(5,715)	(2,059)	(18,134)
ไม่เคยเลย	92.7	84.4	80.8	78.6	84.3	95.9	92.9	92.5	89.1	92.9
เคย 1 ครั้ง	4.8	9.7	11.0	12.0	9.3	2.8	4.7	4.8	7.0	4.7
เคย 2- 3 ครั้ง	2.6	5.9	8.3	9.4	6.5	1.3	2.4	2.6	3.8	2.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(51)	(43)	(29)	(32)	(155)	(29)	(48)	(44)	(11)	(132)

ตารางที่ 5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(3,978)	(3,918)	(2,940)	(1,914)	(12,750)	(5,164)	(5,787)	(6,446)	(2,480)	(19,877)
ไม่เคยเลย	91.7	80.1	78.3	70.0	80.5	98.2	96.4	96.4	92.1	96.2
เคย 1 ครั้ง	5.7	11.9	11.6	15.7	11.0	1.2	2.5	2.2	4.4	2.3
เคย 2- 3 ครั้ง	2.6	8.0	10.1	14.3	8.4	0.7	1.2	1.4	3.5	1.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(56)	(42)	(31)	(35)	(164)	(32)	(54)	(50)	(14)	(150)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้										
สารเสพติด(จำนวน)	(3,953)	(3,868)	(2,666)	(1,677)	(12,164)	(5,096)	(5,604)	(6,109)	(2,312)	(19,121)
ไม่เคยเลย	97.2	91.7	91.6	88.8	92.4	99.2	97.9	97.5	95.6	97.8
เคย 1 ครั้ง	2.0	6.1	6.1	8.1	5.5	0.5	1.8	1.9	3.3	1.7
เคย 2- 3 ครั้ง	0.8	2.3	2.3	3.1	2.1	0.3	0.3	0.6	1.1	0.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(55)	(45)	(25)	(33)	(158)	(32)	(45)	(42)	(11)	(130)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้										
สารเสพติด(จำนวน)	(3,831)	(3,751)	(2,647)	(1,630)	(11,859)	(5,000)	(5,532)	(6,057)	(2,259)	(18,848)
ไม่เคยเลย	98.6	95.7	97.1	95.3	96.7	99.6	99.3	99.4	98.6	99.3
เคย 1 ครั้ง	1.0	3.0	2.0	3.6	2.4	0.3	0.4	0.4	1.2	0.5
เคย 2- 3 ครั้ง	0.4	1.3	0.9	1.2	0.9	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(55)	(48)	(30)	(35)	(168)	(32)	(46)	(42)	(10)	(130)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

สรุป

บทนี้เป็นรายงานผลการศึกษาด้านการรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน รวมทั้งนโยบาย กฎระเบียบของโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัญหาการดื่มสุราของนักเรียน ส่วนสำคัญที่พบจากการศึกษานี้คือ นักเรียนมีการรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง และระหว่างนักเรียนในแต่ละระดับชั้น นักเรียนทั้งชายและหญิงมองว่ามีนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 26 ดื่มสุราและมีเพื่อนของตนเองเฉลี่ยร้อยละ 22 และ 17 ดื่มสุราด้วย แต่มองว่ามีนักเรียนในโรงเรียนหรือเพื่อนของตนเองเพียงส่วนน้อยที่ดื่มมากหรือดื่มจนเป็นปัญหา และนักเรียนจะมองว่ามีนักเรียนในโรงเรียนของตนและเพื่อนที่สูบบุหรี่จำนวนมากกว่านักเรียนที่ดื่มสุรา นักเรียนส่วนใหญ่ทราบว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมปัญหาการดื่มสุราของนักเรียน แต่นักเรียนสายอาชีพค่อนข้างจะมองเห็นว่าโรงเรียนมีการอนุญาตให้ดื่มสุราได้ แต่ให้ดื่มอย่างปลอดภัยหรือไม่ให้ดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหามากกว่านักเรียนสายสามัญ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่านักเรียนจะรับทราบว่าโรงเรียนมีนโยบายหรือกฎระเบียบเกี่ยวกับการดื่มสุราหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ก็ยังมีนักเรียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เคยได้รับการปฏิบัติโดยตรงจากโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ เช่นการถูกตรวจค้นสุรา บุหรี่หรือสารเสพติด การถูกปรับถูกลงโทษหรือการได้รับคำเตือน การแนะนำ และการส่งต่อไปรับการบำบัดรักษา ข้อมูลในบทนี้ทั้งหมดจัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราของเยาวชน ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ในบทอื่นต่อไป

4.2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษานี้ค่อนข้างมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านการระมัดระวังความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ และพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เห็นได้จากข้อมูลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งสวมหมวกกันน็อคเวลาขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยเวลานั่งในรถยนต์ ด้านหน้าข้างคนขับ โดยนักเรียนชายมีอัตราเหล่านี้สูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนทุกระดับชั้นมีอัตราการขับขี่รถยนต์หลังจากที่เพิ่งดื่มสุรามา น้อยมาก (ร้อยละ 1.2-4) และนักเรียนชายหญิงน้อยกว่าร้อยละ 10 เคยพกพา มีด ปืน หรือไม้กระบองหรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ สำหรับการชกต่อย ตบตีต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล เคยถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ และเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ทั้งชายและหญิงมีอัตราการมีพฤติกรรมดังกล่าวสูงกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(735)	(620)	(329)	(196)	(1,880)	(834)	(721)	(680)	(194)	(2,429)
ไม่เคยเลย	24.8	19.3	14.1	11.7	18.3	22.6	19.3	14.2	15.2	18.0
นานๆครั้ง	41.9	42.9	38.0	34.5	39.8	46.9	49.7	44.5	40.9	46.1
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	33.3	37.9	47.9	53.8	41.9	30.5	30.9	41.3	43.9	35.9
ไม่ตอบ(จำนวน)	(361)	(325)	(178)	(257)	(1,121)	(258)	(220)	(193)	(161)	(832)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(711)	(700)	(499)	(594)	(2,504)	(695)	(767)	(847)	(491)	(2,800)
ไม่เคยเลย	26.0	23.5	18.2	21.7	22.8	22.0	23.0	17.7	23.9	21.2
นานๆครั้ง	35.6	36.0	35.7	36.2	35.9	39.7	41.2	40.2	40.1	40.3
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	38.4	40.5	46.2	42.1	41.4	38.3	35.8	42.1	36.0	38.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(398)	(350)	(208)	(300)	(1,256)	(265)	(258)	(219)	(191)	(933)
ขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากเพิ่งดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	94.2	85.1	76.6	57.5	80.6	97.6	93.7	91.8	82.6	92.7
นานๆครั้ง	4.1	11.7	19.3	33.8	15.4	1.8	5.4	7.1	14.6	6.2
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	1.7	3.2	4.1	8.7	4.0	0.6	0.9	1.2	2.8	1.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(522)	(495)	(232)	(307)	(1,556)	(398)	(339)	(348)	(227)	(1,312)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	85.7	79.8	81.0	71.0	80.1	93.2	91.2	90.5	88.7	91.2
นานๆครั้ง	11.4	16.2	15.2	22.0	15.7	5.5	7.2	7.7	8.8	7.1
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	3.0	4.0	3.8	6.9	4.2	1.3	1.6	1.8	2.6	1.7
ไม่ตอบ(จำนวน)	(484)	(448)	(226)	(305)	(1,463)	(340)	(320)	(304)	(223)	(1,187)

ตารางที่ 6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่น มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	93.7	91.5	90.4	82.6	90.2	98.6	98.1	98.6	96.5	98.2
นานๆ ครั้ง	5.3	6.9	8.2	14.0	8.1	1.1	1.6	1.1	2.8	1.5
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	1.0	1.6	1.4	3.4	1.7	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(491)	(453)	(231)	(319)	(1,494)	(347)	(308)	(298)	(215)	(1,168)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	71.6	70.1	74.6	64.8	70.5	89.9	88.6	90.7	85.1	89.1
นานๆ ครั้ง	25.2	25.5	22.0	29.5	25.4	9.0	10.3	8.3	13.3	9.7
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	3.2	4.5	3.4	5.7	4.1	1.2	1.1	1.0	1.6	1.2
ไม่ตอบ (จำนวน)	(491)	(462)	(230)	(314)	(1,497)	(346)	(313)	(297)	(216)	(1,172)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	92.8	90.1	90.7	83.9	89.8	98.1	97.8	97.7	95.0	97.5
นานๆ ครั้ง	5.8	8.0	8.0	12.8	8.3	1.6	1.9	1.9	4.1	2.1
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	1.4	1.8	1.3	3.3	1.9	0.4	0.3	0.4	0.9	0.4
ไม่ตอบ (จำนวน)	(486)	(452)	(233)	(320)	(1,491)	(346)	(317)	(299)	(211)	(1,173)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(4,632)	(3,691)	(2,275)	(1,581)	(12,179)	(5,781)	(4,912)	(4,366)	(1,156)	(16,215)
ไม่เคยเลย	92.0	90.2	87.0	85.9	88.6	96.9	94.5	93.5	91.6	93.8
เคย	8.0	9.8	13.0	14.1	11.4	3.1	5.5	6.5	8.4	6.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(110)	(92)	(52)	(55)	(309)	(46)	(57)	(60)	(22)	(185)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(4,893)	(4,327)	(2,833)	(1,560)	(13,613)	(6,198)	(6,208)	(6,393)	(1,967)	(20,766)
ไม่เคยถูกบังคับ	95.7	91.8	91.9	90.2	92.1	97.8	94.1	93.3	90.9	93.6
เคย	4.3	8.2	8.1	9.8	7.9	2.2	5.9	6.7	9.1	6.4
ไม่ตอบ(จำนวน)	(156)	(123)	(77)	(91)	(447)	(72)	(89)	(115)	(36)	(312)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยข่มขู่/ชกต่อย/ข่มขืน/ข่มขืน
 **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน
 ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

4.3 ความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 13 เคยมีอาการซึมเศร้า หมดาลัยในชีวิตเกือบทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ นักเรียนหญิงมีอัตราการเคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจังและวางแผนวิธีการฆ่าตัวตาย รวมทั้งเคยพยายามฆ่าตัวตายจริงสูงกว่านักเรียนชาย ในจำนวนนักเรียนที่เคยฆ่าตัวตายจริงๆ มีนักเรียนชายร้อยละ 16 และนักเรียนหญิงร้อยละ 6 ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายมากกว่า 5 ครั้ง และนักเรียนชายร้อยละ 27 นักเรียนหญิงร้อยละ 19 ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงจนได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ อัตราการเคยมีอาการซึมเศร้า และการพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามชั้นปี (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 นักเรียนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	91.8	87.6	83.8	83.5	87.3	92.2	87.1	84.0	81.7	86.8
เคย	8.2	12.4	16.2	16.6	12.7	7.8	12.9	16.0	18.3	13.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(84)	(92)	(52)	(50)	(278)	(45)	(59)	(74)	(21)	(199)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	97.4	95.2	94.6	94.0	95.5	97.1	94.4	94.6	91.8	94.8
เคย	2.6	4.8	5.4	6.0	4.5	3.0	5.6	5.4	8.2	5.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(76)	(73)	(43)	(45)	(237)	(37)	(52)	(47)	(18)	(154)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	97.3	94.5	93.6	94.0	95.1	96.3	93.5	93.2	92.1	94.0
เคย	2.7	5.5	6.5	6.0	4.9	3.7	6.5	6.8	7.9	6.1
ไม่ตอบ(จำนวน)	(81)	(79)	(52)	(67)	(279)	(55)	(61)	(68)	(21)	(205)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	97.0	95.5	95.2	93.8	95.6	96.4	94.1	94.3	91.7	94.5
เคย	3.0	4.5	4.8	6.2	4.4	3.6	6.0	5.7	8.3	5.6
ไม่ตอบ(จำนวน)	(88)	(90)	(49)	(64)	(291)	(48)	(63)	(69)	(24)	(204)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	77.0	74.0	66.5	75.9	73.4	77.4	80.2	83.8	86.4	82.1
3-5 ครั้ง	10.8	8.9	12.8	9.9	10.4	15.7	11.4	11.3	10.4	11.9
> 5 ครั้ง	12.3	17.1	20.7	14.2	16.2	6.9	8.4	4.9	3.2	6.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	79.8	77.1	70.0	66.1	73.0	87.0	81.1	81.5	76.1	81.2
เคย	20.2	23.0	30.0	33.9	27.0	13.0	18.9	18.6	24.0	18.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

4.4 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์

นักเรียนชายร้อยละ 16 และหญิงร้อยละ 7 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว โดยอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนชาย 14.6 ปี และนักเรียนหญิง 15.5 ปี ในจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว นักเรียนชายมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์กับคนมากกว่า 1 คนสูงกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 66 และร้อยละ 44) นักเรียนชายดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสูงกว่านักเรียนหญิง (ร้อยละ 23 ร้อยละ 12) นักเรียนชายและนักเรียนหญิงนิยมใช้วิธีการคุมกำเนิดด้วยการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย อัตราการเคยตั้งครรภ์หรือเคยทำให้คนอื่นตั้งครรภ์สูงพอ ๆ กันระหว่างนักเรียนชายและหญิง (ร้อยละ 11 และร้อยละ 9) นักเรียนชั้น ปวช.2 มีอัตราการเคยมีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนสายสามัญ ที่น่าเป็นห่วงคือ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ทั้งชายและหญิงก็เคยตั้งครรภ์หรือเคยทำให้คนอื่นตั้งครรภ์มาแล้ว และอัตราดังกล่าวก็ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นักเรียนส่วนใหญ่ (นักเรียนชายร้อยละ 74 และนักเรียนหญิงร้อยละ 84) เคยได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเอดส์หรือเอชไอวีในโรงเรียน (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	96.6	90.1	82.5	58.6	84.2	99.5	96.5	93.5	72.6	93.0
เคยมี	3.4	9.9	17.5	41.4	15.8	0.6	3.5	6.5	27.4	7.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(391)	(262)	(126)	(141)	(920)	(579)	(322)	(237)	(155)	(1,293)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	12.4±1.7	13.7±1.7	14.8±1.7	15.0±1.7	14.6±1.8	12.1±2.1	13.9±1.6	15.6±1.2	15.9±1.2	15.5±1.5
median (พิสัย)	13(5-18)	14(5-16)	15(6-18)	15(6-20)	15(5-20)	13(7-15)	14(5-17)	16(6-18)	16(9-20)	16 (5-20)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(79)	(113)	(113)	(298)	(603)	(15)	(23)	(47)	(88)	(173)
จำนวนคนตอบ	146	517	696	1502	2861	28	237	478	895	1638
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	52.9	38.2	33.9	31.0	34.3	50.0	54.5	63.4	62.2	61.2
2 คน	13.8	17.1	17.6	17.8	17.4	6.3	16.1	20.0	17.4	17.8
3 คน	7.6	10.5	9.6	11.3	10.5	15.6	6.7	5.7	7.9	7.2
4 คน	3.3	5.1	7.0	7.3	6.6	25.0	12.9	6.1	7.2	8.0
5 คน	4.3	3.6	4.5	5.5	4.9	0.0	5.5	2.0	2.3	2.6
6 คน ขึ้นไป	18.1	25.5	27.5	27.1	26.4	25.0	12.9	6.1	7.2	8.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(20)	(20)	(29)	(81)	(5)	(5)	(13)	(22)	(45)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	82.4	75.0	75.1	78.2	77.2	65.7	80.9	86.8	90.9	87.8
เคย	17.7	25.0	24.9	21.8	22.9	34.3	19.1	13.2	9.1	12.3
ไม่ตอบ(จำนวน)	(18)	(29)	(31)	(71)	(149)	(2)	(9)	(16)	(28)	(55)

ตารางที่ 8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	28.6	17.5	18.4	17.5	18.4	34.4	22.8	24.1	19.0	21.3
ยาเม็ดคุมกำเนิด	3.3	3.9	3.9	6.1	5.0	3.1	8.2	7.3	14.3	11.2
ถุงยางอนามัย	52.4	56.4	54.6	53.1	54.0	37.5	41.6	31.8	33.2	34.1
ยาฉีดคุมกำเนิด	1.0	0.3	0.5	0.8	0.7	6.3	0.4	1.4	1.9	1.6
หลังภายนอก	2.9	13.4	13.4	13.4	12.8	9.4	18.4	26.3	23.8	23.5
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	1.4	1.0	2.3	3.1	2.4	6.3	2.4	5.9	5.4	5.1
วิธีการอื่นๆ	2.4	1.6	1.1	1.4	1.4	0.0	2.4	1.8	1.2	1.5
ไม่แน่ใจ	8.1	5.9	5.8	4.7	5.4	3.1	3.9	1.6	1.3	1.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(16)	(15)	(20)	(63)	(5)	(5)	(14)	(13)	(37)
การตั้งครรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรภ์*										
ไม่เคย	86.5	90.1	92.1	88.3	89.4	90.3	91.6	92.9	89.6	90.8
1 ครั้ง	6.2	2.7	5.0	8.4	6.5	0.0	2.5	5.3	8.2	6.4
≥2 ครั้ง	7.3	7.1	2.9	3.2	4.1	9.7	5.9	1.8	2.2	2.8
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	(29)	(81)	(87)	(187)	(384)	(6)	(21)	(33)	(42)	(102)
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	25.4	16.9	10.7	17.9	18.4	15.8	8.1	5.6	10.1	9.7
เคย	65.1	74.8	84.9	74.3	73.9	72.8	85.3	90.5	84.4	83.4
ไม่แน่ใจ	9.5	8.3	4.3	7.8	7.7	11.4	6.6	4.0	5.5	6.9
ไม่ตอบ(จำนวน)	(394)	(361)	(235)	(203)	(1193)	(370)	(348)	(330)	(191)	(1239)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

สรุป

ในบทนี้เป็นผลการศึกษาด้านพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย พฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย และพฤติกรรมด้านเพศสัมพันธ์ นักเรียนประมาณครึ่งหนึ่งมีความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ โดยสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัยบ่อยครั้งเวลาขับขี่โดยสารยานพาหนะ อัตราการพกพาอาวุธ การชกต่อย ทะเลาะวิวาทก็ค่อนข้างต่ำในนักเรียนทุกชั้นปี เมื่อเทียบกับผลการศึกษาด้านเดียวกันนี้ของนักเรียนในภาคใต้ในปีการศึกษา 2545-2548 พบว่ามีอัตราใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการมีความรู้สึกซึมเศร้าและความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือการพยายามฆ่าตัวตายก็ใกล้เคียงกับผลการศึกษาในนักเรียนภาคใต้ในปีการศึกษา 2545-2548 โดยนักเรียนประมาณร้อยละ 13 มีอารมณ์ซึมเศร้าจนรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน และร้อยละ 4-5 เคยคิดฆ่าตัวตาย ในด้านพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ นักเรียนชายร้อยละ 16 และหญิงร้อยละ 7 เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว อัตราดังกล่าวนี้สูงกว่าอัตราของนักเรียนในภาคใต้ของปีการศึกษา 2545-2548 อย่างชัดเจน (ร้อยละ 10-14 ในนักเรียนชายและร้อยละ 2-4 ในนักเรียนหญิง) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรในเยาวชนไทย ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างอื่นตามมา

4.5 ประสพการณ์ด้านการดื่มสุรา

ก. พฤติกรรมการดื่มสุรา

เมื่อถามประสพการณ์ตรงของตัวนักเรียนเองเรื่องการดื่มสุรา พบว่านักเรียนชายและหญิงร้อยละ 40 และ 24 เคยดื่มสุรามาแล้วในชีวิต นักเรียนชายชั้น ปวช.2 เกือบร้อยละ 70 เคยดื่มสุราแล้ว และนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวนมากก็เคยดื่มสุราแล้วเช่นกัน โดยอายุเฉลี่ยที่นักเรียนเริ่มดื่มสุราเป็นครั้งแรก ประมาณ 13 ปีในผู้ชายและ 14 ปีในผู้หญิง ในนักเรียนที่เคยดื่มสุรามาแล้ว จะเห็นว่าส่วนใหญ่ดื่มครั้งสุดท้ายภายใน 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งจัดว่าเป็นการดื่มในปัจจุบัน (current drinking) นักเรียนชายหญิงชั้น ปวช.2 ประมาณร้อยละ 55 และ 39 เพิ่งดื่มสุราเป็นครั้งสุดท้ายภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในจำนวนนักเรียนที่ดื่มในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะดื่มเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น และดื่มเพียง 1-2 หน่วยต่อครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบว่านักเรียนชายเกือบร้อยละ 20 และนักเรียนหญิงประมาณร้อยละ 7 ที่ดื่ม 10 ครั้งขึ้นไปใน 30 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนชายที่ดื่มในปัจจุบันอย่างน้อยร้อยละ 63 นักเรียนหญิงอย่างน้อยร้อยละ 50 เคยดื่มจนเมาอย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 30 วันที่ผ่านมา

ในนักเรียนที่เคยดื่มสุรามาแล้ว นักเรียนชายประมาณครึ่งหนึ่งเคยดื่มหนักโดยดื่มมากกว่า 5 หน่วยขึ้นไปต่อครั้ง และนักเรียนหญิงร้อยละ 40 ก็เคยดื่มหนักเช่นนี้อย่างน้อย 1-2 ครั้งใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ปวช. 2 และนักเรียนชั้นโตกว่ามีแนวโน้มที่จะเคยดื่มหนักบ่อยครั้งกว่านักเรียนชั้นเล็กกว่า และนักเรียนชายมีอัตราการดื่มหนักมากกว่านักเรียนหญิงในทุกระดับชั้น (ตารางที่ 9) จากข้อมูลเหล่านี้แสดงว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย มีประสพการณ์ดื่มสุราค่อนข้างสูงในปัจจุบัน โดยนักดื่มรุ่นเยาว์เหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่ดื่มหนัก หรือดื่มจนเมาเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชาย และนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2

ตารางที่ 9 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ไม่เคย	82.7	65.0	48.2	31.2	60.2	91.1	77.8	68.7	55.3	75.5
เคยดื่มสุรา	17.3	35.0	51.8	68.8	39.8	8.9	22.2	31.3	44.7	24.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(207)	(183)	(125)	(145)	(660)	(141)	(139)	(172)	(64)	(516)
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก										
mean±sd	10.9± 2.0	12.6± 2.1	14.1± 2.1	14.2± 1.9	13.3± 2.3	11.3± 1.7	13.0± 1.7	14.6± 1.7	15.0± 1.6	14.0± 2.0
median	11	13	15	15	14	12	13	15	15	14
พิสัย	3-17	3-16	3-18	4-20	3-20	3-15	3-17	(5-19)	(7-20)	(3-20)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(152)	(174)	(155)	(261)	(742)	(61)	(96)	(155)	(112)	(424)
นักเรียนที่ตอบ	1021	2084	2240	2727	8072	587	1588	2402	1531	6108
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว* (ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา)										
ไม่เคยเลย	67.7	56.7	50.5	40.8	51.0	70.5	64.9	67.7	56.5	64.4
1-2 ครั้ง	21.6	25.7	28.4	30.1	27.4	21.0	23.3	22.6	27.9	23.9
3-5 ครั้ง	5.3	8.2	9.9	13.2	10.0	5.3	7.0	5.9	8.7	6.9
6-9 ครั้ง	1.4	2.3	3.2	5.2	3.4	0.9	2.2	1.3	2.5	1.8
10 ครั้ง ขึ้นไป	3.9	7.1	8.0	10.8	8.2	2.2	2.6	2.5	4.4	3.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(21)	(25)	(29)	(91)	(4)	(10)	(18)	(18)	(50)

ตารางที่ 9 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)(ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา* (ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา)										
>12 เดือนที่ผ่านมา	31.7	16.9	13.9	10.3	14.9	24.6	19.8	21.0	15.0	19.4
>30 วัน แต่ < 12 เดือนนี้	21.1	20.3	20.2	16.1	18.8	18.2	25.3	26.6	20.9	24.1
>1สัปดาห์แต่ < 30 วัน	18.5	21.5	22.8	18.8	20.6	24.2	23.4	25.0	25.0	24.6
ภายใน 1 สัปดาห์นี้	28.7	41.3	43.0	54.8	45.7	33.0	31.5	27.4	39.1	32.0
ไม่ตอบ(จำนวน)	(590)	(737)	(503)	(642)	(2,472)	(311)	(579)	(717)	(452)	(2,059)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ดื่มครั้งสุดท้ายภายใน 1 สัปดาห์ถึง 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	66.4	55.3	54.5	39.6	49.2	75.3	67.8	71.2	60.3	67.4
3-5 ครั้ง	16.8	21.5	23.0	25.4	23.3	17.4	19.2	19.1	20.3	19.4
6-9 ครั้ง	6.6	8.8	10.1	13.3	10.9	2.3	6.4	6.0	8.8	6.6
10-19 ครั้ง	4.9	5.2	5.0	11.8	7.9	3.9	4.0	2.5	6.5	4.2
20 ครั้ง ขึ้นไป	5.3	9.2	7.4	10.0	8.7	1.1	2.7	1.2	4.1	2.5
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(28)	(49)	(56)	(157)	(11)	(20)	(38)	(34)	(103)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	48.0	44.3	36.8	35.5	38.6	63.1	51.6	47.3	44.9	48.7
3-5 หน่วย	34.0	24.3	25.6	27.6	26.6	28.2	27.1	27.5	26.4	27.1
6-8 หน่วย	10.5	10.7	8.3	8.9	9.2	2.0	7.7	8.5	7.7	7.6
9 หน่วย ขึ้นไป	7.5	20.7	29.4	28.1	25.6	6.7	13.6	16.7	20.9	16.6
ไม่ตอบ(จำนวน)	(44)	(110)	(144)	(139)	(437)	(29)	(89)	(124)	(69)	(311)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ดื่มครั้งสุดท้ายภายใน 1 สัปดาห์ถึง 30 วันที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	49.4	43.7	43.2	27.3	37.1	55.0	53.8	53.3	39.5	49.3
1-2 ครั้ง	37.8	35.0	36.8	43.4	39.2	37.6	35.9	38.2	45.4	39.8
3-5 ครั้ง	6.0	11.5	10.3	14.4	39.8	5.3	6.7	6.1	10.5	7.5
6-9 ครั้ง	2.6	3.5	4.0	6.3	4.7	1.1	1.5	1.5	2.0	1.6
10-19 ครั้ง	1.1	2.5	3.2	4.5	3.5	0.5	1.0	0.8	1.3	1.0
20 ครั้ง ขึ้นไป	3.0	3.8	2.5	4.1	3.5	0.5	1.2	0.2	1.3	0.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	(2)	(2)	(7)	(0)	(4)	(0)	(0)	(4)

ข. สถานที่ดื่ม และแหล่งที่เคยได้สุรามา

สถานที่ที่นักเรียนมักจะดื่มสุรากันมากที่สุดได้แก่ ในสวน/ไร่/นา และหอพักแสดงว่าสถานที่เหล่านี้น่าจะเป็นแหล่งที่นักเรียนมาชุมนุมกันและอาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนสามารถมาร่วมดื่มสุรากันได้ ส่วนใหญ่นักเรียนจะได้สุรามาจากผู้อื่นทั้งเป็นผู้ที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม นักเรียนชายระดับชั้น ปวช.2 จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งก็ซื้อหาสุรามาดื่มเองโดยที่ผู้ชายไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัว และมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.3 ร้อยละ 4-16 ที่เคยซื้อสุรามาดื่มเองโดยที่ผู้ชายก็ไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัวเช่นกัน ทั้งนี้ที่นักเรียนเหล่านี้จะอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่จะซื้อหาหรือดื่มสุราก็ได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้จะเห็นว่า นักเรียนชายและหญิงร้อยละ 13 และ 6 สามารถซื้อหาสุรามาได้จากร้านค้า ร้านอาหารบริเวณรอบโรงเรียนในรัศมีไม่เกิน 500 เมตร ทั้งนี้ที่บริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นบริเวณที่ควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายสุรา โดยนักเรียนชั้น ปวช.2 ถึงร้อยละ 28 และ 15 สามารถซื้อหาสุรามาได้จากสถานที่ดังกล่าว เมื่อถามถึงเวลาเฉลี่ยในการซื้อหาสุรามา พบว่านักเรียนใช้เวลาเพียงประมาณ 12-14 นาทีก็สามารถหาซื้อสุรามาได้ โดยนักเรียนจำนวนครึ่งหนึ่งใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็สามารถหาซื้อสุรามาได้ (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 สถานที่ดื่ม และแหล่งที่เคยได้สุรามา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
สถานที่ที่มักจะดื่มสุรา*										
งานฉลอง/รื่นเริง	3.3	1.9	1.7	1.1	1.8	3.9	2.8	1.2	1.1	1.8
บ้าน	2.1	3.1	4.2	11.8	6.3	1.7	3.1	4.7	13.1	6.2
หอพัก	40.6	32.6	31.6	33.8	33.7	38.0	37.2	34.7	27.0	33.7
งานโรงเรียน	2.0	2.8	2.8	3.5	3.0	1.2	1.3	1.0	3.4	1.7
ร้านรอบโรงเรียน รัศมี < 500 เมตร	3.4	6.3	10.3	10.5	8.5	2.4	2.8	6.8	11.5	6.6
ร้านรอบโรงเรียน รัศมี > 500 เมตร	0.0	0.3	0.6	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1
ร้านน้ำชา	4.8	3.4	2.4	3.1	3.2	0.2	1.2	0.7	0.4	0.7
สวน/ไร่/นา	40.1	43.6	42.9	32.6	39.2	49.9	48.3	48.0	40.7	46.4
อื่นๆ	3.8	6.0	3.6	3.1	4.0	2.4	3.1	2.8	2.6	2.8
ไม่ตอบ(จำนวน)	(210)	(182)	(127)	(162)	(681)	(56)	(86)	(105)	(67)	(314)
แหล่งที่เคยได้สุรามาใน 30 วันที่ผ่านมา										
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	7.4	17.1	26.3	38.9	20.4	4.5	11.2	14.1	23.7	12.0
ซื้อเองโดยใช้บัตรฯ ของคนอื่น	2.8	5.0	6.9	15.4	6.8	0.8	1.5	2.0	5.7	2.1
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	10.0	21.9	32.0	48.2	25.6	6.1	12.3	16.5	29.3	14.3
ซื้อเองโดยผู้ชายไม่ตรวจบัตรฯ	6.8	16.2	25.9	43.9	20.9	4.0	9.5	11.6	22.2	10.4
เอามาจากบ้าน (ของพ่อแม่ ญาติ)	6.4	10.5	14.4	20.2	12.0	4.0	7.7	9.6	11.6	7.8
ร้านค้ารอบโรงเรียน รัศมี < 500 ม.	4.3	9.9	15.8	28.2	13.1	2.6	5.1	6.6	15.2	6.3
เวลาเฉลี่ยในการซื้อหาสุรา										
mean±sd	12.4±13.5	12.1±12.6	13.4±12.4	13.6±11.6		12.2±13.1	12.5±11.7	14.0±12.4	13.4±10.6	
median (พิสัย)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-60)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4536)	(3803)	(2296)	(1952)	(12587)	(5119)	(4974)	(4690)	(2162)	(16945)
รวม	2353	2816	2439	2528	10136	2236	2734	3617	1574	10161

* ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองและของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนจำนวนมากที่ดื่มสุราในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เคยประสบปัญหาหรือมีประสบการณ์ต่างๆ จากการดื่มสุราของตนเอง โดยประสบการณ์ที่พบมากที่สุดทั้งในนักเรียนชายและหญิง ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน รองลงมาในห้าอันดับแรก ได้แก่ การขับชี่รดหลังดื่มสุรา มีอาการเมาค้าง ถูกตำหนิต่อว่าจากคนที่รู้จัก และทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พบในนักเรียนชายร้อยละ 35-49 ส่วนในนักเรียนหญิง ได้แก่ ถูกตำหนิต่อว่าจากคนที่รู้จัก มีอาการเมาค้าง ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง และทำของสำคัญหรือเงินหาย ประสบการณ์เหล่านี้พบในนักเรียนหญิงร้อยละ 30-44 (ภาพที่ 2) เมื่อแยกตามชั้นปี พบว่านักเรียนชั้น ปวช.2 ที่ดื่มสุรา มีประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองมากกว่านักเรียนสายสามัญ และนักเรียนชั้นโตกว่ามีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์เหล่านี้มากกว่านักเรียนชั้นเล็กกว่า ซึ่งอาจจะเกิดเนื่องจากนักเรียนชั้นโตกว่าดื่มสุราในปริมาณที่มากกว่าต่อครั้งและดื่มบ่อยกว่า นักเรียนชั้นเล็กกว่าจึงทำให้มีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มมากกว่าด้วย (ตารางที่ 11)


ตารางที่ 11 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์*	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
อาการเมาค้าง	21.4	33.5	41.4	56.1	41.8	22.2	30.2	32.8	44.4	34.0
ทำข้อสอบ/งานได้ไม่ดี เรียนไม่ทัน	33.3	34.6	37.8	43.5	38.3	28.0	25.4	29.5	36.8	30.2
มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ/ครูผู้ใหญ่คนอื่น	17.3	21.3	20.1	23.8	21.3	15.4	13.1	11.9	15.8	13.5
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้	12.7	11.6	9.6	12.4	11.4	7.2	6.0	5.2	5.8	5.8
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย	33.3	32.2	26.2	34.3	31.4	20.2	16.2	12.4	18.4	15.7
คลื่นไส้ อาเจียน	37.6	44.2	47.5	58.3	49.1	33.9	40.1	42.2	54.2	43.9
ขับชี่รด หลังดื่มสุรา	21.1	35.9	42.5	57.8	43.4	18.4	26.8	26.8	36.6	28.5
ขาดเรียน	37.0	35.5	32.0	48.5	39.2	31.9	27.6	26.4	40.8	30.9
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก	33.6	37.6	40.8	46.2	40.9	32.3	36.1	34.9	42.2	36.8
ตนเองน่าจะจะมีปัญหาการดื่ม	16.9	20.0	21.8	28.8	23.1	13.2	15.1	12.8	20.3	15.3
ทำของสำคัญหรือเงินหาย	37.5	33.2	30.9	37.1	34.4	35.9	29.3	26.3	34.0	29.9
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจ	27.8	31.3	34.6	40.9	35.0	30.4	30.4	31.7	39.6	33.3
ถูกจับเพราะขับชี่รดขณะเมา	6.8	6.9	5.7	10.8	7.9	3.7	2.4	2.1	4.0	2.8
ถูกลวนลาม/เพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ	8.2	9.9	9.6	15.2	11.4	4.4	5.3	4.4	6.6	5.2
ลวนลาม/เอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น	9.4	11.2	10.3	16.0	12.3	5.4	4.4	3.5	5.1	4.3
พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ	15.9	20.6	22.2	34.2	25.1	16.5	14.6	13.8	22.2	16.4
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง	6.0	6.3	5.4	8.4	6.7	6.6	5.5	4.6	6.4	5.5
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย	8.2	7.0	5.9	7.8	7.1	9.3	6.6	5.3	7.5	6.6
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ	28.9	27.2	23.4	35.0	29.0	24.2	20.3	17.7	23.0	20.4
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา	7.0	6.6	5.2	9.2	7.2	3.9	2.6	2.1	4.0	2.9

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่มสุรา ไม่รวมนักเรียนที่ไม่ตอบข้อนี้

จำนวนนักเรียนที่ไม่ตอบคำถามแต่ละข้อ ชาย 510-751 คน หญิง 334-515 คน

ภาพที่ 2 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)



เมื่อถามถึงประสบการณ์/ปัญหาพฤติกรรมที่เคยได้รับจากนักเรียนคนอื่นที่ดื่มสุรา พบว่านักเรียนชายเกือบร้อยละ 20 เคยถูกนักเรียนคนอื่นที่ดื่มสุรารังแก/ตำหนิ/ต่อว่า ทะเลาะวิวาทได้เพียงรุนแรง ระบายขณะอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลาอนและต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา นักเรียน ปวช. ทั้งชายและหญิงเคยมีประสบการณ์ถูกนักเรียนคนอื่นที่ดื่มสุรา ระบายเวลาอ่าน/เรียนหนังสือหรือเวลาอนและต้องคอยดูแลนักเรียนนักเรียนคนอื่นที่เมาสุรามากที่สุด (ร้อยละ 26-33) นอกจากนั้น นักเรียนชายเกือบร้อยละ 5 และนักเรียนหญิงเกือบร้อยละ 2 เคยถูกนักเรียนที่ดื่มสุราลวนลามหรือข่มขืนด้วย ซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมจากการดื่มสุราที่จัดว่ารุนแรงมาก

ตารางที่ 12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์*	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ถูกรังแก/ถูก/ตำหนิ ต่อว่า	19.9	18.5	18.4	22.7	19.7	12.4	12.5	12.5	17.2	13.1
ทะเลาะวิวาท ได้เพียงอย่างรุนแรง	14.9	17.3	17.2	24.9	18.0	7.5	9.9	10.3	14.5	10.0
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อผู้	13.3	13.4	11.6	18.8	14.1	4.0	5.4	5.0	8.1	5.3
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้	4.0	5.5	5.0	8.9	5.6	1.7	2.6	2.4	3.7	2.4
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา	6.8	14.2	23.4	32.6	17.5	5.3	12.4	17.9	26.4	14.1
ถูกรบกวนขณะอ่าน/เรียนหนังสือ/นอน	17.5	19.8	20.6	28.1	20.9	16.7	19.2	21.2	27.1	20.2
ถูกจับหรือเกี่ยวพาวาสิโดยที่ไม่ต้องการ	9.7	12.6	15.5	20.3	13.8	8.0	11.9	15.5	23.8	13.6
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน	2.8	4.6	4.7	8.1	4.8	1.0	1.6	1.5	3.0	1.6

4.6 ทศนคติต่อการโฆษณาสุรา

นักเรียนชายชั้นปีต่างๆ ร้อยละ 74-83 และนักเรียนหญิงร้อยละ 78-87 เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ มีนักเรียนชายและหญิงทุกชั้นปีประมาณร้อยละ 23 และ 18 ไม่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ เลย สื่อที่นักเรียนเคยเห็นโฆษณาสูรามากที่สุดได้แก่ โทรทัศน์ โดยนักเรียนเกือบทุกคนเคยเห็นโฆษณาสูราในสื่อโทรทัศน์ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สื่อชนิดอื่นๆ ที่นักเรียนเคยเห็นโฆษณาสูรารองลงมาตามลำดับได้แก่ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 75 และ 74) แผ่นป้ายโฆษณา (ร้อยละ 71 และ 68) อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 65 และ 61) นิตยสาร (ร้อยละ 57) วิทยุ (ร้อยละ 48 และ 42) แผ่นปิดประกาศ (ร้อยละ 42 และ 32) และแผ่นปลิว (ร้อยละ 39 และ 31) อัตราการเคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อต่างๆ เหล่านี้ ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักในระหว่างนักเรียนแต่ละชั้นปี นักเรียนชายมีแนวโน้มที่จะเคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อแต่ละชนิดมากกว่านักเรียนหญิงในระดับชั้นเดียวกัน ซึ่งอาจจะแสดงว่านักเรียนชายให้ความสนใจสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่านักเรียนหญิงในวัยเดียวกัน จึงทำให้เปิดรับโฆษณาจากสื่อเหล่านี้ได้มากกว่านักเรียนหญิง และนักเรียนส่วนใหญ่ที่ตอบว่าเคยเห็น/ได้ยินโฆษณาสูราจากสื่อแต่ละชนิดมักจะเคยเห็น/ได้ยินจำนวนหลายครั้งใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ตารางที่ 13 และภาพที่ 3)

เมื่อแยกตามชนิดของเครื่องดื่ม จะพบว่า เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่นักเรียนเคยเห็นการโฆษณาในสื่อทุกชนิดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เหล้า ไวน์/สปาย และเหล้าผสมพร้อมดื่ม โดยอัตราการเคยเห็นโฆษณาเบียร์จากสื่อชนิดต่างๆ ประมาณร้อยละ 60-88 และเมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่เคยเห็นโฆษณาสูราในสื่อแต่ละประเภท นักเรียนหญิงมีแนวโน้มที่จะเคยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแต่ละชนิดมากกว่านักเรียนชาย (ภาพที่ 4)

นอกจากนี้หากจำแนกตามช่วงเวลาที่นักเรียนเคยเห็นโฆษณาสูราทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์มากที่สุด ซึ่งรวมถึงการโฆษณาทางอ้อมผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ด้วยนั้น พบว่านักเรียนมักจะเห็น/ได้ยินโฆษณาสูราในช่วงเวลา 20.00-24.00 น. มากที่สุดซึ่งคงจะเป็นเวลาที่นักเรียนอยู่บ้านและดูโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ซึ่งเป็นเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน อัตราการเห็น/ได้ยินโฆษณาในแต่ละช่วงเวลาไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักระหว่างนักเรียนแต่ละชั้นปี (ภาพที่ 5) ในจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาสูราตามสื่อต่างๆ นักเรียนประมาณร้อยละ 53 สามารถจำชื่อยี่ห้อสุราได้ นักเรียนชั้น ม.1 มีอัตราการจำยี่ห้อสุราได้น้อยที่สุด ยี่ห้อสุราที่นักเรียนทุกชั้นปีจำได้มากที่สุดคือ “ช้าง” รองลงมาได้แก่ “ริเจนซี” “ลิโอ” และสปาย ไวน์คูลเลอร์ หรือบัคคาร์รี่ อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่านักเรียนอยากลองหรืออยากดื่มสุรายี่ห้ออะไรมากที่สุด อันดับหนึ่งในนักเรียนชายกลับเป็น “Johnie Walker” และในนักเรียนหญิงเป็น “Spy Wine Cooler/Bacardi ส่วนยี่ห้ออื่นๆ ที่นักเรียนชายและหญิงบอกว่าอยากลอง/อยากดื่มรองลงมาได้แก่ “ช้าง” “ริเจนซี” “ลิโอ” และ “Heineken”


ตารางที่ 13 ชนิดของสื่อและประเภทของสุราที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ไม่ตอบ(จำนวน)	73.8 (862)	74.7 (690)	79.8 (349)	82.6 (430)	77.1 (2,331)	77.8 (815)	81.0 (678)	84.8 (528)	87.1 (344)	82.2 (2,365)
จำนวนคนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา และอัตราของคนที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณาสุราหลายครั้งในสื่อแต่ละชนิด ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา										
โทรทัศน์	4228	4248	3401	3205	15082	4873	5530	6421	2864	19688
เคยเห็นหลายครั้ง**	69.8	72.3	71.4	67	70.4	67.8	69.6	66.6	69.3	68.1
วิทยุ	1875	1593	1062	1531	6061	1661	1799	1956	1210	6626
เคยได้ยินหลายครั้ง**	49.4	55.1	61.1	51.7	53.6	45.9	53.5	55.5	57.2	52.4
หนังสือพิมพ์	2926	2901	2300	2357	10484	3150	3666	4173	1928	12917
เคยเห็นหลายครั้ง**	53.6	56.4	59.9	50.8	55.2	47.7	51.9	51.9	54.5	51.1
นิตยสาร	2023	2067	1639	1680	7409	2149	2675	3111	1410	9345
เคยเห็นหลายครั้ง**	47.2	53.1	59.5	47.3	51.7	44.7	51.8	52	52.8	50.2
แผ่นป้ายโฆษณา	2801	2733	2083	2175	9792	2992	3287	3707	1786	11772
เคยเห็นหลายครั้ง**	51.7	54.5	55.9	52.5	53.5	47.8	52.8	51.1	53.1	51
แผ่นปลิว	1502	1361	789	1182	4834	1317	1333	1256	875	4781
เคยเห็นหลายครั้ง**	44.8	51.8	53.1	45.3	48.3	42.9	48.8	50.7	50.8	47.8
แผ่นปิดประกาศ	1662	1443	904	1304	5313	1299	1364	1401	896	4960
เคยเห็นหลายครั้ง**	46.6	53.9	59.1	48.3	51.2	44.4	52	52.2	51.8	49.8
สื่ออินเตอร์เน็ต	2520	2486	1819	1829	8654	2484	2866	3294	1563	10207
เคยเห็นหลายครั้ง**	56.9	64.6	66	57.4	61.2	51.3	59.9	60.5	61.4	57.9
จำชื่อยี่ห้อสุรา										
จำได้*	47.6	52.2	61.2	51.8	52.9	46.1	50.2	61.0	53.4	53.2
ไม่ตอบ(จำนวน)	(372)	(267)	(126)	(194)	(959)	(304)	(260)	(214)	(134)	(912)
ยี่ห้อสุราที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง
อันดับ2	ลิโอ	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์
อันดับ3	รีเจนท์	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	Spy / Bacardi	Spy / Bacardi	ลิโอ	ลิโอ
ยี่ห้อสุราที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	Johnie Walker	Johnie Walker	Johnie Walker	Spy / Bacardi	Spy / Bacardi	Spy / Bacardi	รีเจนท์	Spy / Bacardi
อันดับ2	Spy / Bacardi	Spy / Bacardi	รีเจนท์ และ ช้าง	ลิโอ	ช้าง	ลิโอ	ช้าง	รีเจนท์	Spy / Bacardi	รีเจนท์
อันดับ3	ลิโอ	รีเจนท์	Spy / Bacardi	รีเจนท์	Spy / Bacardi	ช้าง	รีเจนท์ และ Heineken	Heineken	Johnie Walker	Heineken

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ เท่านั้น


*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

ภาพที่ 3 อัตราการเคยเห็นโฆษณาสุราในสื่อชนิดต่างๆ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ร้อยละ)




ภาพที่ 4 อัตราการเคยเห็นโฆษณาเครื่องดื่มรายชนิดในสื่อต่างๆ ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (ร้อยละ)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็นโฆษณาสุราในสื่อชนิดนั้นๆ เท่านั้น




ภาพที่ 5 ช่วงเวลาที่นักเรียนมักจะเห็นได้ยีนโฆฆณาสุราทางวิทยุโทรทัศน์มากที่สุด

นักเรียนชาย



นักเรียนหญิง



*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็นได้ยีนโฆฆณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

สรุป

บทนี้ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการดื่มสุรา ปัญหาหรือผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และการรับรู้โฆฆณาสุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย อัตราการเคยดื่ม ความถี่และปริมาณการดื่มมีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง และระหว่างชั้นปีอย่างชัดเจน นักเรียนชั้นใดก็ตามที่มีอัตราการดื่มสุราสูงกว่านักเรียนชั้นเล็กกว่า และนักเรียนชายดื่มมากกว่านักเรียนหญิง ปัญหาหรือผลกระทบที่ตามมาจึงมีความแตกต่างกันด้วย อัตราการเคยดื่มสุราของนักเรียนทั่วประเทศในปีนี้สูงพอๆ กันกับอัตราการดื่มของนักเรียนภาคใต้ในการสำรวจของปีการศึกษา 2548 (ร้อยละ 39-40 ในนักเรียนชาย และร้อยละ 23-24 ในนักเรียนหญิง) สถานที่ที่นักเรียนนิยมใช้ดื่มสุรามากที่สุดคือ เรือกสวนไร่นา และหอพัก นักเรียนใช้เวลาเพียงประมาณ 12-14 นาทีที่สามารถหาซื้อสุราได้ โดยนักเรียนสายอาชีพประมาณครึ่งหนึ่งสามารถซื้อสุราได้เองโดยที่ผู้ชายไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และยังสามารถหาซื้อสุราได้จากร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียนอีกด้วย นักเรียนส่วนใหญ่เคยสัมผัสกับสื่อโฆฆณาสุรา เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่นักเรียนเคยเห็นได้ยีนโฆฆณามากที่สุด นักเรียนที่เคยเห็นได้ยีนโฆฆณาสุราตามสื่อต่างๆ ประมาณครึ่งหนึ่งสามารถจำชื่อยี่ห้อสุราได้ โดยยี่ห้อสุราที่นักเรียนจำได้มากที่สุดคือ “ช้าง” รองลงมาได้แก่ “รีเจนท์” และ “ลีโอ” อัตราความชุกของการดื่มสุราแบบแผนต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมในบทอื่นต่อไป

4.7 ประสบการณ์การใช้สารเสพติด


ก. การรู้จักและเคยเห็นสารเสพติด

เมื่อให้นักเรียนบอกชื่อสารเสพติดที่นักเรียนรู้จักมา พบว่า ยาบ้า กัญชา ฝิ่น กระท่อม และสารระเหย เป็นสารเสพติดห้าอันดับแรกที่นักเรียนหญิงและชายในทุกระดับชั้นรู้จักมากที่สุด โดยนักเรียนร้อยละ 30 ขึ้นไปรู้จักกัญชาและยาบ้า แต่สารเสพติดที่นักเรียนเคยเห็นของจริงมากที่สุด ได้แก่ กัญชา ยาบ้า สารระเหย และกระท่อม สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดของจริงสามอันดับแรก ได้แก่ ร้านค้าทั่วไป แถวบ้านมีคนขายและมีคนใช้ และญาติ คนในครัวเรือนหรือเพื่อนใช้ (ตารางที่ 14 และภาพที่ 6)

ตารางที่ 14 ชนิดของสารเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด 3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	ยาบ้า	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	สารระเหย	สารระเหย	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 2	สารระเหย	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	กระท่อม	กระท่อม	สารระเหย	ยาบ้า	สารระเหย
อันดับ 3	กระท่อม	สารระเหย	สารระเหย	กระท่อม	สารระเหย	ยานอนหลับ	กัญชา	ยาบ้า	กระท่อม	ยาบ้า
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดของจริงครั้งสุดท้าย										
ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ร้านค้า
อันดับ 2	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน
อันดับ 3	ญาติใช้	ญาติใช้	เพื่อนใช้	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ญาติใช้	นิทรรศการ	นิทรรศการ	ร้านค้า	ญาติใช้
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ร้านค้า
อันดับ 2	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน
อันดับ 3	ญาติใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	ร้านค้า	ญาติใช้
กระท่อม : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้า	ร้านค้า	แถวบ้านใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านใช้	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	แถวบ้านใช้	ร้านค้า
อันดับ 2	แถวบ้าน	แถวบ้าน	ร้านค้า	แถวบ้าน	ร้านค้า	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	เพื่อนใช้	แถวบ้าน
อันดับ 3	ญาติใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	ญาติใช้
สารระเหย : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	เพื่อนใช้	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า	ร้านค้า
อันดับ 2	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	ร้านค้า	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	แถวบ้าน	เพื่อนใช้	แถวบ้าน
อันดับ 3	ญาติใช้	ญาติใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้าน	เพื่อนใช้	ญาติใช้	ญาติใช้	นิทรรศการ	แถวบ้าน	ญาติใช้

ภาพที่ 6 สารเสพติดที่นักเรียนรู้จักมากที่สุด 5 อันดับแรก (ร้อยละ)



ข. การใช้สารเสพติดในชีวิต 12 เดือนและ 30 วันที่ผ่านมา

ชนิดของสารเสพติดที่ศึกษา ได้แก่ บุหรี่ ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม กระท่อม กัญชา ฝิ่น ยาอี/ยาเลิฟ ยาเค ผงขาว/เฮโรอีน สารระเหย ยาบ้าและไอซ์ รวมทั้งยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด และยานอนหลับ พบว่าสารเสพติดที่นักเรียนชายทุกชั้นปีเคยใช้มากที่สุดคือ บุหรี่ (ร้อยละ 21) รองลงมาเรียงตามลำดับ ได้แก่ กัญชา ยานอนหลับ กระท่อม/สารผสมกระท่อม ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด ซึ่งมีนักเรียนชายร้อยละ 2-7 เคยใช้ในชีวิต นอกจากนั้นเป็นสารที่นักเรียนชายน้อยกว่าร้อยละ 2 เคยใช้ในชีวิต ซึ่งได้แก่ ไอซ์ ฝิ่น ยาอี/ยาเลิฟ ยาเค และโคเคน ตามลำดับ

นักเรียนหญิงเพียงจำนวนน้อยเคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติดในชีวิต สารเสพติดที่นักเรียนหญิงเคยใช้ในชีวิตมากที่สุด ได้แก่ ยานอนหลับ (ร้อยละ 7) และบุหรี่ (ร้อยละ 5) ส่วนสารอื่น ๆ ที่นักเรียนหญิงเพียงร้อยละ 1-2 เคยใช้ ได้แก่ ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด และกัญชา นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าเคยใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกว่าทั้งชายและหญิง (ตารางที่ 15)

เมื่อพิจารณาประสบการณ์ใช้สารเสพติดแต่ละชนิดใน 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าอัตราการใช้ใน 12 เดือนลดต่ำลงจากอัตราในชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่านักเรียนจำนวนมากเพิ่งมีประสบการณ์ใช้สารแต่ละตัวในหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ชัดเจนในนักเรียนชั้น ม.1 ซึ่งอัตราการเคยใช้ในชีวิตและในหนึ่งปีของสารแต่ละตัวมีความแตกต่างกันน้อยมาก (ตารางที่ 16 และภาพที่ 6) นอกจากนั้นเมื่อดูอัตราการคงใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา จะเห็นว่านักเรียนประมาณร้อยละ 60 ขึ้นไปที่เคยใช้สารใน 12 เดือนที่ผ่านมา ยังคงใช้สารนั้นใน 30 วันที่ผ่านมาเช่นกัน (ตารางที่

17) ซึ่งอาจจะแสดงว่านักเรียนเหล่านี้เพิ่งเคยลองใช้สารเหล่านี้ใน 30 วันที่ผ่านมา หรืออาจจะเคยใช้ก่อนหน้านี้และยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันก็ได้

นอกจากนี้ จะเห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเหล่านี้เคยมีประสบการณ์ใช้สารเสพติดทุกชนิด แม้กระทั่งสารที่จัดว่าเป็นสารเสพติดร้ายแรง เช่น ผงขาว/เฮโรอีน สารที่เคยนิยมใช้ในอดีต แต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีผู้นิยมมากนัก เช่น ฝิ่น รวมทั้งสารที่จัดว่าเป็นสารเสพติดตัวใหม่ๆ ที่เพิ่งแพร่ระบาดไม่นาน เช่น สารกลุ่มที่ใช้สำหรับบันเทิง (Club drugs) เช่น ยาอี/ยาเลิฟ ไอซ์ โคเคน ยาเค เป็นต้น และสารที่จัดอยู่ในกลุ่มยารักษาโรค คือ ยากลุ่มประสาทและยานอนหลับ โดยที่นักเรียนจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ใช้สารเหล่านี้ ก็ยังคงใช้อยู่ใน 30 วันก่อนการสำรวจ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าถึงสารเสพติดเกือบทุกชนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและควรได้รับความสนใจติดตามเฝ้าระวังต่อไป

ตารางที่ 15 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
a. บุหรี่	8.5	18.1	22.9	43.6	21.2	1.5	4.8	5.4	13.4	5.3
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	2.6	3.5	4.5	8.6	4.4	1.0	1.5	1.7	3.5	1.7
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครือขีด	0.9	1.8	2.5	3.5	2.0	0.6	1.1	2.4	2.5	1.6
d. ยานอนหลับ	4.0	5.6	6.3	7.1	5.6	4.1	6.1	8.2	10.5	6.8
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม	1.5	3.5	4.9	11.1	4.7	0.2	0.4	0.5	1.7	0.5
f. กัญชา	1.7	4.5	8.0	18.7	7.2	0.2	0.7	0.9	3.3	1.0
g. ฝิ่น	0.7	1.2	1.5	2.3	1.3	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0.6	1.0	1.3	2.2	1.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2
i. ยาเค (เคตามีน)	0.5	0.8	0.9	1.5	0.8	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1
j. โคเคน	0.6	0.7	1.0	1.2	0.8	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1
k. ผงขาว/เฮโรอีน	0.5	1.0	1.1	1.9	1.0	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	0.9	1.9	2.3	3.9	2.1	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
m. ยาบ้า	0.5	1.7	3.1	7.7	2.8	0.1	0.3	0.4	1.8	0.5
n. ไอซ์	0.6	0.9	1.7	3.3	1.4	0.1	0.3	0.3	0.9	0.3

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 16 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
	(6889)	(6619)	(4735)	(4480)	(22723)	(7355)	(7708)	(8307)	(3736)	(27106)
a. บุหรี่	8.0	16.0	19.3	39.4	18.8	1.7	4.4	4.5	11.4	4.6
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	2.5	3.3	3.8	7.5	4.0	1.1	1.4	1.3	3.0	1.5
c. ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด	0.9	1.3	2.1	3.1	1.7	0.7	1.0	1.8	1.6	1.2
d. ยานอนหลับ	3.3	4.0	4.8	5.7	4.3	3.4	4.6	6.1	7.8	5.2
e. กระเทียม หรือสารผสมกระเทียม	1.4	3.0	3.2	7.9	3.5	0.1	0.5	0.4	1.2	0.5
f. กัญชา	1.5	4.0	6.1	15.3	5.9	0.2	0.6	0.6	2.5	0.7
g. ฝิ่น	0.7	1.0	1.1	2.3	1.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0.6	0.8	1.0	2.2	1.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2
i. ยาเค (เคตามีน)	0.6	0.7	0.9	1.6	0.9	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0.6	0.8	1.0	1.8	1.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1.1	1.6	1.9	3.3	1.8	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4
l. ยาบ้า	0.6	1.5	2.5	6.2	2.4	0.1	0.3	0.3	1.1	0.4
m. ไอซ์	0.6	1.0	1.3	2.9	1.3	0.1	0.3	0.3	0.8	0.3

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)


ตารางที่ 17 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
	(6889)	(6619)	(4735)	(4480)	(22723)	(7355)	(7708)	(8307)	(3736)	(27106)
a. บุหรี่	63.2	70.0	77.6	83.9	76.6	55.5	55.1	59.2	73.6	62.5
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	64.0	65.5	54.8	57.8	60.3	65.6	63.2	60.2	60.0	62.1
c. ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด	70.0	77.1	67.6	62.2	68.5	67.5	60.3	68.4	64.4	65.8
d. ยานอนหลับ	56.8	56.1	58.0	62.4	58.1	65.7	60.3	53.1	71.0	60.8
e. กระเทียม	69.6	68.1	59.8	57.1	62.0	71.4	44.0	42.3	42.1	45.5
f. กัญชา	64.9	69.5	70.4	68.5	68.8	80.0	54.3	43.9	50.8	51.6
g. ฝิ่น	80.7	82.9	66.7	74.6	76.1	75.0	50.0	75.0	40.0	59.3
h. ยาอี/ยาเลิฟ	78.6	77.1	64.9	68.6	71.5	80.0	64.3	75.0	40.0	66.7
i. ยาเค (เคตามีน)	80.8	83.9	71.9	77.1	78.2	100.0	77.8	87.5	33.3	80.0
j. ผงขาว/เฮโรอีน	76.9	81.8	67.6	75.0	75.0	80.0	87.5	90.0	50.0	81.5
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	75.4	75.0	73.9	67.9	72.7	93.3	75.0	42.9	64.3	71.8
l. ยาบ้า	84.0	74.7	66.7	71.8	72.1	100.0	68.8	57.9	50.0	60.0
m. ไอซ์	72.4	73.8	57.8	59.2	64.1	100.0	75.0	46.7	58.8	63.3


ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 16)

ภาพที่ 6 อัตราการใช้สารเสพติดแต่ละชนิดในชีวิตและใน 12 เดือนที่ผ่านมา

นักเรียนชาย



นักเรียนหญิง



4.8 ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

นักเรียนชายหญิงประมาณร้อยละ 40 มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด บุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่มากที่สุดได้แก่ พ่อ รองลงมาคือญาติฝ่ายพ่อและแม่ ส่วนบุคคลที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติดมากที่สุด ได้แก่ แพนและพี่น้อง (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
บุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	55.7	61.1	64.4	61.9	60.4	56.9	58.9	60.2	54.6	58.2
มี	44.3	39.0	35.6	38.1	39.6	43.1	41.1	39.8	45.4	41.8
ไม่ระบุ(จำนวน)	(1693)	(1505)	(844)	(1012)	(5054)	(1344)	(1277)	(1119)	(601)	(4341)
บุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
แม่	45.8	46.6	49.2	51.0	47.6	46.4	46.0	46.3	49.3	46.7
พ่อ	73.3	73.8	76.4	71.5	73.8	73.7	72.4	74.2	73.4	73.4
แม่เลี้ยง	10.9	9.4	14.3	16.0	11.9	8.1	6.1	6.9	7.4	7.1
พ่อเลี้ยง	15.5	13.9	17.3	20.9	16.3	14.4	13.8	13.8	20.1	14.9
พี่น้อง	39.8	46.7	53.1	53.7	47.3	40.7	50.6	52.3	57.4	49.6
ปู่/ย่า	37.4	36.0	34.6	41.9	37.4	31.7	30.4	27.4	28.4	29.7
ตา/ยาย	39.6	35.9	35.9	40.4	38.0	33.1	35.0	30.1	34.6	33.1
ญาติฝ่ายพ่อ	60.7	61.7	64.2	63.2	62.1	66.6	67.3	66.7	71.4	67.5
ญาติฝ่ายแม่	55.8	57.7	65.3	60.8	59.1	62.0	65.0	64.9	68.1	64.5
แฟน	18.6	21.5	26.7	37.2	24.6	18.8	40.7	42.4	59.4	39.9
บุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	12.7	10.8	12.7	18.4	13.2	8.4	9.4	8.4	9.7	8.8
พ่อ	49.1	49.4	55.4	55.0	51.5	54.9	56.0	58.5	58.8	56.9
แม่เลี้ยง	4.0	5.4	1.6	10.4	5.3	2.2	1.8	2.0	3.4	2.2
พ่อเลี้ยง	9.8	8.9	9.2	20.0	11.4	12.1	9.4	9.6	13.1	10.8
พี่น้อง	27.7	29.7	36.1	40.6	32.5	27.5	34.0	37.2	41.2	34.3
ปู่/ย่า	27.8	25.8	24.2	28.2	26.7	26.2	25.3	23.0	19.5	24.1
ตา/ยาย	27.0	27.2	27.6	30.3	27.8	26.9	25.8	26.1	24.5	26.0
ญาติฝ่ายพ่อ	41.3	41.6	46.0	44.6	42.9	43.4	49.7	50.2	49.3	48.0
ญาติฝ่ายแม่	34.0	35.8	42.1	40.5	37.3	39.5	42.4	44.5	44.1	42.4
แฟน	5.5	8.4	9.3	16.9	9.3	12.9	27.2	30.1	41.4	27.6
บุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	2.6	2.1	2.4	8.3	3.5	1.1	1.7	1.7	1.4	1.5
พ่อ	1.4	1.5	1.1	4.0	1.8	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8
แม่เลี้ยง	2.6	3.5	1.2	6.9	3.4	0.6	1.4	1.0	0.9	1.0
พ่อเลี้ยง	2.4	2.5	1.8	5.7	3.0	0.9	1.3	1.2	0.8	1.1
พี่น้อง	3.8	3.5	3.8	9.5	4.9	2.7	3.7	3.5	3.6	3.4
ปู่/ย่า	3.0	2.9	0.7	5.4	3.1	0.8	1.5	1.1	1.6	1.2
ตา/ยาย	2.9	3.2	1.1	5.6	3.2	1.2	1.1	1.2	0.6	1.1
ญาติฝ่ายพ่อ	2.3	2.7	0.9	5.1	2.7	1.9	1.0	1.4	2.0	1.5
ญาติฝ่ายแม่	3.2	2.8	1.4	5.0	3.1	0.9	1.5	1.5	1.4	1.3
แฟน	4.5	4.5	3.4	8.8	5.2	2.3	5.0	4.0	5.7	4.2

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

4.9 ทักษะคิดต่อการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด

ทักษะคิดจากการใช้สารเสพติด เป็นการถามความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่อง ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเพียงหนึ่งหรือสองครั้ง การรังเกียจการใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งแม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง และความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

นักเรียนชาย และหญิงทุกระดับชั้นคิดว่าการใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงหนึ่งหรือสองครั้งมีผลเสียต่อสุขภาพ สารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพน้อยที่สุดได้แก่ ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม และมากที่สุดได้แก่ ยาบ้า นักเรียนทั้งชาย-หญิงมีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน นักเรียนชั้น ม.5 ทั้งชาย-หญิงมีความคิดว่าการใช้สารเสพติดเพียงหนึ่งหรือสองครั้งมีผลเสียต่อสุขภาพมากกว่านักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ (ตารางที่ 19)

ตารางที่ 19 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้ เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
a. บุหรี่	70.1	69.1	72.2	65.7	69.4	79.5	77.8	79.4	75.9	78.5
b. สุรา-เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	70.6	68.1	69.0	66.0	68.6	79.8	76.5	75.8	74.9	77.0
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	63.6	63.7	67.2	59.6	63.6	70.4	69.8	70.8	67.0	69.9
d. ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด	70.4	70.9	75.0	67.8	71.0	80.3	80.5	82.6	79.7	81.0
e. ยานอนหลับ	64.8	64.2	67.4	62.4	64.7	71.8	70.7	70.9	69.3	70.9
f. กระเทียม หรือ 4X100	72.5	74.5	80.2	70.1	74.2	81.8	84.1	87.9	82.8	84.5
g. กัญชา	75.2	76.4	81.9	72.4	76.4	85.5	86.2	89.8	84.6	86.9
h. ฝิ่น	75.0	76.7	82.8	73.0	76.7	85.5	86.8	90.0	85.2	87.2
i. ยาอี/ยาเลิฟ	75.4	76.7	83.0	73.4	77.0	85.2	86.6	90.5	85.6	87.3
j. ยาเค (เคตามีน)	74.7	76.8	83.0	73.7	76.8	84.4	86.5	90.4	85.5	87.0
k. โคเคน	74.4	76.9	83.0	73.7	76.8	83.7	86.2	90.3	85.6	86.7
l. ผงขาว/เฮโรอีน	74.7	77.1	83.6	74.2	77.2	84.4	86.3	90.6	85.5	87.0
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	73.7	75.9	81.9	73.7	76.1	83.6	84.9	88.8	85.0	85.7
n. ยาบ้า	76.1	78.1	83.9	75.1	78.1	86.7	88.0	91.4	86.5	88.5
o. ไอซ์	73.8	76.1	82.2	73.1	76.1	83.2	85.5	89.8	85.0	86.1

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด

นักเรียนทั้งชาย-หญิงคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจถ้านักเรียนใช้สารเสพติดแม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง โดยนักเรียนระดับชั้น ม. 1 คิดว่าเพื่อนจะรังเกียจมากกว่านักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่า นักเรียนชั้น ปวช.2 คิดว่าเพื่อนจะรังเกียจน้อยที่สุด สุรา-เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท เป็นสารเสพติดที่นักเรียนชายคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจน้อยที่สุด (ร้อยละ 40) ยานอนหลับเป็นสารเสพติดที่นักเรียนหญิงคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจน้อยที่สุด (ร้อยละ 40) ส่วนสารเสพติดที่นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจมากที่สุดได้แก่ ยาบ้า (นักเรียนชาย ร้อยละ 66 และนักเรียนหญิง ร้อยละ 76) นักเรียนหญิงมีอัตราการมองว่าเพื่อนจะรังเกียจหากตนเองใช้สารเสพติดเกือบทุกชนิดสูงกว่านักเรียนชายในชั้นปีเดียวกัน (ตารางที่ 20)

ตารางที่ 20 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
a. บุหรี่	59.6	47.3	42.6	25.8	45.7	66.7	56.7	53.5	43.7	56.6
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	57.5	40.8	32.3	21.3	40.1	62.0	46.7	39.0	30.8	46.3
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	57.8	48.5	44.2	30.9	46.9	60.7	52.8	49.1	42.1	52.3
d. ยาแก้ปวด/ยาลดไข้/ยาคลายเครียด	61.6	51.7	48.4	35.1	50.7	65.7	58.2	55.7	52.2	58.6
e. ยานอนหลับ	50.2	41.5	36.5	26.8	40.1	48.0	39.7	35.2	34.0	39.8
f. กระเทียม หรือ 4X100	69.1	61.9	60.5	39.9	59.4	75.3	70.5	72.9	62.8	71.5
g. กัญชา	71.7	64.2	63.2	41.1	61.7	78.4	72.9	75.7	65.8	74.3
h. ฝิ่น	72.0	65.4	65.3	46.6	63.6	78.7	73.5	76.7	67.5	75.1
i. ยาอี/ยาเลิฟ	72.1	65.9	66.0	47.4	64.2	78.8	73.9	77.0	67.7	75.3
j. ยาเค (เคตามีน)	71.9	66.1	66.5	48.3	64.4	78.3	74.1	77.3	68.1	75.4
k. โคเคน	71.9	66.5	66.6	48.7	64.6	78.2	73.9	77.3	68.5	75.4
l. ผงขาว/เฮโรอีน	72.3	66.5	66.8	49.1	64.9	78.3	74.2	77.4	68.4	75.5
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	71.6	65.8	66.3	50.0	64.5	77.4	73.3	76.3	68.1	74.6
n. ยาบ้า	73.5	67.1	67.6	49.1	65.6	79.6	75.2	78.1	69.2	76.4
o. ไอซ์	71.8	65.8	65.7	47.6	64.0	78.0	73.6	76.5	67.5	74.8

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ยาเคเป็นสารเสพติดที่นักเรียนทั้งชาย-หญิงในทุกระดับชั้น คิดว่าหายากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผงขาว/เฮโรอีน ยาอี/ยาเลิฟ ฝิ่นและไอซ์ (ตารางที่ 21) นักเรียนชั้น ปวช. 2 สัดส่วนน้อยกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ มีความคิดว่าจะหาสารเสพติดเกือบทุกชนิดได้ยาก นักเรียนชายสัดส่วนน้อยกว่านักเรียนหญิงมองว่าสามารถหาสารเหล่านี้ได้ยาก กระเทียมหรือ 4X100 กัญชา ฝิ่น ยาอี ยาเค โคเคน ยาบ้าและไอซ์

ตารางที่ 21 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ง่าย หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
a. บุหรี่	8.5	6.7	5.1	5.0	6.6	7.3	5.2	4.4	4.6	5.4
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	9.7	7.2	5.6	5.6	7.3	8.7	5.8	4.4	4.9	6.0
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	21.9	20.1	17.5	17.2	19.5	21.7	16.8	15.0	14.5	17.2
d. ยาแก้ปวด/ยาลดไข้/ยาคลายเครียด	32.2	32.7	32.0	31.6	32.2	33.3	30.4	30.4	32.9	31.6
e. ยานอนหลับ	22.8	22.7	21.7	21.5	22.3	19.3	17.1	15.7	17.8	17.4
f. กระเทียม หรือ 4X100	42.3	45.0	50.5	39.1	44.2	44.5	44.7	52.5	44.6	47.0
g. กัญชา	46.0	47.5	51.1	39.9	46.3	48.9	47.9	54.6	46.3	50.0
h. ฝิ่น	48.7	52.2	59.3	52.7	52.7	51.3	51.7	59.6	53.9	54.3
i. ยาอี/ยาเลิฟ	48.4	53.3	60.3	53.5	53.3	50.3	51.9	60.2	54.0	54.3
j. ยาเค (เคตามีน)	48.9	54.3	61.6	54.7	54.3	50.9	53.1	61.3	55.7	55.4
k. โคเคน	48.9	54.3	62.0	55.4	54.5	50.8	52.9	61.6	55.9	55.4
l. ผงขาว/เฮโรอีน	48.4	53.0	60.5	54.0	53.4	49.1	51.3	59.5	53.7	53.6
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	38.4	40.7	44.4	39.3	40.5	38.6	38.7	44.3	42.8	41.0
n. ยาบ้า	47.1	50.4	55.4	45.4	49.5	49.2	50.0	56.2	49.3	51.6
o. ไอซ์	47.4	52.9	59.1	51.9	52.4	49.2	51.4	59.5	53.7	53.6

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ง. ความคิดเห็นของนักเรียนต่อผลจากการดื่มสุรา

เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าคิดว่ากาการดื่มสุราส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ มากกว่านักเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกว่า ได้แก่ ทำให้เกิดความสนุกสนาน ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้สนิทกับเพื่อนได้เร็วขึ้น ไม่ประหม่า เก้อเงิน สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ และทำให้มีเรื่องที่จะคุยกันได้ ฯลฯ (ตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 นักเรียนคิดว่ากาการดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1 (6889)	ม. 3 (6619)	ม. 5 (4735)	ปวช. 2 (4480)	รวม (22723)	ม. 1 (7355)	ม. 3 (7708)	ม. 5 (8307)	ปวช. 2 (3736)	รวม (27106)
a. ไม่ประหม่า เก้อเงิน สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	28.3	37.5	43.3	49.1	38.3	26.9	32.5	38.9	40.6	34.1
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	16.4	26.0	35.8	39.8	27.9	9.6	17.0	25.6	26.1	18.9
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	18.0	27.6	33.2	43.8	29.1	12.4	19.6	24.0	30.1	20.4
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	16.1	25.8	33.6	45.4	28.4	8.6	14.9	19.7	25.6	16.2
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	19.2	30.5	39.5	50.9	33.0	11.6	20.1	27.5	32.2	21.7
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	20.1	33.1	42.7	53.9	35.3	14.9	22.9	29.6	31.6	24.0
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	14.6	24.2	29.4	41.7	25.9	11.1	16.7	21.2	27.8	18.1
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	27.0	43.5	53.4	66.1	45.1	22.2	37.1	45.1	49.6	37.3
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	19.5	30.0	34.9	45.7	30.9	11.9	19.4	20.4	26.2	18.6
j. ทำให้กินอาหารได้อร่อยมากขึ้น	16.1	24.2	26.3	34.4	24.2	10.1	13.9	16.8	20.3	14.6
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	16.1	25.4	29.0	39.2	26.1	11.0	15.2	16.2	19.7	15.0
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	11.8	17.6	20.9	27.4	18.5	8.9	12.2	13.8	16.6	12.4
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	11.0	16.6	18.5	25.6	17.1	5.9	8.2	9.2	13.2	8.6
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	27.7	40.0	47.8	55.4	41.0	28.5	35.5	39.9	35.9	35.0

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

สรุป

ในบทนี้ได้กล่าวถึงพฤติกรรมกาการใช้สารเสพติด และทัศนคติต่อกาการใช้สารเสพติดของนักเรียน นอกจากบุหรีซึ่งเป็นสารที่นักเรียนชายเคยใช้มากที่สุดแล้ว (ร้อยละ 21) นักเรียนชายร้อยละ 2-7 เคยใช้ กัญชา ยานอนหลับ กระต้อม/สารผสม กระต้อม ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยาบ้า สารระเหย ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด ในขณะที่นักเรียนหญิงร้อยละ 7 เคยใช้ยานอนหลับ ร้อยละ 5 เคยใช้บุหรี และนักเรียนหญิงเพียงร้อยละ 1-2 เคยใช้ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด และกัญชา นักเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าเคยใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนในระดับชั้นที่ต่ำกว่าทั้งชายและหญิง นักเรียนส่วนใหญ่รับรู้ว่าการใช้สารเสพติดทุกตัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อนจะรังเกียจหากตนเองใช้สารเหล่านี้ แม้เพียง 1-2 ครั้งก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในนักเรียนในภาคใต้ปีการศึกษา 2548 พบว่าอัตราต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

ผลการศึกษา 2

การดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ก. อัตราความชุกของการดื่มสุรา

ตารางที่ 23 แสดงอัตราความชุกของการดื่มสุราตามช่วงเวลาต่างๆ จำแนกตามชั้นปีและเพศ จะเห็นว่าอัตราความชุกของการดื่มสุรา และการดื่มหนักหรือดื่มจนเมาเพิ่มขึ้นตามชั้นปี และความชุกในนักเรียนชายสูงกว่าในนักเรียนหญิงทุกชั้นปี นักเรียนที่เคยดื่มในชีวิตเพียงประมาณครึ่งหนึ่งที่ยังดื่มอยู่ในปัจจุบันหรือใน 30 วันที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่จะดื่มเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น แต่จะสังเกตได้ว่านักเรียนที่ดื่มในปัจจุบันส่วนใหญ่ดื่มค่อนข้างหนัก คือมากกว่า 5 หน่วยขึ้นไปต่อครั้ง และส่วนใหญ่ดื่มจนเมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักเรียนชั้น ปวช. 2

ตารางที่ 23 อัตราความชุกของการดื่มสุราแบบแผนต่างๆ จำแนกตามชั้นปีและเพศ

แบบแผนการดื่ม	เพศ	ม.1	ม.3	ม.5	ปวช.2	รวม
การดื่มในชีวิต	ชาย	17.3	35.0	51.8	68.8	39.8
	หญิง	8.9	22.2	31.3	44.7	24.5
การดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา	ชาย	6.4	20.4	36.2	49.0	25.1
	หญิง	3.8	12.2	18.4	27.9	14.0
การดื่มใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	4.5	15.3	27.6	40.1	19.5
	หญิง	2.8	8.3	12.2	21.0	9.8
การดื่ม >3 ครั้งขึ้นไปใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	2.6	9.2	14.7	29.2	12.3
	หญิง	1.1	3.4	4.0	9.2	3.8
การดื่มหนัก (≥ 5 หน่วย/ครั้ง) ใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	1.7	7.7	14.3	20.6	10.2
	หญิง	0.8	3.2	5.4	9.1	4.1
การดื่มจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา	ชาย	3.9	12.7	20.3	36.8	16.4
	หญิง	1.8	5.8	7.8	16.2	6.7

ข. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา

ข.1 ลักษณะประชากรของนักเรียน

ตารางที่ 24 เป็นการแสดงลักษณะประชากรของนักเรียนที่ดื่มสุรารายใน 12 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าเพศ ระดับชั้นเรียน ศาสนา ภาคที่อยู่อาศัย สถานที่พัก และผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยนักเรียนหญิงมีความเสี่ยงในการดื่มน้อยกว่านักเรียนชายประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้น ม.1 นักเรียนชั้น ม.3 ม.5 และชั้นปวช.2 มีความเสี่ยงในการดื่มสุราเป็น 4-12 เท่า โดยความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นตามชั้นปี นักเรียนที่อยู่ในภาคอื่นๆ มีโอกาสดื่มน้อยกว่านักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณครึ่งหนึ่ง นักเรียนที่อยู่โรงเรียนนอกเขตเทศบาลมีความเสี่ยงน้อยกว่านักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล และนักเรียนของโรงเรียนเอกชนมีอัตราการดื่มสุรามากกว่านักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลเล็กน้อย นักเรียนที่อยู่หอพักนอกโรงเรียน หรืออยู่บ้านเช่า มีความเสี่ยงในการดื่มสุรามากกว่านักเรียนที่อยู่บ้านของครอบครัว และนักเรียนที่อยู่หอพักของโรงเรียนมีโอกาสที่จะดื่มน้อยกว่านักเรียนที่อยู่กับครอบครัว นักเรียนที่อยู่คนเดียวมีโอกาสในการดื่มสุราสูงที่สุดเมื่อเทียบกับนักเรียนที่อยู่กับพ่อแม่ เพื่อนหรือญาติพี่น้อง

ตารางที่ 24 ลักษณะประชากรของนักเรียนที่ดื่มสุรา

	นักเรียนที่ไม่ดื่มสุรา* (n=40,510)	นักเรียนที่ดื่มสุรา* (n=9,523)	OR (95% confidence interval)
เพศ : ชาย	74.9	25.1	1
หญิง	86.0	14.0	0.48 (0.46, 0.51)
ระดับชั้นเรียน : ม.1	94.9	5.1	1
ม.3	84.0	16.0	3.56 (3.26, 3.88)
ม.5	75.2	24.8	6.15 (5.65, 6.70)
ปวช.2	60.6	39.4	12.17 (11.16, 13.27)
ศาสนา : พุทธ	80.4	19.6	1
อื่นๆ	90.2	9.8	0.45 (0.39, 0.51)
ภาคที่อยู่ : กรุงเทพฯ	69.6	30.4	1
ปริมณฑล	79.0	21.0	0.61 (0.54, 0.68)
กลาง	84.9	15.1	0.41 (0.37, 0.45)
เหนือ	77.4	22.6	0.67 (0.61, 0.73)
ตะวันออกเฉียงเหนือ	80.9	19.1	0.54 (0.49, 0.59)
ใต้	84.7	15.3	0.40 (0.38, 0.46)
ลักษณะเมือง : ในเขตเทศบาล	78.9	21.1	1
นอกเขตเทศบาล	84.4	15.6	0.69 (0.66, 0.72)
ลักษณะโรงเรียน : รัฐบาล	81.3	18.7	1
เอกชน	79.1	20.9	1.15 (1.09, 1.22)
สถานที่พัก : บ้านครอบครัว	81.4	18.6	1
หอพักของโรงเรียน	83.7	16.3	0.85 (0.74, 0.98)
หอพักนอกโรงเรียน	62.3	37.7	2.66 (2.37, 2.97)
บ้านเช่า	78.4	21.6	1.21 (1.1, 1.33)

ตารางที่ 24 ลักษณะประชากรของนักเรียนที่ดื่มสุรา(ต่อ)

	นักเรียนที่ไม่ดื่มสุรา* (n=40,510)	นักเรียนที่ดื่มสุรา* (n=9,523)	OR (95% confidence interval)
พักอยู่กับ : คนเดียว	66.2	33.8	1
พ่อแม่	81.9	18.1	0.43 (0.37, 0.51)
เพื่อน	71.8	28.2	0.77 (0.64, 0.92)
ญาติพี่น้อง	79.5	20.5	0.50 (0.43, 0.60)
ผลการเรียน : ≥ 3	85.2	14.8	1
2.0-2.9	74.5	25.5	1.98 (1.86, 2.08)
1.0-1.9	66.8	33.2	2.85 (2.61, 3.11)
<1.0	84.9	15.1	0.98 (0.79, 1.2)
สถานภาพนักเรียน : เต็มเวลา	80.9	19.1	1
เรียนภาคค่ำ	78.4	21.6	1.16 (0.84,1.61)

* Row Percent

ข.2 การรับรู้สภาพแวดล้อม นโยบายและกฎระเบียบในโรงเรียน

การรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งกฎระเบียบและการปฏิบัติของโรงเรียนในด้านการป้องกันและควบคุมการดื่มสุรา เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราของเยาวชน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่ดื่มสุรามักจะมองสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น การทำร้ายร่างกาย ยกพวกตีกัน ทะเลาะวิวาท ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดมากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุรา นอกจากนี้นักเรียนที่ดื่มสุราเองก็มักจะมองว่ามีนักเรียนในโรงเรียนหรือเพื่อนของตนเองจำนวนมากที่ดื่มสุราหรือดื่มอย่างหนักด้วย โดยนักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสเป็น 2-3 เท่าของนักเรียนที่ไม่ดื่มสุราที่จะมองว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ดื่มสุราหรือดื่มอย่างหนักจำนวนมาก(ตารางที่ 25) การรับรู้สภาพแวดล้อมเช่นนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการดื่มสุราของนักเรียนคนนั้น เพราะนักเรียนอาจจะดื่มสุราด้วยเพื่อให้เข้ากับสังคมแวดล้อมที่ตนเองรับรู้ หรืออาจจะเป็นผลจากการที่นักเรียนคนนั้นดื่มสุราเอง จึงทำให้นักเรียนคนนั้นมีเพื่อนฝูงที่ดื่มสุราด้วยเป็นจำนวนมากก็ได้ ซึ่งการศึกษานี้ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเนื่องจากการเก็บข้อมูลภาคตัดขวาง

ตารางที่ 25 ยังแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุรามีแนวโน้มที่จะรับรู้นโยบายและกฎระเบียบของโรงเรียนในเชิงป้องกันและควบคุมการดื่มสุราของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมากกว่านักเรียนที่ดื่มสุรา เช่นการไม่ส่งเสริมการดื่มสุราของนักเรียน การบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสุรา รวมทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่นักเรียนที่ดื่มสุรากลั้มองว่าโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนดื่มสุราได้แต่ให้ดื่มอย่างปลอดภัยหรือไม่ดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา และยังคงมองว่าโรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียนมากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่ดื่มสุราเลือกที่จะรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียนในแบบที่เอื้อต่อการดื่มสุราของตนเอง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราของนักเรียน

ตารางที่ 25 การรับรู้สภาพแวดล้อม นโยบายและกฎระเบียบในโรงเรียน

	นักเรียนที่ไม่ดื่ม (n=40,510)	นักเรียนที่ดื่มสุรา (n=9,523)	OR (95% confidence interval)
คิดว่านักเรียนในโรงเรียนไม่มีปัญหาพฤติกรรมเลย	9099 (22.5)	1160(12.2)	1
มีปัญหาเล็กน้อย-ปัญหาหนัก	31411 (77.5)	8363 (87.8)	2.09 (1.96, 2.23)
คิดว่ามีนักเรียนในโรงเรียน <30% ดื่มสุรา	25025 (61.8)	4180 (43.9)	1
>30%	15485 (38.2)	5343 (87.8)	2.07 (1.97, 2.16)
คิดว่ามีเพื่อน <30% ดื่มสุรา	31498 (77.8)	4722 (49.6)	1
>30%	9012 (22.2)	4801 (50.4)	3.55 (3.39, 3.72)
คิดว่ามีนักเรียนในโรงเรียน <30% ดื่มสุราหนัก	33507 (82.7)	6697 (70.3)	1
>30%	7003 (17.3)	2826 (29.7)	2.02 (1.92, 2.12)
คิดว่ามีเพื่อน <30% ดื่มสุราหนัก	35844 (88.5)	7278 (76.4)	1
>30%	4666 (11.5)	2245 (23.6)	2.37 (2.24, 2.51)
ร. ไม่ส่งเสริมการดื่ม ไร	22761 (56.2)	4957 (52.1)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	17749 (43.8)	4566 (47.9)	1.18 (1.13,1.24)
ร. ยอมให้ดื่มแต่ไม่ให้ดื่มจนเมา ไร	3806 (9.4)	1777 (18.7)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	36704 (90.6)	7746 (81.3)	0.45 (0.43,0.48)
ร. แนะนำให้ดื่มอย่างปลอดภัย ไร	5293 (13.1)	2404 (25.2)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	35217 (86.9)	7119 (74.8)	0.45 (0.42,0.47)
ร. ไม่ค่อยทำอะไรเกี่ยวกับการป้องกันการดื่ม ไร	3798 (9.4)	1214 (12.7)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	36712 (90.6)	8309 (87.3)	0.71 (0.66,0.76)
ร. มีนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาการดื่ม ไร	31261 (77.2)	7126 (74.8)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	9249 (22.8)	2397 (25.2)	1.14 (1.08,1.2)
ร. บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการดื่ม	22761 (56.2)	4957 (52.1)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	17749 (43.8)	4566 (47.9)	1.18 (1.13,1.24)
นักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันการสุรา ไร	23296 (57.5)	4958 (52.1)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	17214 (42.5)	4565 (47.9)	1.25 (1.19, 1.3)
ร. ห้ามทุกคนดื่มในบริเวณโรงเรียน ไร	25135 (62.0)	5906 (62.0)	1
ไม่ใช่ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ	15375 (36.0)	3617 (38.0)	1.00 (0.96,1.05)

ง. การสัมผัสโฆษณาสุรา

เมื่อถามถึงประสบการณ์ที่นักเรียนได้สัมผัสกับโฆษณาสุราทางสื่อต่างๆ จะเห็นว่านักเรียนที่ดื่มสุรามีอัตราการสัมผัสกับสื่อโฆษณาสุราทุกชนิดบ่อยครั้งกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุราประมาณหนึ่งเท่าครึ่ง และมีอัตราการจำชื่อยี่ห้อสุราได้มากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มถึงเกือบสองเท่า รวมทั้งยังมีความรู้สึกลอยลางคิดถึงสุรามากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มประมาณสองเท่าเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการโฆษณามีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราของนักเรียนอย่างชัดเจน โดยจะเป็นในทางที่การเห็นได้ยีนโฆษณามีผลให้นักเรียนจดจำ และอยากดื่มสุรา หรือในทางกลับกันคือนักเรียนที่ดื่มสุราอยู่แล้วมีความสนใจต่อโฆษณาสุรามากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มจึงทำให้มองเห็นได้ยีนหรือจดจำโฆษณาสุราได้มากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่ม ดังนั้นการโฆษณาก็ยังมีผลส่งเสริมการดื่มสุราของนักเรียนเหล่านี้มากขึ้น

ตารางที่ 26 การสัมผัสโฆษณาสุรา

	นักเรียนที่ไม่ดื่มสุรา (n=40510)	นักเรียนที่ดื่มสุรา (n=9523)	OR (95% CI)
การเห็นได้ยีนโฆษณา ไม่เคย	11936 (29.5)	1994 (20.9)	1
เคย	28574 (70.5)	7529 (79.1)	1.58 (1.49,1.66)
จำนวนครั้งที่เห็นในโทรทัศน์ <5 ครั้ง/บางครั้ง	29085 (71.8)	6303 (66.2)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	11425 (28.2)	3220 (33.8)	1.3 (1.24,1.36)
จำนวนครั้งที่เห็นในวิทยุ <5 ครั้ง/บางครั้ง	37847 (93.4)	8671 (91.1)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	2663 (6.6)	852 (8.9)	1.4 (1.29,1.51)
จำนวนครั้งที่เห็นในหนังสือพิมพ์ <5 ครั้ง/บางครั้ง	35204 (86.9)	7881 (82.8)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	5306 (13.1)	1642 (17.2)	1.38 (1.3,1.47)
จำนวนครั้งที่เห็นในนิตยสาร <5 ครั้ง/บางครั้ง	37189 (91.8)	8435 (88.6)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	3321 (8.2)	1088 (11.4)	1.44 (1.34,1.55)
จำนวนครั้งที่เห็นในแผ่นป้าย <5 ครั้ง/บางครั้ง	35800 (88.4)	8021 (84.2)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	4710 (11.6)	1502 (15.8)	1.42 (1.34,1.52)
จำนวนครั้งที่เห็นในแผ่นปลิว <5 ครั้ง/บางครั้ง	38871 (96)	8956 (94)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	1639 (4)	567 (6)	1.5 (1.36,1.66)
จำนวนครั้งที่เห็นในแผ่นปิด <5 ครั้ง/บางครั้ง	38663 (95.4)	8884 (93.3)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	1847 (4.6)	639 (6.7)	1.51 (1.37,1.65)
จำนวนครั้งที่เห็นในอินเทอร์เน็ต <5 ครั้ง/บางครั้ง	36039 (89)	8047 (84.5)	1
>5 ครั้ง/หลายครั้ง	4471 (11)	1476 (15.5)	1.48 (1.39,1.58)
จำชื่อยี่ห้อสุรา ไม่ได้	26255 (64.8)	4704 (49.4)	1
ได้	14255 (35.2)	4819 (50.6)	1.89 (1.8,1.97)
อยากลองดื่มสุราหรือไม่ ไม่	36413 (89.9)	6601 (69.3)	1
ใช่	4097(10.1)	2922(30.7)	3.77(3.58,3.98)

จ. การมีทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่มสุรา

การมองเห็นผลเชิงบวกของการดื่มสุรา เช่นคิดว่าการดื่มสุราจะช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น ลดความประหม่าเงินอายุ จัดการกับความเครียดได้ กินอาหารได้ดีขึ้น หรือทำให้คนดูเชิ่กขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่ชักนำให้เยาวชนดื่มสุรา การศึกษานี้พบว่า นักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสที่จะมองเห็นผลเชิงบวกของการดื่มสุรามากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเมื่อรวมจำนวนข้อที่นักเรียนตอบว่าเห็นด้วยกับผลเชิงบวกของการดื่มสุราหรือไม่ 14 ข้อเข้าด้วยกัน (จากตารางที่ 23) นักเรียนที่ดื่มสุรามีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 5.88 (SD=4.56, median=6) ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ดื่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83 (SD=3.91, median=1) และเมื่อพิจารณาค่า odds ratio พบว่านักเรียนที่ดื่มสุรามีโอกาสที่จะมองเห็นผลเชิงบวกของการดื่มสุราเพิ่มมากขึ้นทุกข้อหนึ่งข้อเป็น 1.16 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ไม่ดื่มสุรา (OR= 1.16, 95%CI=1.16, 1.17)

สรุป

ผลการศึกษาในส่วนนี้ได้แสดงถึงอัตราความชุกของการดื่มสุราของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมา โดยพบว่านักเรียนชายร้อยละ 25 และนักเรียนหญิงร้อยละ 14 ดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมา และร้อยละ 19.5 และ 10 ดื่มใน 30 วันที่ผ่านมา อัตราการดื่มหนักและดื่มจนเมาใน 30 วันที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 10 และ 16 ในนักเรียนชาย และ 4 กับ 6 ในนักเรียนหญิง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราใน 12 เดือนที่ผ่านมาในนักเรียนเหล่านี้ได้แก่ ลักษณะประชากรด้าน เพศ ระดับชั้นเรียน ศาสนา สถานที่อยู่อาศัย และผลการเรียน โดยระดับชั้นเรียนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราสูงสุด การรับรู้สภาพแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน และนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียน โดยนักเรียนที่ดื่มสุรามีแนวโน้มที่จะรับรู้สภาพแวดล้อมและนโยบายกฎระเบียบของโรงเรียนในด้านที่สอดคล้องกับการดื่มสุรา ในขณะที่นักเรียนที่ไม่ดื่มสุรามองว่าตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ดื่มสุราน้อยกว่า และรับทราบกฎระเบียบของโรงเรียนในเชิงที่ไม่ส่งเสริมการดื่มสุราของนักเรียน ปัจจัยที่สำคัญอีกด้านหนึ่งที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราของนักเรียนจากผลการศึกษานี้ได้แก่ การสัมผัสกับโฆษณาสุรา นักเรียนที่ดื่มสุรามีอัตราการสัมผัสโฆษณาสุราบ่อยครั้งกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มและสามารถจดจำรวมทั้งมีความรู้สึกอยากลองดื่มมากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มสุราอย่างชัดเจน และนักเรียนที่ดื่มสุรามีทัศนคติเชิงบวกต่อการดื่มสุรามากกว่านักเรียนที่ไม่ดื่มอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า การรับรู้และยอมรับบรรทัดฐานสังคมที่ส่งเสริมการไม่ดื่มสุราและการรับรู้โฆษณาสุราเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการดื่มสุราของเยาวชน ข้อมูลเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการวางแผนโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาการดื่มสุราในเยาวชนของประเทศไทยได้ต่อไป

บรรณานุกรม

1. Assanangkornchai S, Pattanasattayawong U, Samangsri N, Muekthong A. Substance use among high-school students in Southern Thailand: trends over 3 years (2002-2004). *Drug Alcohol Depend.* 2007;12;86(2-3):167-74.
2. Johnston L, O' Malley P, Bachman J, Schulenberg J. *Monitoring the Future, National Survey Results on Drug Use, 1975-2004. Volume I: Secondary school students.* NIH Pub. No. 05-5727. Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse; 2005.
3. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Underage drinking. *Alcohol Alert.* 2006;67:1-8.
4. Bohning D, Na Ayutha RS. A case-control study of non-fatal traffic accidents on hospital patients in Bangkok metropolis. *Soc Preventiv Med.* 1997;42(6):351-7.
5. Swaddiwudhipong W, Nguntra P, Mahasakpan P, Koonchote S, Tantriratna G. Epidemiologic characteristics of drivers, vehicles, pedestrians and road environments involved in road traffic injuries in rural Thailand. *Southeast Asian J Trop Med Public Health.* 1994;25(1):37-44.
6. Karam E, Kypri K, Salamoun M. Alcohol use among college students: an international perspective. *Curr Opin Psychiatry.* 2007;20(3):213-21.
7. DeJong W, Wechsler H. Preventing alcohol-related problems on campus: Methods for assessing student use of alcohol and other drugs. 1998 [cited 2007 15/1/2007]; Available from: <http://www.edc.org/hee/>
8. สาวิตรี อัจฉนวงศ์กรชัย. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด. ใน: พิเชษฐ อุดมรัตน์, บรรณานิการ. ระบาดวิทยาของปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชในประเทศไทย. สงขลา: ลิบบราเดอรีการพิมพ์; 2547. p. 17-57.
9. American Psychiatric Association. Substance-related disorders. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition.* Washington, DC: American Psychiatric Association; 1994. p. 175-85.
10. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Youth risk behaviour surveillance: National college health risk behaviour survey - United States, 1995. *Morbid Mortal Weekly Report.* 1997;46:1-56.
11. คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์การวิชาการสารเสพติด. การประมาณการจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศ พ.ศ. 2546 : รายงานเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยยาเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547.
12. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. ข้อมูลจำแนกตามสาขาสถิติ, พฤติกรรมเสี่ยง. 2549 [cited 2549 25/01]; Available from: <http://www.nso.go.th>
13. พรเทพ สิริวนารังสรรค์, ธรณินทร์ กองสุข, สุวรรณภา อรุณพงศ์ไพศาล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, อัจฉรา จรัสสิงห์, เนตรชนก บัวเล็ก, et al. ความชุกของโรคจิต เวชในประเทศไทย : การสำรวจระดับชาติปี 2546, รายงานวิจัย. กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข; 2547.

14. นพดล กรรณิกา. รายงานผลโครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2545.
15. สาวิตรี อัครณงค์กรชัย, อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, นิศานต์ สำอางศรี, อโนชา หมักทอง. การศึกษาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ พ.ศ. 2548, รายงานวิจัย. สงขลา: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2549.
16. Dunn ME, Yniguez RM. Experimental demonstration of the influence of alcohol advertising on the activation of alcohol expectancies in memory among fourth- and fifth-grade children. *Exp Clin Psychopharmacol.* 1999;7(4):473-83.
17. Spear L. The adolescent brain and age-related behavioral manifestations. *Neuroscience Behav Rev.* 2000;24:417-63.
18. Jones SP, Heaven PC. Psychosocial correlates of adolescent drug-taking behavior. *J Adolesc.* 1998;21(2):127-34.
19. Assanangkornchai S, Geater AF, Saunders JB, McNeil DR. Effects of paternal drinking, conduct disorder and childhood home environment on the development of alcohol use disorders in a Thai population. *Addiction.* 2002;97(2):217-26.
20. Rose R, Dick D, Viken R, Kaprio J. Gene-environment interaction in patterns of adolescent drinking: Regional residency moderates longitudinal influences on alcohol use. *Alcohol Clin Exp Res.* 2001;25:637-43.
21. National Institute on alcohol Abuse and Alcoholism. Preventing alcohol abuse and related problems. *Alcohol Alert.* Rockville, MD: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism; 1996 October 1996. Report No.: 34 PH370.
22. Austin EW, Chen MJ, Grube JW. How does alcohol advertising influence underage drinking? The role of desirability, identification and skepticism. *J Adolesc Health.* 2006 ;38(4):376-84.
23. National Institute of Drug Abuse. NIDA research priorities and highlights: Drug abuse and addiction research. Rockville, MD: National Institute on Drug Abuse; 1999.
24. Fleming C, Brewer D. Parent drug use and bonding to parents as predictors of substance use in children of substance abuser. *J Child Adolesc Subs Abuse.* 1997;6:75-86.
25. Pentz M, Brannon B. The power of policy : relationship of smoking policy to adolescent smoking. *Am J Public Health.* 1989;79:857-62.
26. Toumbourou J, Stockwell T, Neighbors C, Marlatt G, Sturrgge J, Rehm J. Interventions to reduce harm associated with adolescent substance use. *Lancet.* 2007;369:1391-401.
27. Clark DB, Lynch KG, Donovan JE, Block GD. Health problems in adolescents with alcohol use disorders: self-report, liver injury, and physical examination findings and correlates. *Alcohol Clin Exp Res.* 2001;25(9):1350-9.

28. Strauss RS, Barlow SE, Dietz WH. Prevalence of abnormal serum aminotransferase values in overweight and obese adolescents. *J Pediatr.* 2000;136(6):727-33.
29. Dees WL, Srivastava VK, Hiney JK. Alcohol and female puberty: the role of intraovarian systems. *Alcohol Res Health.* 2001;25(4):271-5.
30. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Adolescent and school health: Youth Risk Behavior Surveillance System high school questionnaire, 2001. 2001 [cited 05/13/2002]; Available from: <http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/index.htm>

แบบสอบถาม

R P SC CR ST

โครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง หรือ เขียนอธิบายเพิ่มใน.....

ไม่ต้องเขียนชื่อ หรือเลขประจำตัวนักเรียน ขอขอบคุณในความร่วมมือ





หมวด A. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

A1. เพศ	<input type="checkbox"/> 1) ชาย <input type="checkbox"/> 2) หญิง
A21. อายุ	<input type="text"/> ปี เกิดเมื่อ พ.ศ. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> A22
A31. สถานที่เกิด	ภาค..... <input type="checkbox"/> จังหวัด <input type="text"/> <input type="text"/> A32
A4. ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ภาษา)	<input type="checkbox"/> 1) ไทย <input type="checkbox"/> 2) ไทยท้องถิ่น (ไทยใต้ ไทยเหนือ ไทยอีสาน) <input type="checkbox"/> 3) จีน <input type="checkbox"/> 4) มลายู/ยาวี <input type="checkbox"/> 5) สปป. ลาว <input type="checkbox"/> 6) เขมร <input type="checkbox"/> 7) พม่า <input type="checkbox"/> 8) อังกฤษ <input type="checkbox"/> 9) อื่นๆ ระบุ
A5. ศาสนา	<input type="checkbox"/> 1) พุทธ <input type="checkbox"/> 2) อิสลาม <input type="checkbox"/> 3) คริสต์ <input type="checkbox"/> 4) อื่นๆระบุ
A6. คุณกำลังเรียนอยู่ชั้น	<input type="checkbox"/> 1) ม.1 <input type="checkbox"/> 2) ม.3 <input type="checkbox"/> 3) ม.5 <input type="checkbox"/> 4) ปวช. ปี2
A7. คุณพักอยู่ที่ไหน	<input type="checkbox"/> 1) บ้าน/แฟลตของครอบครัว <input type="checkbox"/> 2) หอพักของโรงเรียน <input type="checkbox"/> 3) หอพักนอกโรงเรียน <input type="checkbox"/> 4) บ้านเช่า <input type="checkbox"/> 5) อื่นๆ ระบุ.....
A8. คุณพักอยู่กับใคร	<input type="checkbox"/> 1) คนเดียว <input type="checkbox"/> 2) พ่อแม่ <input type="checkbox"/> 3) เพื่อน <input type="checkbox"/> 4)ญาติพี่น้อง <input type="checkbox"/> 5) อื่นๆ ระบุ.....
A9. ผลการเรียนในเทอมที่ผ่านมาเกรดเฉลี่ย (กรุณาเขียนตัวเลขลงใน <input type="text"/>)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> หรือ <input type="text"/> <input type="text"/> เปอร์เซนต์ (เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง)
A10. คุณทำงานเพื่อหารายได้หรือไม่	<input type="checkbox"/> 1) ไม่ทำ <input type="checkbox"/> 2) ทำ
A11. สถานภาพนักเรียน	<input type="checkbox"/> 1) เรียนเต็มเวลา <input type="checkbox"/> 2) เรียนภาคค่ำ / เสาร์-อาทิตย์

หมวด B. ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน	
B1. คุณคิดว่านักเรียนในโรงเรียนของคุณมีปัญหาเหล่านี้มากน้อยเพียงไร	
a. ทำร้ายร่างกาย / ถูกทำร้าย/ทำร้ายคนอื่น	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
b. ใช้ยาเสพติด(ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
c. ฆ่าตัวตาย	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
d. ช่มชู้ กระทำซ้ำเรา	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
e. ดื่มสุร่าอย่างหนัก	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
f. ยกพวกตีกัน	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
g. ทะเลาะวิวาท	<input type="checkbox"/> 1) ไม่มีปัญหาเลย <input type="checkbox"/> 2) มีเล็กน้อย <input type="checkbox"/> 3) มีปานกลาง <input type="checkbox"/> 4) มีปัญหาหนัก
B2. ทำเครื่องหมาย X บนเส้นที่ตรงกับคำตอบของนักเรียน	
ตัวอย่าง	
a. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไรที่ดื่มสุร่า	
b. เพื่อนที่คุณรู้จักร้อยละเท่าไรที่ดื่มสุร่า	
c. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไรที่ดื่มสุร่าอย่างหนัก หรือดื่มจนเป็นปัญหา	
d. เพื่อนที่คุณรู้จักร้อยละเท่าไรที่ดื่มสุร่าอย่างหนัก หรือดื่มจนเป็นปัญหา	
e. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไรที่สูบบุหรี่	
f. เพื่อนที่คุณรู้จักร้อยละเท่าไรที่สูบบุหรี่	
g. นักเรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไรที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุร่า)	
h. เพื่อนที่คุณรู้จักร้อยละเท่าไรที่ใช้สารเสพติด (ไม่รวมบุหรี่/สุร่า)	

หมวด C. ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบ กติกาของโรงเรียน	
C1. โรงเรียนของคุณ :	
a. ไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
b. ยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
c. แนะนำให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
d. ไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
e. โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
f. โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
g. คุณเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
h. โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน	<input type="checkbox"/> 1) ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 3) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
C3. ตั้งแต่เปิดเรียนในปีการศึกษานี้มา เคยมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่	
a. คุณถูกตรวจค้นว่ามีสุรา บุหรี่หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของคุณ	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) เคย 2-3 ครั้ง
b. คุณถูกตรวจค้นว่ามีสุรา บุหรี่หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) เคย 2-3 ครั้ง
c. ขณะที่คุณหรือเพื่อนๆ กำลังดื่มสุรากัน คุณหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเสียดหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่น	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) เคย 2-3 ครั้ง
d. ขณะที่คุณกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนดื่มสุรา	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) เคย 2-3 ครั้ง
C4. ตั้งแต่เปิดเรียนในปีการศึกษานี้ โรงเรียนเคยทำสิ่งต่อไปนี้กับคุณ :	
a. คุณถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา	<input type="checkbox"/> 1) ฉันไม่ได้ดื่มสุรา <input type="checkbox"/> 2) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 3) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) เคย 2-3 ครั้ง
b. คุณถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่	<input type="checkbox"/> 1) ฉันไม่ได้สูบบุหรี่ <input type="checkbox"/> 2) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 3) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) เคย 2-3 ครั้ง
c. คุณถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด	<input type="checkbox"/> 1) ฉันไม่ได้ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด <input type="checkbox"/> 2) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 3) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) เคย 2-3 ครั้ง
d. คุณถูกส่งต่อไปรับการบำบัดรักษาเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติด	<input type="checkbox"/> 1) ฉันไม่ได้ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด <input type="checkbox"/> 2) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 3) เคย 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) เคย 2-3 ครั้ง

หมวด D. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน								
D1 คุณทำกิจกรรมต่อไปนี้บ่อยเพียงไร	ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา				ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา			
	0) ไม่ได้ขี่/ขี่ ขึ้น/นั่งรถ	1) ไม่เคย เลย	2) นานๆ ครั้ง	3) บ่อยๆ	4) ทุก ครั้ง	0) ไม่ได้ขี่/ขี่ ขึ้น/นั่งรถ	1) ไม่เคย เลย	2) เคย
a. สวมหมวกกันน็อก เวลาที่คุณขี่หรือขี่ขึ้นท้ายรถมอเตอร์ไซด์								
b. คาดเข็มขัดนิรภัยเวลาที่ขึ้นรถ หรือนั่งในรถยนต์ ด้านหน้าข้างคนขับ								
c. ขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ หลังจากที่เพิ่งดื่มสุรา								
d. พกพามีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ								
e. ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ								
f. ชกต่อยตบตีหรือต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ								
g. ชกต่อย/ตบตี/ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น <u>จนคุณได้รับบาดเจ็บที่ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล</u>								
D2a. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แพนของคุณเคยตบตีหรือทำร้ายร่างกายคุณโดยตั้งใจบ้างหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย	<input type="checkbox"/> 2) เคย		
D2b. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่คุณไม่เต็มใจบ้างหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยถูกบังคับ	<input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/> 3) ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	
D3. บางครั้งคนเราก็เกิดมีความรู้สึกเศร้าหมดอาลัยกับชีวิตและคิดอยากตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเพื่อจบชีวิตของตนเองเสีย								
D3a. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน จนคุณไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย	<input type="checkbox"/> 2) เคย		
D3b. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายอย่างจริงจังหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย	<input type="checkbox"/> 2) เคย		
D3c. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย	<input type="checkbox"/> 2) เคย		
D3d. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆกี่ครั้ง	<input type="checkbox"/> 1) 0 ครั้ง		<input type="checkbox"/> 2) 1-2 ครั้ง		<input type="checkbox"/> 3) 3-5 ครั้ง			
	<input type="checkbox"/> 4) 6-9 ครั้ง		<input type="checkbox"/> 5) 10 ครั้งขึ้นไป					
D3e. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ถ้าคุณเคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ การกระทำนั้นได้ทำให้คุณบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์หรือพยาบาลหรือไม่					<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย	<input type="checkbox"/> 2) เคย		

D4a. คุณเคยมีเพศสัมพันธ์บ้างหรือไม่	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย (ข้ามไปตอบข้อ D4f) <input type="checkbox"/> 2) เคย มีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกเมื่ออายุ <input type="text"/> <input type="text"/> ปี (ขณะนี้คุณอายุ ปี)
D4b. ในตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนทั้งหมดกี่คน	<input type="checkbox"/> 1) 1 คน <input type="checkbox"/> 2) 2 คน <input type="checkbox"/> 3) 3 คน <input type="checkbox"/> 4) 4 คน <input type="checkbox"/> 5) 5 คน <input type="checkbox"/> 6) 6 คนหรือมากกว่า
D4c. ครั้งสุดท้ายก่อนหรือระหว่างที่คุณมีเพศสัมพันธ์ คุณดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดหรือไม่	<input type="checkbox"/> 1) ไม่ใช่ <input type="checkbox"/> 2) ใช่
D4d. ครั้งสุดท้ายที่คุณมีเพศสัมพันธ์ คุณหรือคู่ของคุณใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบใด (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่ได้ใช้วิธีการใดๆ <input type="checkbox"/> 2) ยาเม็ดคุมกำเนิด <input type="checkbox"/> 3) ถุงยางอนามัย <input type="checkbox"/> 4) ยาฉีดคุมกำเนิด <input type="checkbox"/> 5) หลั่งภายนอก <input type="checkbox"/> 6) ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> 7) วิธีการอื่นๆ <input type="checkbox"/> 8) ไม่แน่ใจ
D4e. คุณเคยตั้งครรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรภ์กี่ครั้ง	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) 2 ครั้งหรือมากกว่านั้น <input type="checkbox"/> 4) ไม่แน่ใจ
D4f. คุณเคยได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องเอดส์ หรือ เอชไอวี (HIV) บ้างหรือไม่ในโรงเรียน	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) เคย <input type="checkbox"/> 3) ไม่แน่ใจ
หมวด E. ประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนเกี่ยวกับการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ 1 หน่วยหรือ 1 ดริงค์ (drink) เท่ากับเบียร์ 1 แก้ว/กระป๋อง หรือไวน์ 1 แก้ว หรือเหล้าวิสกี้/บรันดี 1 ถ้วยเล็ก 1 เป๊ก (50 มล.) เบียร์ 1 แก้ว(280-285 มล.) ไวน์ 1 แก้ว (100 มล.) เหล้า/วิสกี้ 1 ถ้วยเล็ก (30 มล.) หรือ 1 ฝาใหญ่    	
E1a. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณเคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว กี่ครั้ง	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) 1 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) 2 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) 3-5 ครั้ง <input type="checkbox"/> 5) 6-9 ครั้ง <input type="checkbox"/> 6) 10 ครั้งขึ้นไป
E1b. คุณดื่มสุราครั้งสุดท้ายเมื่อไร (ไม่นับการจิบหรือชิมเพียง 1-2 จิบเล็กๆ)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) มากกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 3) มากกว่า 30 วันที่ผ่านมาแต่ภายใน 12 เดือนนี้ <input type="checkbox"/> 4) มากกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ภายใน 30 วัน <input type="checkbox"/> 5) ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
E1c. ใน 30 วันที่ผ่านมา คุณดื่มสุรากี่ครั้ง	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) 1-2 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) 3-5 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) 6-9 ครั้ง <input type="checkbox"/> 5) 10-19 ครั้ง <input type="checkbox"/> 6) 20 ครั้งขึ้นไป
E1d. ใน 30 วันที่ผ่านมา แต่ละครั้งที่คุณดื่มสุรา คุณมักจะดื่มสักกี่หน่วย	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) 1 หน่วย <input type="checkbox"/> 3) 2 หน่วย <input type="checkbox"/> 4) 3 หน่วย <input type="checkbox"/> 5) 4 หน่วย <input type="checkbox"/> 6) 5 หน่วย <input type="checkbox"/> 7) 6 หน่วย <input type="checkbox"/> 8) 7 หน่วย <input type="checkbox"/> 9) 8 หน่วย <input type="checkbox"/> 10) 9 หน่วยขึ้นไป
E1e. ใน 30 วันที่ผ่านมาคุณดื่มสุราจนเมาสักกี่ครั้ง	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยเลย <input type="checkbox"/> 2) 1-2 ครั้ง <input type="checkbox"/> 3) 3-5 ครั้ง <input type="checkbox"/> 4) 6-9 ครั้ง <input type="checkbox"/> 5) 10-19 ครั้ง <input type="checkbox"/> 6) 20 ครั้งขึ้นไป

E1f. คุณดื่มสุร่าเป็นครั้งแรกตอนอายุเท่าไร (ไม่นับการจิบหรือชิมเพียง 1-2 จิบเล็กๆ)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยดื่มเลย <input type="checkbox"/> 2) เคยดื่ม ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ <input type="text"/> <input type="text"/> ปี (ขณะนี้คุณอายุ..... ปี)			
E1g. เวลาที่คุณดื่มสุร่า คุณมักจะดื่มที่ไหน (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยดื่ม <input type="checkbox"/> 2) งานโรงเรียน <input type="checkbox"/> 3) หอพัก <input type="checkbox"/> 4) บ้าน <input type="checkbox"/> 5) ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์รอบบริเวณโรงเรียน รัศมีไม่เกิน 500 เมตร <input type="checkbox"/> 6) ร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ รัศมีเกิน 500 เมตร <input type="checkbox"/> 7) ร้านน้ำชา <input type="checkbox"/> 8) สวน/ไร่/นา <input type="checkbox"/> 9) งานฉลอง/รื่นเริง <input type="checkbox"/> 10) อื่นๆ ระบุ.....			
E2. ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คุณเคยได้สุร่าจากแหล่งต่อไปนี้หรือไม่				
a. ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
b. ซื้อมาเอง โดยใช้บัตรประจำตัวของคนอื่น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
c. ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
d. ซื้อมาเอง โดยผู้ขายไม่ได้ตรวจบัตรประจำตัว	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
e. เามาจากบ้าน (ของพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง)	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
f. ซื้อมาเอง/ได้จากคนอื่นซึ่งได้มาจากร้านค้า/ร้านอาหาร /ผับ/บาร์ รอบบริเวณโรงเรียน รัศมีไม่เกิน 500 เมตร	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่		
g. หากคุณจะดื่มสุร่า คุณจะใช้เวลาในการไปซื้อ / หา นานเท่าไร	ใช้เวลาในการไปซื้อ / หา <input type="text"/> <input type="text"/> นาที			
E3. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีประสบการณ์ต่อไปนี้ เนื่องจากตัวคุณเองดื่มสุร่าหรือไม่	0) ไม่เคย	1) 1 ครั้ง	2) 2-3 ครั้ง	3) 4 ครั้งขึ้นไป
a. มีอาการเมาค้าง				
b. ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน				
c. มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น				
d. ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้				
e. ทะเลาะวิวาท ต่อสู้ ทำร้ายร่างกาย				
f. คลื่นไส้ อาเจียน				
g. ขับซิ่งรถ หลังดื่มสุร่า				
h. ขาดเรียน				
i. ถูกตำหนิต่อว่าจากคนที่รู้จัก				
j. คิดว่าฉันน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุร่า				
k. ทำของสำคัญหรือเงินหาย				
l. ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง				
m. ถูกจับเพราะขับซิ่งรถขณะเมาสุร่า				
n. ถูกลวนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ				
o. ลวนลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น				
p. พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ				
q. คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง				
r. พยายามที่จะฆ่าตัวตาย				
s. บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ				

t. ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา				
E4. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยมีประสบการณ์ต่อไปนี้เนื่องจากนักเรียนคนอื่นดื่มสุราหรือไม่	0) ไม่เลย	1) 1 ครั้ง	2) 2-3 ครั้ง	3) 4 ครั้งขึ้นไป
a. ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า				
b. ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง				
c. ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้				
d. ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้				
e. ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา				
f. ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน				
g. ถูกจับ หรือ เกี้ยวพาราสี โดยที่คุณไม่ต้องการ				
h. ถูกกลั่นแกล้ง หรือข่มขืน				

หมวด F ทศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

F1. คุณเคยเห็น/ได้ยิน โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อดังตารางด้านล่างนี้บ้างหรือไม่

1) ไม่เคย (ข้ามไปตอบหมวด G) 2) เคยเห็น

ถ้าเคยเห็น / ได้ยิน กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ที่ตรงกับคำตอบของคุณ

ชนิดของสื่อที่พบเห็น ใน 24 ชม.	1) เคยเห็น	2) จำนวนครั้งที่เห็น/ได้ยิน	(Type) ประเภทเครื่องดื่มที่เห็นทางสื่อนั้นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)				
			1) เหล้า	2) เบียร์	3) Spy / ไวน์	4) เหล้าผสมพร้อมดื่ม (เช่น บัคคาดี)	5) อื่นๆ โปรดระบุ.....
a. โทรทัศน์	<input type="checkbox"/>						
b. วิทยุ	<input type="checkbox"/>						
c. หนังสือพิมพ์	<input type="checkbox"/>						
d. นิตยสาร	<input type="checkbox"/>						
e. แผ่นป้ายโฆษณา (cut out)	<input type="checkbox"/>						
f. แผ่นปลิว	<input type="checkbox"/>						
g. แผ่นปิดประกาศ	<input type="checkbox"/>						
h. อินเทอร์เน็ต	<input type="checkbox"/>						
i. อื่นๆ ระบุ.....	<input type="checkbox"/>						

F2. ช่วงเวลาที่คุณมักจะเห็น/ได้ยินโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางวิทยุ / โทรทัศน์ บ่อยที่สุด (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬา หรือกิจกรรมอื่น) (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)

1) 16.00-20.00 น. 2) 20.00-24.00 น.
 3) 24.00-04.00 น. 4) 04.00-.8.00 น.
 5) 08.00-12.00 น. 6) 12.00-16.00 น.

F3. คุณจำชื่อยี่ห้อของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้บ้างหรือไม่

1) จำไม่ได้ 2) จำได้

F4. คุณจดจำหรือชอบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้ออะไรบ้าง

ตอบ.....

F5. คุณอยากลองหรืออยากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้ออะไร

ตอบ.....

หมวด G การรู้จักและเคยเห็นสารเสพติด		
G1. นอกจากสุราและบุหรี่แล้ว คุณรู้จักสารเสพติดอะไรบ้าง และเคยเห็นของจริงหรือไม่ กรุณาใส่ชื่อสารเสพติดที่รู้จักลงในช่อง A) แล้วตอบว่าเคยเห็นของจริงหรือไม่ในช่อง B) และ ถ้าเคยเห็นของจริง ให้ใส่ หมายเลข แหล่งหรือสถานที่ ที่เคยเห็นลงในช่อง C) (ดูหมายเลขด้านล่างนี้)		
แหล่งที่เคยเห็นของจริง (ไม่ใช่เคยเห็นจากโทรทัศน์)		
1) นิทรรศการ/การแสดงต่างๆ 2) ญาติ/คนในครัวเรือนใช้ 3) เพื่อนใช้ 4) แถวบ้านมีขาย/มีคนใช้ 5) ร้านขายยา 6) ร้านค้าทั่วไป 7) ใช้เอง 8) ตำรวจ 9) คนขายสารเสพติด 10) อื่นๆ (กรุณาระบุลงในตาราง)		
A) ชื่อสารเสพติด	B) เคยเห็นของจริงหรือไม่	C) เคยเห็นของจริงครั้งสุดท้ายที่ไหน
1.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคย <input type="checkbox"/> 2) เคย	<input type="checkbox"/>

G2. คุณใช้สารต่อไปนี้ เป็นครั้งแรกตอนอายุเท่าไร			(ขณะนี้คุณอายุ..... ปี)
a. บุหรี่	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
c. ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
d. ยานอนหลับ	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
e. กระพ้อม หรือสารผสมกระพ้อม เช่น 4X100	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
f. กัญชา	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
g. ฝิ่น	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
h. ยาอี/ยาเลิฟ	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
i. ยาเค (เคตามีน)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
j. โคเคน	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
k. ผงขาว/เฮโรอีน	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
m. ยาบ้า	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี
n. ไอซ์	<input type="checkbox"/> 1) ไม่เคยใช้เลย <input type="checkbox"/> 2) เคยใช้	ใช้ครั้งแรกอายุ	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ปี

G5. บุคคลในครอบครัวของคุณมีปัญหาจากการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติด หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) ไม่มีใครมีปัญหาจากการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดเลย 2) มี ถ้ามี กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ด้านล่าง

		1) ดื่ม สุรา	2) สูบ บุหรี่	3) ใช้สาร เสพติด			1) ดื่ม สุรา	2) สูบ บุหรี่	3) ใช้สาร เสพติด
a) แม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีแม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) ปู่/ย่า	<input type="checkbox"/> ไม่มีปู่/ย่า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) พ่อ	<input type="checkbox"/> ไม่มีพ่อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) ตา/ยาย	<input type="checkbox"/> ไม่มีตา/ยาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) แม่เลี้ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มีแม่เลี้ยง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) ญาติ ฝ่ายพ่อ	<input type="checkbox"/> ไม่มีญาติ ฝ่ายพ่อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) พ่อเลี้ยง	<input type="checkbox"/> ไม่มีพ่อเลี้ยง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i) ญาติ ฝ่ายแม่	<input type="checkbox"/> ไม่มีญาติ ฝ่ายแม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) พี่/น้อง	<input type="checkbox"/> ไม่มีพี่น้อง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j) แฟนของคุณ	<input type="checkbox"/> ไม่มีแฟน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

หมวด H ทศนคติต่อการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด

H1. คุณคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้ เพียง 1 – 2 ครั้ง มีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่	0) ไม่มีผลเสีย	1) มีผลเสีย	2) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
a. บุหรี่			
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท			
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)			
d. ยาแก้ปวดประสาทร/ยาคลายเครียด			
e. ยานอนหลับ			
f. กระเทียม หรือ 4X100			
g. กัญชา			
h. ฟีน			
i. ยาอี/ยาเลิฟ			
j. ยาเค (เคตามีน)			
k. โคเคน			
l. ผงขาว/เฮโรอีน			
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)			
n. ยาบ้า			
o. ไอซ์			

H2. คุณคิดว่าเพื่อนฝูงจะรังเกียจคุณหรือไม่ ถ้าคุณใช้สารต่อไปนี้เพียง 1 – 2 ครั้ง	0) ไม่รังเกียจ	1) รังเกียจ	2) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
a. บุหรี่			
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท			
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)			
d. ยาแก้ปวดประสาทร/ยาคลายเครียด			
e. ยานอนหลับ			

H2. คุณคิดว่าเพื่อนฝูงจะรังเกียจคุณหรือไม่ ถ้าคุณใช้สารต่อไปนี้เพียง 1-2 ครั้ง	0) ไม่รังเกียจ	1) รังเกียจ	2) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
f. กระท่อม หรือ 4X100			
g. กัญชา			
h. ฝิ่น			
i. ยาอี/ยาเลิฟ			
j. ยาเค (เคตามีน)			
k. โคเคน			
l. ผงขาว/เฮโรอีน			
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)			
n. ยาบ้า			
o. ไอซ์			
H3. คุณคิดว่าถ้าคุณต้องใช้สารต่อไปนี้ คุณจะหาได้ง่ายหรือไม่	0) ง่าย	1) หายาก	2) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
a. บุหรี่			
b. สุรา-เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท			
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)			
d. ยากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด			
e. ยานอนหลับ			
f. กระท่อม หรือ 4X100			
g. กัญชา			
h. ฝิ่น			
i. ยาอี/ยาเลิฟ			
j. ยาเค (เคตามีน)			
k. โคเคน			
l. ผงขาว/เฮโรอีน			
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)			
n. ยาบ้า			
o. ไอซ์			

H4. คุณคิดว่าการติ่มสุราทำให้เกิดผลต่อไปนี้หรือไม่		
a. ไม่ประหม่า เก้อเขิน สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่

g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
i. ช่วยให้คุณมีอะไรจะทำ	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
j. ทำให้กินอาหารได้อร่อยมากขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
m. ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ขึ้น	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	<input type="checkbox"/> 1) ใช่	<input type="checkbox"/> 2) ไม่ใช่

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจนจบ โชคดีค่ะ 😊

ภาคผนวก

สารบัญภาคผนวก

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลโรงเรียนกรุงเทพมหานคร	1
ภาคผนวก 1 สรุปผลการศึกษาของกรุงเทพมหานคร	3
ข้อมูลโรงเรียนปริมณฑล	40
ภาคผนวก 2 สรุปผลการศึกษาของปริมณฑล	42
ข้อมูลโรงเรียนภาคกลาง	79
ภาคผนวก 3 สรุปผลการศึกษาของภาคกลาง	85
ข้อมูลโรงเรียนภาคเหนือ	124
ภาคผนวก 4 สรุปผลการศึกษาของภาคเหนือ	128
ข้อมูลโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	166
ภาคผนวก 5 สรุปผลการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	171
ข้อมูลโรงเรียนภาคใต้	208
ภาคผนวก 6 สรุปผลการศึกษาของภาคใต้	212

ข้อมูลโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

จำนวนตัวอย่างแยกตามเขตการศึกษาและระดับชั้นเรียน

เขตการศึกษา	จำนวนโรงเรียน	ม. 1 (n=659)		ม. 3 (n=877)		ม. 5 (n=710)		ปวช. 2 (n=722)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. เขตการศึกษา 1	4 โรงเรียน	137	151	133	170	117	116	150	52	1026
1. เขตการศึกษา 2	4 โรงเรียน	105	145	124	135	82	126	158	87	962
2. เขตการศึกษา 3	4 โรงเรียน	46	75	147	168	131	138	169	106	980
รวม	9 โรงเรียน	288	371	404	473	330	380	477	245	2968

* ไม่ระบุเพศ 3 คน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามเขตการศึกษา ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
มัธยมวัดธาตุทอง	47	93	42	111	36	51	-	-	380
ศรีวิกรม์	90	58	91	59	81	65	-	-	444
โยนออฟอาร์คเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	32	49	81
เทคนิควิทยา	-	-	-	-	-	-	118	3	121
รวมเขตการศึกษา 1	137	151	133	170	117	116	150	52	1026
นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา	69	96	72	89	54	78	-	-	458
อุดมศึกษา	36	49	52	46	28	48	-	-	259
เซนต์จอร์จเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	46	82	128
เซนต์จอร์จโพลีเทคนิค	-	-	-	-	-	-	112	5	117
รวมเขตการศึกษา 2	105	145	124	135	82	126	158	87	962
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	46	75	38	77	40	77	-	-	353
ทิวไผ่งาม	-	-	109	91	91	61	-	-	352
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู(อาชีพะ)	-	-	-	-	-	-	24	102	126
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู(เทคนิค)	-	-	-	-	-	-	145	4	149
รวมเขตการศึกษา 3	46	75	147	168	131	138	169	106	980

* ไม่ระบุเพศ 3 คน

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
เขตการศึกษา 1 :									
ประเภท									
รัฐบาล	47	93	42	111	36	51	-	-	380
เอกชน	90	58	91	59	81	65	150	52	646
สายการเรียน									
สามัญ	137	151	133	170	117	116	-	-	824
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	150	52	202
เขตการศึกษา 2 :									
ประเภท									
รัฐบาล	69	96	72	89	54	78	-	-	458
เอกชน	36	49	52	46	28	48	158	87	504
สายการเรียน									
สามัญ	105	145	124	135	82	126	-	-	717
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	158	87	245
เขตการศึกษา 3 :									
ประเภท									
รัฐบาล	46	75	38	77	40	77	-	-	353
เอกชน	-	-	109	91	91	61	169	106	627
สายการเรียน									
สามัญ	46	75	147	168	131	138	-	-	705
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	169	106	275

*ไม่ระบุเพศ 3 คน

ภาคผนวก 1.

สรุปผลการศึกษารายการของกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=660)	ม. 3 (n=878)	ม. 5 (n=710)	ปวช.2 (n=723)	รวม (n=2971)
อายุ : mean±sd	12.76±0.6	12.76±0.7	16.50±0.7	17.11±1.0	15.25±1.8
median (พิสัย)	13(11-15)	15(12-17)	17(13-19)	17(15-23)	15(11-23)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(2)	(0)	(6)
รวม	658	876	708	723	2965
เพศ : ชาย (%)	288(43.7)	404(46.1)	330(46.5)	477(66.1)	1499(50.5)
หญิง (%)	371(56.3)	434(53.9)	380(53.5)	245(33.9)	1469(49.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(0)	(1)	(3)
รวม	659(100.0)	877(100.0)	710(100.0)	722(100.0)	2968(100.0)
ศาสนา : พุทธ	625(94.8)	839(95.8)	681(95.9)	695(96.1)	2840(95.7)
อิสลาม	22(3.3)	23(2.6)	18(2.5)	15(2.1)	78(2.6)
คริสต์และอื่นๆ	12(1.9)	14(1.6)	11(1.5)	13(1.8)	50(1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	659(100.0)	876(100.0)	710(99.9)	723(100.0)	2968(100.0)
สถานที่เกิด : ภาคใต้	16(2.6)	35(4.2)	41(6.1)	33(4.7)	125(4.4)
กรุงเทพ	510(81.5)	681(81.6)	497(74.2)	418(59.6)	2106(74.4)
ปริมณฑล	16(2.6)	28(3.4)	40(6.0)	81(11.6)	165(5.8)
ภาคกลาง	36(5.8)	44(5.3)	39(5.8)	87(12.4)	206(7.3)
ภาคเหนือ	21(3.4)	11(1.3)	16(2.4)	22(3.1)	70(2.5)
ภาคอีสาน	27(2.6)	35(4.2)	37(5.5)	60(4.7)	159(5.4)
ต่างประเทศ	-	1(0.1)	-	-	1(0.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(43)	(40)	(22)	(139)
รวม	626(100.2)	835(100.1)	670(100.0)	701(100.0)	2832(100.0)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน* :					
ไทย	651(98.6)	862(98.2)	692(97.5)	680(94.1)	2885(97.1)
ไทยท้องถิ่น	82(12.4)	83(9.5)	103(14.5)	100(13.8)	368(12.4)
จีน	47(7.1)	77(8.8)	74(10.4)	21(2.9)	219(7.4)
มลายู/ยาวี	3(0.5)	3(0.3)	1(0.1)	1(0.1)	8(0.3)
สปป.ลาว	2(0.3)	2(0.2)	2(0.3)	1(0.1)	7(0.2)
อื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น	49(7.4)	64(7.3)	46(6.5)	18(2.5)	174(5.8)
จำนวนทั้งหมด	660	878	710	723	2971
* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา					
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	545(82.8)	699(80.0)	581(81.9)	542(75.2)	2367(79.9)
หอพักของโรงเรียน	18(2.0)	60(6.9)	57(8.0)	7(1.0)	137(4.6)
หอพักนอกโรงเรียน	6(0.9)	14(1.6)	19(2.7)	41(5.7)	80(2.7)
บ้านเช่า	93(14.1)	99(11.3)	52(7.3)	127(17.6)	371(12.5)
อื่นๆ	1(0.2)	2(0.2)	-	4(0.6)	7(0.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(4)	(1)	(2)	(9)
รวม	658(100.0)	874(100.0)	709(100.0)	721(100.1)	2962(99.9)

ตารางที่ 1.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ	ม.1 (n=660)	ม. 3 (n=878)	ม. 5 (n=710)	ปวช.2 (n=723)	รวม (n=2971)
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว	9(0.9)	11(1.3)	14(2.0)	14(1.9)	45(1.5)
พ่อ แม่	574(87.1)	709(81.0)	568(80.1)	575(79.5)	2426(81.8)
เพื่อน	7(1.1)	29(3.3)	36(5.1)	15(2.1)	87(2.9)
ญาติพี่น้อง	72(10.9)	96(11.0)	81(11.4)	115(15.9)	364(12.3)
อื่นๆ	-	30(3.4)	10(1.4)	4(0.6)	44(1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(1)	(0)	(5)
รวม	659(100.0)	875(100.0)	709(100.0)	723(100.0)	2966(100.0)
ผลการเรียน: เกรตเฉลี่ย	mean±sd				
เกรต 0.1-1.0	3.3±0.6	3.0±0.6	2.8±0.8	2.6±0.6	2.9±0.7
เกรต 1.1-2.0	-	5(0.7)	20(3.1)	11(1.7)	36(1.5)
เกรต 2.1-3.0	24(6.5)	81(10.6)	98(15.3)	143(21.5)	346(14.2)
เกรต 3.1-4.0	101(27.3)	335(43.8)	270(42.1)	359(53.9)	1065(43.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	245(66.2)	343(44.9)	253(39.5)	153(23.0)	994(40.7)
รวม	(290)	(114)	(169)	(57)	(530)
รวม	370(100.0)	764(100.0)	641(100.0)	666(100.1)	2441(100.0)
ทำงานเพื่อหารายได้ : ไม่ทำ	588(89.4)	772(88.0)	601(85.2)	520(72.0)	2481(83.8)
ทำ	70(10.6)	105(12.0)	104(14.8)	202(28.0)	481(16.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(5)	(1)	(9)
รวม	658(100.0)	877(100.0)	705(100.0)	722(100.0)	2962(100.0)

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 1.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	89(31.3)	136(34.0)	108(33.2)	194(40.8)	527(35.5)	119(32.2)	172(36.6)	123(32.5)	96(39.3)	510(34.9)
มีเล็กน้อย	139(48.9)	191(47.8)	166(51.1)	210(44.1)	706(47.5)	193(52.2)	213(45.3)	182(48.0)	106(43.4)	694(47.4)
มีปานกลาง	47(16.5)	60(15.0)	45(13.8)	64(13.4)	216(14.5)	55(14.9)	75(16.0)	68(17.9)	36(14.8)	234(16.0)
มีปัญหามาก	9(3.2)	13(3.3)	6(1.8)	8(1.7)	36(2.4)	3(0.8)	10(2.1)	6(1.6)	6(2.5)	25(1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(5)	(1)	(14)	(1)	(3)	(1)	(1)	(6)
รวม	284(99.9)	400(100.1)	325(99.9)	476(100.0)	1485(99.9)	370(100.1)	470(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1463(100.0)
การใช้ยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	214(75.6)	281(70.3)	186(57.2)	269(56.4)	950(64.0)	253(68.6)	308(65.4)	198(52.1)	136(55.5)	895(61.1)
มีเล็กน้อย	53(18.7)	93(23.3)	100(30.8)	134(28.1)	380(25.6)	96(26.0)	136(28.9)	132(34.7)	55(22.4)	419(28.6)
มีปานกลาง	13(4.6)	19(4.8)	32(9.8)	54(11.3)	118(7.9)	18(4.9)	24(5.1)	43(11.3)	38(15.5)	123(8.4)
มีปัญหามาก	3(1.1)	7(1.8)	7(2.2)	20(4.2)	37(2.5)	2(0.5)	3(0.6)	7(1.8)	16(6.5)	28(1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(4)	(5)	(0)	(14)	(2)	(2)	(0)	(0)	(4)
รวม	283(100.0)	400(100.2)	325(100.0)	477(100.0)	1485(100.0)	369(100.0)	471(100.0)	380(100.0)	245(99.9)	1465(100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	251(88.4)	345(86.3)	296(91.1)	437(91.6)	1329(89.4)	316(85.4)	411(87.4)	339(89.2)	199(81.2)	1265(86.3)
มีเล็กน้อย	32(11.3)	46(11.5)	27(8.3)	28(5.9)	133(9.0)	51(13.8)	54(11.5)	37(9.7)	42(17.1)	184(12.6)
มีปานกลาง	1(0.4)	2(0.5)	-	4(0.8)	7(0.5)	1(0.3)	2(0.4)	3(0.8)	4(1.6)	10(0.7)
มีปัญหามาก	-	7(1.8)	2(0.6)	8(1.7)	17(1.1)	2(0.5)	3(0.6)	1(0.3)	-	6(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(5)	(0)	(13)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	284(100.1)	400(100.1)	325(100.0)	477(100.0)	1486(100.0)	370(100.0)	470(99.9)	380(100.0)	245(99.9)	1465(100.0)
ข่มขืน กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	249(87.7)	353(88.5)	282(86.8)	428(89.9)	1312(88.4)	326(88.1)	430(91.3)	399(89.2)	299(93.5)	1324(90.3)
มีเล็กน้อย	34(12.0)	34(8.5)	37(11.4)	32(6.7)	137(9.2)	39(10.5)	37(7.9)	35(9.2)	9(3.7)	120(8.2)
มีปานกลาง	1(0.4)	4(1.0)	4(1.2)	8(1.7)	17(1.1)	4(1.1)	2(0.4)	2(0.5)	3(1.2)	11(0.8)
มีปัญหามาก	-	8(2.0)	2(0.6)	8(1.7)	18(1.2)	1(0.3)	2(0.4)	4(1.1)	1(1.6)	11(0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(5)	(1)	(15)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	284(100.1)	399(100.0)	325(100.0)	476(100.0)	1484(99.9)	370(100.0)	471(100.0)	380(100.0)	245(100.0)	1466(100.1)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	219(77.1)	266(66.7)	181(54.7)	207(43.4)	873(58.8)	268(72.8)	308(65.4)	190(50.0)	127(51.8)	893(61.0)
มีเล็กน้อย	59(20.8)	104(26.1)	89(27.4)	161(33.8)	413(27.8)	87(29.6)	131(27.8)	148(38.9)	63(25.7)	429(29.3)
มีปานกลาง	4(1.4)	26(6.5)	48(14.8)	79(16.6)	157(10.6)	13(3.5)	31(6.6)	32(8.4)	43(17.6)	119(8.1)
มีปัญหามาก	2(0.7)	3(0.8)	7(2.2)	30(6.3)	42(2.8)	-	1(0.2)	10(2.6)	12(4.9)	23(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(5)	(0)	(14)	(3)	(2)	(0)	(0)	(5)
รวม	284(100.0)	399(99.9)	325(100.0)	477(100.0)	1485(100.0)	368(99.9)	471(100.0)	380(99.9)	245(100.0)	1464(100.0)

ตารางที่ 1.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	138(48.6)	200(49.9)	120(36.9)	205(43.1)	663(44.6)	141(38.1)	179(38.0)	126(33.2)	103(42.0)	549(37.4)
มีเล็กน้อย	115(40.5)	141(35.2)	157(48.3)	185(38.9)	598(40.2)	165(44.6)	189(40.1)	163(42.9)	82(33.5)	599(40.9)
มีปานกลาง	24(8.5)	47(11.7)	35(10.8)	69(14.5)	175(11.8)	54(14.6)	81(17.2)	74(19.5)	39(15.9)	248(16.9)
มีปัญหามาก	7(2.5)	13(3.2)	13(4.0)	17(3.6)	50(3.4)	10(2.7)	22(4.7)	17(4.5)	21(8.6)	70(4.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(3)	(5)	(1)	(13)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	284(100.1)	401(100.0)	325(100.0)	476(100.0)	1486(100.0)	370(100.0)	471(100.0)	380(100.1)	245(100.0)	1466(100.0)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	79(27.8)	117(29.3)	78(24.0)	136(28.6)	410(27.6)	86(23.2)	118(25.1)	73(19.2)	59(24.1)	336(22.9)
มีเล็กน้อย	148(52.1)	188(47.0)	176(54.2)	247(52.0)	759(51.1)	173(46.8)	191(40.6)	172(45.3)	109(44.5)	645(44.0)
มีปานกลาง	41(14.4)	74(18.5)	56(17.2)	73(15.4)	244(16.4)	98(26.5)	126(26.8)	111(29.2)	56(22.9)	391(26.7)
มีปัญหามาก	16(5.6)	21(5.3)	15(4.6)	19(4.0)	71(4.8)	13(3.5)	36(7.6)	24(6.3)	21(8.6)	94(6.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(5)	(2)	(15)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	284(99.9)	400(100.1)	325(100.0)	475(100.0)	1484(99.9)	370(100.0)	471(100.1)	380(100.0)	245(100.1)	1466(100.0)

ตารางที่ 1.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียน/เพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	253(91.7)	340(85.6)	209(64.9)	106(22.4)	908(61.8)	341(92.7)	364(78.3)	224(59.7)	84(34.4)	1013(69.8)
41-60%	18(6.5)	39(9.8)	68(21.0)	143(30.2)	268(18.2)	15(4.1)	65(14.0)	92(24.5)	82(33.6)	254(17.5)
>60 %	5(1.8)	18(4.5)	45(14.0)	225(47.5)	239(19.9)	12(3.3)	36(7.7)	59(15.7)	78(32.0)	185(12.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(7)	(8)	(3)	(30)	(3)	(8)	(5)	(1)	(17)
รวม	276(100.0)	397(99.9)	322(99.9)	474(100.1)	1469(99.9)	368(100.0)	465(100.0)	375(100.0)	244(100.0)	1452(100.0)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	273(96.1)	332(83.6)	183(56.8)	112(23.6)	900(60.9)	358(97.3)	395(84.4)	240(64.2)	120(49.2)	1113(76.7)
41-60%	7(2.5)	36(9.1)	51(15.8)	113(23.8)	207(14.0)	7(1.9)	42(9.0)	68(18.2)	59(24.2)	176(12.1)
>60 %	4(1.4)	29(7.3)	88(27.3)	249(52.5)	370(25.1)	3(0.8)	29(6.2)	66(17.6)	65(26.6)	163(11.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(7)	(8)	(3)	(22)	(3)	(7)	(6)	(1)	(17)
รวม	284(100.0)	397(100.0)	322(99.9)	474(100.1)	1477(100.0)	368(100.0)	466(100.0)	374(100.0)	244(100.0)	1452(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	275(98.2)	372(93.9)	285(88.8)	327(69.1)	1259(85.6)	354(96.2)	434(93.5)	338(90.9)	187(76.3)	1313(90.6)
41-60%	3(1.1)	16(4.0)	25(7.8)	97(20.5)	141(9.6)	10(2.7)	19(4.1)	27(7.3)	32(13.1)	88(6.1)
>60 %	2(0.7)	8(2.0)	11(3.4)	49(10.4)	70(4.8)	4(1.1)	11(2.4)	7(1.9)	26(10.6)	48(3.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(8)	(9)	(4)	(29)	(3)	(9)	(8)	(0)	(20)
รวม	280(100.0)	396(100.0)	321(100.0)	473(100.0)	1470(100.0)	368(100.0)	464(100.0)	372(100.1)	245(100.0)	1449(100.0)

ตารางที่ 1.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	277(98.2)	374(94.0)	290(90.1)	335(70.7)	1276(86.4)	360(98.1)	444(95.5)	344(92.0)	192(78.4)	1340(92.4)
41-60%	3(1.1)	15(3.8)	22(6.8)	84(17.7)	124(8.4)	7(1.9)	10(2.2)	22(5.9)	33(13.5)	72(5.0)
>60 %	2(0.7)	9(2.3)	10(3.1)	55(11.6)	76(5.1)	-	11(2.4)	8(2.1)	20(8.2)	39(2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(6)	(10)	(3)	(23)	(4)	(8)	(6)	(0)	(18)
รวม	282(100.0)	398(100.0)	322(100.0)	474(100.0)	1476(99.9)	367(100.0)	465(100.1)	374(100.0)	245(100.0)	1451(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	238(84.4)	333(83.7)	220(68.1)	87(18.4)	878(59.5)	323(87.8)	384(82.6)	243(65.1)	91(37.1)	1041(71.7)
41-60%	31(11.0)	34(8.5)	55(17.0)	99(21.0)	219(14.8)	29(7.9)	52(11.2)	79(21.2)	55(22.4)	215(14.8)
>60 %	13(4.6)	31(7.8)	48(14.9)	286(60.6)	378(25.6)	16(4.3)	29(6.2)	51(13.7)	99(40.4)	195(13.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(6)	(7)	(5)	(24)	(3)	(8)	(7)	(0)	(18)
รวม	282(100.0)	398(100.0)	323(100.0)	472(100.0)	1475(99.9)	368(100.0)	465(100.0)	373(100.0)	245(100.0)	1451(100.1)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	268(94.7)	350(88.6)	214(66.5)	124(26.3)	956(64.9)	359(97.8)	421(90.5)	293(78.3)	127(51.8)	1200(82.7)
41-60%	12(4.2)	25(6.3)	48(14.9)	91(19.3)	176(12.0)	7(1.9)	22(4.7)	37(9.9)	60(24.5)	126(8.7)
>60 %	3(1.1)	20(5.1)	60(18.6)	257(54.4)	340(23.1)	1(0.3)	22(4.7)	44(11.8)	58(23.7)	125(8.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(9)	(8)	(5)	(27)	(4)	(8)	(6)	(0)	(18)
รวม	283(100.0)	395(100.0)	322(100.0)	472(100.0)	1472(100.0)	367(100.0)	465(100.0)	374(100.0)	245(100.0)	1451(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	276(97.9)	385(97.0)	307(95.3)	394(83.1)	1362(92.3)	361(98.1)	443(95.3)	356(95.2)	215(87.8)	1375(94.7)
41-60%	5(1.8)	6(1.5)	12(3.7)	50(10.5)	73(4.9)	6(1.6)	14(3.0)	16(4.3)	23(9.4)	59(4.1)
>60 %	1(0.4)	6(1.5)	3(0.9)	30(6.3)	40(2.7)	1(0.3)	8(1.7)	2(0.5)	7(2.9)	18(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(7)	(8)	(3)	(24)	(3)	(8)	(6)	(0)	(17)
รวม	282(100.1)	397(100.0)	322(99.9)	474(100.0)	1475(99.9)	368(100.0)	465(100.0)	374(100.0)	245(100.1)	1452(100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	280(98.6)	386(97.2)	311(96.3)	390(82.3)	1367(92.5)	365(99.2)	444(95.5)	361(96.5)	214(87.3)	1384(95.3)
41-60%	4(1.4)	4(1.0)	7(2.2)	48(10.1)	63(4.3)	2(0.5)	12(2.6)	8(2.1)	22(9.0)	44(3.0)
>60 %	-	7(1.8)	5(1.5)	36(7.6)	48(3.2)	1(0.3)	9(1.9)	5(1.3)	9(3.7)	24(1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(7)	(7)	(3)	(21)	(3)	(8)	(6)	(0)	(17)
รวม	284(100.0)	397(100.0)	323(100.0)	474(100.0)	1478(100.0)	368(100.0)	465(100.0)	374(99.9)	245(100.0)	1452(100.0)

ตารางที่ 1.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	195(67.9)	235(58.8)	183(56.1)	233(49.1)	864(56.9)	278(75.1)	298(63.7)	235(61.8)	134(54.7)	945(64.6)
ไม่ใช่	48(16.7)	91(22.8)	81(24.8)	112(23.6)	332(22.3)	63(17.0)	126(26.9)	92(24.2)	69(28.2)	350(23.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	44(15.3)	74(18.5)	62(19.0)	130(27.4)	310(20.8)	29(7.8)	44(1.4)	53(13.9)	42(17.1)	168(11.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(4)	(2)	(11)	(1)	(5)	(0)	(0)	(6)
รวม	287(100.0)	400(100.1)	326(99.9)	475(100.1)	1488(100.0)	370(99.9)	468(100.0)	380(99.9)	245(100.0)	1463(100.1)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	15(5.2)	53(13.3)	47(14.4)	114(23.9)	229(15.4)	12(3.2)	34(7.2)	38(10.0)	40(16.3)	124(8.5)
ไม่ใช่	220(76.7)	267(66.8)	228(69.9)	273(57.4)	988(66.4)	302(81.6)	367(78.3)	274(72.1)	169(69.0)	1112(76.0)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	52(18.1)	80(20.0)	51(15.6)	89(8.7)	272(18.3)	56(15.1)	68(14.5)	68(7.9)	36(14.7)	228(15.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(4)	(1)	(10)	(1)	(4)	(0)	(0)	(5)
รวม	287(100.0)	400(100.1)	326(99.9)	476(100.0)	1489(100.0)	370(99.9)	469(100.0)	380(100.0)	245(100.0)	1464(100.1)
โรงเรียนแนะนำให้ให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	27(9.4)	58(14.5)	71(21.8)	180(37.8)	336(22.6)	41(11.1)	59(12.6)	71(18.7)	57(23.3)	228(15.6)
ไม่ใช่	210(73.2)	270(67.5)	195(59.8)	216(45.4)	891(59.8)	264(71.4)	314(67.0)	232(61.1)	144(58.8)	954(65.2)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	50(17.4)	72(18.0)	60(18.4)	80(16.8)	262(17.6)	65(17.6)	96(20.5)	77(20.3)	44(18.0)	282(19.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(4)	(1)	(10)	(1)	(4)	(0)	(0)	(5)
รวม	287(100.0)	400(100.0)	326(100.0)	476(100.0)	1489(100.0)	370(100.1)	469(100.1)	380(100.1)	245(100.1)	1464(100.1)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	18(6.3)	52(13.0)	59(18.1)	63(13.2)	192(12.9)	10(2.7)	30(6.4)	36(9.5)	22(9.0)	98(6.7)
ไม่ใช่	214(74.6)	262(65.5)	196(60.1)	305(63.9)	977(65.6)	314(85.1)	360(76.9)	270(71.2)	177(72.5)	1121(76.8)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	55(19.2)	86(21.5)	71(21.8)	109(22.9)	321(21.5)	45(12.2)	78(16.7)	73(19.3)	45(18.4)	241(16.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(4)	(0)	(9)	(2)	(5)	(1)	(1)	(9)
รวม	287(100.1)	400(100.0)	326(100.0)	477(100.0)	1490(100.0)	369(100.0)	468(100.0)	379(100.0)	244(99.9)	1460(100.0)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	226(78.7)	283(70.8)	243(74.5)	347(72.7)	1099(73.8)	335(90.5)	367(77.8)	314(82.6)	198(81.1)	1214(83.2)
ไม่ใช่	23(8.0)	43(10.8)	31(9.5)	49(10.3)	146(9.8)	14(3.8)	37(7.9)	25(6.6)	15(6.1)	91(6.2)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	38(13.2)	74(18.5)	52(16.0)	81(17.0)	245(16.4)	21(5.7)	62(13.3)	41(10.8)	31(12.7)	155(10.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(4)	(0)	(9)	(1)	(7)	(0)	(1)	(9)
รวม	287(99.9)	400(100.1)	326(100.0)	477(100.0)	1490(100.0)	370(100.0)	466(100.0)	380(100.0)	244(100.0)	1460(100.0)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด										
ใช่	196(68.3)	261(65.4)	236(72.4)	367(77.1)	1060(71.2)	261(70.5)	321(68.6)	273(72.0)	189(77.5)	1044(71.5)
ไม่ใช่	36(12.5)	45(11.3)	32(9.8)	43(9.0)	156(10.5)	31(8.4)	48(10.3)	29(7.7)	17(7.0)	125(8.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	55(19.2)	93(23.3)	58(17.8)	66(13.9)	272(18.3)	78(21.1)	99(21.2)	77(20.3)	38(15.6)	292(20.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(5)	(4)	(1)	(11)	(1)	(5)	(1)	(1)	(8)
รวม	287(100.0)	399(100.0)	326(100.0)	476(100.0)	1488(100.0)	370(100.0)	468(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1460(100.1)

ตารางที่ 1.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	157(54.9)	144(36.5)	115(35.5)	175(36.8)	591(39.9)	261(70.5)	321(68.6)	273(72.0)	121(49.6)	661(45.3)
ไม่ใช่	74(25.9)	129(32.7)	126(38.9)	171(35.9)	500(33.8)	31(8.4)	48(10.3)	29(7.7)	53(21.7)	373(25.5)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	55(19.2)	122(30.9)	83(25.6)	130(27.3)	390(26.3)	78(21.1)	99(21.2)	77(20.3)	70(28.7)	426(29.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(9)	(6)	(1)	(18)	(1)	(5)	(1)	(1)	(9)
รวม	286(100.0)	395(100.1)	324(100.0)	476(100.0)	1481(100.0)	370(100.0)	468(100.1)	379(100.0)	244(100.0)	1460(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	190(66.7)	236(59.7)	198(60.9)	358(75.5)	982(66.4)	196(53.0)	206(44.0)	138(36.5)	182(74.6)	1011(69.2)
ไม่ใช่	16(5.6)	52(13.2)	55(16.9)	56(11.8)	179(12.1)	72(19.5)	126(26.9)	122(32.3)	17(7.0)	70(4.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	79(27.7)	107(27.1)	72(22.2)	60(12.7)	318(21.5)	102(27.6)	136(29.1)	118(31.2)	45(18.4)	379(25.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(9)	(5)	(3)	(20)	(1)	(5)	(2)	(1)	(8)
รวม	285(100.0)	395(100.0)	325(100.0)	474(100.0)	1479(100.0)	370(100.1)	468(100.0)	380(100.0)	244(100.0)	1461(100.0)

ตารางที่ 1.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของนักเรียนเอง										
ไม่เคยเลย	276(96.2)	353(88.9)	281(86.2)	374(78.4)	1284(86.3)	363(98.1)	459(97.2)	365(96.1)	212(86.5)	1399(95.4)
เคย 1 ครั้ง	7(2.4)	22(5.5)	26(8.0)	40(8.4)	95(6.4)	4(1.1)	9(1.9)	11(2.9)	25(10.2)	49(3.3)
เคย 2- 3 ครั้ง	4(1.4)	22(5.5)	19(5.8)	63(13.2)	108(7.3)	3(0.8)	4(0.8)	4(1.1)	8(3.3)	19(1.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(7)	(4)	(0)	(12)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	287(100.0)	397(99.9)	326(100.0)	477(100.0)	1487(100.0)	370(100.0)	472(100.0)	380(100.1)	245(100.0)	1467(100.0)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	275(96.5)	359(90.4)	281(86.2)	349(73.5)	1265(85.2)	356(96.2)	448(95.3)	371(97.6)	222(90.6)	1397(95.4)
เคย 1 ครั้ง	-	18(4.5)	28(8.6)	43(9.1)	89(6.0)	8(2.2)	14(3.0)	7(1.8)	13(5.3)	42(2.9)
เคย 2- 3 ครั้ง	10(3.5)	20(5.0)	17(5.2)	83(17.5)	130(8.8)	6(1.6)	8(1.7)	2(0.5)	10(4.1)	26(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(7)	(4)	(2)	(16)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	285(100.0)	397(99.9)	326(100.0)	475(100.0)	1483(100.0)	370(100.0)	470(100.0)	380(99.9)	245(100.0)	1469(100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนกำลังดื่มสุรานั้น										
ไม่เคยเลย	273(96.5)	355(89.6)	256(78.8)	322(67.8)	1206(81.5)	359(97.3)	438(93.2)	343(90.3)	210(85.7)	1350(92.2)
เคย 1 ครั้ง	6(2.1)	17(4.3)	30(9.5)	65(13.7)	119(8.0)	5(1.4)	19(4.0)	23(6.1)	13(5.3)	60(4.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	4(1.4)	24(6.1)	38(11.7)	88(18.5)	154(10.4)	5(1.4)	13(2.8)	14(3.7)	22(9.0)	54(3.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(8)	(5)	(2)	(20)	(2)	(3)	(0)	(0)	(5)
รวม	283(100.0)	396(100.0)	325(100.0)	475(100.0)	1479(100.0)	369(100.1)	470(100.0)	380(100.1)	245(100.0)	1464(100.0)

ตารางที่ 1.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	280(98.2)	357(90.4)	307(94.8)	446(94.7)	1390(94.2)	362(97.8)	422(90.0)	364(95.8)	234(95.5)	1382(94.4)
เคย 1 ครั้ง	4(1.4)	30(7.6)	11(3.4)	12(2.5)	57(3.9)	6(1.6)	35(7.5)	12(3.2)	6(2.4)	59(4.0)
เคย 2- 3 ครั้ง	1(0.4)	8(2.0)	6(1.9)	13(2.8)	28(1.9)	2(0.5)	12(2.6)	4(1.1)	5(2.0)	23(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(8)	(6)	(6)	(24)	(1)	(4)	(0)	(0)	(5)
รวม	285(100.0)	395(100.0)	324(100.0)	471(100.0)	1475(100.0)	370(99.9)	469(100.0)	380(100.0)	245(99.9)	1464(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(204)	(235)	(144)	(143)	(726)	(309)	(351)	(238)	(146)	(1044)
ไม่เคยเลย	80(97.6)	129(79.1)	145(97.7)	258(77.5)	612(80.5)	58(95.1)	107(89.9)	123(86.6)	86(86.9)	374(88.8)
เคย 1 ครั้ง	1(1.2)	19(11.7)	19(10.4)	30(9.0)	69(9.1)	2(3.3)	5(4.2)	12(8.5)	6(6.1)	25(5.9)
เคย 2- 3 ครั้ง	1(1.2)	15(9.2)	18(9.9)	45(13.5)	79(10.4)	1(1.6)	7(5.9)	7(4.9)	7(7.1)	22(5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(6)	(4)	(1)	(13)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	82(100.0)	163(100.0)	182(100.0)	333(100.0)	760(100.0)	61(100.0)	119(100.0)	142(100.0)	99(100.1)	421(99.9)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(203)	(270)	(188)	(168)	(829)	(312)	(390)	(311)	(170)	(1183)
ไม่เคยเลย	78(96.3)	102(79.7)	91(65.9)	165(53.6)	436(66.6)	57(98.3)	74(92.5)	62(89.9)	64(85.3)	257(91.1)
เคย 1 ครั้ง	3(3.7)	10(7.8)	20(14.5)	49(15.9)	82(12.5)	1(1.7)	3(3.8)	4(5.8)	7(9.3)	15(5.3)
เคย 2- 3 ครั้ง	-	16(12.5)	27(19.6)	94(30.5)	137(20.9)	-	3(3.8)	3(4.3)	4(5.3)	10(3.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(6)	(4)	(1)	(15)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	81(100.0)	128(100.0)	138(100.0)	308(100.0)	655(100.0)	58(100.0)	80(100.1)	69(100.0)	75(99.9)	282(99.9)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(203)	(260)	(159)	(138)	(760)	(307)	(372)	(276)	(153)	(1108)
ไม่เคยเลย	81(98.8)	117(85.4)	143(85.6)	274(81.3)	615(95.5)	63(100.0)	96(98.0)	101(97.1)	83(90.2)	343(96.1)
เคย 1 ครั้ง	1(1.2)	12(8.8)	17(10.2)	39(11.6)	69(9.5)	-	1(1.0)	2(1.9)	6(6.5)	9(2.5)
เคย 2- 3 ครั้ง	-	8(5.8)	7(4.2)	24(7.1)	39(5.4)	-	1(1.0)	1(1.0)	3(3.3)	5(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(7)	(4)	(2)	(16)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	82(100.0)	137(100.0)	167(100.0)	337(100.0)	723(100.0)	63(100.0)	98(100.0)	104(100.0)	92(100.0)	357(100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(200)	(260)	(163)	(135)	(758)	(308)	(371)	(278)	(157)	(1114)
ไม่เคยเลย	84(98.8)	126(91.3)	154(94.5)	327(96.2)	691(95.2)	62(100.0)	98(99.0)	102(100.0)	85(96.6)	347(98.9)
เคย 1 ครั้ง	1(1.2)	5(3.6)	5(3.1)	12(3.5)	23(3.2)	-	1(1.0)	-	3(3.4)	4(1.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	-	7(5.1)	4(2.5)	1(0.3)	12(1.7)	-	-	-	-	-
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(6)	(4)	(2)	(15)	(1)	(3)	(0)	(0)	(4)
รวม	85(100.0)	138(100.0)	163(100.0)	340(100.0)	726(100.0)	62(100.0)	99(100.0)	102(100.0)	88(100.0)	351(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 1.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(69)	(107)	(68)	(53)	(297)	(114)	(132)	(120)	(37)	(403)
ไม่เคยเลย	50(23.7)	88(30.9)	68(27.0)	66(15.9)	272(23.4)	34(13.4)	89(26.3)	86(33.9)	56(26.9)	265(25.2)
นานๆครั้ง	81(38.4)	134(47.0)	118(46.8)	148(35.6)	481(41.3)	108(42.7)	176(52.1)	111(43.7)	95(45.7)	490(46.5)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	80(37.9)	63(22.1)	66(26.2)	202(48.6)	411(35.3)	111(43.9)	73(21.6)	57(22.4)	57(27.4)	298(28.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(12)	(10)	(8)	(38)	(4)	(3)	(6)	(0)	(13)
รวม	211(100.0)	285(100.0)	252(100.0)	416(99.9)	1164(100.0)	253(100.0)	338(100.0)	254(100.0)	208(100.0)	1053(100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(21)	(25)	(21)	(54)	(121)	(25)	(27)	(18)	(17)	(87)
ไม่เคยเลย	27(10.4)	64(17.5)	29(9.7)	56(13.6)	176(13.2)	22(6.4)	67(15.1)	32(9.0)	28(12.3)	149(10.9)
นานๆครั้ง	68(26.3)	91(24.9)	68(22.7)	114(27.7)	341(25.5)	94(27.4)	135(30.5)	92(25.8)	76(33.5)	397(29.0)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	164(63.3)	211(57.7)	202(67.6)	241(58.6)	818(61.3)	227(66.2)	241(54.4)	232(65.2)	123(54.2)	823(60.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(13)	(10)	(12)	(43)	(3)	(3)	(6)	(1)	(13)
รวม	(100.0)	366(100.0)	299(100.0)	411(100.0)	1335(100.0)	343(100.0)	443(100.0)	356(100.0)	227(100.0)	1369(100.0)
ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากที่พักดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	272(97.1)	347(88.7)	274(85.9)	299(64.3)	1192(81.9)	361(98.6)	450(96.2)	358(95.7)	210(87.1)	1379(95.2)
นานๆครั้ง	5(1.8)	37(9.5)	38(11.9)	134(28.8)	214(14.7)	3(0.8)	12(2.6)	14(3.7)	30(12.4)	59(4.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	3(1.1)	7(1.8)	7(2.2)	32(6.9)	49(3.4)	2(0.5)	6(1.3)	2(0.5)	1(0.4)	11(0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(13)	(11)	(12)	(44)	(5)	(5)	(6)	(4)	(20)
รวม	280(100.0)	391(100.0)	319(100.0)	465(100.0)	1455(100.0)	366(99.9)	468(100.1)	374(99.9)	241(99.9)	1449(100.1)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	253(90.7)	315(80.6)	256(80.3)	311(67.2)	1135(78.2)	348(95.1)	410(87.8)	320(85.6)	200(82.6)	1278(88.2)
นานๆครั้ง	18(6.5)	56(14.3)	49(15.4)	199(25.7)	242(16.7)	13(3.6)	41(8.8)	46(12.3)	30(12.4)	130(9.0)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	8(2.9)	20(5.1)	14(4.4)	33(7.1)	75(5.2)	5(1.4)	16(3.4)	8(2.1)	12(5.0)	41(2.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(13)	(11)	(14)	(47)	(5)	(6)	(6)	(3)	(20)
รวม	279(100.1)	391(100.0)	319(100.1)	463(100.0)	1452(100.1)	366(100.1)	467(100.0)	374(100.0)	242(100.0)	1449(100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	269(96.1)	362(92.8)	287(90.0)	369(79.7)	1287(88.6)	363(99.5)	458(98.1)	371(99.2)	232(96.3)	1424(98.4)
นานๆครั้ง	10(3.6)	22(5.6)	29(9.1)	79(17.1)	140(9.6)	-	8(1.7)	3(0.8)	7(2.9)	18(1.2)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	1(0.4)	6(1.5)	3(0.9)	15(3.2)	25(1.7)	2(0.5)	1(0.2)	-	2(0.8)	5(0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(14)	(11)	(14)	(47)	(6)	(6)	(6)	(4)	(22)
รวม	280(100.1)	390(100.0)	319(100.0)	463(100.0)	1452(99.9)	365(100.0)	467(100.0)	374(100.0)	241(100.0)	1447(99.9)

ตารางที่ 1.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	207(73.9)	295(75.6)	229(72.0)	286(62.0)	1017(70.2)	338(92.3)	421(90.1)	340(90.9)	197(81.7)	1296(89.5)
นานๆครั้ง	61(21.8)	73(18.7)	73(23.0)	148(32.1)	355(24.5)	25(6.8)	40(8.6)	30(8.0)	40(16.6)	135(9.3)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	12(4.3)	22(5.6)	16(5.0)	27(5.9)	77(5.3)	3(0.8)	6(1.3)	4(1.1)	4(1.7)	17(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(14)	(12)	(16)	(50)	(5)	(6)	(6)	(4)	(21)
รวม	280(100.0)	390(100.0)	318(100.0)	461(100.0)	1449(100.0)	366(99.9)	467(100.0)	374(100.0)	241(100.0)	1448(100.0)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	262(93.6)	347(89.0)	269(84.3)	393(85.2)	1271(87.7)	359(98.1)	455(97.4)	365(97.6)	277(94.2)	1406(97.1)
นานๆครั้ง	15(5.4)	31(7.9)	47(14.7)	59(12.8)	152(10.5)	4(1.1)	10(2.1)	9(2.4)	11(4.6)	34(2.3)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	3(1.1)	12(3.1)	3(0.9)	9(2.0)	27(1.9)	3(0.8)	2(0.4)	-	3(1.2)	8(0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(14)	(11)	(16)	(49)	(5)	(6)	(6)	(4)	(21)
รวม	280(100.1)	390(100.0)	319(99.9)	461(100.0)	1450(100.1)	366(100.0)	467(100.0)	374(100.0)	241(100.0)	1469(100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(193)	(218)	(151)	(138)	(700)	(298)	(277)	(173)	(59)	(807)
ไม่เคยเลย	85(92.4)	154(86.5)	146(83.0)	271(80.7)	656(83.9)	70(95.9)	180(94.2)	194(93.7)	165(88.7)	609(92.7)
เคย	7(7.6)	24(13.5)	30(17.0)	65(19.3)	126(16.1)	3(4.1)	11(5.8)	13(6.3)	21(11.3)	48(7.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(8)	(3)	(3)	(17)	(0)	(5)	(0)	(0)	(5)
รวม	92(100.0)	178(100.0)	176(100.0)	336(100.0)	782(100.0)	73(100.0)	191(100.0)	207(100.0)	186(100.0)	657(100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(229)	(248)	(189)	(123)	(789)	(328)	(374)	(301)	(105)	(1108)
ไม่เคยถูกบังคับ	57(100.0)	137(93.8)	122(89.1)	313(89.7)	629(91.3)	43(100.0)	88(97.8)	75(94.9)	123(50.2)	329(93.5)
เคย	-	9(6.2)	15(10.9)	36(10.3)	60(8.7)	-	2(2.2)	4(5.1)	17(6.9)	23(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(10)	(4)	(5)	(21)	(0)	(9)	(0)	(0)	(9)
รวม	57(100.0)	146(100.0)	137(100.0)	349(100.0)	689(100.0)	43(100.0)	90(100.0)	79(100.0)	140(100.1)	352(100.1)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขบขัน/ซอมนั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 1.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	252(88.1)	315(80.2)	267(81.9)	390(82.1)	1224(82.7)	336(90.6)	379(80.2)	305(81.1)	186(75.9)	1206(82.7)
เคย	34(11.9)	78(19.8)	59(18.1)	85(17.9)	256(17.3)	35(9.4)	88(18.2)	71(18.9)	59(24.1)	253(17.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(11)	(4)	(2)	(19)	(0)	(6)	(4)	(0)	(10)
รวม	286(100.0)	393(100.0)	326(100.0)	475(100.0)	1480(100.0)	371(100.0)	467(100.0)	376(100.0)	245(100.0)	1459(100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	278(97.2)	361(91.6)	301(92.6)	443(93.1)	1383(93.4)	358(96.5)	430(91.8)	352(93.1)	212(86.9)	1352(92.5)
เคย	8(2.8)	33(8.4)	24(7.4)	33(6.9)	98(6.6)	13(3.5)	39(8.3)	26(6.9)	32(13.1)	110(7.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(10)	(5)	(1)	(18)	(0)	(4)	(2)	(1)	(7)
รวม	286(100.0)	394(100.0)	325(100.0)	477(100.0)	1481(100.0)	371(100.0)	469(100.0)	378(100.0)	244(100.0)	1462(100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	277(97.2)	358(90.9)	300(92.6)	446(94.3)	1381(93.6)	358(96.5)	419(89.5)	349(92.3)	217(88.6)	1343(91.9)
เคย	8(2.8)	36(9.1)	24(7.3)	27(5.7)	95(6.3)	13(3.5)	49(10.5)	29(7.7)	28(11.4)	119(8.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(10)	(6)	(4)	(23)	(0)	(5)	(2)	(0)	(7)
รวม	285(100.0)	394(100.0)	324(100.0)	473(100.0)	1476(100.0)	371(100.0)	468(100.0)	378(100.0)	245(100.0)	1462(100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	275(96.2)	357(90.4)	300(92.6)	449(94.5)	1381(93.3)	358(96.5)	431(91.9)	352(93.1)	218(89.0)	1359(92.9)
เคย	11(3.8)	38(9.6)	24(7.4)	26(5.5)	99(6.7)	13(3.5)	38(8.1)	26(6.9)	27(11.0)	104(7.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(9)	(6)	(2)	(19)	(0)	(4)	(2)	(0)	(6)
รวม	286(100.0)	395(100.0)	324(100.0)	475(100.0)	1480(100.0)	371(100.0)	469(100.0)	378(100.0)	245(100.0)	1463(100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	7(63.6)	21(55.3)	14(58.3)	24(92.3)	66(66.7)	7(53.8)	28(73.7)	20(76.9)	20(74.1)	75(72.1)
3-5 ครั้ง	4(36.4)	4(10.0)	2(8.3)	2(7.7)	12(12.1)	4(30.8)	7(18.4)	5(19.2)	6(22.2)	22(21.2)
> 5 ครั้ง	0(0.0)	13(34.2)	8(33.3)	0(0.0)	21(21.2)	2(15.4)	3(7.9)	1(3.8)	1(3.7)	7(6.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11(100.0)	38(100.0)	24(99.9)	26(100.0)	99(100.0)	13(100.0)	38(100.0)	26(99.9)	27(100.0)	104(100.0)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	9(81.8)	25(65.8)	14(58.3)	19(73.1)	67(67.7)	11(84.6)	29(78.4)	22(84.6)	20(74.1)	82(79.6)
เคย	2(18.2)	13(34.2)	10(41.7)	7(26.9)	32(32.3)	2(15.4)	8(21.6)	4(15.4)	7(25.9)	21(20.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
รวม	11(100.0)	38(100.0)	24(99.9)	26(100.0)	99(100.0)	13(100.0)	37(100.0)	26(99.9)	27(100.0)	104(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 1.8 พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	281(97.9)	366(92.0)	272(83.4)	212(44.6)	1131(76.1)	371(100.0)	459(97.5)	368(97.4)	141(57.6)	1339(91.4)
เคยมี	6(2.1)	32(7.9)	54(16.6)	263(55.4)	355(23.9)	-	12(2.5)	10(2.6)	104(42.4)	126(8.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(6)	(4)	(2)	(13)	(0)	(2)	(2)	(0)	(4)
รวม	287(100.0)	398(100.0)	326(100.0)	475(100.0)	1486(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	378(100.0)	(100.0)	1465(100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	10.7±2.3	13.1±2.1	13.8±2.0	14.9±1.4	14.6±1.7	-	12.8±1.9	15.0±1.7	15.6±1.2	15.2±1.6
median (พิสัย)	12(8-12)	14(6-15)	14(8-17)	15(7-20)	15(6-20)	-	13.5(9-15)	15(12-17)	16(10-18)	15(9-18)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(14)	(5)	(35)	(57)	-	(0)	(1)	(11)	(12)
รวม	3	18	49	228	298	-	12	9	93	114
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	5(83.3)	16(50.0)	11(21.6)	55(21.1)	87(24.9)	-	2(45.5)	4(44.4)	53(53.0)	62(51.7)
2 คน	1(16.7)	1(3.1)	13(25.5)	65(24.9)	80(22.9)	-	1(9.1)	3(3.33)	33(33.0)	37(30.8)
3 คน	-	1(3.1)	2(3.9)	29(11.1)	32(9.1)	-	1(9.1)	-	7(7.0)	8(6.7)
4 คน	-	3(9.4)	2(3.9)	31(11.9)	36(10.3)	-	2(18.2)	1(11.1)	1(1.0)	4(3.3)
5 คน	-	1(3.1)	4(7.8)	13(5.0)	18(5.1)	-	-	-	2(2.0)	2(1.7)
6 คน ขึ้นไป	-	10(31.3)	19(37.3)	68(26.1)	97(27.7)	-	2(18.2)	1(11.1)	4(4.0)	7(5.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(2)	(5)	-	(1)	(1)	(4)	(6)
รวม	6(100.0)	32(100.0)	51(100.0)	261(100.0)	350(100.0)	(0.0)	11(100.0)	9(100.0)	100(100.0)	120(100.0)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	5(100.0)	22(68.8)	35(67.3)	227(88.0)	289(83.3)	-	11(91.7)	7(70.0)	92(89.3)	110(88.0)
เคย	-	10(31.3)	17(32.7)	31(12.0)	58(16.3)	-	1(8.3)	3(30.0)	11(10.7)	15(12.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(0)	(2)	(5)	(8)	-	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	5(100.0)	32(99.9)	52(100.0)	258(100.0)	347(100.0)	(0.0)	12(100.0)	10(100.0)	103(100.0)	125(100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	1(16.7)	10(31.3)	9(16.7)	40(15.4)	60(17.2)	-	8(72.7)	4(40.0)	19(18.3)	31(24.8)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	-	2(6.3)	1(1.9)	18(6.9)	21(6.0)	-	-	-	10(9.6)	10(8.0)
ถุงยางอนามัย	3(50.0)	13(40.6)	25(46.3)	129(49.8)	170(48.7)	-	1(8.3)	-	36(34.6)	37(29.6)
ยาฉีดคุมกำเนิด	-	3(9.4)	()	2(0.8)	2(0.6)	-	-	-	2(1.9)	2(1.6)
หลังภายนอก	-	1(3.1)	8(14.8)	52(20.1)	63(18.1)	-	1(8.3)	5(50.0)	29(27.9)	35(28.0)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	-	-	4(7.4)	7(2.7)	11(3.2)	-	1(8.3)	-	5(4.8)	6(4.8)
วิธีการอื่นๆ	-	1(3.1)	1(1.9)	3(1.1)	5(1.4)	-	-	-	1(1.0)	1(0.8)
ไม่แน่ใจ	2(33.3)	3(9.4)	4(7.4)	8(3.1)	17(4.9)	-	-	1(10.0)	2(1.9)	3(2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(2)	(4)	(6)	-	(1)	(0)	(0)	(1)
รวม	6(100.0)	33(100.0)	52(100.0)	259(100.0)	349(100.0)	(0.0)	11(100.0)	10(100.0)	104(100.0)	125(100.0)

ตารางที่ 1.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การตั้งครรรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรรภ์*										
ไม่เคย	6(100.0)	23(79.3)	35(85.4)	216(88.9)	280(87.8)	-	9(90.0)	9(100.0)	86(86.9)	104(88.1)
1 ครั้ง	-	-	4(9.8)	21(8.6)	25(7.8)	-	1(10.0)	-	11(11.1)	11(9.3)
≥2 ครั้ง	-	6(20.7)	2(4.9)	6(2.5)	14(4.4)	-	-	-	2(1.9)	3(2.5)
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	(0)	(3)	(13)	(20)	(36)	-	(2)	(1)	(5)	(8)
รวม	6(100.0)	29(100.0)	41(100.0)	243(100.0)	319(100.0)	(0.0)	10(100.0)	9(100.0)	99(100.0)	118(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 1.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	40(17.5)	54(14.1)	35(11.1)	81(17.3)	220(15.2)	37(10.0)	31(6.7)	20(5.4)	15(6.2)	103(7.1)
เคย	180(62.9)	288(75.4)	264(83.8)	349(74.6)	1081(74.5)	276(74.4)	396(85.7)	332(89.5)	218(90.1)	1222(84.5)
ไม่แน่ใจ	56(19.6)	40(10.5)	16(5.1)	38(8.1)	150(10.3)	58(15.6)	35(7.6)	19(5.1)	9(3.7)	121(8.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(22)	(15)	(9)	(48)	(0)	(11)	(9)	(3)	(23)
รวม	286(100.0)	382(100.0)	315(100.0)	468(100.0)	1451(100.0)	371(100.0)	462(100.0)	371(100.0)	242(100.0)	1446(100.0)

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา

ตารางที่ 1.10 พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	242(84.3)	240(60.5)	132(40.4)	84(17.7)	698(47.0)	330(89.2)	335(71.3)	194(51.1)	107(44.0)	966(66.0)
เคยดื่มสุรา	45(15.7)	157(39.5)	195(59.6)	390(82.3)	787(53.0)	40(10.8)	135(28.7)	186(48.9)	136(56.0)	497(34.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(7)	(3)	(3)	(14)	(1)	(3)	(0)	(2)	(6)
รวม	287(100.0)	397(100.0)	327(100.0)	474(100.0)	1485(100.0)	370(100.0)	470(100.0)	380(100.0)	243(100.0)	1463(100.0)
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก										
mean±sd	10.0±2.4	12.1±2.11	13.5±2.2	14.1±1.9	13.3±2.3	10.4±1.6	12.5±1.7	14.1±1.8	14.7±1.2	13.5±2.0
median (พิสัย)	10(3-13)	12(7-15)	14(5-18)	14(5-20)	14 (3-20)	10(5-13)	13(7-15)	14(7-18)	15(10-17)	14(5-18)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(12)	(17)	(28)	(59)	(4)	(2)	(9)	(3)	(18)
รวม	43	145	178	362	728	36	133	177	133	479
สถานที่ที่มักจะดื่มสุรา*										
งานโรงเรียน	0(0.0)	7(4.8)	6(3.3)	1(0.3)	14(1.9)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.1)	1(0.7)	3(0.6)
หอพัก	0(0.0)	3(2.1)	9(4.9)	24(6.3)	36(4.8)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.6)	1(0.7)	2(0.4)
บ้าน	18(45.0)	52(35.6)	62(33.9)	147(38.9)	279(37.3)	22(61.1)	64(48.5)	72(39.8)	40(29.6)	198(40.9)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีไม่ เกิน 500 เมตร	2(5.0)	2(1.4)	5(2.7)	14(3.7)	23(33.1)	0(0.0)	4(3.0)	2(1.1)	6(4.4)	12(2.5)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีเกิน 500 เมตร	3(7.5)	11(7.5)	29(15.8)	66(17.5)	109(14.6)	1(2.8)	13(9.8)	31(17.1)	26(19.3)	71(14.7)
ร้านน้ำชา	0(0.0)	0(0.0)	1(0.5)	1(0.3)	2(0.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
สวนไทรนา	0(0.0)	3(2.1)	1(0.5)	1(0.3)	5(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
งานฉลอง/รื่นเริง	15(37.5)	14(43.8)	63(34.4)	117(31.0)	259(34.7)	13(36.1)	49(37.1)	72(39.8)	54(42.2)	191(39.5)
อื่นๆ	2(5.0)	4(2.7)	7(3.8)	7(1.9)	20(2.7)	0(0.0)	2(1.5)	1(0.6)	4(3.0)	7(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(11)	(12)	(12)	(40)	(4)	(3)	(5)	(1)	(13)
รวม	40(100.0)	146(100.0)	183(100.0)	378(100.0)	747(100.0)	36(100.0)	132(100.0)	181(100.0)	135(100.0)	484(100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	37(60.0)	92(59.4)	93(48.4)	149(38.3)	361(46.2)	33(82.5)	94(69.6)	134(72.0)	78(57.8)	339(68.3)
1-2 ครั้ง	14(31.1)	36(23.2)	65(33.9)	115(29.6)	230(29.4)	5(12.5)	23(17.0)	37(19.9)	35(25.9)	100(20.2)
3-5 ครั้ง	4(8.9)	13(8.4)	12(6.3)	73(18.8)	102(13.1)	1(2.5)	14(10.4)	9(4.8)	10(7.4)	34(6.9)
6-9 ครั้ง	0(0.0)	3(1.9)	7(3.6)	18(4.6)	28(3.6)	0(0.0)	4(3.0)	3(1.6)	8(5.9)	15(3.0)
10 ครั้ง ขึ้นไป	0(0.0)	11(7.1)	15(7.8)	34(8.7)	60(7.7)	1(2.5)	0(0.0)	3(1.6)	4(3.0)	8(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(2)	(3)	(1)	(6)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	45(100.0)	155(100.0)	192(100.0)	389(100.0)	781(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	135(100.0)	496(100.0)

ตารางที่ 1.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	7(25.9)	27(22.1)	23(13.1)	36(11.4)	93(14.5)	10(47.6)	22(20.8)	29(17.8)	17(16.0)	78(19.7)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	9(33.3)	29(23.8)	47(26.9)	62(19.6)	147(23.0)	4(19.0)	40(37.7)	60(36.8)	28(26.4)	132(33.3)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	4(14.8)	25(20.5)	45(25.7)	64(20.3)	138(21.6)	4(19.0)	26(24.5)	43(26.4)	31(29.2)	104(26.3)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	7(25.9)	41(33.6)	60(34.3)	154(48.7)	262(40.9)	3(14.3)	18(17.0)	31(19.0)	30(28.3)	82(20.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(18)	(35)	(20)	(74)	(147)	(19)	(29)	(23)	(30)	(101)
รวม	27(100.0)	122(100.0)	175(100.0)	316(100.0)	640(100.0)	21(100.0)	106(100.0)	163(100.0)	106(100.0)	396(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	-	32(51.6)	62(62.0)	88(41.3)	191(49.5)	5(71.4)	25(58.1)	58(78.4)	31(52.5)	119(65.0)
3-5 ครั้ง	9(81.8)	17(37.4)	20(20.0)	56(26.3)	95(24.6)	1(14.3)	14(32.6)	10(13.5)	17(28.8)	42(23.0)
6-9 ครั้ง	2(18.2)	4(6.5)	8(8.0)	35(16.4)	47(12.2)	-	4(9.3)	2(2.7)	5(8.5)	11(6.0)
10-19 ครั้ง	-	1(1.6)	4(4.0)	17(8.0)	22(5.7)	1(14.3)	-	4(5.4)	5(8.5)	10(5.5)
20 ครั้ง ขึ้นไป	-	8(12.9)	6(6.0)	17(8.0)	31(8.0)	-	-	-	1(1.7)	1(0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(4)	(5)	(5)	(14)	(0)	(1)	(0)	(2)	(3)
รวม	11(100.0)	62(100.0)	100(100.0)	213(100.0)	386(100.0)	7(100.0)	43(100.0)	74(100.0)	59(100.0)	183(100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	2(20.0)	18(29.5)	28(28.0)	60(29.1)	108(28.6)	5(71.4)	20(46.5)	22(29.7)	16(27.1)	64(34.4)
3-5 หน่วย	6(60.0)	21(34.4)	35(35.0)	60(29.1)	122(32.4)	2(28.6)	16(37.2)	34(46.0)	18(30.5)	70(38.2)
6-8 หน่วย	2(20.0)	12(19.7)	10(10.0)	23(11.2)	47(12.5)	-	3(7.0)	12(16.2)	13(22.0)	28(15.3)
9 หน่วย ขึ้นไป	-	10(16.4)	27(27.0)	63(30.6)	100(26.5)	-	4(9.3)	6(8.1)	12(20.3)	22(12.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(0)	(7)	(9)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	10(100.0)	61(100.0)	100(100.0)	206(100.0)	377(100.0)	7(100.0)	43(100.0)	74(100.0)	59(100.1)	183(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่าดื่มครั้งสุดท้ายมากกว่า 1 สัปดาห์แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	7(63.6)	35(53.0)	58(55.2)	63(28.9)	163(40.8)	4(57.1)	26(59.1)	50(67.6)	17(27.9)	97(52.2)
1-2 ครั้ง	2(18.2)	18(27.3)	33(31.4)	90(41.3)	143(35.8)	2(28.6)	17(38.6)	19(25.7)	35(57.4)	73(39.2)
3-5 ครั้ง	1(9.1)	3(4.5)	11(10.5)	32(14.7)	47(11.8)	-	1(2.3)	3(4.1)	6(9.8)	10(5.4)
6-9 ครั้ง	-	1(1.5)	-	14(6.4)	15(3.8)	1(14.3)	-	2(2.7)	1(1.6)	4(2.2)
10-19 ครั้ง	1(9.1)	2(3.0)	2(1.9)	8(3.7)	13(3.3)	-	-	-	1(1.6)	1(0.5)
20 ครั้ง ขึ้นไป	(0)	7(10.6)	1(1.0)	11(5.0)	19(4.8)	-	-	-	1(1.6)	1(0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	11(100.0)	66(100.0)	105(100.0)	218(100.0)	400(100.0)	7(100.0)	44(100.0)	74(100.0)	61(100.0)	186(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 1.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง*	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	7(2.5)	58(14.8)	85(26.0)	202(42.5)	352(23.8)	6(1.6)	56(11.9)	72(19.0)	60(24.6)	194(13.3)
ชื่อเองโดยใช้บัตรประจำตัวของคนอื่น	1(0.4)	23(5.9)	18(5.5)	73(15.4)	115(7.8)	5(1.4)	10(2.1)	5(1.3)	15(6.1)	35(2.4)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	20(7.0)	97(24.7)	99(30.3)	257(54.1)	473(32.0)	15(4.0)	82(17.4)	78(20.6)	79(32.4)	254(17.4)
ชื่อเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตรประจำตัว	11(3.9)	49(12.5)	88(26.9)	260(54.6)	408(27.6)	10(2.7)	37(7.9)	45(11.9)	63(25.8)	155(10.6)
เอามาจากบ้าน (ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	15(5.3)	58(14.8)	59(18.0)	113(23.8)	245(16.6)	27(7.3)	64(13.6)	72(19.1)	42(17.2)	205(14.0)
ชื่อเอง/ได้จากคนอื่นที่ได้มาจากร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน										
รัศมีไม่เกิน 500 เมตร	2(0.7)	36(9.2)	53(16.2)	130(27.4)	221(15.0)	6(1.6)	29(6.2)	26(6.9)	43(17.6)	104(7.1)
เวลาเฉลี่ยในการซื้อ/หาสุรา										
mean±sd	11.5±9.8	13.1±14.3	14.2±10.8	11.6±9.7	12.5±11.0	22.9±41.6	18.4±12.5	17.3±14.0	13.1±9.7	17.3±18.1
median (พิสัย)	10(1-40)	10(1-90)	10(1-60)	10(0-60)	10(0-90)	15(1-50)	15(1-60)	10(1-60)	10(1-60)	10(1-60)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(247)	(287)	(174)	(162)	(870)	(322)	(344)	(213)	(135)	(1014)
รวม	41	117	156	315	629	49	129	167	110	455

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมาดัง*										
ไม่เลย	36(80.0)	111(70.7)	122(62.9)	184(47.3)	453(57.7)	37(92.5)	97(71.9)	134(72.0)	75(55.1)	343(69.0)
เคย	9(15.8)	46(29.3)	72(37.1)	205(52.7)	332(42.3)	3(7.5)	38(28.1)	52(28.0)	61(44.9)	154(31.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	5(55.6)	21(45.7)	41(56.9)	89(43.4)	156(47.0)	3(100.0)	19(50.0)	35(67.3)	30(49.2)	87(56.5)
2-3 ครั้ง	4(44.4)	12(26.1)	23(31.9)	69(33.7)	108(32.5)	-	16(42.1)	15(28.8)	22(36.1)	53(34.4)
4 ครั้งขึ้นไป	-	13(28.3)	8(11.1)	47(22.9)	68(20.5)	-	3(7.9)	2(3.8)	9(14.8)	14(9.1)
รวม	9(100.0)	46(100.0)	72(99.9)	205(100.0)	332(100.0)	3(100.0)	38(100.0)	52(100.0)	61(100.0)	154(100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เลย	30(66.7)	103(65.6)	122(62.9)	232(59.8)	487(62.1)	33(82.5)	103(76.3)	140(75.3)	88(64.7)	364(73.2)
เคย	15(33.3)	54(34.4)	72(37.1)	156(40.2)	297(37.9)	7(17.5)	32(23.7)	46(24.7)	48(35.3)	133(26.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	388(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีพิมพ์ของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	9(60.0)	34(63.0)	22(30.6)	69(44.2)	134(45.1)	2(28.6)	10(31.3)	22(47.8)	28(58.3)	62(46.6)
2-3 ครั้ง	4(26.7)	8(14.8)	24(33.3)	56(35.9)	92(31.0)	3(42.9)	17(53.1)	13(28.3)	14(29.2)	47(35.3)
4 ครั้งขึ้นไป	(0)	12(22.2)	26(36.1)	31(19.9)	71(23.9)	2(28.6)	5(15.6)	11(23.9)	6(12.5)	14(18.0)
รวม	15(100.0)	54(100.0)	72(100.0)	156(100.0)	297(100.0)	7(99.9)	32(100.0)	46(100.0)	48(100.0)	133(100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตำราฯ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เลย	38(84.4)	111(70.7)	152(78.4)	286(73.5)	587(74.8)	40(100.0)	121(89.6)	164(88.2)	111(81.6)	436(87.7)
เคย	7(15.6)	46(29.3)	42(21.6)	103(26.5)	198(25.2)	-	14(10.4)	22(11.8)	25(18.4)	61(12.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4(57.1)	22(47.8)	22(52.4)	54(52.4)	102(51.5)	-	9(64.3)	13(59.1)	14(56.0)	36(59.0)
2-3 ครั้ง	3(42.9)	14(30.4)	14(33.3)	40(38.8)	71(35.9)	-	4(28.6)	7(31.8)	8(32.0)	19(31.1)
4 ครั้งขึ้นไป	-	10(21.7)	6(14.3)	9(8.7)	25(12.6)	-	1(7.1)	2(9.1)	3(12.0)	6(9.8)
รวม	7(100.0)	46(100.1)	42(100.0)	103(100.0)	198(100.0)	0(0.0)	14(100.0)	22(100.0)	25(100.0)	61(100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เลย	41(91.1)	137(87.3)	172(88.7)	341(87.9)	691(88.1)	40(100.0)	132(97.8)	179(96.2)	125(91.9)	476(95.8)
เคย	4(8.9)	20(12.7)	22(11.3)	47(12.1)	93(11.9)	-	3(2.2)	7(3.8)	11(8.1)	21(4.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	388(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	3(75.0)	6(30.0)	13(59.1)	31(66.0)	53(57.0)	-	2(66.7)	1(14.3)	5(45.5)	8(38.1)
2-3 ครั้ง	1(25.0)	8(40.0)	6(27.3)	14(29.8)	29(31.2)	-	1(33.3)	3(42.9)	4(36.4)	8(38.1)
4 ครั้งขึ้นไป	-	6(30.0)	3(13.6)	2(4.3)	11(11.8)	-	-	3(42.9)	2(18.2)	5(23.8)
รวม	4(100.0)	20(100.0)	22(100.0)	47(100.0)	93(100.0)	0(0.0)	3(100.0)	7(100.1)	11(100.1)	21(100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เลย	31(68.9)	107(68.2)	135(69.6)	268(68.9)	541(68.9)	39(97.5)	117(86.7)	172(92.5)	111(81.6)	439(88.3)
เคย	14(31.1)	50(31.8)	59(30.4)	121(31.1)	244(31.1)	1(2.5)	18(13.3)	14(7.5)	25(18.4)	58(11.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(57.1)	22(44.0)	40(67.8)	53(43.8)	123(50.4)	1(100.0)	10(55.6)	7(50.0)	9(36.0)	27(46.6)
2-3 ครั้ง	5(35.7)	14(28.0)	13(22.0)	43(35.5)	75(30.7)	-	5(27.8)	4(28.6)	11(44.0)	20(34.5)
4 ครั้งขึ้นไป	1(7.1)	14(28.0)	6(10.2)	25(20.7)	46(18.9)	-	3(16.7)	3(21.4)	5(20.0)	11(19.0)
รวม	14(99.9)	50(100.1)	59(100.0)	121(100.0)	244(100.0)	1(100.0)	18(100.0)	14(100.0)	25(100.0)	58(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีตราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
คลื่นไส้ อาเจียน*										
ไม่เคย	30(66.7)	101(64.3)	113(58.2)	179(46.0)	423(53.9)	31(77.5)	88(65.2)	111(59.7)	58(42.6)	288(57.9)
เคย	15(33.3)	56(35.7)	81(41.8)	210(54.0)	362(46.1)	9(22.5)	47(34.8)	75(40.3)	78(57.4)	209(42.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(53.3)	26(46.4)	49(60.5)	102(48.6)	185(51.1)	5(55.6)	28(59.6)	52(68.4)	41(10.3)	125(50.8)
2-3 ครั้ง	4(26.7)	16(28.6)	23(28.4)	80(38.1)	123(34.0)	3(33.3)	15(31.9)	18(23.7)	30(5.1)	66(31.6)
4 ครั้งขึ้นไป	3(20.0)	14(25.0)	9(11.1)	28(13.3)	54(14.9)	1(11.1)	4(8.9)	6(7.9)	7(3.7)	18(8.6)
รวม	15(100.0)	56(100.0)	81(100.0)	210(100.0)	362(100.0)	9(100.0)	47(100.0)	76(100.0)	78(100.0)	209(100.0)
ขับขี้รด หลังตีตรา*										
ไม่เคย	42(93.3)	135(86.0)	157(80.9)	230(59.1)	564(71.8)	38(95.0)	123(91.1)	172(92.5)	11(80.9)	443(89.1)
เคย	3(6.7)	22(14.0)	37(19.1)	159(40.9)	221(28.2)	2(5.0)	12(8.9)	14(7.5)	26(19.1)	54(10.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	3(100.0)	10(45.5)	16(43.2)	63(39.6)	92(41.6)	1(50.0)	6(50.0)	9(64.3)	14(53.8)	30(55.6)
2-3 ครั้ง	-	5(22.7)	13(35.1)	48(30.2)	66(29.9)	1(50.0)	3(25.0)	5(35.7)	7(26.9)	16(29.6)
4 ครั้งขึ้นไป	-	7(31.8)	8(21.6)	48(30.2)	63(28.5)	-	3(25.0)	-	5(19.2)	8(14.8)
รวม	3(100.0)	22(100.0)	37(100.0)	159(100.0)	221(100.0)	2(100.0)	12(100.0)	14(100.0)	26(100.0)	54(100.0)
ขาดเรียน*										
ไม่เคย	29(64.4)	111(70.7)	135(69.6)	218(56.0)	493(62.8)	33(82.5)	103(76.3)	144(77.4)	87(64.0)	367(73.8)
เคย	16(35.6)	46(29.3)	59(30.4)	171(44.0)	292(37.2)	7(17.5)	32(23.7)	42(22.6)	49(36.0)	130(26.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	3(18.8)	17(37.0)	21(35.6)	68(39.8)	109(13.9)	1(14.3)	12(37.5)	13(31.0)	23(46.9)	49(37.7)
2-3 ครั้ง	11(68.8)	18(39.1)	21(35.6)	57(33.3)	107(13.6)	5(71.4)	11(38.0)	15(35.7)	16(32.7)	47(36.2)
4 ครั้งขึ้นไป	2(12.5)	11(23.9)	17(28.8)	46(26.9)	76(9.7)	1(14.3)	9(28.1)	14(33.3)	10(20.4)	34(26.2)
รวม	16(100.1)	46(100.0)	59(100.0)	171(100.0)	292(100.0)	7(100.0)	32(100.0)	42(100.0)	49(100.0)	130(100.0)
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*										
ไม่เคย	32(71.1)	100(63.7)	110(56.7)	207(53.2)	449(57.2)	33(82.5)	94(69.6)	115(61.8)	74(54.4)	316(63.6)
เคย	13(28.9)	57(36.3)	84(43.3)	182(46.8)	336(42.8)	7(17.5)	41(30.4)	71(38.2)	62(45.6)	181(36.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	9(69.2)	27(47.4)	45(53.6)	83(45.6)	164(48.8)	4(57.1)	24(58.5)	43(60.6)	27(43.5)	98(54.1)
2-3 ครั้ง	2(15.4)	17(29.8)	27(32.1)	65(35.7)	111(33.0)	3(42.9)	13(31.7)	20(28.2)	24(38.7)	60(33.1)
4 ครั้งขึ้นไป	2(15.4)	13(22.8)	12(14.3)	34(18.7)	61(18.2)	-	4(9.8)	8(11.3)	11(17.7)	23(12.7)
รวม	13(100.0)	57(100.0)	84(100.0)	182(100.0)	336(100.0)	7(100.0)	41(100.0)	71(100.0)	62(100.0)	181(100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เลย	41(91.1)	133(85.3)	161(83.0)	307(78.9)	642(81.9)	40(100.0)	124(91.9)	167(89.8)	115(84.6)	446(89.7)
เคย	4(8.9)	23(14.7)	33(17.0)	82(21.1)	142(18.1)	-	11(8.1)	19(10.2)	21(15.4)	51(10.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(1)	(1)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	156(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	2(50.0)	9(39.1)	25(75.8)	45(54.9)	81(57.0)	-	10(90.9)	14(73.7)	11(52.4)	35(68.6)
2-3 ครั้ง	2(50.0)	8(34.8)	5(15.2)	29(35.4)	44(31.0)	-	1(9.1)	5(26.3)	7(33.3)	13(25.5)
4 ครั้งขึ้นไป	-	6(26.1)	3(9.1)	8(9.8)	17(12.0)	-	-	-	3(14.3)	3(5.9)
รวม	4(100.0)	23(100.0)	33(100.0)	82(100.0)	142(100.0)	0(0.0)	11(100.0)	19(100.0)	21(100.0)	51(100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	29(64.4)	110(70.1)	146(75.3)	265(31.9)	550(70.1)	30(75.0)	103(76.3)	150(80.6)	86(63.2)	369(74.2)
เคย	16(35.6)	47(29.9)	48(24.7)	124(68.1)	235(29.9)	10(25.0)	32(23.7)	36(19.4)	50(36.8)	128(25.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	7(43.8)	17(36.2)	29(60.4)	65(52.4)	118(50.2)	4(40.0)	16(50.0)	15(41.7)	25(50.0)	60(46.9)
2-3 ครั้ง	7(43.8)	18(38.3)	16(33.3)	41(33.1)	82(34.9)	6(60.0)	12(37.5)	15(41.7)	17(34.0)	50(39.1)
4 ครั้งขึ้นไป	2(12.5)	12(25.5)	3(6.3)	18(14.5)	35(14.9)	0	4(12.5)	6(16.7)	8(16.0)	18(14.1)
รวม	16(100.0)	47(100.0)	48(100.0)	124(100.0)	235(100.0)	10(100.0)	32(100.0)	36(100.0)	50(100.0)	128(100.1)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เลย	36(80.0)	104(66.2)	129(66.5)	221(56.8)	490(62.4)	30(75.0)	102(75.6)	129(69.4)	90(66.2)	351(70.6)
เคย	9(20.0)	53(33.8)	65(33.5)	168(43.2)	295(37.6)	10(25.0)	33(24.4)	57(30.6)	46(33.8)	146(29.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	6(66.7)	29(54.7)	34(52.3)	84(50.0)	153(51.9)	5(50.0)	14(42.4)	31(54.4)	19(41.3)	65(47.3)
2-3 ครั้ง	2(22.2)	14(26.4)	25(38.5)	59(35.1)	100(33.9)	3(30.0)	14(42.4)	17(29.8)	17(37.0)	51(34.9)
4 ครั้งขึ้นไป	1(11.1)	10(18.9)	6(9.2)	25(14.9)	42(14.2)	2(20.0)	5(15.2)	9(15.8)	10(21.7)	26(17.8)
รวม	9(100.0)	53(100.0)	65(100.0)	168(100.0)	295(100.0)	10(100.0)	33(100.0)	57(100.0)	46(100.0)	146(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกจับเพราะขับขี้อรขณะเมาสุรา*										
ไม่เลย	44(97.8)	145(92.9)	182(94.8)	363(93.6)	734(94.0)	40(100.0)	133(99.3)	182(98.4)	136(100.0)	491(99.2)
เคย	1(2.2)	11(7.1)	10(5.2)	25(6.4)	47(6.0)	-	1(0.7)	3(1.6)	-	4(0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	45(100.0)	156(100.0)	192(100.0)	388(100.0)	781(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	185(100.0)	136(100.0)	495(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	-	2(18.2)	6(60.0)	16(64.0)	24(51.1)	-	-	2(66.7)	-	2(50.0)
2-3 ครั้ง	1(100.0)	2(18.2)	2(20.0)	5(20.0)	10(21.3)	-	-	1(33.3)	-	1(25.0)
4 ครั้งขึ้นไป	-	7(63.6)	2(20.0)	4(16.0)	13(27.7)	-	1(100.0)	-	-	1(25.0)
รวม	1(100.0)	11(100.0)	10(100.0)	25(100.0)	47(100.0)	0(0.0)	1(100.0)	3(100.0)	0(0.0)	4(100.0)
ถูกвлอนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เลย	44(97.8)	139(88.5)	168(86.6)	345(88.7)	696(88.7)	38(95.0)	131(97.0)	183(98.4)	127(93.4)	479(96.4)
เคย	1(2.2)	18(11.5)	26(13.4)	44(11.3)	89(11.3)	2(5.0)	4(3.0)	3(1.6)	9(6.6)	18(3.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	-	7(38.9)	14(53.8)	25(56.8)	46(51.7)	2(100.0)	3(75.0)	2(66.6)	7(77.8)	14(77.8)
2-3 ครั้ง	1(100.0)	4(22.2)	3(11.5)	13(29.5)	21(23.6)	-	1(25.0)	1(33.3)	1(11.1)	3(16.7)
4 ครั้งขึ้นไป	-	7(38.9)	9(34.6)	6(13.6)	22(24.7)	-	-	-	1(11.1)	1(5.6)
รวม	1(100.0)	18(100.0)	26(100.0)	44(100.0)	89(100.0)	2(100.0)	4(100.0)	3(100.0)	9(100.0)	18(100.0)
влอนลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เลย	45(100.0)	141(89.8)	177(91.2)	341(87.9)	704(89.8)	40(100.0)	132(97.8)	183(98.4)	131(96.3)	486(97.8)
เคย	-	16(10.2)	17(8.8)	47(12.1)	80(10.2)	-	3(2.2)	3(1.6)	5(3.7)	11(2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	388(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	-	5(31.3)	7(41.2)	24(51.1)	36(45.0)	-	3(100.0)	1(33.3)	3(60.0)	7(63.6)
2-3 ครั้ง	-	4(25.0)	6(35.3)	16(34.0)	26(32.5)	-	-	2(66.7)	1(20.0)	3(27.3)
4 ครั้งขึ้นไป	-	7(73.8)	4(23.5)	7(14.9)	18(22.5)	-	-	-	1(20.0)	1(9.1)
รวม	0(0.0)	16(100.0)	17(100.0)	47(100.0)	80(100.0)	0(0.0)	3(100.0)	3(100.0)	5(100.0)	11(100.0)
พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เลย	40(88.9)	136(86.6)	165(85.1)	294(75.6)	635(80.9)	39(97.5)	127(94.1)	170(91.4)	120(88.2)	456(91.8)
เคย	5(11.1)	21(13.4)	29(14.9)	95(24.4)	150(19.1)	1(2.5)	8(5.9)	16(8.6)	16(11.8)	41(8.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	5(100.0)	8(38.1)	18(62.1)	53(55.8)	84(56.0)	-	5(62.5)	12(75.0)	11(68.8)	28(68.3)
2-3 ครั้ง	-	5(23.8)	3(10.3)	25(26.3)	33(22.0)	1(100.0)	2(25.0)	3(18.8)	4(25.0)	10(24.4)
4 ครั้งขึ้นไป	-	8(38.1)	8(27.6)	17(17.9)	33(22.0)	-	1(12.5)	1(6.3)	1(6.3)	3(7.3)
รวม	5(100.0)	21(100.0)	29(100.0)	95(100.0)	150(100.0)	1(100.0)	8(100.0)	16(100.1)	16(100.1)	41(100.0)
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*										
ไม่เลย	45(100.0)	142(90.4)	182(94.3)	379(97.4)	748(95.4)	40(100.0)	129(95.6)	179(96.2)	129(94.9)	477(96.0)
เคย	-	15(9.6)	11(5.7)	10(2.6)	36(4.5)	-	6(4.4)	7(3.8)	7(5.1)	20(4.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(2)	(1)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	193(100.0)	389(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	-	6(40.0)	7(63.6)	6(60.0)	18(52.8)	-	3(50.0)	4(57.1)	2(28.6)	9(45.0)
2-3 ครั้ง	-	3(20.0)	2(18.2)	4(40.0)	9(25.0)	-	2(33.3)	3(42.9)	3(42.9)	8(40.0)
4 ครั้งขึ้นไป	-	6(40.0)	2(18.2)	-	8(22.2)	-	1(16.7)	-	2(28.6)	3(15.0)
รวม	0(0.0)	15(100.0)	11(100.0)	10(100.0)	36(100.0)	0(0.0)	6(100.0)	7(100.0)	7(100.1)	20(100.0)
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*										
ไม่เลย	44(97.8)	142(90.4)	184(94.8)	377(97.2)	747(95.3)	39(97.5)	127(94.1)	181(97.3)	127(93.4)	474(95.4)
เคย	1(2.2)	15(9.6)	10(5.2)	11(2.8)	37(4.7)	1(2.5)	8(5.9)	5(2.7)	9(6.6)	23(4.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	195(100.0)	388(100.0)	784(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	-	7(46.7)	7(70.0)	6(54.5)	20(54.1)	1(100.0)	5(62.5)	5(100.0)	4(2.9)	15(65.2)
2-3 ครั้ง	1(100.0)	1(6.7)	1(10.0)	4(36.4)	7(18.9)	-	1(12.5)	-	3(2.2)	4(17.4)
4 ครั้งขึ้นไป	-	7(46.7)	2(20.0)	1(9.1)	10(27.0)	-	2(25.0)	-	2(1.5)	4(17.4)
รวม	1(100.0)	15(100.1)	10(100.0)	11(100.0)	37(100.0)	1(100.0)	8(100.0)	5(100.0)	9(100.1)	23(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	33(73.3)	119(75.8)	155(79.9)	273(70.2)	580(73.9)	34(85.0)	112(83.0)	158(84.9)	110(80.9)	414(83.3)
เคย	12(26.7)	38(24.2)	39(20.1)	116(29.8)	205(26.1)	6(15.0)	23(17.0)	28(15.1)	26(19.1)	83(16.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(66.7)	16(42.1)	19(48.7)	69(59.5)	112(54.6)	2(33.3)	14(60.9)	17(60.7)	16(61.5)	49(59.0)
2-3 ครั้ง	3(25.0)	8(21.1)	14(35.9)	34(29.3)	59(28.8)	2(33.3)	7(30.4)	9(32.1)	6(23.1)	24(29.0)
4 ครั้งขึ้นไป	1(8.3)	14(36.8)	6(15.4)	13(11.2)	34(16.6)	2(33.3)	2(8.7)	2(7.1)	4(15.4)	10(12.0)
รวม	12(99.9)	38(100.0)	39(100.0)	116(100.0)	205(100.0)	6(100.0)	23(100.0)	28(100.0)	26(100.0)	83(100.0)

ตารางที่ 1.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	43(95.6)	148(94.3)	187(96.4)	370(95.1)	748(95.3)	40(100.0)	134(99.3)	184(98.9)	136(100.0)	494(99.4)
เคย	2(4.4)	9(5.7)	7(3.6)	19(4.9)	37(4.7)	-	1(0.7)	2(1.1)	-	3(0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(1)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	45(100.0)	157(100.0)	194(100.0)	389(100.0)	785(100.0)	40(100.0)	135(100.0)	186(100.0)	136(100.0)	497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	2(100.0)	1(11.1)	3(42.9)	11(57.9)	17(45.9)	-	1(100.0)	2(100.0)	-	3(100.0)
2-3 ครั้ง	-	3(33.3)	2(28.6)	6(31.6)	11(29.7)	-	-	-	-	-
4 ครั้งขึ้นไป	-	5(55.6)	2(28.6)	2(10.5)	9(24.3)	-	-	-	-	-
รวม	2(100.0)	9(100.0)	7(100.1)	19(100.0)	37(100.0)	0(0.0)	1(100.0)	2(100.0)	0(0.0)	3(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 1.13 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เลย	210(73.2)	317(80.1)	265(81.3)	371(78.3)	1163(78.4)	338(91.1)	409(86.8)	334(88.1)	193(79.1)	1274(87.0)
เคย	77(26.8)	79(19.9)	61(18.7)	103(21.7)	320(21.6)	33(8.9)	62(13.2)	45(11.9)	51(20.9)	191(13.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(3)	(16)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	474(100.0)	1483(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	50(64.9)	39(49.4)	34(55.7)	58(56.3)	181(56.6)	22(66.7)	33(53.2)	31(68.9)	21(41.2)	107(56.0)
2-3 ครั้ง	8(10.4)	19(24.1)	16(26.2)	20(19.4)	63(19.7)	7(21.2)	23(37.1)	7(15.6)	16(31.4)	53(27.7)
4 ครั้งขึ้นไป	19(24.7)	21(26.6)	11(18.0)	25(24.3)	76(23.8)	4(12.1)	6(9.7)	7(15.6)	14(27.5)	31(16.2)
รวม	77(100.0)	79(100.0)	61(100.0)	103(100.0)	320(100.0)	33(100.0)	62(100.0)	45(100.0)	51(100.0)	191(100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง										
ไม่เลย	234(81.5)	332(83.8)	267(81.9)	358(75.5)	1191(80.3)	352(94.9)	421(89.4)	345(91.0)	197(80.7)	1315(89.8)
เคย	53(18.5)	64(16.2)	59(18.1)	116(24.5)	292(19.7)	19(5.1)	50(10.6)	34(9.0)	47(19.3)	150(10.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(3)	(16)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	474(100.0)	1483(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	39(73.6)	35(54.7)	36(61.0)	56(48.3)	166(56.8)	12(63.2)	29(58.0)	22(64.7)	21(44.7)	84(56.0)
2-3 ครั้ง	7(13.2)	11(17.2)	16(27.1)	37(31.9)	71(24.3)	7(36.8)	17(34.0)	10(29.4)	14(29.8)	48(32.0)
4 ครั้งขึ้นไป	7(13.2)	18(28.1)	7(11.9)	23(19.8)	55(18.8)	-	4(8.0)	2(5.9)	12(25.5)	18(12.0)
รวม	53(100.0)	64(100.0)	59(100.0)	116(100.0)	292(100.0)	19(100.0)	50(100.0)	34(100.0)	47(100.0)	150(100.0)

ตารางที่ 1.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการติ่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เคย	241(84.0)	347(87.6)	280(85.9)	395(83.7)	1263(85.3)	356(96.0)	450(95.5)	364(96.0)	215(88.1)	1385(94.5)
เคย	46(16.0)	49(12.4)	46(14.1)	77(16.3)	218(14.7)	15(4.0)	21(4.5)	15(4.0)	29(11.9)	80(5.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(5)	(18)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	472(100.0)	1481(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	27(58.7)	30(61.2)	23(50.0)	41(53.2)	121(55.5)	12(80.0)	14(66.7)	10(66.7)	13(44.8)	49(61.3)
2-3 ครั้ง	8(17.4)	8(16.3)	16(34.8)	20(26.0)	52(23.9)	3(20.0)	4(19.0)	3(20.0)	11(37.9)	21(26.3)
4 ครั้งขึ้นไป	11(23.9)	11(22.4)	7(15.2)	16(20.8)	45(20.6)	-	3(14.3)	2(13.3)	5(17.2)	10(12.5)
รวม	46(100.0)	49(100.0)	46(100.0)	77(100.0)	218(100.0)	15(100.0)	21(100.0)	15(100.0)	29(100.0)	80(100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เคย	282(98.3)	365(92.2)	304(93.3)	436(92.2)	1387(93.6)	366(98.7)	458(92.4)	373(99.7)	235(96.3)	1432(97.7)
เคย	5(1.7)	31(7.8)	22(6.7)	37(7.8)	95(6.4)	5(1.3)	13(7.6)	6(0.3)	9(3.7)	33(2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(4)	(17)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	473(100.0)	1482(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	3(60.0)	18(58.1)	11(50.0)	24(64.9)	56(58.9)	4(80.0)	6(46.2)	-	6(66.7)	22(66.7)
2-3 ครั้ง	2(40.0)	3(9.7)	6(27.3)	10(27.0)	21(22.1)	1(20.0)	4(30.8)	3(50.0)	3(33.3)	8(24.2)
4 ครั้งขึ้นไป	-	10(32.3)	5(22.7)	3(8.1)	18(18.9)	-	3(23.1)	3(50.0)	-	3(9.1)
รวม	5(100.0)	31(100.0)	22(100.0)	37(100.0)	95(100.0)	5(100.0)	13(100.0)	6(100.0)	9(100.0)	33(100.0)
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เคย	280(97.6)	349(88.1)	250(76.9)	301(63.8)	1180(79.7)	362(97.6)	435(92.4)	315(83.1)	178(73.0)	1290(88.1)
เคย	7(2.4)	47(11.9)	75(23.1)	171(36.2)	300(20.3)	9(2.4)	36(7.6)	64(16.9)	66(27.0)	175(11.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(5)	(5)	(19)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	325(100.0)	472(100.0)	1480(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	5(71.4)	26(55.3)	43(57.3)	76(44.4)	150(50.0)	8(88.9)	17(47.2)	40(62.5)	35(14.3)	100(57.1)
2-3 ครั้ง	-	7(14.9)	22(29.3)	62(36.3)	91(30.3)	1(11.1)	16(44.4)	20(31.3)	18(7.3)	55(31.4)
4 ครั้งขึ้นไป	2(28.6)	14(29.8)	10(13.3)	33(19.3)	59(19.7)	-	3(8.3)	4(6.3)	13(5.3)	20(11.4)
รวม	7(100.0)	47(100.0)	75(100.0)	171(100.0)	300(100.0)	9(100.0)	36(100.0)	64(100.0)	66(100.0)	175(100.0)
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เคย	233(81.2)	333(84.3)	254(77.9)	366(77.4)	1186(80.1)	328(88.4)	393(83.4)	307(81.0)	176(72.1)	1204(82.2)
เคย	54(18.8)	62(15.7)	72(22.1)	107(22.6)	295(19.9)	43(11.6)	78(16.6)	72(19.0)	68(27.9)	261(17.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(4)	(18)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	473(100.0)	1481(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)

ตารางที่ 1.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	25(46.3)	23(37.1)	40(55.6)	43(40.2)	131(44.4)	30(69.8)	31(39.7)	39(54.2)	29(42.6)	129(49.4)
2-3 ครั้ง	10(18.5)	17(27.4)	20(27.8)	36(33.6)	83(28.1)	9(20.9)	30(38.5)	20(27.8)	22(32.4)	81(31.0)
4 ครั้งขึ้นไป	19(35.2)	22(35.5)	12(16.7)	28(26.2)	81(27.5)	4(9.3)	17(21.8)	13(18.1)	17(25.0)	51(19.5)
รวม	54(100.0)	62(100.0)	72(100.0)	107(100.0)	295(100.0)	43(100.0)	78(100.0)	72(100.0)	68(100.0)	261(100.0)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยไม่ต้องการ										
ไม่เคย	266(92.7)	351(88.6)	274(84.0)	377(79.5)	1268(98.8)	347(93.5)	422(89.6)	323(85.2)	172(70.5)	1264(86.3)
เคย	21(7.3)	45(11.4)	52(16.0)	97(20.5)	215(1.2)	24(6.5)	49(10.4)	56(14.8)	72(29.5)	201(13.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(3)	(16)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	474(100.0)	1483(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	8(38.1)	17(37.8)	24(46.2)	47(48.5)	96(44.7)	13(54.2)	18(36.7)	33(58.9)	23(31.9)	87(43.3)
2-3 ครั้ง	7(33.3)	8(17.8)	10(19.2)	36(37.1)	61(28.4)	7(29.2)	20(40.8)	19(33.9)	25(34.7)	71(35.3)
4 ครั้งขึ้นไป	6(28.6)	20(44.4)	18(34.6)	14(14.4)	58(27.0)	4(16.7)	11(22.4)	4(7.1)	24(33.3)	43(21.4)
รวม	21(100.0)	45(100.0)	52(100.0)	97(100.0)	215(100.0)	24(100.0)	49(100.0)	56(100.0)	72(100.0)	201(100.0)
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เคย	284(98.6)	375(94.7)	311(95.4)	449(94.7)	1418(95.6)	369(99.5)	472(99.8)	375(98.9)	238(97.5)	1452(99.1)
เคย	4(1.4)	21(5.3)	15(4.6)	25(5.3)	65(4.4)	2(0.5)	1(0.2)	4(1.1)	6(2.5)	13(0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(4)	(3)	(16)	(0)	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	287(100.0)	396(100.0)	326(100.0)	474(100.0)	1483(100.0)	371(100.0)	471(100.0)	379(100.0)	244(100.0)	1465(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	4(100.0)	9(42.9)	7(46.7)	13(52.0)	33(50.8)	1(50.0)	-	3(75.0)	3(50.0)	7(53.8)
2-3 ครั้ง	-	3(14.3)	3(20.0)	4(16.0)	10(15.4)	1(50.0)	-	1(25.0)	2(33.3)	4(30.8)
4 ครั้งขึ้นไป	-	9(42.9)	5(33.3)	8(32.0)	22(33.8)	-	1(100.0)	-	1(16.7)	2(15.4)
รวม	4(100.0)	21(100.0)	15(100.0)	25(100.0)	65(100.0)	2(100.0)	1(100.0)	4(100.0)	6(100.0)	13(100.0)

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 1.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	68(24.0)	112(29.2)	72(22.5)	53(11.5)	305(21.1)	63(17.1)	73(15.6)	36(9.5)	26(10.8)	198(13.6)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา เครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใด ชนิดหนึ่ง	215(76.0)	272(70.8)	248(77.5)	406(88.5)	1141(78.9)	306(82.9)	394(84.4)	344(90.5)	215(89.2)	1259(86.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(20)	(10)	(18)	(53)	(2)	(6)	(0)	(4)	(12)
รวม	283(100.0)	384(100.0)	320(100.0)	459(100.0)	1146(100.0)	369(100.0)	467(100.0)	380(100.0)	241(100.0)	1457(100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	212(98.6)	264(97.1)	240(96.8)	383(94.3)	1099(96.3)	302(98.7)	391(99.2)	338(98.3)	214(99.5)	1245(98.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	47(31.5)	37(26.1)	46(33.3)	108(45.6)	238(35.7)	64(30.3)	68(25.4)	67(33.3)	41(35.3)	240(30.2)
5-9 ครั้ง	26(17.4)	15(10.6)	25(18.1)	44(18.6)	110(16.5)	49(23.2)	51(19.0)	43(21.4)	14(12.1)	157(19.7)
≥10 ครั้ง	29(19.5)	21(14.8)	28(20.3)	26(11.0)	104(15.6)	43(20.4)	47(17.5)	28(13.9)	6(5.2)	124(15.6)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	42(28.2)	69(48.6)	38(27.5)	53(22.4)	202(30.3)	53(25.1)	100(37.3)	54(26.9)	51(44.0)	258(32.4)
จำไม่ได้	5(3.4)	-	1(0.7)	6(2.5)	12(1.8)	2(0.9)	2(0.7)	9(4.5)	4(3.4)	17(2.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(63)	(112)	(102)	(146)	(433)	(91)	(123)	(137)	(98)	(499)
รวม	149(100.0)	142(100.0)	138(100.0)	237(100.0)	666(100.0)	211(100.0)	268(100.0)	201(100.0)	116(100.0)	796(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	149(78.4)	192(81.7)	182(82.7)	282(82.0)	805(81.4)	229(79.2)	308(83.2)	268(82.7)	162(79.8)	967(81.5)
เบียร์	161(84.7)	202(86.0)	197(89.5)	272(79.1)	832(75.7)	259(89.6)	337(91.1)	298(91.7)	177(87.2)	1071(90.2)
Spy/ไวน์	120(63.2)	157(66.8)	138(62.7)	110(32.0)	525(53.1)	179(61.9)	246(66.5)	189(58.2)	94(46.3)	708(59.6)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	43(22.6)	65(27.7)	86(39.1)	69(20.1)	263(26.6)	52(18.0)	112(30.3)	102(31.4)	41(20.2)	307(25.9)
อื่นๆ	-	1(0.4)	-	-	1(0.1)	1(0.3)	1(0.3)	1(0.3)	-	30.3)
วิทยุ										
เคยเห็น*	90(41.9)	97(35.7)	82(33.1)	138(34.0)	407(35.7)	80(26.1)	145(36.8)	109(31.7)	79(36.7)	413(32.8)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	27(47.4)	12(34.3)	18(43.9)	41(61.2)	98(49.0)	30(52.6)	31(34.4)	33(58.9)	17(50.0)	111(46.8)
5-9 ครั้ง	5(8.8)	2(5.7)	3(7.3)	6(9.0)	16(8.0)	9(15.8)	7(7.8)	3(5.4)	3(8.8)	22(9.3)
≥10 ครั้ง	4(7.0)	3(8.6)	11(26.8)	4(6.0)	22(11.0)	4(7.0)	9(10.0)	3(5.4)	1(2.9)	17(7.2)
บางครั้ง	-	-	-	1(1.5)	1(0.5)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	15(26.3)	18(51.4)	6(14.6)	14(20.9)	53(26.5)	13(22.8)	40(44.4)	14(25.0)	12(35.3)	79(33.3)
จำไม่ได้	6(10.5)	()	3(7.3)	1(1.5)	10(5.0)	1(1.8)	3(3.3)	3(5.4)	1(2.9)	8(3.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(62)	(41)	(71)	(207)	(23)	(55)	(53)	(45)	(176)
รวม	57(100.0)	35(100.0)	41(100.0)	67(100.0)	200(100.0)	57(100.0)	90(100.0)	56(100.0)	34(100.0)	237(100.0)

ตารางที่ 1.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	56(77.8)	47(64.4)	43(69.4)	73(70.9)	219(70.6)	32(47.8)	81(64.3)	51(51.5)	33(50.0)	197(55.0)
เบียร์	53(73.6)	56(76.7)	47(75.8)	72(69.9)	228(73.5)	56(83.6)	103(81.7)	68(68.7)	50(75.8)	277(77.4)
Spy/ไวน์	29(40.3)	31(42.5)	28(45.2)	21(20.4)	109(35.2)	23(34.3)	52(41.3)	36(36.4)	28(42.4)	139(38.8)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	15(20.8)	15(20.5)	12(19.4)	18(17.5)	60(19.4)	7(10.4)	37(21.4)	23(23.2)	12(18.2)	69(19.3)
อื่นๆ	-	1(1.4)	-	1(1.0)	2(0.6)	-	-	-	-	-
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	133(61.9)	155(57.0)	154(62.1)	232(57.1)	674(59.1)	174(56.9)	250(63.5)	206(59.9)	140(65.1)	770(61.2)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	50(55.6)	26(37.7)	35(44.3)	81(63.3)	192(52.5)	65(57.5)	70(46.1)	56(54.4)	32(50.0)	223(51.6)
5-9 ครั้ง	8(8.9)	5(7.2)	7(8.9)	12(9.4)	32(8.7)	16(14.2)	23(15.1)	13(12.6)	6(9.4)	58(13.4)
≥10 ครั้ง	10(11.1)	5(7.2)	18(22.8)	7(5.5)	40(10.9)	9(8.0)	11(7.2)	8(7.8)	-	28(6.5)
บางครั้ง	-	-	-	6(4.7)	6(1.6)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	17(18.9)	32(46.4)	16(20.3)	17(13.3)	82(22.4)	20(17.7)	44(28.9)	19(18.4)	23(35.9)	106(24.5)
จำไม่ได้	5(5.6)	1(1.4)	3(3.8)	5(3.9)	14(3.8)	3(2.7)	4(2.6)	7(6.8)	3(4.7)	17(3.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(43)	(86)	(75)	(104)	(308)	(61)	(98)	(103)	(76)	(338)
รวม	90(100.0)	69(100.0)	79(100.0)	128(100.0)	366(100.0)	113(100.0)	152(100.0)	103(100.0)	64(100.0)	432(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	75(68.8)	92(72.4)	107(81.1)	138(73.0)	409(73.4)	87(55.8)	164(73.2)	146(76.0)	88(69.3)	485(69.4)
เบียร์	84(77.1)	101(79.5)	87(50.8)	142(75.1)	434(77.9)	125(80.1)	184(82.1)	152(79.2)	94(74.0)	555(79.4)
Spy/ไวน์	51(46.8)	58(45.7)	67(50.8)	62(32.8)	238(42.7)	70(44.9)	103(46.0)	85(44.3)	53(41.7)	311(44.5)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	20(18.3)	21(16.5)	41(31.1)	36(19.0)	118(21.1)	18(11.5)	47(21.0)	40(20.8)	21(16.5)	126(18.0)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นิตยสาร										
เคยเห็น*	100(46.5)	137(50.4)	133(53.6)	178(43.8)	548(48.0)	125(40.8)	223(56.6)	186(54.1)	115(53.5)	649(51.5)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	32(55.2)	16(26.7)	32(52.5)	52(68.4)	132(51.8)	48(57.8)	58(43.6)	47(51.1)	25(49.0)	178(49.6)
5-9 ครั้ง	5(8.6)	9(15.0)	8(13.1)	6(7.9)	28(11.0)	13(15.7)	17(12.8)	13(14.1)	5(9.8)	48(13.4)
≥10 ครั้ง	5(8.6)	7(11.7)	11(18.0)	4(5.3)	27(10.6)	8(9.6)	6(4.5)	6(6.5)	1(2.0)	21(5.8)
บางครั้ง	-	-	-	1(1.3)	1(0.4)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	12(20.7)	27(45.0)	9(14.8)	11(14.5)	59(23.1)	14(16.9)	49(36.8)	18(19.6)	13(25.5)	94(26.2)
จำไม่ได้	4(6.9)	1(1.7)	1(1.6)	2(2.6)	(8)3.1	-	3(2.3)	8(8.7)	7(13.7)	18(5.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(77)	(72)	(102)	(293)	(42)	(90)	(94)	(64)	(290)
รวม	58(100.0)	60(100.0)	61(100.0)	76(100.0)	255(100.0)	83(100.0)	133(100.0)	92(100.0)	51(100.0)	359(100.0)

ตารางที่ 1.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็นได้ยืนยันโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	62(75.6)	73(68.2)	82(73.9)	97(70.3)	314(71.7)	58(52.7)	121(61.7)	97(60.2)	65(64.4)	341(52.5)
เบียร์	60(73.2)	77(72.0)	88(79.3)	104(75.4)	329(75.1)	77(70.0)	148(75.5)	122(75.8)	72(71.3)	419(73.8)
Spy/ไวน์	53(64.6)	53(49.5)	59(53.2)	61(44.2)	226(51.6)	63(57.3)	123(62.8)	97(60.2)	63(62.4)	346(60.9)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	20(24.4)	25(23.4)	43(38.7)	29(16.3)	117(26.7)	22(20.0)	56(28.6)	42(26.1)	30(29.7)	150(26.4)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผ่นป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	132(61.4)	185(68.0)	165(66.5)	247(60.8)	729(63.9)	200(65.4)	260(66.0)	225(65.4)	251(70.2)	836(66.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	52(55.9)	26(29.5)	35(40.7)	81(63.3)	194(49.1)	70(53.8)	75(45.3)	65(58.6)	35(47.9)	242(51.2)
5-9 ครั้ง	10(10.8)	9(10.2)	14(16.3)	11(8.6)	44(11.1)	23(17.7)	18(11.3)	13(11.7)	10(13.7)	64(13.5)
≥10 ครั้ง	6(6.5)	11(12.5)	14(16.3)	12(9.4)	43(10.9)	12(9.2)	13(8.2)	10(9.0)	2(2.7)	37(7.8)
บางครั้ง	-	-	1(1.2)	1(0.8)	2(0.5)	-	-	1(0.9)	-	1(0.2)
หลายครั้ง	19(20.4)	41(46.6)	20(23.3)	17(13.3)	97(24.6)	24(18.5)	53(33.3)	15(13.5)	23(31.5)	115(24.3)
จำไม่ได้	6(6.5)	1(1.1)	2(2.3)	6(4.7)	15(3.8)	1(0.8)	3(1.9)	7(6.3)	3(4.1)	14(3.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(97)	(79)	(119)	(334)	(70)	(101)	(114)	(78)	(363)
รวม	93(100.0)	88(100.0)	86(100.0)	128(100.0)	395(100.0)	130(100.0)	159(100.0)	111(100.0)	73(100.0)	473(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	70(61.4)	113(74.3)	104(72.7)	153(72.9)	440(71.1)	106(59.6)	174(75.3)	158(76.7)	94(70.1)	532(71.0)
เบียร์	81(71.1)	117(77.0)	124(86.7)	160(76.2)	482(77.9)	143(80.3)	193(83.5)	180(87.4)	103(68.2)	619(82.6)
Spy/ไวน์	57(50.0)	75(49.3)	84(58.7)	52(24.8)	268(43.3)	87(48.9)	123(53.2)	105(51.0)	57(42.5)	372(49.7)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	21(18.4)	33(21.7)	41(28.7)	30(14.3)	125(20.2)	29(16.3)	47(18.1)	61(29.6)	28(20.9)	165(22.0)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผ่นปลิว										
เคยเห็น*	70(32.6)	83(30.5)	62(25.0)	111(27.3)	326(28.6)	76(24.8)	104(26.4)	65(18.9)	66(30.7)	311(24.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	23(48.9)	8(30.8)	14(63.6)	31(60.8)	76(52.1)	29(54.7)	22(36.7)	16(66.7)	17(60.7)	84(50.9)
5-9 ครั้ง	4(8.5)	1(3.8)	3(13.6)	6(11.8)	14(9.6)	9(17.0)	3(5.0)	2(8.3)	4(14.3)	18(10.9)
≥10 ครั้ง	5(10.6)	4(15.4)	2(9.1)	5(9.8)	16(11.0)	4(7.5)	7(11.7)	1(4.2)	1(3.6)	13(7.9)
บางครั้ง	-	-	-	1(2.0)	1(0.7)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	11(23.4)	13(50.0)	3(13.6)	7(13.7)	34(23.3)	10(18.9)	25(41.7)	4(16.7)	5(17.9)	44(26.7)
จำไม่ได้	4(8.5)	-	-	1(2.0)	5(3.4)	1(1.9)	3(5.0)	1(4.2)	1(3.6)	6(3.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(57)	(40)	(60)	(180)	(23)	(44)	(41)	(38)	(146)
รวม	47(100.0)	26(100.0)	22(100.0)	51(100.0)	146(100.0)	53(100.0)	60(100.0)	24(100.0)	28(100.0)	165(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	36(65.5)	35(59.3)	31(70.5)	58(65.9)	160(65.0)	46(74.2)	68(81.0)	34(64.2)	38(69.1)	186(73.2)
เบียร์	41(74.5)	42(71.2)	31(70.5)	54(61.4)	168(68.3)	50(80.6)	67(79.8)	37(69.8)	36(65.5)	190(74.8)
Spy/ไวน์	30(54.5)	28(47.5)	23(37.1)	25(28.4)	106(43.1)	33(53.2)	49(58.3)	30(56.6)	24(43.6)	136(53.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	11(20.0)	12(20.3)	10(22.7)	13(14.8)	46(18.7)	14(22.6)	25(29.8)	18(34.0)	20(36.4)	77(30.3)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
แผ่นปิดประกาศ										
เคยเห็น*	63(29.3)	83(30.5)	75(30.2)	109(26.8)	330(28.9)	60(19.6)	96(24.4)	76(22.1)	64(29.8)	296(23.5)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	18(46.2)	10(33.3)	18(58.1)	32(64.0)	78(52.0)	20(51.3)	19(34.5)	19(67.9)	14(60.9)	72(49.7)
5-9 ครั้ง	6(15.4)	1(3.3)	5(16.1)	8(16.0)	20(13.3)	5(12.8)	4(7.3)	3(10.7)	2(8.7)	14(9.7)
≥10 ครั้ง	4(10.3)	4(13.3)	3(9.7)	3(6.0)	14(9.3)	6(15.4)	6(10.9)	2(7.1)	1(4.3)	15(10.3)
บางครั้ง	-	-	-	1(2.0)	1(0.7)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	8(20.5)	15(50.0)	4(12.9)	6(12.0)	33(22.0)	7(17.9)	24(25.0)	4(14.3)	6(26.1)	41(28.3)
จำไม่ได้	3(7.7)	-	1(3.2)	-	4(22.0)	1(2.6)	2(3.6)	-	-	3(2.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(53)	(44)	(59)	(180)	(21)	(41)	(48)	(41)	(151)
รวม	39(100.0)	30(100.0)	31(100.0)	50(100.0)	150(100.0)	39(100.0)	55(100.0)	28(100.0)	23(100.0)	145(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	51(72.5)	42(68.9)	41(70.7)	57(68.7)	177(70.0)	33(68.8)	61(79.2)	48(75.0)	34(61.8)	176(72.1)
เบียร์	41(80.4)	44(72.1)	46(79.3)	62(74.7)	193(76.3)	41(85.4)	64(83.1)	52(81.3)	40(72.7)	197(80.7)
Spy/ไวน์	25(49.0)	26(42.6)	26(44.8)	19(22.9)	96(37.9)	19(39.6)	44(57.1)	34(53.1)	28(50.9)	125(51.2)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	13(25.5)	13(21.3)	11(19.0)	15(18.1)	52(20.6)	9(18.8)	23(29.9)	20(31.3)	15(27.3)	67(27.5)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	113(52.6)	165(60.7)	136(54.8)	202(49.8)	616(54.0)	150(49.0)	236(99.7)	192(55.8)	130(60.5)	708(56.2)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	32(41.6)	21(28.4)	24(36.9)	54(50.5)	131(40.6)	45(45.9)	47(31.3)	40(43.5)	21(35.0)	153(38.3)
5-9 ครั้ง	5(6.5)	6(10.8)	7(10.8)	15(14.0)	35(10.8)	23(23.5)	24(16.0)	13(14.1)	10(16.7)	70(17.5)
≥10 ครั้ง	14(18.2)	14(18.9)	18(27.7)	9(8.4)	55(17.0)	8(8.2)	24(16.0)	14(15.2)	3(5.0)	49(12.3)
บางครั้ง	-	-	-	4(3.4)	4(1.2)	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	21(27.3)	29(39.2)	14(21.5)	23(21.5)	87(26.9)	22(22.4)	51(34.0)	19(20.7)	21(35.0)	113(28.3)
จำไม่ได้	5(6.5)	2(2.7)	2(3.1)	2(1.9)	11(3.4)	-	4(2.7)	6(6.5)	5(8.3)	15(3.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(91)	(71)	(95)	(293)	(52)	(86)	(100)	(70)	(308)
รวม	77(100.0)	74(100.0)	65(100.0)	107(100.0)	323(100.0)	98(100.0)	150(100.0)	92(100.0)	60(100.0)	400(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	68(70.8)	108(79.4)	101(86.3)	134(80.7)	411(79.8)	404(75.4)	165(79.3)	140(79.1)	95(79.2)	501(78.4)
เบียร์	74(77.1)	113(83.1)	99(84.6)	133(80.1)	419(81.4)	111(82.8)	177(85.1)	151(85.3)	102(85.0)	541(84.7)
Spy/ไวน์	62(64.6)	79(58.1)	83(70.9)	82(49.4)	306(59.4)	92(68.7)	154(74.0)	126(71.2)	77(64.2)	449(70.3)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	27(28.1)	42(30.9)	50(42.7)	64(38.6)	183(35.5)	32(23.9)	88(42.3)	73(41.2)	49(40.8)	242(37.9)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 1.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเห็น/ได้ยินโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น)*										
16.00-20.00 น.	58(28.7)	57(22.6)	41(18.0)	80(20.9)	236(22.2)	90(31.1)	84(22.7)	46(14.1)	51(25.5)	271(22.8)
20.00-24.00 น.	78(38.6)	121(48.0)	111(48.7)	167(43.6)	477(44.8)	135(46.7)	191(51.6)	187(57.2)	89(44.5)	602(50.8)
24.00-04.00 น.	40(19.8)	51(20.2)	60(26.3)	119(31.1)	270(25.4)	41(14.2)	76(20.5)	83(25.4)	46(23.0)	246(20.7)
04.00-08.00 น.	7(3.5)	6(2.4)	2(0.9)	3(0.8)	18(1.7)	2(0.7)	2(0.5)	1(0.3)	2(1.0)	7(0.6)
08.00-12.00 น.	12(5.9)	7(2.8)	3(1.3)	6(1.6)	28(2.6)	6(2.1)	4(1.1)	2(0.6)	3(1.5)	15(1.3)
12.00-16.00 น.	7(3.5)	10(4.0)	11(4.8)	8(2.1)	36(3.4)	15(5.2)	13(3.5)	8(2.4)	9(4.5)	45(3.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(20)	(20)	(23)	(76)	(17)	(24)	(17)	(15)	(73)
รวม	202(100.0)	252(100.0)	228(100.0)	383(100.0)	1065(100.0)	289(100.0)	370(100.0)	327(100.0)	200(100.0)	1186(100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	118(57.8)	115(43.9)	70(29.0)	144(36.5)	447(40.5)	146(49.3)	172(44.1)	101(30.1)	88(41.7)	507(41.1)
จำได้	88(42.7)	147(56.1)	171(71.0)	250(63.5)	656(59.5)	150(50.7)	218(55.9)	235(69.9)	123(58.3)	726(58.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(10)	(7)	(12)	(38)	(10)	(4)	(8)	(4)	(26)
รวม	206(100.0)	262(100.0)	241(100.0)	394(100.0)	1103(100.0)	296(100.0)	390(100.0)	336(100.0)	211(100.0)	1233(100.0)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	Spy wine cooler/ Bacardi	ซ้าง	ซ้าง
อันดับ2	สิงห์	Heineken	Heineken	ลิโอ	ลิโอ	รีเจนท์	Spy wine cooler/ Bacardi	ซ้าง	รีเจนท์	Spy wine cooler/ Bacardi
อันดับ3	ลิโอ	Spy wine cooler/ Bacardi	Johnnie Walker	แสงโสม	Heineken	สิงห์	สิงห์	Heineken	ลิโอ	รีเจนท์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ลิโอ	Spy wine cooler/ Bacardi	Vodka	Johnnie Walker	Johnnie Walker	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi
อันดับ2	Spy wine cooler, Heineken, แม่โขง, ไวน์	Johnnie Walker	ซ้าง	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	ไวน์	Johnnie Walker	Heineken	Johnnie Walker	Johnnie Walker
อันดับ3	รีเจนท์	ซ้าง	Spy wine cooler/ Bacardi และ Heineken	รีเจนท์	Heineken	Johnnie Walkerและ ลิโอ	Heineken	สิงห์, Scotch whisky และ Vodka	ไวน์	Heineken

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ

ประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดที่รู้จักและเคยเห็นของจริง

ตารางที่ 1.15 ชนิดของสิ่งเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา)(ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด 3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)										
อันดับ 1	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	ยาบ้า	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ฝิ่น และ ยาอี/ยา เลิฟ	ผงขาว/เฮโรอีน	ผงขาว/ เฮโรอีน	ไอซ์	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ผงขาว/ เฮโรอีน	ยาอี/ยาเลิฟ	ฝิ่น
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	สารระเหย	ยาบ้า	กัญชา	กัญชา	กัญชา	สารระเหย	สารระเหย	สารระเหย	กัญชา	กัญชา
อันดับ 2	ยานอนหลับ/ โดมิแกม	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยานอนหลับ/ โดมิแกม	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 3	ยาบ้า	กระท่อม	สารระเหย	ไอซ์	สารระเหย	ยาบ้า/กัญชา	ยาบ้า	กัญชา	ไอซ์	สารระเหย
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดครั้งสุดท้าย										
ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	แถวบ้านมีชายมีคน ใช้	เพื่อนใช้ และแถว บ้านมีชายมีคนใช้	เพื่อนใช้ และ แถวบ้านมีชายมี คนใช้	แถวบ้านมีชายมี คนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	นิทรรศการ	นิทรรศการ	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้
อันดับ 2	นิทรรศการ	นิทรรศการ, ตำรวจ และ โรงเรียน	นิทรรศการ, ตำรวจ และ คนขายสารฯ	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้ และ ตำรวจ	เพื่อนใช้ และ แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	ตำรวจ	นิทรรศการและ แถวบ้านมีชายมี คนใช้	นิทรรศการ
อันดับ 3	ตำรวจ	ใช้เอง และคนขาย สารฯ	ใช้เองและ โรงเรียน	ตำรวจ	นิทรรศการและ ตำรวจ	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	นิทรรศการ	คนขายสารฯ	เพื่อนใช้
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ใช้เอง	แถวบ้านมีชายมี คนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	เพื่อนใช้	ที่บ้านปลูก	เพื่อนใช้
อันดับ 2	-	นิทรรศการ และ เพื่อนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	แถวบ้านมีชายมี คนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	นิทรรศการ และ แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	เพื่อนใช้	นิทรรศการ และ แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	นิทรรศการ	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้
อันดับ 3	-	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	นิทรรศการ และ ใช้ดอง	ใช้เอง	ใช้เอง	เพื่อนใช้และ ตำรวจ	นิทรรศการ	ตำรวจ	แถวบ้านมีชายมี คนใช้	นิทรรศการ
สารระเหย : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้และแถว บ้านมีชายมีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้	ร้านค้าทั่วไป
อันดับ 2	แถวบ้านมีชายมีคน ใช้	แถวบ้านมีชายมี คนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป และ ใช้เอง	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้และ ร้านค้าทั่วไป	แถวบ้านมีชาย มีคนใช้
อันดับ 3	-	-	นิทรรศการ	โรงเรียน	เพื่อนใช้และใช้ เอง	นิทรรศการ	นิทรรศการ	โรงเรียน	นิทรรศการ	เพื่อนใช้

ตารางที่ 1.16 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	15(5.2)	64(16.5)	96(30.3)	297(63.7)	472(32.4)	5(1.4)	29(6.3)	43(11.4)	72(29.5)	149(10.3)
b. ยาแก้ไอผสมมึนน้ำอัดลม	6(2.1)	12(3.1)	27(8.5)	45(9.8)	90(6.2)	5(1.4)	8(1.7)	12(3.2)	11(4.5)	36(2.5)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	2(0.7)	9(2.3)	15(4.8)	14(3.0)	40(2.8)	3(0.8)	12(2.6)	16(4.3)	6(2.5)	37(2.5)
d. ยานอนหลับ	16(5.6)	25(6.4)	24(7.6)	29(6.3)	94(6.5)	16(4.3)	34(7.4)	44(11.7)	40(16.4)	134(9.2)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม										
เช่น 4X100	3(1.0)	13(3.3)	15(4.8)	52(11.3)	83(5.7)	0(0.0)	1(0.2)	4(1.1)	5(2.0)	10(0.7)
f. ัญชา	4(1.4)	14(3.6)	35(11.1)	136(29.4)	189(13.0)	0(0.0)	3(0.6)	9(2.4)	18(7.4)	30(2.1)
g. ฟีน	0(0.0)	6(1.5)	6(1.9)	3(0.7)	15(1.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.3)	1(0.4)	2(0.1)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0(0.0)	5(1.3)	7(2.2)	9(2.0)	21(1.4)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.5)	1(0.4)	3(0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	0(0.0)	5(1.3)	5(1.6)	4(0.9)	14(1.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.4)	1(0.1)
j. โคเคน	0(0.0)	5(1.3)	8(2.5)	3(0.7)	16(1.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.4)	1(0.1)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	1(0.3)	7(1.8)	7(2.2)	5(1.1)	20(1.4)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.3)	2(0.8)	3(0.2)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1(0.3)	9(2.3)	6(1.9)	16(3.5)	32(2.2)	1(0.3)	3(0.6)	6(1.6)	2(0.8)	12(0.8)
m. ยาบ้า	0(0.0)	11(2.8)	14(4.4)	38(8.3)	63(4.3)	0(0.0)	3(0.6)	2(0.5)	7(2.9)	12(0.8)
n. ไอซ์	0(0.0)	6(1.5)	10(3.2)	22(4.8)	38(2.6)	0(0.0)	1(0.2)	4(1.1)	6(2.5)	11(0.8)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 1.17 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	10(3.5)	57(15.1)	95(30.3)	268(57.6)	430(29.8)	5(1.4)	25(5.4)	34(9.0)	57(23.5)	121(8.3)
b. ยาแก้ไอผสมมึนน้ำอัดลม	8(2.8)	15(4.0)	25(8.0)	35(7.7)	83(5.8)	5(1.4)	7(1.5)	9(2.4)	8(3.3)	29(2.0)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	1(0.3)	9(2.4)	13(4.2)	13(2.8)	36(2.5)	2(0.5)	9(1.9)	11(2.9)	5(2.1)	27(1.9)
d. ยานอนหลับ	14(4.9)	22(5.8)	18(5.8)	22(4.8)	76(5.3)	15(4.1)	23(5.0)	37(9.8)	29(12.0)	104(7.2)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม										
เช่น 4X100	1(0.3)	11(2.9)	14(4.5)	29(6.3)	55(3.8)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.3)	3(1.2)	4(0.3)
f. ัญชา	2(0.7)	13(3.4)	32(10.2)	112(24.2)	159(11.0)	0(0.0)	3(0.6)	6(1.6)	16(6.6)	25(1.7)
g. ฟีน	0(0.0)	7(1.9)	6(1.9)	6(1.3)	19(1.3)	0(0.0)	1(0.2)	1(0.3)	1(0.4)	3(0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0(0.0)	6(1.6)	8(2.6)	10(2.2)	24(1.7)	0(0.0)	1(0.2)	1(0.3)	1(0.4)	3(0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	1(0.3)	5(1.3)	6(1.9)	6(1.3)	18(1.3)	0(0.0)	1(0.2)	0(0.0)	1(0.4)	2(0.1)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0(0.0)	6(1.6)	7(2.2)	5(1.1)	18(1.3)	0(0.0)	1(0.2)	1(0.3)	1(0.4)	3(0.2)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1(0.3)	9(2.4)	8(2.6)	10(2.2)	28(1.9)	1(0.3)	3(0.6)	3(0.8)	1(0.4)	8(0.6)
l. ยาบ้า	0(0.0)	10(2.7)	15(4.8)	36(7.8)	61(4.2)	0(0.0)	1(0.2)	2(0.5)	4(1.6)	7(0.5)
m. ไอซ์	0(0.0)	7(1.9)	13(4.2)	17(3.7)	37(2.6)	0(0.0)	0(0.0)	3(0.8)	5(2.1)	8(0.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 1.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	5(50.0)	29(50.9)	51(53.7)	209(78.0)	294(68.4)	2(40.0)	10(40.0)	14(41.2)	34(59.6)	60(49.6)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	3(37.5)	9(60.0)	5(20.0)	15(42.9)	32(38.6)	3(60.0)	3(42.9)	2(22.2)	5(62.5)	13(44.8)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเครียด	1(100.0)	7(77.8)	2(15.4)	6(46.2)	15(41.7)	1(50.0)	3(33.3)	6(54.5)	3(60.0)	13(48.1)
d. ยานอนหลับ	2(14.3)	9(40.9)	2(11.1)	7(31.8)	20(26.3)	6(40.0)	3(13.0)	7(18.9)	18(62.1)	34(32.7)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	1(100.0)	6(54.5)	2(14.3)	12(41.4)	21(38.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(100.0)	0(0.0)	1(25.0)
f. กัญชา	1(50.0)	8(61.5)	15(46.9)	55(49.1)	79(49.7)	0(0.0)	1(33.3)	1(16.7)	7(43.8)	9(36.0)
g. ฝิ่น	0(0.0)	6(85.7)	1(16.7)	4(66.7)	11(57.9)	0(0.0)	0(0.0)	1(100.0)	0(0.0)	1(33.3)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0(0.0)	5(83.3)	1(12.5)	3(30.0)	9(37.5)	0(0.0)	1(100.0)	1(100.0)	0(0.0)	2(66.7)
i. ยาเค (เคตามีน)	1(100.0)	4(80.0)	1(16.7)	3(30.0)	8(44.4)	0(0.0)	1(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(50.0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0(0.0)	5(83.3)	1(14.3)	4(80.0)	10(55.6)	0(0.0)	1(100.0)	1(100.0)	0(0.0)	2(66.7)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1(100.0)	5(55.6)	3(37.5)	3(30.0)	12(42.9)	1(100.0)	3(100.0)	1(33.3)	0(0.0)	5(62.5)
l. ยาบ้า	0(0.0)	6(60.0)	4(26.7)	22(61.1)	32(52.5)	0(0.0)	1(100.0)	1(50.0)	2(50.0)	4(57.1)
m. ไอซ์	0(0.0)	6(85.7)	4(30.8)	7(41.2)	17(45.9)	0(0.0)	0(0.0)	1(33.3)	3(60.0)	4(50.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการติ่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

ตารางที่ 1.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	155(59.2)	205(63.3)	179(64.4)	237(55.2)	776(60.0)	197(57.1)	254(57.5)	192(54.1)	125(52.7)	768(55.7)
มี	107(40.8)	119(36.7)	99(35.6)	192(44.8)	517(40.0)	148(42.9)	188(42.5)	163(45.9)	112(47.3)	611(44.3)
ไม่ระบุ(จำนวน)	(26)	(80)	(52)	(48)	(206)	(26)	31()	(25)	(8)	(90)
รวม	262(100.0)	324(100.0)	278(100.0)	429(100.0)	1293(100.0)	345(100.0)	442(100.0)	355(100.0)	237(100.0)	1379(100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการติ่มสุรา*										
แม่	16(15.0)	23(19.3)	12(12.1)	34(17.7)	85(16.4)	29(19.6)	36(19.1)	23(14.1)	16(14.3)	104(17.0)
พ่อ	62(57.9)	83(69.7)	59(59.6)	91(47.4)	295(57.1)	83(56.1)	89(47.3)	87(53.4)	59(52.7)	318(52.0)
แม่เลี้ยง	-	4(3.4)	-	2(1.0)	6(1.2)	4(2.7)	4(2.1)	3(1.8)	3(2.7)	14(2.3)
พ่อเลี้ยง	1(0.9)	6(66.7)	3(3.0)	4(2.1)	14(2.7)	3(2.0)	4(2.1)	2(1.2)	6(5.4)	15(2.5)
พี่น้อง	9(8.4)	31(26.1)	21(21.2)	41(21.4)	102(19.7)	17(11.5)	51(27.1)	32(19.6)	30(26.8)	130(21.3)
ปู่/ย่า	14(13.1)	21(17.6)	16(16.2)	26(13.5)	77(14.9)	16(10.8)	19(10.1)	16(9.8)	9(8.0)	60(9.8)
ตา/ยาย	21(19.6)	24(20.2)	18(18.2)	26(13.5)	89(17.2)	21(14.2)	16(8.5)	16(9.8)	11(9.8)	64(10.5)
ญาติฝ่ายพ่อ	36(33.6)	39(32.8)	31(31.3)	54(28.1)	160(30.9)	58(39.2)	61(32.4)	53(32.5)	46(41.1)	218(35.7)
ญาติฝ่ายแม่	28(26.2)	36(30.3)	30(30.3)	57(29.7)	151(29.2)	49(33.1)	53(28.2)	59(36.2)	38(33.9)	199(62.6)
แฟน	8(7.5)	3(2.5)	6(6.1)	18(9.4)	35(6.8)	1(0.7)	25(13.3)	20(12.3)	35(31.3)	81(13.3)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	9(8.4)	6(5.0)	9(9.1)	7(8.9)	41(7.9)	8(5.4)	14(7.4)	6(3.7)	5(4.5)	33(5.4)
พ่อ	41(38.3)	57(47.9)	47(47.5)	76(39.6)	221(42.7)	62(41.9)	88(46.8)	76(46.6)	47(42.0)	273(44.7)
แม่เลี้ยง	-	2(1.7)	-	5(2.6)	7(1.4)	1(0.7)	3(1.6)	3(1.8)	1(0.9)	5(0.8)
พ่อเลี้ยง	1(0.9)	2(1.7)	2(2.0)	11(5.7)	15(2.9)	4(2.7)	3(1.6)	4(2.5)	4(3.6)	15(2.5)
พี่น้อง	10(9.3)	22(18.5)	23(23.2)	40(20.8)	95(18.4)	14(9.5)	36(19.1)	25(15.3)	26(23.2)	101(16.5)
ปู่/ย่า	15(14.0)	16(13.4)	5(5.1)	14(7.3)	50(9.7)	19(12.8)	11(5.9)	8(4.9)	8(7.1)	46(7.5)
ตา/ยาย	12(11.2)	18(15.1)	8(8.1)	16(8.3)	54(10.4)	22(14.9)	15(8.0)	16(9.8)	8(7.1)	61(10.0)
ญาติฝ่ายพ่อ	30(28.0)	37(31.1)	21(21.2)	40(20.8)	128(24.8)	48(32.4)	48(25.5)	46(28.2)	36(32.1)	178(29.1)
ญาติฝ่ายแม่	18(16.8)	28(23.5)	21(21.2)	39(20.3)	106(20.5)	42(28.4)	32(17.0)	35(21.5)	27(24.1)	136(22.3)
แฟน	1(0.9)	3(2.5)	2(2.0)	14(7.3)	20(3.9)	2(1.4)	17(9.0)	18(11.0)	34(30.4)	71(11.6)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	-	4(3.4)	1(1.0)	5(2.6)	10(1.9)	1(0.7)	1(0.5)	1(0.6)	-	3(0.5)
พ่อ	-	5(4.2)	2(2.0)	5(2.6)	12(2.3)	2(1.4)	1(0.5)	3(1.8)	-	6(1.0)
แม่เลี้ยง	-	2(1.7)	-	3(1.6)	5(1.0)	-	-	-	-	-
พ่อเลี้ยง	-	2(1.7)	1(1.0)	2(1.0)	5(1.0)	-	-	-	-	-
พี่น้อง	-	6(5.0)	3(3.0)	12(6.3)	21(4.1)	1(0.7)	1(0.5)	4(2.5)	6(5.4)	12(2.0)
ปู่/ย่า	1(0.9)	2(1.7)	-	3(1.6)	6(1.2)	-	1(0.5)	1(0.6)	1(0.9)	3(0.5)
ตา/ยาย	2(1.9)	2(1.7)	-	3(1.6)	7(1.4)	-	-	1(0.6)	1(0.9)	2(0.3)
ญาติฝ่ายพ่อ	-	3(2.5)	1(1.0)	4(2.1)	8(1.5)	1(0.7)	2(1.1)	2(1.2)	2(1.8)	7(1.1)
ญาติฝ่ายแม่	1(0.9)	3(2.5)	1(1.0)	5(2.6)	10(1.9)	-	2(1.1)	2(1.2)	2(1.8)	6(1.0)
แฟน	-	2(1.7)	3(3.0)	3(1.6)	8(1.5)	1(0.7)	6(3.2)	3(1.8)	5(4.5)	15(2.5)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 1.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	215(77.1)	271(69.3)	210(65.6)	328(70.2)	1024(70.3)	299(81.3)	354(75.5)	278(74.1)	186(76.9)	1117(76.8)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	215(77.1)	264(67.5)	193(60.5)	314(67.2)	986(67.7)	300(81.5)	331(70.6)	237(63.2)	179(74.0)	1047(72.0)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	194(69.5)	257(65.7)	208(65.2)	283(60.6)	942(64.7)	275(74.7)	318(67.8)	242(64.5)	169(70.1)	1004(69.1)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	220(78.9)	290(74.2)	223(69.9)	333(71.3)	1066(73.2)	309(84.0)	363(77.4)	281(74.9)	194(80.2)	1147(78.9)
e. ยานอนหลับ	205(73.5)	259(66.4)	196(61.4)	305(65.3)	965(66.3)	271(73.6)	320(68.2)	233(62.1)	174(71.9)	998(68.6)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	228(81.7)	294(75.4)	240(75.2)	340(72.8)	1102(75.7)	318(86.4)	395(84.2)	327(87.2)	198(81.8)	1238(85.1)
g. กัญชา	233(83.5)	305(78.0)	244(76.5)	346(74.1)	1128(77.5)	331(89.9)	397(84.6)	332(88.5)	202(83.5)	1262(86.8)
h. ฝิ่น	236(84.6)	311(79.5)	246(77.1)	348(74.5)	1141(78.4)	330(89.7)	402(85.7)	334(87.9)	203(84.2)	1269(87.3)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	234(83.9)	315(80.6)	247(77.4)	356(76.2)	1152(79.1)	332(90.2)	404(86.1)	336(89.6)	204(84.3)	1276(87.8)
j. ยาเค (เคตามีน)	231(82.8)	309(79.0)	252(79.0)	356(76.2)	1148(78.8)	328(89.1)	403(85.9)	335(89.3)	206(85.1)	1272(87.5)
k. โคเคน	232(83.2)	312(80.0)	251(78.7)	354(75.8)	1149(79.0)	329(89.4)	404(86.1)	336(89.6)	207(85.5)	1276(87.8)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	234(83.9)	312(80.0)	254(79.6)	357(76.4)	1157(79.5)	329(89.4)	400(85.3)	338(90.1)	205(84.7)	1272(87.5)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	231(82.8)	303(77.7)	249(78.1)	355(76.0)	1138(78.2)	323(87.8)	390(83.2)	317(84.5)	205(84.7)	1235(84.9)
n. ยาบ้า	235(84.2)	313(80.3)	256(80.3)	359(76.9)	1163(79.9)	333(90.5)	405(86.4)	338(90.1)	208(86.0)	1284(88.3)
o. ไอซ์	231(82.8)	307(78.7)	245(76.8)	352(75.4)	1135(78.0)	327(88.9)	397(84.6)	335(89.6)	205(84.7)	1264(87.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 1.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจ ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	196(71.0)	145(37.3)	88(27.4)	71(15.2)	500(34.4)	259(70.4)	214(45.6)	138(36.8)	77(31.8)	688(47.3)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	179(64.9)	124(31.9)	61(19.1)	63(13.5)	427(29.4)	229(62.2)	167(35.6)	71(18.9)	60(24.8)	527(36.2)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	189(68.5)	158(40.7)	98(30.6)	121(26.0)	566(39.0)	240(65.2)	215(45.8)	132(35.2)	96(39.7)	683(47.0)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	199(72.1)	166(42.8)	110(34.4)	143(30.7)	618(42.6)	258(70.1)	228(48.6)	162(43.2)	113(46.7)	761(52.3)
e. ยานอนหลับ	163(59.1)	134(34.5)	85(26.6)	102(21.9)	484(33.4)	170(46.2)	159(33.9)	83(22.1)	75(31.0)	487(33.5)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	221(79.2)	221(57.0)	158(49.1)	164(35.3)	764(52.5)	288(78.0)	313(66.9)	252(67.0)	142(58.4)	995(68.3)
g. กัญชา	226(81.0)	224(57.7)	171(53.3)	163(35.1)	784(54.0)	293(79.4)	315(67.3)	256(68.1)	135(55.6)	991(68.1)
h. ฝิ่น	226(81.0)	226(58.2)	176(54.8)	186(40.0)	814(56.0)	293(79.4)	315(67.3)	259(68.9)	143(58.8)	1010(69.4)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	228(81.7)	224(57.7)	177(55.1)	194(41.7)	823(56.6)	292(79.1)	315(67.3)	260(69.1)	143(58.8)	1010(69.4)
j. ยาเค (เคตามีน)	229(82.1)	227(58.5)	183(57.0)	200(43.0)	839(57.7)	293(79.4)	321(68.6)	263(69.9)	149(61.3)	1026(70.5)
k. โคเคน	226(81.0)	229(59.0)	179(55.9)	201(43.3)	835(57.5)	294(79.7)	320(68.4)	262(69.7)	150(61.7)	1026(70.5)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	228(81.7)	227(58.5)	183(57.0)	202(43.5)	840(57.9)	297(80.5)	319(68.2)	268(71.3)	152(62.6)	1036(71.2)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	225(80.6)	226(58.2)	183(57.0)	213(45.8)	847(58.3)	291(78.9)	313(66.9)	255(67.8)	152(62.6)	1011(69.4)
n. ยาบ้า	226(81.3)	235(60.6)	185(57.6)	201(43.2)	847(58.3)	298(80.8)	324(69.2)	271(72.1)	149(61.3)	1042(71.6)
o. ไอซ์	224(80.0)	221(27.1)	169(52.8)	186(41.2)	800(55.7)	296(80.2)	314(37.2)	256(68.4)	145(59.9)	1011(69.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 1.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	25(9.0)	26(6.7)	7(2.2)	14(3.0)	75(4.9)	29(7.9)	20(4.3)	16(4.3)	13(5.3)	78(5.4)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	26(9.3)	26(6.7)	7(2.2)	18(3.8)	77(5.3)	33(8.9)	17(3.6)	17(4.5)	13(5.3)	80(5.5)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	79(28.3)	90(23.2)	37(11.5)	86(18.4)	292(20.1)	79(21.4)	74(15.8)	61(16.3)	39(16.0)	253(17.4)
d. ยาแก้ลมประสาท/ยาคลายเครียด	93(33.3)	126(32.5)	78(24.3)	149(31.8)	446(30.6)	120(32.5)	122(26.1)	91(24.3)	80(32.9)	413(28.4)
e. ยานอนหลับ	68(24.4)	91(23.5)	49(15.3)	105(22.4)	313(21.5)	60(16.3)	72(15.4)	50(13.3)	46(18.9)	228(15.7)
f. กระเทียม หรือ 4X100	139(49.8)	177(45.6)	148(45.8)	186(39.7)	649(44.5)	169(45.8)	210(44.9)	216(57.6)	110(45.3)	705(48.5)
g. กัญชา	135(48.4)	187(42.2)	129(40.2)	160(34.2)	611(42.0)	166(45.0)	202(43.3)	198(52.8)	99(40.7)	665(45.7)
h. ฝิ่น	142(50.9)	197(50.8)	163(50.8)	248(53.0)	750(51.5)	176(47.7)	218(46.6)	226(60.3)	123(50.6)	743(51.1)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	142(50.9)	197(50.8)	159(49.5)	235(50.1)	733(50.3)	171(46.3)	209(44.7)	224(59.7)	122(50.4)	726(49.9)
j. ยาเค (เคตามีน)	146(52.3)	200(51.5)	167(52.0)	255(54.4)	768(52.7)	174(47.2)	212(45.3)	231(61.6)	130(53.7)	747(51.3)
k. โคเคน	143(51.3)	201(51.7)	169(52.6)	255(54.4)	768(52.7)	177(48.0)	213(45.5)	235(62.7)	134(55.1)	759(52.2)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	142(50.9)	193(49.6)	163(50.8)	251(53.5)	749(51.4)	170(46.1)	206(44.0)	224(59.7)	125(51.7)	725(49.9)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	115(41.2)	159(40.9)	100(31.2)	173(36.9)	547(37.5)	127(34.4)	163(34.9)	142(37.9)	100(41.2)	532(36.6)
n. ยาบ้า	132(47.3)	184(47.3)	151(47.0)	283(39.0)	650(44.6)	161(43.6)	201(42.9)	208(55.5)	101(41.6)	671(41.1)
o. ไอซ์	144(47.3)	195(50.1)	152(47.4)	217(46.3)	708(48.6)	170(46.1)	214(45.7)	205(54.7)	115(47.3)	704(48.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 1.23 นักเรียนคิดว่า การดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ประหม่า เกือบเงิน สร้าง ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	65(23.0)	161(42.8)	150(45.5)	273(58.1)	654(44.7)	91(24.6)	182(38.8)	178(47.0)	106(43.6)	557(38.1)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	43(15.2)	117(30.2)	144(44.6)	237(50.4)	541(37.0)	37(10.0)	108(23.0)	144(38.0)	69(28.4)	358(24.5)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือ ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	50(17.7)	127(32.7)	122(37.8)	237(50.4)	536(36.6)	41(11.1)	117(24.9)	118(31.1)	84(34.6)	360(24.6)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	38(13.4)	101(26.0)	124(38.4)	245(52.1)	508(34.7)	18(4.9)	68(14.5)	96(25.3)	67(27.6)	249(17.0)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	46(16.3)	122(31.4)	151(46.7)	282(60.0)	601(41.1)	27(7.3)	98(20.9)	139(36.7)	86(35.4)	350(24.0)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	19(17.3)	138(35.6)	161(49.8)	295(62.8)	643(43.9)	35(9.5)	118(25.2)	149(39.3)	72(29.6)	374(25.6)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	34(11.9)	91(23.3)	113(35.2)	224(47.8)	462(31.5)	29(7.9)	82(17.6)	106(28.1)	75(31.0)	292(20.1)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	71(24.9)	169(43.3)	200(62.3)	362(77.0)	802(54.7)	74(20.1)	207(44.5)	232(61.5)	146(60.3)	659(45.4)
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	54(18.9)	132(33.8)	140(43.6)	253(53.9)	579(39.5)	34(9.2)	99(21.3)	110(29.2)	74(30.6)	317(21.8)
j. ทำให้กินอาหารได้ร่อยมากขึ้น	40(14.0)	90(23.1)	95(29.6)	164(35.0)	389(26.6)	27(7.3)	78(16.8)	87(23.1)	58(24.0)	250(17.2)
k. ทำให้ผู้หญิงเซ็กซี่ขึ้น	42(14.7)	104(26.7)	121(37.7)	202(43.2)	469(32.0)	31(8.4)	87(18.7)	89(23.6)	67(27.7)	274(18.9)
l. ทำให้ผู้ชายเซ็กซี่ขึ้น	24(8.4)	68(17.4)	71(22.1)	110(23.6)	273(18.7)	23(6.2)	63(13.5)	57(15.1)	57(23.6)	200(13.8)
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	25(8.8)	60(15.4)	65(20.2)	103(22.1)	253(17.3)	9(2.4)	49(10.5)	40(10.6)	44(18.2)	142(9.8)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	80(28.1)	156(40.0)	173(53.9)	291(61.9)	700(47.7)	100(27.1)	170(36.6)	163(43.2)	99(41.1)	532(36.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข้อมูลโรงเรียนปริณิตล

จำนวนตัวอย่างแยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

จังหวัดปริณิตล	จำนวนโรงเรียน	ม. 1 (n=974)		ม. 3 (n=973)		ม. 5 (n=1007)		ปวช. 2 (n=708)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. จังหวัดนนทบุรี	6 โรงเรียน	171	139	133	161	145	167	137	45	1098
2. จังหวัดนครปฐม	5 โรงเรียน	197	169	149	179	150	211	113	77	1245
3. จังหวัดสมุทรสาคร	5 โรงเรียน	162	136	190	156	100	232	199	137	1312
รวม	16 โรงเรียน	530	444	472	496	395	610	449	259	3655

* ไม่ระบุเพศ 7 คน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. รัตนวิเศษ	63	48	47	61	87	77			383
2. เตรียมอุดมอ่อนเกล้า	75	56	49	54	21	30			285
3. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์	33	35	37	46	37	60			248
4. วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย							63		63
5. พัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ							25	22	47
6. ปัญญาวิวัฒน์ฯ							49	23	72
รวมจังหวัดนนทบุรี	171	139	133	161	145	167	137	45	1098
7. พระปฐมวิทยาลัย	84	64	67	79	65	86			445
8. กาญจนภิเษกวิทยาลัย	46	59	71	89	60	86			411
9. เสริมสิริวิทยา	67	46	11	11	25	39			199
10. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล							61	36	97
11. เทคโนโลยีนครปฐม							52	41	93
รวมจังหวัดนครปฐม	197	169	149	179	150	211	113	77	1245
12. สมุทรสาครวิทยาลัย	55	49	87	65	45	74			375
13. กระทุ่มแบนฯ	48	56	56	32	24	91			307
14. สมุทรสาครวุฒิชัย	59	31	47	59	31	67			294
15. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร							136	45	181
16. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว							63	92	155
รวมจังหวัดสมุทรสาคร	162	136	190	156	100	232	199	137	1312

* ไม่ระบุเพศ 7 คน

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดนนทบุรี :	171	139	133	161	145	167	137	45	1098
ในเขต	63	48	47	61	87	77	74	45	502
นอกเขต	108	91	86	100	58	90	63		596
ประเภท									
รัฐบาล	138	104	96	115	108	107	63		731
เอกชน	33	35	37	46	37	60	74	45	367
สหายกรเรียน									
สามัญ	171	139	133	161	145	167			916
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	137	45	182
จังหวัดนครปฐม :	197	169	149	179	150	211	113	77	1245
ในเขต	84	64	67	79	65	86	52	41	541
นอกเขต	113	105	82	100	85	125	61	36	707
ประเภท									
รัฐบาล	130	123	138	168	125	172	61	36	956
เอกชน	67	46	11	11	25	39	52	41	292
สหายกรเรียน									
สามัญ	197	169	149	179	150	211			1058
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	113	77	190
จังหวัดสมุทรสาคร:	162	136	190	156	100	232	199	137	1312
ในเขต	114	80	134	124	76	141	136	45	854
นอกเขต	48	56	56	32	24	91	63	92	462
ประเภท									
รัฐบาล	103	105	143	97	69	165	199	137	1019
เอกชน	59	31	47	59	31	67			297
สหายกรเรียน									
สามัญ	162	136	190	156	100	232			980
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	199	137	336

ภาคผนวก 2.
สรุปผลการศึกษาของปริมณฑล

ตารางที่ 2.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=974)	ม. 3 (n=973)	ม. 5 (n=1007)	ปวช.2 (n=708)	รวม (n=3662)
อายุ : mean±sd	12.8±0.49	14.6±0.51	16.8±0.61	17.2±0.89	15.2±1.86
median (พิสัย)	13 (12-15)	15 (14-16)	17 (15-19)	17 (15-22)	15 (12-22)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(2)	(1)	(6)	(9)
รวม	974	971	1006	702	3653
เพศ : ชาย (%)	530 (54.4)	472 (48.8)	395 (39.3)	449 (63.4)	1846 (50.5)
หญิง (%)	444 (45.6)	496 (51.2)	610 (60.7)	259 (36.6)	1809 (49.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(5)	(2)	-	(7)
รวม	974 (100.0)	968 (100.0)	1005 (100.0)	708 (100.0)	3655 (100.0)
ศาสนา : พุทธ	960 (98.8)	952 (98.1)	982 (97.7)	682 (96.5)	3576 (97.9)
อิสลาม	6 (0.6)	5 (0.5)	6 (0.6)	17 (2.4)	34 (0.9)
คริสต์และอื่นๆ	6 (0.6)	13 (1.3)	17 (1.7)	8 (1.1)	44 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(2)	(1)	(8)
รวม	972 (100.0)	970 (99.9)	1005 (100.0)	707 (100.0)	3654 (100.0)
สถานที่เกิด : ปริมณฑล	500 (52.8)	413 (44.4)	304 (31.5)	443 (66.1)	1660 (47.3)
กรุงเทพ	206 (21.8)	219 (23.5)	374 (38.8)	121 (18.1)	920 (26.2)
ภาคกลาง	186 (19.6)	230 (24.7)	215 (22.3)	41 (6.1)	672 (19.1)
ภาคเหนือ	18 (1.9)	23 (2.5)	37 (3.8)	32 (4.8)	110 (3.1)
ภาคอีสาน	27 (2.9)	29 (3.1)	17 (1.8)	25 (3.7)	98 (2.8)
ภาคใต้	8 (0.8)	16 (1.7)	16 (1.7)	7 (1.0)	47 (1.3)
อื่นๆ (ต่างประเทศ)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(42)	(43)	(38)	(150)
รวม	947 (100.0)	931 (100.0)	964 (100.0)	670 (99.9)	3512 (99.9)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน :					
ไทย	958 (98.6)	954 (98.1)	995 (98.8)	686 (97.0)	3593 (98.2)
ไทยท้องถิ่น	66 (6.8)	62 (6.4)	90 (8.9)	60 (8.5)	278 (7.6)
จีน	28 (2.9)	43 (4.4)	61 (6.1)	7 (1.0)	139 (3.8)
มลายู/ยาวี	2 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	-	5 (0.1)
สปป.ลาว	4 (0.4)	1 (0.1)	-	1 (0.1)	6 (0.2)
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	24 (0.0)	65 (0.1)	63 (0.1)	20 (0.0)	172 (0.0)
จำนวน	974	973	1007	708	3662
* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา					
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	834 (85.9)	854 (88.0)	905 (90.4)	592 (83.9)	3185 (87.3)
หอพักของโรงเรียน	20 (2.1)	10 (1.0)	10 (1.0)	4 (0.6)	44 (1.2)
หอพักนอกโรงเรียน	3 (0.3)	5 (0.5)	4 (0.4)	9 (1.3)	21 (0.6)
บ้านเช่า	100 (10.3)	96 (9.9)	63 (6.3)	94 (13.3)	353 (9.7)
อื่นๆ	14 (1.4)	5 (0.5)	19 (1.9)	7 (1.0)	45 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(6)	(2)	(14)
รวม	971 (100.0)	970 (99.9)	1001 (100.0)	706 (100.1)	3648 (100.0)

ตารางที่ 2.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ	ม.1 (n=974)	ม. 3 (n=973)	ม. 5 (n=1007)	ปวช.2 (n=708)	รวม (n=3662)	
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว	4 (0.4)	5 (0.5)	8 (0.8)	9 (1.3)	26 (0.7)	
พ่อ แม่	820 (84.4)	847 (87.5)	898 (89.4)	588 (83.4)	3153 (86.4)	
เพื่อน	13 (1.3)	11 (1.1)	9 (0.9)	5 (0.7)	38 (1.0)	
ญาติพี่น้อง	120 (12.3)	103 (10.6)	82 (8.2)	96 (13.6)	401 (11.0)	
อื่นๆ	15 (1.5)	2 (0.2)	8 (0.8)	7 (1.0)	32 (0.9)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(5)	(2)	(3)	(12)	
รวม	972 (99.9)	968 (99.9)	1005 (100.1)	705 (100.0)	3650 (100.0)	
ผลการเรียน: เกรตเฉลี่ย	mean±sd	3.3±0.58	3.0±0.70	3.1±0.54	2.6±0.66	3.0±0.66
เกรต 0.1-1.0	1 (0.1)	1 (0.2)	1 (0.1)	5 (0.8)	9 (0.3)	
เกรต 1.1-2.0	25 (3.6)	88 (9.9)	29 (3.1)	125 (20.1)	267 (8.5)	
เกรต 2.1-3.0	174 (25.0)	341 (38.4)	405 (43.2)	338 (54.4)	1258 (40.0)	
เกรต 3.1-4.0	495 (71.2)	458 (51.5)	502 (53.6)	153 (24.6)	1608 (51.2)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(279)	(84)	(70)	(87)	(520)	
รวม	695 (99.9)	889 (100.0)	937 (100.0)	621 (99.9)	3142 (100.0)	
ทำงานเพื่อหารายได้ :	ไม่ทำ	820 (85.0)	798 (82.4)	813 (81.2)	368 (52.5)	2799 (77.0)
ทำ	145 (15.0)	171 (17.6)	188 (18.8)	333 (47.5)	837 (23.0)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(4)	(6)	(7)	(26)	
รวม	965 (100.0)	969 (100.0)	1001 (100.0)	701 (100.0)	3636 (100.0)	

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 2.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	184 (34.7)	148 (31.5)	141 (36.1)	196 (44.5)	669 (36.5)	192 (43.2)	144 (29.2)	207 (34.0)	85 (32.8)	628 (34.8)
มีเล็กน้อย	251 (47.4)	231 (49.1)	174 (44.5)	164 (37.3)	820 (44.8)	202 (45.5)	238 (48.3)	285 (46.8)	113 (43.6)	838 (46.4)
มีปานกลาง	76 (14.3)	74 (15.7)	63 (16.1)	64 (14.5)	277 (15.1)	41 (9.2)	102 (20.7)	102 (16.7)	51 (19.7)	296 (16.4)
มีปัญหามาก	19 (3.6)	17 (3.6)	13 (3.3)	16 (3.6)	65 (3.5)	9 (2.0)	9 (1.8)	15 (2.5)	10 (3.9)	43 (2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(2)	(4)	(9)	(15)	-	(3)	(1)	-	(4)
รวม	530(100.0)	470(99.9)	391(100.0)	440(99.9)	1831(99.9)	444(99.9)	493(100.0)	609(100.0)	259(100.0)	1805(100.0)
การใช้ยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	445 (84.4)	321 (68.3)	236 (59.9)	236 (53.6)	1238 (67.6)	350 (79.0)	310 (62.9)	381 (62.7)	117 (45.2)	1158 (64.2)
มีเล็กน้อย	65 (12.3)	122 (26.0)	119 (30.2)	118 (26.8)	424 (23.2)	73 (16.5)	140 (28.4)	180 (29.6)	85 (32.8)	478 (26.5)
มีปานกลาง	12 (2.3)	16 (3.4)	25 (6.3)	60 (13.6)	113 (6.2)	18 (4.1)	36 (7.3)	40 (6.6)	39 (15.1)	133 (7.4)
มีปัญหามาก	5 (0.9)	11 (2.3)	14 (3.6)	26 (5.9)	56 (3.1)	2 (0.5)	7 (1.4)	7 (1.2)	18 (6.9)	34 (1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(2)	(1)	(9)	(15)	(1)	(3)	(2)	-	(6)
รวม	527(99.9)	470(100.0)	394(100.0)	440(99.9)	1831(100.1)	443(100.1)	493(100.0)	608(100.1)	259(100.0)	1803(100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	514 (97.0)	442 (94.4)	372 (94.4)	411 (93.2)	1739 (94.9)	419 (94.4)	462 (93.5)	575 (94.4)	231 (89.2)	1687 (93.4)
มีเล็กน้อย	12 (2.3)	22 (4.7)	15 (3.8)	16 (3.6)	65 (3.5)	23 (5.2)	26 (5.3)	31 (5.1)	25 (9.7)	105 (5.8)
มีปานกลาง	1 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.8)	8 (1.8)	13 (0.7)	1 (0.2)	3 (0.6)	-	-	4 (0.2)
มีปัญหามาก	3 (0.6)	3 (0.6)	4 (1.0)	6 (1.4)	16 (0.9)	1 (0.2)	3 (0.6)	3 (0.5)	3 (1.2)	10 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(4)	(1)	(8)	(13)	-	(2)	(1)	-	(3)
รวม	530(100.1)	468(99.9)	394(100.0)	441(100.0)	1833(100.0)	444(100.0)	494(100.0)	609(100.0)	259(100.1)	1806(100.0)
ข่มขืน กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	492 (92.8)	409 (87.2)	330 (84.0)	356 (81.1)	1587 (86.7)	409 (92.1)	427 (86.4)	541 (88.8)	213 (82.6)	1590 (88.1)
มีเล็กน้อย	31 (5.8)	43 (9.2)	54 (13.7)	61 (13.9)	189 (10.3)	29 (6.5)	62 (12.6)	62 (10.2)	32 (12.4)	185 (10.2)
มีปานกลาง	3 (0.6)	14 (3.0)	5 (1.3)	9 (2.1)	31 (1.7)	4 (0.9)	4 (0.8)	4 (0.7)	8 (3.1)	20 (1.1)
มีปัญหามาก	4 (0.8)	3 (0.6)	4 (1.0)	13 (3.0)	24 (1.3)	2 (0.5)	1 (0.2)	2 (0.3)	5 (1.9)	10 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(3)	(2)	(10)	(15)	-	(2)	(1)	(1)	(4)
รวม	530(100.0)	469(100.0)	393(100.0)	439(100.1)	1831(100.0)	444(100.0)	494(100.0)	609(100.0)	258(100.0)	1805(100.0)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	424 (80.2)	312 (66.4)	221 (56.2)	200 (45.6)	1157 (63.2)	360 (81.3)	326 (66.0)	374 (61.4)	111 (42.9)	1171 (64.9)
มีเล็กน้อย	92 (17.4)	121 (25.7)	120 (30.5)	138 (31.4)	471 (25.7)	61 (13.8)	142 (28.7)	175 (28.7)	95 (36.7)	473 (26.2)
มีปานกลาง	10 (1.9)	29 (6.2)	42 (10.7)	70 (15.9)	151 (8.2)	18 (4.1)	25 (5.1)	52 (8.5)	34 (13.1)	129 (7.1)
มีปัญหามาก	3 (0.6)	8 (1.7)	10 (2.5)	31 (7.1)	52 (2.8)	4 (0.9)	1 (0.2)	8 (1.3)	19 (7.3)	32 (1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	(2)	(10)	(15)	(1)	(2)	(1)	-	(4)
รวม	529(100.1)	470(100.0)	393(99.9)	439(100.0)	1831(99.9)	443(100.1)	494(100.0)	609(99.9)	259(100.0)	1805(100.0)

* ไม่ระบุเพศ 7 คน

ตารางที่ 2.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	296 (55.8)	195 (41.5)	166 (42.1)	212 (48.2)	869 (47.4)	229 (51.6)	152 (30.8)	223 (36.6)	88 (34.0)	692 (38.3)
มีเล็กน้อย	163 (30.8)	188 (40.0)	151 (38.3)	142 (32.3)	644 (35.1)	142 (32.0)	229 (46.4)	249 (40.9)	94 (36.3)	714 (39.5)
มีปานกลาง	54 (10.2)	61 (13.0)	52 (13.2)	58 (13.2)	225 (12.3)	47 (10.6)	85 (17.2)	113 (18.6)	46 (17.8)	291 (16.1)
มีปัญหามาก	17 (3.2)	26 (5.5)	25 (6.3)	28 (6.4)	96 (5.2)	26 (5.9)	28 (5.7)	24 (3.9)	31 (12.0)	109 (6.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(2)	(1)	(9)	(12)	-	(2)	(1)	-	(3)
รวม	530(100.0)	470(100.0)	394(99.9)	440(100.1)	1834(100.0)	444(100.1)	494(100.1)	609(100.0)	259(100.1)	1806(99.9)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	162 (30.6)	132 (28.1)	97 (24.6)	172 (39.1)	563 (30.7)	129 (29.1)	85 (17.2)	103 (16.9)	50 (19.3)	367 (20.3)
มีเล็กน้อย	251 (47.4)	216 (46.0)	176 (44.7)	162 (36.8)	805 (43.9)	214 (48.2)	215 (43.5)	300 (49.3)	116 (44.8)	845 (46.8)
มีปานกลาง	82 (15.5)	81 (17.2)	85 (21.6)	77 (17.5)	325 (17.7)	67 (15.1)	138 (27.9)	145 (23.8)	56 (21.6)	406 (22.5)
มีปัญหามาก	35 (6.6)	41 (8.7)	36 (9.1)	29 (6.6)	141 (7.7)	34 (7.7)	56 (11.3)	60 (9.9)	37 (14.3)	187 (10.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	(2)	(1)	(9)	(12)	-	(2)	(2)	-	(4)
รวม	530(100.1)	470(100.0)	394(100.0)	440(100.0)	1834(100.0)	444(100.1)	494(99.9)	608(99.9)	259(100.0)	1805(100.0)

ตารางที่ 2.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	456 (90.7)	373 (82.5)	322 (82.8)	155 (35.8)	1306 (73.5)	369 (84.8)	397 (83.1)	452 (75.5)	118 (49.8)	1336 (76.4)
41-60%	33 (6.6)	53 (11.7)	40 (10.3)	153 (35.3)	279 (15.7)	43 (9.9)	53 (11.1)	91 (15.2)	50 (21.1)	237 (13.6)
>60 %	14 (2.8)	26 (5.8)	27 (6.9)	125 (28.9)	192 (10.8)	23 (5.3)	28 (5.9)	56 (9.3)	69 (29.1)	176 (10.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(20)	(6)	(6)	(69)	(9)	(18)	(11)	(22)	(60)
รวม	503(100.1)	452(100.0)	389(100.0)	433(100.0)	1777(100.0)	435(100.0)	478(100.1)	599(100.0)	237(100.0)	1749(100.1)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	470 (93.3)	382 (83.8)	321 (82.1)	195 (45.3)	1368 (76.8)	413 (94.3)	432 (90.2)	496 (83.1)	135 (57.7)	1476 (84.4)
41-60%	23 (4.6)	44 (9.6)	37 (9.5)	92 (21.4)	196 (11.0)	15 (3.4)	28 (5.8)	63 (10.6)	53 (22.6)	159 (9.1)
>60 %	11 (2.2)	30 (6.6)	33 (8.4)	143 (33.3)	217 (12.2)	10 (2.3)	19 (4.0)	38 (6.4)	46 (19.7)	113 (6.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(16)	(4)	(19)	(65)	(6)	(17)	(13)	(25)	(61)
รวม	504(100.1)	456(100.0)	391(100.0)	430(100.0)	1781(100.0)	438(100.0)	479(100.0)	597(100.1)	234(100.0)	1748(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	478 (94.5)	431 (95.1)	374 (95.7)	304 (70.2)	1587 (89.0)	412 (94.9)	456 (94.8)	567 (94.7)	180 (76.3)	1615 (92.3)
41-60%	21 (4.2)	13 (2.9)	16 (4.1)	82 (18.9)	132 (7.4)	13 (3.0)	20 (4.2)	28 (4.7)	36 (15.3)	97 (5.5)
>60 %	7 (1.4)	9 (2.0)	1 (0.3)	47 (10.9)	64 (3.6)	9 (2.1)	5 (1.0)	4 (0.7)	20 (8.5)	38 (2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(19)	(4)	(16)	(63)	(10)	(15)	(11)	(23)	(59)
รวม	506(100.1)	453(100.0)	391(100.1)	433(100.0)	1783(100.0)	434(100.0)	481(100.0)	599(100.1)	236(100.1)	1750(100.0)

ตารางที่ 2.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรานั้นเป็นปัญหา										
0-40 %	489 (96.8)	426 (93.8)	377 (96.7)	327 (75.9)	1619 (91.0)	429 (97.7)	460 (95.8)	584 (97.5)	199 (84.3)	1672 (95.3)
41-60%	10 (2.0)	20 (4.4)	11 (2.8)	63 (14.6)	104 (5.8)	4 (0.9)	12 (2.5)	12 (2.0)	26 (11.0)	54 (3.1)
>60 %	6 (1.2)	8 (1.8)	2 (0.5)	41 (9.5)	57 (3.2)	6 (1.4)	8 (1.7)	3 (0.5)	11 (4.7)	28 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(18)	(5)	(18)	(66)	(5)	(16)	(11)	(23)	(55)
รวม	505(100.0)	454(100.0)	390(100.0)	431(100.0)	1780(100.0)	439(100.0)	480(100.0)	599(100.0)	236(100.0)	1754(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	433 (85.6)	364 (80.4)	329 (84.4)	139 (32.2)	1265 (71.0)	372(85.3)	401 (83.2)	467 (77.8)	80 (33.9)	1320 (75.3)
41-60%	47 (9.3)	51 (11.3)	36 (9.2)	95 (22.0)	229 (12.9)	38 (8.7)	44 (9.1)	82 (13.7)	69 (29.2)	233 (13.3)
>60 %	26 (5.1)	38 (8.4)	25 (6.4)	198 (45.8)	287 (16.1)	26 (6.0)	37 (7.7)	51 (8.5)	87 (36.9)	201 (11.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(19)	(5)	(17)	(65)	(8)	(14)	(10)	(23)	(55)
รวม	506(100.0)	453(100.0)	390(100.0)	432(100.0)	1781(100.0)	436(100.0)	482(100.0)	600(100.0)	236(100.0)	1754(100.1)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	476 (94.6)	400 (88.7)	344 (88.4)	190 (44.2)	1410 (79.5)	416 (95.4)	435 (90.8)	546 (91.6)	143 (61.6)	1540 (88.4)
41-60%	17 (3.4)	32 (7.1)	23 (5.9)	96 (22.3)	168 (9.5)	11 (2.5)	33 (6.9)	34 (5.7)	57 (24.6)	135 (7.7)
>60 %	10 (2.0)	19 (4.2)	22 (5.7)	144 (33.5)	195 (11.0)	9 (2.1)	11 (2.3)	16 (2.7)	32 (13.8)	68 (3.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(21)	(6)	(19)	(73)	(8)	(17)	(14)	(27)	(66)
รวม	503(100.0)	451(100.0)	389(100.0)	430(100.0)	1773(100.0)	436(100.0)	479(100.0)	596(100.0)	232(100.0)	1743(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	491(97.0)	441 (96.9)	387 (99.0)	339 (78.1)	1658 (92.8)	427 (97.3)	473 (98.3)	594 (99.0)	204 (86.4)	1698 (96.7)
41-60%	11 (2.2)	9 (2.0)	2 (0.5)	69 (15.9)	91 (5.1)	8 (1.8)	6 (1.2)	6 (1.0)	22 (9.3)	42 (2.4)
>60 %	4 (0.8)	5 (1.1)	2 (0.5)	26 (6.0)	37 (2.1)	4 (0.9)	2 (0.4)	-	10 (4.2)	16 (0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(17)	(4)	(15)	(60)	(5)	(15)	(10)	(23)	(53)
รวม	506(100.0)	455(100.0)	391(100.0)	434(100.0)	1786(100.0)	439(100.0)	481(99.9)	600(100.0)	236(99.9)	1756(100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	496 (97.8)	441 (96.9)	385 (98.5)	358 (82.7)	1680 (94.1)	432 (98.2)	472 (98.1)	592 (98.5)	214 (90.3)	1710 (97.2)
41-60%	8 (1.6)	7 (1.5)	3 (0.8)	50 (11.5)	68 (3.8)	5 (1.1)	9 (1.9)	7 (1.2)	14 (5.9)	35 (2.0)
>60 %	3 (0.6)	7 (1.5)	3 (0.8)	25 (5.8)	38 (2.1)	3 (0.7)	-	2 (0.3)	9 (3.8)	14 (0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(17)	(4)	(16)	(60)	(4)	(15)	(9)	(22)	(50)
รวม	507(100.0)	455(100.0)	391(100.0)	433(100.0)	1786(100.0)	440(100.0)	481(100.0)	601(100.0)	237(100.0)	1759(100.0)

ตารางที่ 2.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	274 (51.9)	246 (52.5)	206 (52.3)	221 (50.1)	947 (51.7)	239 (54.6)	280 (56.5)	332 (54.9)	121 (46.9)	972 (54.1)
ไม่ใช่	138 (26.1)	125 (26.7)	106 (26.9)	101 (22.9)	470 (25.7)	129 (29.5)	146 (29.4)	196 (32.4)	73 (28.3)	544 (30.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	116 (22.0)	98 (20.9)	82 (20.8)	119 (27.0)	415 (22.7)	70 (16.0)	70 (14.1)	77 (12.7)	64 (24.8)	281 (15.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(8)	(14)	(6)	-	(5)	(1)	(12)
รวม	528(100.0)	469(100.1)	394(100.0)	441(100.0)	1832(100.1)	438(100.1)	496(100.0)	605(100.0)	258(100.0)	1797(100.0)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	42 (8.0)	54 (11.5)	43 (10.9)	97 (22.0)	236 (12.9)	28 (6.3)	17 (3.4)	38 (6.3)	49 (19.0)	132 (7.3)
ไม่ใช่	367 (69.5)	349 (74.1)	284 (72.1)	244 (55.5)	1244 (67.9)	342 (77.2)	404 (81.6)	495 (81.5)	153 (59.3)	1394 (77.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	119 (22.5)	68 (14.4)	67 (17.0)	99 (22.5)	353 (19.3)	73 (16.5)	74 (14.9)	74 (12.2)	56 (21.7)	277 (15.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(1)	(9)	(13)	(1)	(1)	(3)	(1)	(6)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	394(100.0)	440(100.0)	1833(100.1)	443(100.0)	495(99.9)	607(100.0)	258(100.0)	1803(100.0)
โรงเรียนแนะนำให้ให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	61 (11.5)	63 (13.4)	59 (15.0)	140 (31.9)	323 (17.6)	29 (6.6)	42 (8.5)	100 (16.5)	88 (34.1)	259 (14.4)
ไม่ใช่	349 (66.0)	321 (68.3)	266 (67.7)	194 (44.2)	1130 (61.7)	303 (68.6)	358 (72.5)	386 (63.6)	101 (39.1)	1148 (63.7)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	119 (22.5)	86 (18.3)	68 (17.3)	105 (23.9)	378 (20.6)	110 (24.9)	94 (19.0)	121 (19.9)	69 (26.7)	394 (21.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	(2)	(10)	(15)	(2)	(2)	(3)	(1)	(8)
รวม	529(100.0)	470(100.0)	393(100.0)	439(100.0)	1831(99.9)	442(100.1)	494(100.0)	607(100.0)	258(99.9)	1801(100.0)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	63 (11.9)	61 (13.0)	66 (16.8)	76 (17.2)	266 (14.5)	20 (4.5)	35 (7.1)	60 (9.9)	29 (11.2)	144 (8.0)
ไม่ใช่	334 (63.3)	312 (66.5)	242 (61.4)	241 (54.6)	1129 (61.6)	337 (76.4)	375 (75.8)	438 (72.3)	169 (65.5)	1319 (73.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	131 (24.8)	96 (20.5)	86 (21.8)	124 (28.1)	437 (23.9)	84 (19.0)	85 (17.2)	108 (17.8)	60 (23.3)	337 (18.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(8)	(14)	(3)	(1)	(4)	(1)	(9)
รวม	528(100.0)	469(100.0)	394(100.0)	441(99.9)	1832(100.0)	441(99.9)	495(100.1)	606(100.0)	258(100.0)	1800(100.0)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	372 (70.6)	358 (76.2)	282 (71.8)	276 (62.7)	1288 (70.4)	345 (78.2)	411 (83.2)	506 (83.5)	193 (75.1)	1455 (80.9)
ไม่ใช่	51 (9.7)	38 (8.1)	42 (10.7)	79 (18.0)	210 (11.5)	23 (5.2)	29 (5.9)	34 (5.6)	25 (9.7)	111 (6.2)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	104 (19.7)	74 (15.7)	69 (17.6)	85 (19.3)	332 (18.1)	73 (16.6)	54 (10.9)	66 (10.9)	39 (15.2)	232 (12.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(2)	(2)	(9)	(16)	(3)	(2)	(4)	(2)	(11)
รวม	527(100.0)	470(100.0)	393(100.1)	440(100.0)	1830(100.0)	441(100.0)	494(100.0)	606 (100.0)	257(100.0)	1798(100.0)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด										
ใช่	337 (63.9)	325 (69.4)	291 (73.9)	280 (63.5)	1233 (67.4)	277 (63.2)	365 (73.9)	467 (76.9)	183 (70.9)	1292 (71.9)
ไม่ใช่	54 (10.2)	54 (11.5)	32 (8.1)	68 (15.4)	208 (11.4)	36 (8.2)	38 (7.7)	49 (8.1)	30 (11.6)	153 (8.5)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	136 (25.8)	89 (19.0)	71 (18.0)	93 (21.1)	389 (21.3)	125 (28.5)	91 (18.4)	91 (15.0)	45 (17.4)	352 (19.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(1)	(8)	(16)	(6)	(2)	(3)	(1)	(12)
รวม	527(100.0)	468(100.0)	394(100.0)	441(100.0)	1830(100.0)	438(99.9)	494(100.0)	607(100.0)	258(99.9)	1797(100.0)

ตารางที่ 2.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	219 (41.4)	222 (47.3)	170 (43.3)	212 (48.2)	823 (44.9)	236 (53.6)	244 (49.3)	348 (57.5)	148 (57.8)	976 (54.3)
ไม่ใช่	147 (27.8)	109 (23.2)	106 (27.0)	105 (23.9)	467 (25.5)	79 (18.0)	110 (22.2)	143 (23.6)	47 (18.4)	379 (21.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	163 (30.8)	138 (29.4)	117 (29.8)	123 (28.0)	541 (29.5)	125 (28.4)	141 (28.5)	114 (18.8)	61 (23.8)	441 (24.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(2)	(9)	(15)	(4)	(1)	(5)	(3)	(13)
รวม	529(100.0)	469(99.9)	393(100.1)	440(100.1)	1831(99.9)	440(100.0)	494(100.0)	605(99.9)	256(100.0)	1796(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	291 (55.5)	276 (59.2)	204 (52.2)	241 (55.3)	1012 (55.7)	264 (60.0)	283 (57.3)	365 (60.5)	172 (67.5)	1084 (60.5)
ไม่ใช่	49 (9.4)	68 (14.6)	73 (18.7)	77 (17.7)	267 (14.7)	29 (6.6)	56 (11.3)	80 (13.3)	30 (11.8)	195 (10.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	184 (35.1)	122 (26.2)	114 (29.2)	118 (27.1)	538 (29.6)	147 (33.4)	155 (31.4)	158 (26.2)	53 (20.8)	513 (28.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(6)	(4)	(13)	(29)	(4)	(2)	(7)	(4)	(17)
รวม	524(100.0)	466(100.0)	391(100.1)	436(100.1)	1817(100.0)	440(100.0)	494(100.0)	603(100.0)	255(100.1)	1792(100.0)

ตารางที่ 2.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง										
ไม่เคยเลย	523 (98.9)	443 (94.1)	384 (97.5)	383 (86.8)	1733 (94.4)	440 (99.1)	488 (98.6)	6.1 (98.7)	245 (95.0)	1774 (98.2)
เคย 1 ครั้ง	5 (0.9)	13 (2.8)	6 (1.5)	24 (5.4)	48 (2.6)	4 (0.9)	6 (1.2)	5 (0.8)	11 (4.3)	26 (1.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	1 (0.2)	15 (3.2)	4 (1.0)	34 (7.7)	54 (2.9)	-	1 (0.2)	3 (0.5)	2 (0.8)	6 (0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(1)	(8)	(11)	-	(1)	(1)	(1)	(3)
รวม	529(100.0)	471(100.1)	394(100.0)	441(99.9)	1835(99.9)	444(100.0)	495(100.0)	609(100.0)	258(100.1)	1806(99.9)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	516 (97.5)	434 (92.1)	375 (95.2)	371 (84.1)	1696 (92.4)	433 (97.5)	483 (97.6)	601 (99.0)	243 (94.2)	1760 (97.6)
เคย 1 ครั้ง	10 (1.9)	21 (4.5)	8 (2.0)	33 (7.5)	72 (3.9)	9 (2.0)	7 (1.4)	4 (0.7)	9 (3.5)	29 (1.6)
เคย 2- 3 ครั้ง	3 (0.6)	16 (3.4)	11 (2.8)	37 (8.4)	67 (3.7)	2 (0.5)	5 (1.0)	2 (0.3)	6 (2.3)	15 (0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(1)	(8)	(11)	-	(1)	(3)	(1)	(5)
รวม	529(100.0)	471(100.0)	394(100.0)	441(100.0)	1835(100.0)	444(100.0)	495(100.0)	607(100.0)	258(100.0)	1804(100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เขาเสี้ยงลงหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนกำลังดื่มสุรานั้น										
ไม่เคยเลย	499 (94.9)	436 (93.2)	358 (91.1)	348 (79.1)	1641 (89.8)	430 (97.3)	467 (94.7)	593 (97.5)	225 (87.2)	1715 (95.2)
เคย 1 ครั้ง	19 (3.6)	16 (3.4)	18 (4.6)	47 (10.7)	100 (5.5)	7 (1.6)	13 (2.6)	11 (1.8)	23 (8.9)	54 (3.0)
เคย 2- 3 ครั้ง	8 (1.5)	16 (3.4)	17 (4.3)	45 (10.2)	86 (4.7)	5 (1.1)	13 (2.6)	4 (0.7)	10 (3.9)	32 (1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(2)	(9)	(19)	(2)	(3)	(2)	(1)	(8)
รวม	526(100.0)	468(100.0)	393(100.0)	440(100.0)	1827(100.0)	442(100.0)	493(99.9)	608(100.0)	258(100.0)	1801(100.0)

ตารางที่ 2.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่านักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	514 (97.3)	444 (94.9)	379 (96.4)	390 (88.6)	1727 (94.4)	433 (98.0)	467 (94.5)	584 (96.7)	244 (94.6)	1728 (96.1)
เคย 1 ครั้ง	11 (2.1)	18 (3.8)	12 (3.1)	35 (8.0)	76 (4.2)	8 (1.8)	24 (4.9)	20 (3.3)	9 (3.5)	61 (3.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	3 (0.6)	6 (1.3)	2 (0.5)	15 (3.4)	26 (1.4)	1 (0.2)	3 (0.6)	-	5 (1.9)	9 (0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(4)	(2)	(9)	(17)	(2)	(2)	(6)	(1)	(11)
รวม	528(100.0)	468(100.0)	393(100.0)	440(100.0)	1829(100.0)	442(100.0)	494(100.0)	604(100.0)	258(100.0)	1798(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(342)	(293)	(270)	(176)	(1081)	(341)	(384)	(465)	(145)	(1335)
ไม่เคยเลย	164 (88.2)	143 (80.8)	108 (87.8)	204 (77.0)	619 (82.4)	96 (93.2)	103 (92.8)	137 (96.5)	97 (85.8)	433 (92.3)
เคย 1 ครั้ง	14 (7.5)	21 (11.9)	5 (4.1)	35 (13.2)	75 (10.0)	5 (4.9)	6 (5.4)	3 (2.1)	10 (8.8)	24 (5.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	8 (4.3)	13 (7.3)	10 (8.1)	26 (9.8)	57 (7.6)	2 (1.9)	2 (1.8)	2 (1.4)	6 (5.3)	12 (2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(2)	(8)	(14)	-	(1)	(3)	(1)	(5)
รวม	186(100.0)	177(100.0)	123(100.0)	265(100.0)	751(100.0)	103(100.0)	111(100.0)	142(100.0)	113(99.9)	469(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(356)	(316)	(313)	(225)	(1210)	(351)	(412)	(523)	(173)	(1459)
ไม่เคยเลย	155 (90.1)	117 (76.0)	65 (81.3)	133 (61.6)	470 (75.6)	92 (98.9)	75 (91.5)	81 (95.3)	69 (82.1)	317 (92.2)
เคย 1 ครั้ง	12 (7.0)	20 (13.0)	5 (6.3)	42 (19.4)	79 (12.7)	1 (1.1)	5 (6.1)	2 (2.4)	10 (11.9)	18 (5.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	5 (2.9)	17 (11.0)	10 (12.5)	41 (19.0)	73 (11.7)	-	2 (2.4)	2 (2.4)	5 (6.0)	9 (2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(2)	(8)	(14)	-	(2)	(2)	(2)	(6)
รวม	172(100.0)	154(100.0)	80(100.1)	216(100.0)	622 (100.0)	93(100.0)	82(100.0)	85(100.1)	84(100.0)	344(100.0)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(355)	(311)	(290)	(204)	(1160)	(347)	(402)	(491)	(163)	(1403)
ไม่เคยเลย	170 (98.3)	143 (89.9)	98 (94.2)	207 (87.3)	618 (91.8)	97 (100.0)	91 (97.8)	117 (100.0)	90 (94.7)	395 (98.3)
เคย 1 ครั้ง	2 (1.2)	11 (6.9)	2 (1.9)	20 (8.4)	35 (5.2)	-	2 (2.2)	-	4 (4.2)	6 (1.5)
เคย 2- 3 ครั้ง	1 (0.6)	5 (3.1)	4 (3.8)	10 (4.2)	20 (3.0)	-	-	-	1 (1.1)	1 (0.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(1)	(8)	(13)	-	(1)	(2)	(1)	(4)
รวม	173(100.1)	159(99.9)	104(99.9)	237(99.9)	673(100.0)	97(100.0)	93(100.0)	117(100.0)	95(100.0)	402(100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(343)	(303)	(293)	(197)	(1136)	(343)	(403)	(495)	(161)	(1402)
ไม่เคยเลย	183 (98.9)	154 (92.2)	100 (99.0)	227 (93.4)	664 (95.4)	100 (99.0)	92 (100.0)	113 (100.0)	95 (97.9)	400 (99.3)
เคย 1 ครั้ง	1 (0.5)	8 (4.8)	1 (1.0)	8 (3.3)	18 (2.6)	1 (1.0)	-	-	2 (2.1)	3 (0.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	1 (0.5)	5 (3.0)	-	8 (3.3)	14 (2.0)	-	-	-	-	-
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(1)	(9)	(14)	-	(1)	(2)	(1)	(4)
รวม	185(99.9)	167(100.0)	101(100.0)	243(100.0)	696(100.0)	101(100.0)	92(100.0)	113(100.0)	97(100.0)	403(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 2.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(73)	(73)	(85)	(23)	(254)	(67)	(109)	(140)	(23)	(339)
ไม่เคยเลย	171 (38.7)	121 (30.9)	96 (31.2)	79 (20.1)	467 (30.4)	132 (35.5)	166 (43.3)	179 (38.4)	76 (35.2)	553 (38.5)
นานๆครั้ง	169 (38.2)	177 (45.2)	125 (40.6)	149 (37.8)	620 (40.4)	176 (47.3)	158 (41.3)	208 (44.6)	95 (44.0)	637 (44.3)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	102 (23.1)	94 (24.0)	87 (28.2)	166 (42.1)	449 (29.2)	64 (17.2)	59 (15.4)	79 (17.0)	45 (20.8)	247 (17.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(7)	(2)	(32)	(56)	(5)	(4)	(4)	(20)	(33)
รวม	442(100.0)	392(100.1)	308(100.0)	394(100.0)	1536(100.0)	372(100.0)	383(100.0)	466(100.0)	216(100.0)	1437(100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับขี่หรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(48)	(47)	(38)	(48)	(181)	(25)	(41)	(37)	(37)	(140)
ไม่เคยเลย	113(24.4)	75 (18.0)	48 (13.6)	89 (24.4)	325 (20.3)	84 (20.3)	109 (24.2)	68 (12.0)	59 (28.6)	320 (19.5)
นานๆครั้ง	171 (36.9)	117 (28.1)	99 (28.0)	132 (36.2)	519 (32.5)	130 (31.4)	163 (36.2)	191 (33.6)	76 (36.9)	560 (34.2)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	179 (38.7)	225 (54.0)	207 (58.5)	144 (39.5)	755 (47.2)	200 (48.3)	178 (39.6)	309 (54.4)	71 (34.5)	758 (46.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(8)	(3)	(36)	(66)	(5)	(5)	(5)	(16)	(31)
รวม	463(100.0)	417(100.1)	354(100.1)	365(100.1)	1599(100.0)	414(100.0)	450(100.0)	568(100.0)	206(100.0)	1638(100.0)
ขับขี่รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากเพิ่งดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	489 (96.6)	417 (90.7)	354 (91.5)	238 (57.6)	1498 (84.8)	426 (97.9)	462 (95.9)	574 (96.6)	200 (84.0)	1662 (95.0)
นานๆครั้ง	12 (2.4)	38 (8.3)	26 (6.7)	123 (29.8)	199 (11.3)	4 (0.9)	17 (3.5)	16 (2.7)	32 (13.4)	69 (3.9)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	5 (1.0)	5 (1.1)	7 (1.8)	52 (12.6)	69 (3.9)	5 (1.1)	3 (0.6)	4 (0.7)	6 (2.5)	18 (1.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(12)	(8)	(36)	(80)	(9)	(14)	(16)	(21)	(60)
รวม	506(100.0)	460(100.1)	387(100.0)	413(100.0)	1766(100.0)	435(99.9)	482(100.0)	594(100.0)	238(99.9)	1749(99.9)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	408 (80.5)	357 (77.4)	328 (84.5)	277 (67.1)	1370 (77.4)	363 (83.3)	413 (85.5)	537 (89.8)	193 (81.4)	1506 (85.9)
นานๆครั้ง	78 (15.4)	88 (19.1)	48 (12.4)	81 (19.6)	295 (16.7)	59 (13.5)	54 (11.2)	46 (7.7)	33 (13.9)	192 (10.9)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	21 (4.1)	16 (3.5)	12 (3.1)	55 (13.3)	104 (5.9)	14 (3.2)	16 (3.3)	15 (2.5)	11 (4.6)	56 (3.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(11)	(7)	(36)	(77)	(8)	(13)	(12)	(22)	(55)
รวม	507(100.0)	461(100.0)	388(100.0)	413(100.0)	1769(100.0)	436(100.0)	483(100.0)	598(100.0)	237(99.9)	1754(100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	474 (93.7)	431 (93.5)	366 (94.8)	327 (79.2)	1598 (90.5)	421 (96.3)	465 (96.5)	587 (98.2)	225 (94.9)	1698 (96.8)
นานๆครั้ง	31 (6.1)	27 (5.9)	18 (4.7)	60 (14.5)	136 (7.7)	12 (2.7)	13 (2.7)	9 (1.5)	11 (4.6)	45 (2.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	1 (0.2)	3 (0.7)	2 (0.5)	26 (6.3)	32 (1.8)	4 (0.9)	4 (0.8)	2 (0.3)	1 (0.4)	11 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(11)	(9)	(36)	(80)	(7)	(14)	(12)	(22)	(55)
รวม	506(100.0)	461(100.1)	386(100.0)	413(100.0)	1766(100.0)	437(99.9)	482(100.0)	598(100.0)	237(99.9)	1754(100.0)

ตารางที่ 2.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	331 (65.3)	306 (66.7)	316 (81.7)	260 (63.0)	1213 (68.7)	368 (84.2)	425 (87.8)	555 (92.8)	187 (78.9)	1535 (87.4)
นานๆครั้ง	147 (29.0)	134 (29.2)	62 (16.0)	106 (25.7)	449 (25.4)	54 (12.4)	54 (11.2)	41 (6.9)	44 (18.6)	193 (11.0)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	29 (5.7)	19 (4.1)	9 (2.3)	47 (11.4)	104 (5.9)	15 (3.4)	5 (1.0)	2 (0.3)	6 (2.5)	28 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(13)	(8)	(36)	(80)	(7)	(12)	(12)	(22)	(53)
รวม	507(100.0)	459(100.0)	387(100.0)	413(100.1)	1766(100.0)	437(100.0)	484(100.0)	598(100.0)	237(100.0)	1756(100.0)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	467 (92.5)	413 (89.8)	364 (94.3)	333 (80.2)	1577 (89.3)	421 (96.3)	464 (96.3)	586 (98.0)	215 (91.1)	1686 (96.2)
นานๆครั้ง	30 (5.9)	41 (8.9)	20 (5.2)	49 (11.8)	140 (7.9)	12 (2.7)	13 (2.7)	11 (1.8)	19 (8.1)	55 (3.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	8 (1.6)	6 (1.3)	2 (0.5)	33 (8.0)	49 (2.8)	4 (0.9)	5 (1.0)	1 (0.2)	2 (0.8)	12 (0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(12)	(9)	(34)	(80)	(7)	(14)	(12)	(23)	(56)
รวม	505(100.0)	460(100.0)	386(100.0)	415(100.0)	1766(100.0)	437(99.9)	482(100.0)	598(100.0)	236(100.0)	1753(100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(327)	(260)	(233)	(122)	(942)	(320)	(310)	(320)	(56)	(1006)
ไม่เคยเลย	179 (91.3)	188 (90.8)	139 (86.9)	279 (87.2)	785 (88.9)	116 (95.1)	176 (95.1)	270 (93.8)	185 (92.5)	747 (94.0)
เคย	17 (8.7)	19 (9.2)	21 (13.1)	41 (12.8)	98 (11.1)	6 (4.9)	9 (4.9)	18 (6.3)	15 (7.5)	48 (6.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(7)	(5)	(2)	(7)	(21)	(2)	(1)	(2)	(3)	(8)
รวม	196(100.0)	207(100.0)	160(100.0)	320(100.0)	883(100.0)	122(100.0)	185(100.0)	288(100.1)	200(100.0)	795(100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(370)	(316)	(281)	(137)	(1104)	(366)	(408)	(495)	(109)	(1378)
ไม่เคยถูกบังคับ	145 (98.6)	145 (94.8)	107 (95.5)	268 (89.9)	665 (93.7)	74 (97.4)	78 (90.7)	102 (94.4)	131 (89.7)	385 (92.5)
เคย	2 (1.4)	8 (5.2)	5 (4.5)	30 (10.1)	45 (6.3)	2 (2.6)	8 (9.3)	6 (5.6)	15 (10.3)	31 (7.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(3)	(2)	(14)	(32)	(2)	(2)	(7)	(4)	(15)
รวม	147(100.0)	153(100.0)	112(100.0)	298(100.0)	710(100.0)	76(100.0)	86(100.0)	108(100.0)	146(100.0)	416(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขบขี้/ช้อน/นั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 2.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	457 (86.6)	418 (89.1)	331 (84.0)	374 (84.6)	1580 (86.2)	395 (89.0)	402 (81.2)	513 (84.7)	184 (71.9)	1494 (83.0)
เคย	71 (13.4)	51 (10.9)	63 (16.0)	68 (15.4)	253 (13.8)	49 (11.0)	93 (18.8)	93 (15.3)	72 (28.1)	307 (17.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(7)	(13)	-	(1)	(4)	(3)	(8)
รวม	528(100.0)	469(100.0)	394(100.0)	442(100.0)	1833(100.0)	444(100.0)	495(100.0)	606(100.0)	256(100.0)	1801(100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	508 (96.8)	446 (94.7)	371 (94.4)	403 (91.0)	1728 (94.3)	416 (93.9)	458 (92.3)	581 (95.6)	228 (89.1)	1683 (93.3)
เคย	17 (3.2)	25 (5.3)	22 (5.6)	40 (9.0)	104 (5.7)	27 (6.1)	38 (7.7)	27 (4.4)	28 (10.9)	120 (6.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(1)	(2)	(6)	(14)	(1)	-	(2)	(3)	(6)
รวม	525(100.0)	471(100.0)	393(100.0)	443(100.0)	1832(100.0)	443(100.0)	496(100.0)	608(100.0)	256(100.0)	1803(100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	512 (97.3)	442 (93.8)	367 (93.1)	401 (91.1)	1722 (94.0)	409 (92.5)	468 (94.4)	566 (92.9)	233 (91.4)	1676 (93.0)
เคย	14 (2.7)	29 (6.2)	27 (6.9)	39 (8.9)	109 (6.0)	33 (7.5)	28 (5.6)	43 (7.1)	22 (8.6)	126 (7.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(1)	(1)	(9)	(15)	(2)	-	(1)	(4)	(7)
รวม	526(100.0)	471(100.0)	394(100.0)	440(100.0)	1831(100.0)	442(100.0)	496(100.0)	609(100.0)	255(100.0)	1802(100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	506 (96.0)	451 (96.0)	379 (96.2)	405 (91.6)	1741 (95.0)	410 (92.3)	455 (91.7)	580 (95.2)	223 (87.1)	1668 (92.4)
เคย	21 (4.0)	19 (4.0)	15 (3.8)	37 (8.4)	92 (5.0)	34 (7.7)	41 (8.3)	29 (4.8)	33 (12.9)	137 (7.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(2)	(1)	(7)	(13)	-	-	(1)	(3)	(4)
รวม	527(100.0)	470(100.0)	394(100.0)	442(100.0)	1833(100.0)	444(100.0)	496(100.0)	609(100.0)	256(100.0)	1805(100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	17 (81.0)	13 (68.4)	11 (73.3)	25 (67.6)	66 (71.7)	29 (85.3)	32 (78.0)	27 (93.1)	27 (81.8)	115 (83.9)
3-5 ครั้ง	3 (14.3)	2 (10.5)	1 (6.7)	5 (13.5)	11 (12.0)	4 (11.8)	7 (17.1)	2 (6.9)	5 (15.2)	18 (13.1)
> 5 ครั้ง	1 (4.8)	4 (21.1)	3 (20.0)	7 (18.9)	15 (16.3)	1 (2.9)	2 (4.9)	-	1 (3.0)	4 (2.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	21(100.1)	19(100.0)	15(100.0)	37(100.0)	92(100.0)	34(100.0)	41(100.0)	29(100.0)	33(100.0)	137(99.9)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	19 (90.5)	15 (78.9)	12 (80.0)	21 (56.8)	67 (72.8)	28 (82.4)	35 (85.4)	28 (96.6)	24 (72.7)	115 (83.9)
เคย	2 (9.5)	4 (21.1)	3 (20.0)	16 (43.2)	25 (27.2)	6 (17.6)	6 (14.6)	1 (3.4)	9 (27.3)	22 (16.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	21(100.0)	19(100.0)	15(100.0)	37(100.0)	92(100.0)	34(100.0)	41(100.0)	29(100.0)	33(100.0)	137(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 2.8 พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	494 (96.7)	410 (87.6)	344 (88.0)	250 (57.3)	1498 (82.9)	429 (98.6)	469 (96.1)	578 (95.9)	158 (64.0)	1634 (92.2)
เคยมี	17 (3.3)	58 (12.4)	47 (12.0)	186 (42.7)	308 (17.1)	6 (1.4)	19 (3.9)	25 (4.1)	89 (36.0)	139 (7.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(4)	(4)	(13)	(40)	(9)	(8)	(7)	(12)	(36)
รวม	511(100.0)	468(100.0)	391(100.0)	436(100.0)	1806(100.0)	435(100.0)	488(100.0)	603(100.0)	247(100.0)	1773(100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	13.7±0.6	13.6±1.4	14.8±1.2	14.8±1.8	14.5±1.6	13.6±1.3	13.9±0.7	15.7±0.9	16.0±1.4	15.6±1.5
median (พิสัย)	14(13-15)	14(10-15)	15(11-17)	15(10-18)	15 (10-18)	13(12-15)	14(13-15)	16(14-17)	16(13-19)	16 (12-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(15)	(4)	(50)	(75)	(1)	(4)	(1)	(10)	(16)
รวม	11	43	43	136	233	5	15	24	79	123
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	10 (62.5)	26 (47.3)	21 (44.7)	53 (29.4)	110 (36.9)	6 (100.0)	11 (57.9)	15 (60.0)	45 (51.7)	77 (56.2)
2 คน	3 (18.8)	7 (12.7)	7 (14.9)	29 (16.1)	46 (15.4)	-	3 (15.8)	3 (12.0)	20 (23.0)	26 (19.0)
3 คน	2 (12.5)	8 (14.5)	5 (10.6)	15 (8.3)	30 (10.1)	-	2 (10.5)	-	9 (10.3)	11 (8.0)
4 คน	-	1 (1.8)	3 (6.4)	15 (8.3)	19 (6.4)	-	-	1 (4.0)	4 (4.6)	5 (3.6)
5 คน	-	3 (5.5)	2 (4.3)	9 (5.0)	14 (4.7)	-	-	2 (8.0)	2 (2.3)	4 (2.9)
6 คน ขึ้นไป	1 (6.3)	10 (18.2)	9 (19.1)	59 (32.8)	79 (26.5)	-	3 (15.8)	4 (16.0)	7 (8.0)	14 (10.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	-	(6)	(10)	-	-	-	(2)	(2)
รวม	16(100.1)	55(100.0)	47(100.0)	180(99.9)	298(100.0)	6(100.0)	19(100.0)	25(100.0)	87(99.9)	137(99.9)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	14 (87.5)	47 (85.5)	38 (82.6)	144 (80.9)	243 (82.4)	4 (66.7)	17 (89.5)	21 (84.0)	81 (94.2)	123 (90.4)
เคย	2 (12.5)	8 (14.5)	8 (17.4)	34 (19.1)	52 (17.6)	2 (33.3)	2 (10.5)	4 (16.0)	5 (5.8)	13 (9.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(1)	(8)	(13)	-	-	-	(3)	(3)
รวม	16(100.0)	55(100.0)	46(100.0)	178(100.0)	295(100.0)	6(100.0)	19(100.0)	25(100.0)	86(100.0)	136(100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	2 (12.5)	14 (25.9)	6 (13.0)	39 (21.4)	61 (20.5)	3 (50.0)	6 (31.6)	11 (44.0)	17 (19.3)	37 (26.8)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	1 (6.3)	3 (5.6)	3 (6.5)	11 (6.0)	18 (6.0)	-	2 (10.5)	2 (8.0)	13 (14.8)	17 (12.3)
ถุงยางอนามัย	9 (56.3)	26 (48.1)	27 (58.7)	86 (47.3)	148 (49.7)	1 (16.7)	7 (36.8)	8 (32.0)	30 (34.1)	46 (33.3)
ยาฉีดคุมกำเนิด	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1.1)	1 (0.7)
หลังภายนอก	-	7 (13.0)	5 (10.9)	21 (11.5)	33 (11.1)	1 (16.7)	2 (10.5)	4 (16.0)	20 (22.7)	27 (19.6)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	-	-	1 (2.2)	8 (4.4)	9 (3.0)	1 (16.7)	1 (5.3)	-	6 (6.8)	8 (5.8)
วิธีการอื่นๆ	1 (6.3)	1 (1.9)	1 (2.2)	8 (4.4)	11 (3.7)	-	-	-	1 (1.1)	1 (0.7)
ไม่แน่ใจ	3 (18.7)	3 (5.6)	3 (6.5)	9 (4.9)	18 (6.0)	-	1 (5.3)	-	-	1 (0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(1)	(4)	(10)	-	-	-	(1)	(1)
รวม	16(100.1)	54(100.1)	46(100.0)	182(99.9)	298(100.0)	6(100.1)	19(100.0)	25(100.0)	88(99.9)	138(99.9)

ตารางที่ 2.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การตั้งครรรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรรภ์*										
ไม่เคย	15 (93.8)	44 (91.7)	42 (95.5)	145 (86.3)	246 (89.1)	5 (100.0)	17 (89.5)	22 (100.0)	78 (92.9)	122 (93.8)
1 ครั้ง	-	2 (4.2)	2 (4.5)	18 (10.7)	22 (8.0)	-	-	-	5 (6.0)	5 (3.8)
≥2 ครั้ง	1 (6.3)	2 (4.2)	-	5 (3.0)	8 (2.9)	-	2 (10.5)	-	1 (1.2)	3 (2.3)
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	(1)	(10)	(3)	(18)	(32)	(1)	-	(3)	(5)	(9)
รวม	16(100.0)	48(100.0)	44(100.0)	168(100.0)	276(100.0)	5(100.0)	19(100.0)	22(100.0)	84(100.1)	130(99.9)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 2.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	98 (19.4)	66 (14.4)	28 (7.3)	89 (21.2)	281 (15.9)	51 (11.8)	24 (5.1)	12 (2.0)	41 (16.8)	128 (7.3)
เคย	354 (70.1)	367 (80.0)	341 (89.3)	296 (70.6)	1358 (76.9)	344 (79.4)	411 (86.9)	572 (95.7)	190 (77.9)	1517 (86.8)
ไม่แน่ใจ	53 (10.5)	26 (5.7)	13 (3.4)	34 (8.1)	126 (7.1)	38 (8.8)	38 (8.0)	14 (2.3)	13 (5.3)	103 (5.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(13)	(13)	(30)	(81)	(11)	(23)	(12)	(15)	(61)
รวม	505(100.0)	459(100.1)	382(100.0)	419(99.9)	1765(99.9)	433(100.0)	473(100.0)	598(100.0)	244(100.0)	1748(100.0)

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา

ตารางที่ 2.10 พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	405 (76.7)	307 (65.0)	226 (57.4)	159 (36.3)	1097 (59.9)	373 (84.4)	384 (77.9)	410 (67.3)	130 (50.6)	1297 (72.0)
เคยดื่มสุรา	123 (23.3)	165 (35.0)	168 (42.6)	279 (63.7)	735 (40.1)	69 (15.6)	109 (22.1)	199 (32.7)	127 (49.4)	504 (28.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	-	(1)	(11)	(14)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)
รวม	528(100.0)	472(100.0)	394(100.0)	438(100.0)	1832(100.0)	442(100.0)	493(100.0)	609(100.0)	257(100.0)	1801(100.0)
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก										
mean±sd	10.7±1.7	12.1±2.0	14.1±1.9	14.0±2.1	13.1±2.3	10.8±1.5	12.2±1.6	14.2±1.9	15.2±1.7	13.5±2.3
median (พิสัย)	11(7-15)	12(7-15)	14(8-17)	15(7-19)	13(7-19)	11(7-13)	12(7-15)	15(7-17)	15(9-18)	14(7-18)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(17)	(9)	(37)	(78)	(5)	(7)	(7)	(17)	(36)
รวม	108	148	159	242	657	64	102	192	110	468
สถานที่ที่มักจะดื่มสุรา*										
งานฉลอง/รื่นเริง	39 (36.1)	60 (38.2)	63 (38.9)	88 (34.1)	250 (36.5)	29 (43.3)	53 (50.0)	79 (41.6)	41 (35.3)	202 (42.2)
บ้าน	58 (53.7)	75 (47.8)	61 (37.7)	85 (33.0)	279 (40.7)	33 (49.3)	45 (42.5)	79 (41.6)	48 (41.4)	205 (42.8)
หอพัก	1 (0.9)	1 (0.6)	1 (0.6)	5 (1.9)	8 (1.2)	-	1 (0.9)	1 (0.5)	-	2 (0.4)
งานโรงเรียน	2 (1.9)	3 (1.9)	5 (3.1)	6 (2.3)	16 (2.3)	2 (3.0)	1 (0.9)	5 (2.6)	2 (1.7)	10 (2.1)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีไม่ เกิน 500 เมตร	1 (0.9)	7 (4.5)	2 (1.2)	13 (5.0)	23 (3.4)	2 (3.0)	1 (0.9)	2 (1.1)	4 (3.4)	9 (1.9)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีเกิน 500 เมตร	3 (2.8)	2 (1.3)	23 (14.2)	37 (14.3)	65 (9.5)	1 (1.5)	2 (1.9)	15 (7.9)	14 (12.1)	32 (6.7)
ร้านน้ำชา	-	1 (0.6)	1 (0.6)	2 (0.8)	4 (0.6)	-	-	-	-	-
สวน/ไร่ นา	2 (1.9)	-	1 (0.6)	6 (2.3)	9 (1.3)	-	1 (0.9)	3 (1.6)	-	4 (0.8)
อื่นๆ	2 (1.9)	8 (5.1)	5 (3.1)	16 (6.2)	31 (4.5)	-	2 (1.9)	6 (3.2)	7 (6.0)	15 (3.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(8)	(6)	(21)	(50)	(2)	(3)	(9)	(11)	(25)
รวม	108(100.1)	157(100.0)	162(100.0)	258(99.9)	685(100.0)	67(100.1)	106(99.9)	190(100.1)	116(99.9)	479(100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	102 (83.6)	114 (69.5)	118 (70.7)	135 (49.5)	469 (64.6)	55 (79.7)	82 (75.9)	163 (81.9)	95 (75.4)	395 (78.7)
1-2 ครั้ง	17 (13.9)	37 (22.6)	37 (22.2)	76 (27.8)	167 (23.0)	9 (13.0)	23 (21.3)	32 (16.1)	25 (19.8)	89 (17.7)
3-5 ครั้ง	1 (0.8)	8 (4.9)	6 (3.6)	30 (11.0)	45 (6.2)	2 (2.9)	1 (0.9)	4 (2.0)	2 (1.6)	9 (1.8)
6-9 ครั้ง	1 (0.8)	2 (1.2)	3 (1.8)	12 (4.4)	18 (2.5)	2 (2.9)	1 (0.9)	-	2 (1.6)	5 (1.0)
10 ครั้ง ขึ้นไป	1 (0.8)	3 (1.8)	3 (1.8)	20 (7.3)	27 (3.7)	1 (1.4)	1 (0.9)	-	2 (1.6)	4 (0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(1)	(6)	(9)	-	(1)	-	(1)	(2)
รวม	122(99.9)	164(100.0)	167(100.1)	273(100.0)	726(100.0)	69(99.9)	108(99.9)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)

ตารางที่ 2.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	22 (29.7)	28 (21.9)	28 (19.6)	15 (6.8)	93 (16.4)	12 (26.1)	19 (23.2)	43 (27.0)	13 (14.1)	87 (23.0)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	20 (27.0)	31 (24.2)	45 (31.5)	48 (21.6)	144 (25.4)	14 (30.4)	16 (19.5)	52 (32.7)	30 (32.6)	112 (29.6)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	18 (24.3)	28 (21.9)	43 (30.1)	46 (20.7)	135 (23.8)	11 (23.9)	33 (40.2)	46 (28.9)	29 (31.5)	119 (31.4)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	14 (18.9)	41 (32.0)	27 (18.9)	113 (50.9)	195 (34.4)	9 (19.6)	14 (17.1)	18 (11.3)	20 (21.7)	61 (16.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(49)	(37)	(25)	(57)	(168)	(23)	(27)	(40)	(35)	(125)
รวม	74(99.9)	128(100.0)	143(100.1)	222(100.0)	567(100.0)	46(100.0)	82(100.0)	159(99.9)	92(99.9)	379(100.1)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน + ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	24 (75.0)	48 (69.6)	53 (76.8)	73 (46.2)	198 (60.4)	14 (70.0)	38 (80.9)	55 (87.3)	32 (68.1)	139 (78.5)
3-5 ครั้ง	4 (12.5)	13 (18.8)	7 (10.1)	33 (20.9)	57 (17.4)	2 (10.0)	5 (10.6)	8 (12.7)	6 (12.8)	21 (11.9)
6-9 ครั้ง	2 (6.3)	2 (2.9)	4 (5.8)	17 (10.8)	25 (7.6)	2 (10.0)	1 (2.1)	-	3 (6.4)	6 (3.4)
10-19 ครั้ง	1 (3.1)	4 (5.8)	3 (4.3)	23 (14.6)	31 (9.5)	1 (5.0)	3 (6.4)	-	4 (8.5)	8 (4.5)
20 ครั้ง ขึ้นไป	1 (3.1)	2 (2.9)	2 (2.9)	12 (7.6)	17 (5.2)	1 (5.0)	-	-	2 (4.3)	3 (1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	(1)	(1)	(2)	-	-	(1)	(2)	(3)
รวม	32(100.0)	69(100.0)	69(99.9)	158(100.1)	328(100.1)	20(100.0)	47(100.0)	63(100.0)	47(100.1)	177(100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	13 (41.9)	32 (49.2)	27 (39.7)	35 (22.3)	107 (33.3)	9 (45.0)	25 (54.3)	32 (51.6)	21 (44.7)	87 (49.7)
3-5 หน่วย	10 (32.3)	17 (26.2)	25 (36.8)	49 (31.2)	101 (31.5)	9 (45.0)	14 (30.4)	21 (33.9)	15 (31.9)	59 (33.7)
6-8 หน่วย	7 (22.6)	6 (9.2)	7 (10.3)	15 (9.6)	35 (10.9)	-	4 (8.7)	6 (9.7)	2 (4.3)	12 (6.9)
9 หน่วย ขึ้นไป	1 (3.2)	10 (15.4)	9 (13.2)	58 (36.9)	78 (24.3)	2 (10.0)	3 (6.5)	3 (4.8)	9 (19.1)	17 (9.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(4)	(2)	(2)	(9)	-	(1)	(2)	(2)	(5)
รวม	31(100.0)	65(100.0)	68(100.0)	157(100.0)	321(100.0)	20(100.0)	46(99.9)	62(100.0)	47(100.0)	175(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน + ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	17 (53.1)	31 (44.9)	45 (64.3)	55 (34.6)	148 (44.8)	7 (35.0)	28 (59.6)	44 (68.8)	22 (44.9)	101 (56.1)
1-2 ครั้ง	12 (37.5)	23 (33.3)	19 (27.1)	68 (42.8)	122 (37.0)	10 (50.0)	18 (38.3)	18 (28.1)	20 (40.8)	66 (36.7)
3-5 ครั้ง	1 (3.1)	10 (14.5)	2 (2.9)	14 (8.8)	27 (8.2)	3 (15.0)	1 (2.1)	1 (1.6)	5 (10.2)	10 (5.6)
6-9 ครั้ง	1 (3.1)	-	3 (4.3)	9 (5.7)	13 (3.9)	-	-	1 (1.6)	1 (2.0)	2 (1.1)
10-19 ครั้ง	-	2 (2.9)	1 (1.4)	7 (4.4)	10 (3.0)	-	-	-	-	-
20 ครั้ง ขึ้นไป	1 (3.1)	3 (4.3)	-	6 (3.8)	10 (3.0)	-	-	-	1 (2.0)	1 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	32(99.9)	69(99.9)	70(100.0)	159(100.1)	330(99.9)	20(100.0)	47(100.0)	64(100.1)	49(99.9)	180(100.1)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 2.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	37 (7.1)	69 (14.7)	66 (16.9)	165 (38.0)	337 (18.5)	32 (7.3)	43 (8.7)	58 (9.6)	54 (21.3)	187 (10.5)
ตัวเองโดยใช้บัตรประจำตัวของคนอื่น	8 (1.5)	21 (4.5)	23 (5.9)	80 (18.4)	132 (7.3)	2 (0.5)	6 (1.2)	7 (1.2)	16 (6.3)	31 (1.7)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	63 (12.0)	98 (20.9)	90 (23.1)	195 (44.9)	446 (24.6)	53 (12.2)	57 (11.5)	93 (15.5)	71 (28.0)	274 (15.3)
ตัวเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตรประจำตัว	33 (6.3)	64 (13.6)	54 (13.9)	155 (35.7)	306 (16.9)	23 (5.3)	33 (6.7)	44 (7.3)	57 (22.4)	157 (8.8)
เอามาจากบ้าน (ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	52 (9.9)	63 (13.4)	48 (12.3)	104 (24.0)	267 (14.7)	22 (5.0)	46 (9.3)	64 (10.7)	38 (15.0)	170 (9.5)
ตัวเอง/ได้จากคนอื่นที่ได้มาจากร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน	17 (3.2)	45 (9.6)	37 (9.5)	123 (28.3)	222 (12.2)	13 (3.0)	25 (5.1)	30 (5.0)	35 (13.8)	103 (5.8)
รัศมีไม่เกิน 500 เมตร										
เวลาเฉลี่ยในการซื้อ/หาสุรา										
mean±sd	10.5±11.8	11.7±11.7	12.5±13.6	13.7±12.2	12.3±12.3	8.6±9.0	14.5±12.1	13.3±10.3	13.5±10.2	12.6±10.6
median (พิสัย)	10(0-60)	10(0-60)	10(0-90)	10(0-90)	10(0-90)	5(0-30)	10(0-60)	10(0-60)	10(0-60)	10(0-60)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(389)	(317)	(241)	(226)	(1173)	(335)	(384)	(419)	(151)	(1289)
รวม	141	155	154	223	673	109	112	191	108	520

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมาค้าง*										
ไม่เลย	97 (79.5)	126 (76.8)	126 (75.0)	155 (55.8)	504 (68.9)	52 (76.5)	83 (76.1)	163 (81.9)	89 (70.1)	387 (76.9)
เคย	25 (20.5)	38 (23.2)	42 (25.0)	123 (44.2)	228 (31.1)	16 (23.5)	26 (23.9)	36 (18.1)	38 (29.9)	116 (23.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	19 (76.0)	25 (65.8)	27 (64.3)	62 (50.4)	133 (58.3)	10 (62.5)	18 (69.2)	29 (80.6)	30 (78.9)	87 (75.0)
2-3 ครั้ง	4 (16.0)	8 (21.1)	11 (26.2)	36 (29.3)	59 (25.9)	5 (31.3)	5 (19.2)	5 (13.9)	5 (13.2)	20 (17.2)
4 ครั้งขึ้นไป	2 (8.0)	5 (13.2)	4 (9.5)	25 (20.3)	36 (15.8)	1 (6.3)	3 (11.5)	2 (5.6)	3 (7.9)	9 (7.8)
รวม	25(100.0)	38(100.1)	42(100.0)	123(100.0)	228(100.0)	16(100.1)	26(99.9)	36(100.1)	38(100.0)	116(100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เลย	79 (64.8)	113 (68.9)	126 (75.0)	167 (60.1)	485 (66.3)	57 (83.8)	82 (75.2)	144 (72.4)	93 (73.2)	376 (74.8)
เคย	43 (35.2)	51 (31.1)	42 (25.0)	111 (39.9)	247 (33.7)	11 (16.2)	27 (24.8)	55 (27.6)	34 (26.8)	127 (25.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	24 (55.8)	28 (54.9)	19 (45.2)	61 (55.0)	132 (53.4)	9 (81.8)	15 (55.6)	19 (34.5)	23 (67.6)	66 (52.0)
2-3 ครั้ง	14 (32.6)	13 (25.5)	11 (26.2)	33 (29.7)	71 (28.7)	2 (18.2)	9 (33.3)	24 (43.6)	9 (26.5)	44 (34.6)
4 ครั้งขึ้นไป	5 (11.6)	10 (19.6)	12 (28.6)	17 (15.3)	44 (17.8)	-	3 (11.1)	12 (21.8)	2 (5.9)	17 (13.4)
รวม	43(100.0)	51(100.0)	42(100.0)	111(100.0)	247(99.9)	11(100.0)	27(100.0)	55(99.9)	34(100.0)	127(100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เลย	98 (80.3)	130 (79.3)	141 (83.9)	215 (77.3)	584 (79.8)	60 (88.2)	93 (85.3)	183 (92.0)	106 (83.5)	442 (87.9)
เคย	24 (19.7)	34 (20.7)	27 (16.1)	63 (22.7)	148 (20.2)	8 (11.8)	16 (14.7)	16 (8.0)	21 (16.5)	61 (12.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	14 (58.3)	20 (58.8)	17 (63.0)	39 (61.9)	90 (60.8)	5 (62.5)	7 (43.8)	8 (50.0)	15 (71.4)	35 (57.4)
2-3 ครั้ง	4 (16.7)	9 (26.5)	9 (33.3)	15 (23.8)	37 (25.0)	3 (37.5)	7 (43.8)	5 (31.3)	6 (28.6)	21 (34.4)
4 ครั้งขึ้นไป	6 (25.0)	5 (14.7)	1 (3.7)	9 (14.3)	21 (14.2)	-	2 (12.5)	3 (18.8)	-	5 (8.2)
รวม	24(100.0)	34(100.0)	27(100.0)	63(100.0)	148(100.0)	8(100.0)	16(100.1)	16(100.1)	21(100.0)	61(100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เลย	110 (90.2)	143 (87.2)	156 (92.9)	244 (88.1)	653 (89.3)	67 (98.5)	102 (93.6)	197 (99.0)	125 (98.4)	491 (97.6)
เคย	12 (9.8)	21 (12.8)	12 (7.1)	33 (11.9)	78 (10.7)	1 (1.5)	7 (6.4)	2 (1.0)	2 (1.6)	12 (2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(2)	(4)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	277(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	7 (58.3)	13 (61.9)	7 (58.3)	21 (63.6)	48 (61.5)	1 (100.0)	4 (57.1)	1 (50.0)	1 (50.0)	7 (58.3)
2-3 ครั้ง	4 (33.3)	3 (14.3)	3 (25.0)	8 (24.2)	18 (23.1)	-	3 (42.9)	1 (50.0)	1 (50.0)	5 (41.7)
4 ครั้งขึ้นไป	1 (8.3)	5 (23.8)	2 (16.7)	4 (12.1)	12 (15.4)	-	-	-	-	-
รวม	12(99.9)	21(100.0)	12(100.0)	33(99.9)	78(100.0)	1(100.0)	7(100.0)	2(100.0)	2(100.0)	12(100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เลย	84 (68.9)	118 (72.0)	151 (89.9)	194 (70.0)	547 (74.8)	55 (80.9)	95 (87.2)	186 (93.5)	109 (85.8)	445 (88.5)
เคย	38 (31.1)	46 (28.0)	17 (10.1)	83 (30.0)	184 (25.2)	13 (19.1)	14 (12.8)	13 (6.5)	18 (14.2)	58 (11.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(2)	(4)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	277(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	25 (65.8)	27 (58.7)	12 (70.6)	49 (59.0)	113 (61.4)	7 (53.8)	7 (50.0)	7 (53.8)	11 (61.1)	32 (55.2)
2-3 ครั้ง	6 (15.8)	14 (30.4)	2 (11.8)	19 (22.9)	41 (22.3)	4 (30.8)	5 (35.7)	6 (46.2)	5 (27.8)	20 (34.5)
4 ครั้งขึ้นไป	7 (18.4)	5 (10.9)	3 (17.6)	15 (18.1)	30 (16.3)	2 (15.4)	2 (14.3)	-	2 (11.1)	6 (10.3)
รวม	38(100.0)	46(100.0)	17(100.0)	83(100.0)	184(100.0)	13(100.0)	14(100.0)	13(100.0)	18(100.0)	58(100.0)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
คลื่นไส้ อาเจียน*										
ไม่เลย	83 (68.0)	111 (67.7)	115 (68.5)	146 (52.5)	455 (62.2)	43 (63.2)	65 (59.6)	146 (73.4)	68 (53.5)	322 (64.0)
เคย	39 (32.0)	53 (32.3)	53 (31.5)	132 (47.5)	277 (37.8)	25 (36.8)	44 (40.4)	53 (26.6)	59 (46.5)	181 (36.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	18 (46.2)	29 (54.7)	35 (66.0)	70 (53.0)	152 (54.9)	13 (52.0)	24 (54.5)	36 (67.9)	40 (67.8)	113 (62.4)
2-3 ครั้ง	15 (38.5)	16 (30.2)	11 (20.8)	42 (31.8)	84 (30.3)	10 (40.0)	13 (29.5)	12 (22.6)	14 (23.7)	49 (27.1)
4 ครั้งขึ้นไป	6 (15.4)	8 (15.1)	7 (13.2)	20 (15.2)	41 (14.8)	2 (8.0)	7 (15.9)	5 (9.4)	5 (8.5)	19 (10.5)
รวม	39(100.1)	53(100.0)	53(100.0)	132(100.0)	277(100.0)	25(100.0)	44(99.9)	53(99.9)	59(100.0)	181(100.0)
ขับขี้รด หลังดื่มสุรา*										
ไม่เลย	106 (86.9)	128 (78.0)	136 (81.4)	141 (50.7)	511 (69.9)	63 (92.6)	100 (91.7)	186 (93.9)	95 (75.4)	444 (88.6)
เคย	16 (13.1)	36 (22.0)	31 (18.6)	137 (49.3)	220 (30.1)	5 (7.4)	9 (8.3)	12 (6.1)	31 (24.6)	57 (11.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(1)	-	(1)	(1)	(3)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	167(100.0)	278(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	198(100.0)	126(100.0)	501(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	10 (62.5)	22 (61.1)	10 (32.3)	56 (40.9)	98 (44.5)	2 (40.0)	7 (77.8)	9 (75.0)	20 (64.5)	38 (66.7)
2-3 ครั้ง	4 (25.0)	7 (19.4)	13 (41.9)	45 (32.8)	69 (31.4)	2 (40.0)	2 (22.2)	3 (25.0)	5 (16.1)	12 (21.1)
4 ครั้งขึ้นไป	2 (12.5)	7 (19.4)	8 (25.8)	36 (26.3)	53 (24.1)	1 (20.0)	-	-	6 (19.4)	7 (12.3)
รวม	16(100.0)	36(99.9)	31(100.0)	137(100.0)	220(100.0)	5(100.0)	9(100.0)	12(100.0)	31(100.0)	57(100.1)
ขาดเรียน*										
ไม่เลย	82 (67.2)	103 (62.8)	139 (82.7)	155 (55.8)	479 (65.4)	52 (76.5)	82 (75.2)	159 (79.9)	86 (67.7)	379 (75.3)
เคย	40 (32.8)	61 (37.2)	29 (17.3)	123 (44.2)	253 (34.6)	16 (23.5)	27 (24.8)	40 (20.1)	41 (32.3)	124 (24.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	13 (32.5)	33 (54.1)	13 (44.8)	49 (39.8)	108 (42.7)	2 (12.5)	11 (40.7)	19 (47.5)	15 (36.6)	47 (37.9)
2-3 ครั้ง	17 (42.5)	14 (23.0)	8 (27.6)	49 (39.8)	88 (34.8)	11 (68.8)	9 (33.3)	14 (35.0)	11 (26.8)	45 (36.3)
4 ครั้งขึ้นไป	10 (25.0)	14 (23.0)	8 (27.6)	25 (20.3)	57 (22.5)	3 (18.8)	7 (25.9)	7 (17.5)	15 (36.6)	32 (25.8)
รวม	40(100.0)	61(100.1)	29(100.0)	123(99.9)	253(100.0)	16(100.1)	27(99.9)	40(100.0)	41(100.0)	124(100.0)
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*										
ไม่เลย	82 (67.2)	105 (64.0)	112 (66.7)	163 (58.6)	462 (63.1)	50 (73.5)	68 (62.4)	150 (75.8)	88 (69.3)	356 (70.9)
เคย	40 (32.8)	59 (36.0)	56 (33.3)	115 (41.4)	270 (36.9)	18 (26.5)	41 (37.6)	48 (24.2)	39 (30.7)	146 (29.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	(1)	-	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	198(100.0)	127(100.0)	502(100.0)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	24 (60.0)	36 (61.0)	26 (46.4)	59 (51.3)	145 (53.7)	9 (50.0)	23 (56.1)	25 (52.1)	24 (61.5)	81 (55.5)
2-3 ครั้ง	10 (25.0)	17 (28.8)	15 (26.8)	40 (34.8)	82 (30.4)	6 (33.3)	13 (31.7)	18 (37.5)	11 (28.2)	48 (32.9)
4 ครั้งขึ้นไป	6 (15.0)	6 (10.2)	15 (26.8)	16 (13.9)	43 (15.9)	3 (16.7)	5 (12.2)	5 (10.4)	4 (10.3)	17 (11.6)
รวม	40(100.0)	59(100.0)	56(100.0)	115(100.0)	270(100.0)	18(100.0)	41(100.1)	48(100.0)	39(100.0)	146(100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เลย	103 (84.4)	138 (84.1)	151 (89.9)	215 (77.3)	607 (82.9)	61 (89.7)	99 (91.7)	184 (92.5)	111 (87.4)	455 (90.6)
เคย	19 (15.6)	26 (15.9)	17 (10.1)	63 (22.7)	125 (17.1)	7 (10.3)	9 (8.3)	15 (7.5)	16 (12.6)	47 (9.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	(1)	-	-	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	108(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	12 (63.2)	20 (76.9)	13 (76.5)	40 (63.5)	85 (68.0)	6 (85.7)	6 (66.7)	12 (80.0)	14 (87.5)	38 (80.9)
2-3 ครั้ง	3 (15.8)	2 (7.7)	2 (11.8)	15 (23.8)	22 (17.6)	1 (14.3)	2 (22.2)	3 (20.0)	2 (12.5)	8 (17.0)
4 ครั้งขึ้นไป	4 (21.1)	4 (15.4)	2 (11.8)	8 (12.7)	18 (14.4)	-	1 (11.1)	-	-	1 (2.1)
รวม	19(100.1)	26(100.0)	17(100.1)	63(100.0)	125(100.0)	7(100.0)	9(100.0)	15(100.0)	16(100.0)	47(100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	84 (69.4)	114 (69.5)	131 (78.0)	189 (68.2)	518 (71.0)	48 (70.6)	79 (72.5)	159 (79.9)	97 (76.4)	383 (76.1)
เคย	37 (30.6)	50 (30.5)	37 (22.0)	88 (31.8)	212 (29.0)	20 (29.4)	30 (27.5)	40 (20.1)	30 (23.6)	120 (23.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	-	(2)	(5)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	121(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	277(100.0)	730(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	21 (56.8)	29 (58.0)	20 (54.1)	57 (64.8)	127 (59.9)	13 (65.0)	16 (53.3)	13 (32.5)	14 (46.7)	56 (46.7)
2-3 ครั้ง	10 (27.0)	17 (34.0)	14 (37.8)	22 (25.0)	63 (29.7)	3 (15.0)	13 (43.3)	22 (55.0)	11 (36.7)	49 (40.8)
4 ครั้งขึ้นไป	6 (16.2)	4 (8.0)	3 (8.1)	9 (10.2)	22 (10.4)	4 (20.0)	1 (3.3)	5 (12.5)	5 (16.7)	15 (12.5)
รวม	37(100.0)	50(100.0)	37(100.0)	88(100.0)	212(100.0)	20(100.0)	30(99.9)	40(100.0)	30(100.1)	120(100.0)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เลย	87 (71.3)	122 (74.8)	130 (77.4)	185 (66.5)	524 (71.7)	47 (69.1)	81 (74.3)	157 (78.9)	89 (70.1)	374 (74.4)
เคย	35 (28.7)	41 (25.2)	38 (22.6)	93 (33.5)	207 (28.3)	21 (30.9)	28 (25.7)	42 (21.1)	38 (29.9)	129 (25.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	-	(1)	(4)	(1)	-	-	-	(1)
รวม	122(100.0)	163(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	127(100.0)	503(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	20 (57.1)	22 (53.7)	17 (44.7)	57 (61.3)	116 (56.0)	8 (38.1)	14 (50.0)	23 (54.8)	25 (65.8)	70 (54.3)
2-3 ครั้ง	8 (22.9)	17 (41.5)	11 (28.9)	18 (19.4)	54 (26.1)	11 (52.4)	6 (21.4)	13 (31.0)	7 (18.4)	37 (28.7)
4 ครั้งขึ้นไป	7 (20.0)	2 (4.9)	10 (26.3)	18 (19.4)	37 (17.9)	2 (9.5)	8 (28.6)	6 (14.3)	6 (15.8)	22 (17.1)
รวม	35(100.0)	41(100.1)	38(99.9)	93(100.1)	207(100.0)	21(100.0)	28(100.0)	42(100.1)	38(100.0)	129(100.1)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกจับเพราะขับขีรถขณะเมาสุรา*										
ไม่เลย	115 (94.3)	156 (95.1)	163 (97.0)	249 (89.6)	683 (93.3)	65 (95.6)	109 (100.0)	199 (100.0)	121 (96.0)	494 (98.4)
เคย	7 (5.7)	8 (4.9)	5 (3.0)	29 (10.4)	49 (6.7)	3 (4.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (4.0)	8 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4 (57.1)	4 (50.0)	4 (80.0)	13 (44.8)	25 (51.0)	2 (66.7)	-	-	2 (40.0)	4 (50.0)
2-3 ครั้ง	3 (42.9)	3 (37.5)	1 (20.0)	10 (34.5)	17 (34.7)	1 (33.3)	-	-	3 (60.0)	4 (50.0)
4 ครั้งขึ้นไป	-	1 (12.5)	-	6 (20.7)	7 (14.3)	-	-	-	-	-
รวม	7(100.0)	8(100.0)	5(100.0)	29(100.0)	49(100.0)	3(100.0)	-	-	5(100.0)	8(100.0)
ถูกกลอนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เลย	118 (96.7)	151 (92.6)	160 (95.2)	234 (84.5)	663 (90.8)	64 (94.1)	104 (95.4)	194 (97.5)	117 (92.9)	479 (95.4)
เคย	4 (3.3)	12 (7.4)	8 (4.8)	43 (15.5)	67 (9.2)	4 (5.9)	5 (4.6)	5 (2.5)	9 (7.1)	23 (4.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	-	(2)	(5)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	163(100.0)	168(100.0)	277(100.0)	730(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	2 (50.0)	6 (50.0)	5 (62.5)	23 (53.5)	36 (53.7)	3 (75.0)	5 (100.0)	3 (60.0)	8 (88.9)	19 (82.6)
2-3 ครั้ง	2 (50.0)	3 (25.0)	2 (25.0)	9 (20.9)	16 (23.9)	1 (25.0)	-	1 (20.0)	1 (11.1)	3 (13.0)
4 ครั้งขึ้นไป	-	3 (25.0)	1 (12.5)	11 (25.6)	15 (22.4)	-	-	1 (20.0)	-	1 (4.3)
รวม	4(100.0)	12(100.0)	8(100.0)	43(100.0)	67(100.0)	4(100.0)	5(100.0)	5(100.0)	9(100.0)	23(99.9)
กลอนลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เลย	111 (91.0)	148 (90.8)	159 (94.6)	232 (83.5)	650 (88.9)	61 (89.7)	108 (99.1)	196 (98.5)	120 (95.2)	485 (96.6)
เคย	11 (9.0)	15 (9.2)	9 (5.4)	46 (16.5)	81 (11.1)	7 (10.3)	1 (0.9)	3 (1.5)	6 (4.8)	17 (3.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	-	(1)	(4)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	163(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	5 (45.5)	11 (73.3)	6 (66.7)	23 (50.0)	45 (55.6)	2 (28.6)	1 (100.0)	-	3 (50.0)	6 (35.3)
2-3 ครั้ง	3 (27.3)	3 (20.0)	2 (22.2)	12 (26.1)	20 (24.7)	4 (57.1)	-	1 (33.3)	3 (50.0)	8 (47.1)
4 ครั้งขึ้นไป	3 (27.3)	1 (6.7)	1 (11.1)	11 (23.9)	16 (19.8)	1 (14.3)	-	2 (66.7)	-	3 (17.6)
รวม	11(100.1)	15(100.0)	9(100.0)	46(100.0)	81(100.1)	7(100.0)	1(100.0)	3(100.0)	6(100.0)	17(100.0)
พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เลย	105 (86.1)	142 (86.6)	154 (91.7)	213 (76.6)	614 (83.9)	61 (89.7)	100 (91.7)	186 (93.5)	108 (85.7)	455 (90.6)
เคย	17 (13.9)	22 (13.4)	14 (8.3)	65 (23.4)	118 (16.1)	7 (10.3)	9 (8.3)	13 (6.5)	18 (14.3)	47 (9.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	9 (52.9)	11 (50.0)	9 (64.3)	31 (47.7)	60 (50.8)	3 (42.9)	6 (66.7)	7 (53.8)	9 (50.0)	25 (53.2)
2-3 ครั้ง	4 (23.5)	6 (27.3)	3 (21.4)	18 (27.7)	31 (26.3)	2 (28.6)	2 (22.2)	3 (23.1)	6 (33.3)	13 (27.7)
4 ครั้งขึ้นไป	4 (23.5)	5 (22.7)	2 (14.3)	16 (24.6)	27 (22.9)	2 (28.6)	1 (11.1)	3 (23.1)	3 (16.7)	9 (19.1)
รวม	17(99.9)	22(100.0)	14(100.0)	65(100.0)	118(100.0)	7(100.1)	9(100.0)	13(100.0)	18(100.0)	47(100.0)
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*										
ไม่เลย	119 (97.5)	155 (94.5)	161 (95.8)	252 (90.6)	687 (93.9)	63 (92.6)	101 (92.7)	194 (97.5)	118 (93.7)	476 (94.8)
เคย	3 (2.5)	9 (5.5)	7 (4.2)	26 (9.4)	45 (6.1)	5 (7.4)	8 (7.3)	5 (2.5)	8 (6.3)	26 (5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	1 (33.3)	4 (44.4)	5 (71.4)	11 (42.3)	21 (46.7)	3 (60.0)	5 (62.5)	3 (60.0)	6 (75.0)	17 (65.4)
2-3 ครั้ง	1 (33.3)	2 (22.2)	2 (28.6)	9 (34.6)	14 (31.1)	1 (20.0)	2 (25.0)	2 (40.0)	1 (12.5)	6 (23.1)
4 ครั้งขึ้นไป	1 (33.3)	3 (33.3)	0 (0.0)	6 (23.1)	10 (22.2)	1 (20.0)	1 (12.5)	-	1 (12.5)	3 (11.5)
รวม	3(99.9)	9(99.9)	7(100.0)	26(100.0)	45(100.0)	5(100.0)	8(100.0)	5(100.0)	8(100.0)	26(100.0)
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*										
ไม่เลย	114 (93.4)	154 (94.5)	162 (96.4)	258 (92.8)	688 (94.1)	58 (85.3)	103 (94.5)	189 (95.0)	121 (96.0)	471 (93.8)
เคย	8 (6.6)	9 (5.5)	6 (3.6)	20 (7.2)	43 (5.9)	10 (14.7)	6 (5.5)	10 (5.0)	5 (4.0)	31 (6.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	-	(1)	(4)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	163(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	731(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	5 (62.5)	6 (66.7)	4 (66.7)	11 (55.0)	26 (60.5)	9 (90.0)	3 (50.0)	7 (70.0)	3 (60.0)	22 (71.0)
2-3 ครั้ง	2 (25.0)	1 (11.1)	2 (33.3)	4 (20.0)	9 (20.9)	1 (10.0)	2 (33.3)	2 (20.0)	1 (20.0)	6 (19.4)
4 ครั้งขึ้นไป	1 (12.5)	2 (22.2)	0 (0.0)	5 (25.0)	8 (18.6)	-	1 (16.7)	1 (10.0)	1 (20.0)	3 (9.7)
รวม	8(100.0)	9(100.0)	6(100.0)	20(100.0)	43(100.0)	10(100.0)	6(100.0)	10(100.0)	5(100.0)	31(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	88 (72.1)	122 (74.4)	148 (88.1)	207 (74.5)	565 (77.2)	52 (76.5)	85 (78.7)	176 (88.4)	104 (82.5)	417 (83.2)
เคย	34 (27.9)	42 (25.6)	20 (11.9)	71 (25.5)	167 (22.8)	16 (23.5)	23 (21.3)	23 (11.6)	22 (17.5)	84 (16.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	(1)	-	(1)	(3)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	108(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	501(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	18 (52.9)	28 (66.7)	11 (55.0)	39 (54.9)	96 (57.5)	11 (68.8)	15 (65.2)	14 (60.9)	12 (54.5)	52 (61.9)
2-3 ครั้ง	7 (20.6)	9 (21.4)	9 (45.0)	22 (31.0)	47 (28.1)	4 (25.0)	7 (30.4)	5 (21.7)	8 (36.4)	24 (28.6)
4 ครั้งขึ้นไป	9 (26.5)	5 (11.9)	-	10 (14.1)	24 (14.4)	1 (6.3)	1 (4.3)	4 (17.4)	2 (9.1)	8 (9.5)
รวม	34(100.0)	42(100.0)	20(100.0)	71(100.0)	167(100.0)	16(100.1)	23(99.9)	23(100.0)	22(100.0)	84(100.0)

ตารางที่ 2.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	118 (96.7)	158 (96.3)	164 (97.6)	252 (90.6)	692 (94.5)	67 (98.5)	105 (96.3)	199 (100.0)	123 (97.6)	494 (98.4)
เคย	4 (3.3)	6 (3.7)	4 (2.4)	26 (9.4)	40 (5.5)	1 (1.5)	4 (3.7)	0 (0.0)	3 (2.4)	8 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	-	(1)	(3)	(1)	-	-	(1)	(2)
รวม	122(100.0)	164(100.0)	168(100.0)	278(100.0)	732(100.0)	68(100.0)	109(100.0)	199(100.0)	126(100.0)	502(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	2 (50.0)	4 (66.7)	3 (75.0)	16 (61.5)	25 (62.5)	1 (100.0)	3 (75.0)	-	3 (100.0)	7 (87.5)
2-3 ครั้ง	1 (25.0)	1 (16.7)	1 (25.0)	7 (26.9)	10 (25.0)	-	1 (25.0)	-	-	1 (12.5)
4 ครั้งขึ้นไป	1 (25.0)	1 (16.7)	-	3 (11.5)	5 (12.5)	-	-	-	-	-
รวม	4(100.0)	6(100.1)	4(100.0)	26(99.9)	40(100.0)	1(100.0)	4(100.0)	-	3(100.0)	8(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่มสุรา **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 2.13 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เลย	427 (80.9)	401 (85.1)	346 (88.3)	376 (85.8)	1550 (84.7)	379 (85.7)	400 (89.1)	562 (92.9)	216 (85.0)	1597 (89.0)
เคย	101 (19.1)	70 (14.9)	46 (11.7)	62 (14.2)	279 (15.3)	63 (14.3)	54 (10.9)	43 (7.1)	38 (15.0)	198 (11.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(3)	(11)	(17)	(2)	(2)	(5)	(5)	(14)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	438(100.0)	1829(100.0)	442(100.0)	494(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1795(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	58 (57.4)	39 (55.7)	27 (58.7)	33 (53.2)	157 (56.3)	41 (65.1)	32 (59.3)	21 (48.8)	24 (63.2)	118 (59.6)
2-3 ครั้ง	25 (24.8)	17 (24.3)	14 (30.4)	18 (29.0)	74 (26.5)	11 (17.5)	8 (14.8)	17 (39.5)	11 (28.9)	47 (23.7)
4 ครั้งขึ้นไป	18 (17.8)	14 (20.0)	5 (10.9)	11 (17.7)	48 (17.2)	11 (17.5)	14 (25.9)	5 (11.6)	3 (7.9)	33 (16.7)
รวม	101(100.0)	70(100.0)	46(100.0)	62(99.9)	279(100.0)	63(100.1)	54(100.0)	43(99.9)	38(100.0)	198(100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง										
ไม่เลย	440 (83.2)	394 (83.7)	360 (91.8)	344 (78.5)	1538 (84.0)	404 (91.4)	446 (90.1)	560 (92.6)	219 (86.2)	1629 (90.7)
เคย	89 (16.8)	77 (16.3)	32 (8.2)	94 (21.5)	292 (16.0)	38 (8.6)	49 (9.9)	45 (7.4)	35 (13.8)	167 (9.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(3)	(11)	(16)	(2)	(1)	(5)	(5)	(13)
รวม	529(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	438(100.0)	1830(100.0)	442(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1796(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	47 (52.8)	45 (58.4)	18 (56.3)	55 (58.5)	165 (56.5)	23 (60.5)	28 (57.1)	32 (71.1)	17 (48.6)	100 (59.9)
2-3 ครั้ง	28 (31.5)	23 (29.9)	12 (37.5)	21 (22.3)	84 (28.8)	11 (28.9)	14 (28.6)	9 (20.0)	15 (42.9)	49 (29.3)
4 ครั้งขึ้นไป	14 (15.7)	9 (11.7)	2 (6.3)	18 (19.1)	43 (14.7)	4 (10.5)	7 (14.3)	4 (8.9)	3 (8.6)	18 (10.8)
รวม	89(100.0)	77(100.0)	32(100.1)	94(99.9)	292(100.0)	38(99.9)	49(100.0)	45(100.0)	35(100.1)	167(100.0)

ตารางที่ 2.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เลย	449 (84.9)	428 (90.9)	371 (94.6)	373 (85.4)	1621 (88.6)	417 (94.3)	466 (94.1)	591 (97.7)	240 (94.5)	1714 (95.4)
เคย	80 (15.1)	43 (9.1)	21 (5.4)	64 (14.6)	208 (11.4)	25 (5.7)	29 (5.9)	14 (2.3)	14 (5.5)	82 (4.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(3)	(12)	(17)	(2)	(1)	(5)	(5)	(13)
รวม	529(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	437(100.0)	1829(100.0)	442(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1796(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	51 (63.8)	26 (60.5)	12 (57.1)	34 (53.1)	123 (59.1)	18 (72.0)	18 (62.1)	11 (78.6)	10 (71.4)	57 (69.5)
2-3 ครั้ง	17 (21.3)	11 (25.6)	4 (19.0)	18 (28.1)	50 (24.0)	3 (12.0)	8 (27.6)	2 (14.3)	4 (28.6)	17 (20.7)
4 ครั้งขึ้นไป	12 (15.0)	6 (14.0)	5 (23.8)	12 (18.8)	35 (16.8)	4 (16.0)	3 (10.3)	1 (7.1)	-	8 (9.8)
รวม	80(100.1)	43(100.1)	21(99.9)	64(100.0)	208(99.9)	25(100.0)	29(100.0)	14(100.0)	14(100.0)	82(100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เลย	509 (96.4)	457 (97.0)	383 (97.7)	398 (91.1)	1747 (95.6)	437 (98.9)	482 (97.4)	596 (98.5)	247 (97.2)	1762 (98.1)
เคย	19 (3.6)	14 (3.0)	9 (2.3)	39 (8.9)	81 (4.4)	5 (1.1)	13 (2.6)	9 (1.5)	7 (2.8)	34 (1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(3)	(12)	(18)	(2)	(1)	(5)	(5)	(13)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	437(100.0)	1828(100.0)	442(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1796(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	14 (73.7)	9 (64.3)	5 (55.6)	27 (69.2)	55 (67.9)	3 (60.0)	11 (84.6)	6 (66.7)	6 (85.7)	26 (76.5)
2-3 ครั้ง	2 (10.5)	2 (14.3)	3 (33.3)	10 (25.6)	17 (21.0)	2 (40.0)	2 (15.4)	2 (22.2)	1 (14.3)	7 (20.6)
4 ครั้งขึ้นไป	3 (15.8)	3 (21.4)	1 (11.1)	2 (5.1)	9 (11.1)	-	-	1 (11.1)	-	1 (2.9)
รวม	19(100.0)	14(100.0)	9(100.0)	39(99.9)	81(100.0)	5(100.0)	13(100.0)	9(100.0)	7(100.0)	34(100.0)
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เลย	500 (94.7)	450 (95.5)	343 (87.5)	337 (76.9)	1630 (89.1)	423 (95.7)	462 (93.3)	552 (91.2)	203 (79.9)	1640 (91.3)
เคย	28 (5.3)	21 (4.5)	49 (12.5)	101 (23.1)	199 (10.9)	19 (4.3)	33 (6.7)	53 (8.8)	51 (20.1)	156 (8.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(3)	(11)	(17)	(2)	(1)	(5)	(5)	(13)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	438(100.0)	1829(100.0)	442(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1796(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	22 (78.6)	16 (76.2)	22 (44.9)	53 (52.5)	113 (56.8)	15 (78.9)	23 (69.7)	39 (73.6)	31 (60.8)	108 (69.2)
2-3 ครั้ง	3 (10.7)	3 (14.3)	22 (44.9)	34 (33.7)	62 (31.2)	4 (21.1)	8 (24.2)	11 (20.8)	14 (27.5)	37 (23.7)
4 ครั้งขึ้นไป	3 (10.7)	2 (9.5)	5 (10.2)	14 (13.9)	24 (12.1)	-	2 (6.1)	3 (5.7)	6 (11.8)	11 (7.1)
รวม	28(100.0)	21(100.0)	49(100.0)	101(100.1)	199(100.0)	19(100.0)	33(100.0)	53(100.1)	51(100.1)	156(100.0)
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เลย	439(83.1)	392 (83.2)	340 (87.0)	354 (80.8)	1525 (83.4)	377 (85.5)	415 (83.8)	536 (88.7)	192 (75.6)	1520 (84.7)
เคย	89 (16.9)	79 (16.8)	51 (13.0)	84 (19.2)	303 (16.6)	64 (14.5)	80 (16.2)	68 (11.3)	62 (24.4)	274 (15.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(4)	(11)	(18)	(3)	(1)	(6)	(5)	(15)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	391(100.0)	438(100.0)	1828(100.0)	441(100.0)	495(100.0)	604(100.0)	254(100.0)	1794(100.0)

ตารางที่ 2.13 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	42 (47.2)	48 (60.8)	19 (37.3)	48 (57.1)	157 (51.8)	28 (43.8)	31 (38.8)	28 (41.2)	28 (45.2)	115 (42.0)
2-3 ครั้ง	29 (32.6)	17 (21.5)	14 (27.5)	17 (20.2)	77 (25.4)	19 (29.7)	30 (37.5)	23 (33.8)	20 (32.3)	92 (33.6)
4 ครั้งขึ้นไป	18 (20.2)	14 (17.7)	18 (35.3)	19 (22.6)	69 (22.8)	17 (26.6)	19 (23.8)	17 (25.0)	14 (22.6)	67 (24.5)
รวม	89(100.0)	79(100.0)	51(100.1)	84(99.9)	303(100.0)	64(100.1)	80(100.1)	68(100.0)	62(100.1)	274(100.1)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยที่ไม่ต้องการ										
ไม่เลย	485 (91.9)	434 (92.1)	367 (93.6)	359 (82.0)	1645 (89.9)	392 (88.9)	435 (87.9)	550 (90.9)	197 (77.6)	1574 (87.7)
เคย	43 (8.1)	37 (7.9)	25 (6.4)	79 (18.0)	184 (10.1)	49 (11.1)	60 (12.1)	55 (9.1)	57 (22.4)	221 (12.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(3)	(11)	(17)	(3)	(1)	(5)	(5)	(14)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	438(100.0)	1829(100.0)	441(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1795(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	23 (53.5)	17 (45.9)	10 (40.0)	41 (51.9)	91 (49.5)	29 (59.2)	19 (31.7)	30 (54.5)	24 (42.1)	102 (46.2)
2-3 ครั้ง	9 (20.9)	11 (29.7)	8 (32.0)	18 (22.8)	46 (25.0)	11 (22.4)	29 (48.3)	16 (29.1)	19 (33.3)	75 (33.9)
4 ครั้งขึ้นไป	11 (25.6)	9 (24.3)	7 (28.0)	20 (25.3)	47 (25.5)	9 (18.4)	12 (20.0)	9 (16.4)	14 (24.6)	44 (19.9)
รวม	43(100.0)	37(99.9)	25(100.0)	79(100.0)	184(100.0)	49(100.0)	60(100.0)	55(100.0)	57(100.0)	221(100.0)
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เลย	518 (98.1)	462 (98.1)	384 (98.0)	401 (91.6)	1765 (96.5)	437 (98.9)	489 (98.8)	603 (99.7)	247 (97.2)	1776 (98.9)
เคย	10 (1.9)	9 (1.9)	8 (2.0)	37 (8.4)	64 (3.5)	5 (1.1)	6 (1.2)	2 (0.3)	7 (2.8)	20 (1.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(3)	(11)	(17)	(2)	(1)	(5)	(5)	(13)
รวม	528(100.0)	471(100.0)	392(100.0)	438(100.0)	1829(100.0)	442(100.0)	495(100.0)	605(100.0)	254(100.0)	1796(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	8 (80.0)	5 (55.6)	2 (25.0)	20 (54.1)	35 (54.7)	4 (80.0)	3 (50.0)	2 (100.0)	6 (85.7)	15 (75.0)
2-3 ครั้ง	2 (20.0)	3 (33.3)	2 (25.0)	4 (10.8)	11 (17.2)	1 (20.0)	2 (33.3)	-	-	3 (15.0)
4 ครั้งขึ้นไป	-	1 (11.1)	4 (50.0)	13 (35.1)	18 (28.1)	-	1 (16.7)	-	1 (14.3)	2 (10.0)
รวม	10(100.0)	9(100.0)	8(100.0)	37(100.0)	64(100.0)	5(100.0)	6(100.0)	2(100.0)	7(100.0)	20(100.0)

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 2.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	92 (18.0)	78 (17.0)	58 (14.8)	49 (11.8)	277 (15.6)	57 (13.1)	57 (11.6)	68 (11.2)	25 (10.2)	207 (11.6)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา เครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใด ชนิดหนึ่ง	418 (82.0)	382 (83.0)	333 (85.2)	365 (88.2)	1498 (84.4)	379 (86.9)	436 (88.4)	538 (88.8)	219 (89.8)	1572 (88.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(20)	(12)	(4)	(35)	(71)	(8)	(3)	(4)	(15)	(30)
รวม	510(100.0)	460(100.0)	391(100.0)	414(100.0)	1775(100.0)	436(100.0)	493 (100.0)	606(100.0)	244(100.0)	1779(100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	408 (98.8)	375 (98.2)	325 (97.6)	353 (96.7)	1461 (97.9)	374 (98.9)	433 (99.3)	533 (99.3)	210 (97.2)	1550 (98.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	82 (24.0)	61 (20.0)	76 (31.3)	62 (31.0)	281 (25.8)	81 (25.1)	102 (29.3)	145 (35.5)	31 (26.7)	359 (30.0)
5-9 ครั้ง	64 (18.7)	60 (19.7)	24 (9.9)	30 (15.0)	178 (16.3)	50 (15.5)	61 (17.5)	63 (15.4)	15 (12.9)	189 (15.8)
≥10 ครั้ง	104 (30.4)	108 (35.4)	58 (23.9)	31 (15.5)	301 (27.6)	74 (22.9)	77 (22.1)	101 (24.8)	16 (13.8)	268 (22.4)
บางครั้ง	-	1 (0.3)	-	-	1 (0.1)	3 (0.9)	1 (0.3)	-	-	4 (0.3)
หลายครั้ง	84 (24.6)	72 (23.6)	82 (33.7)	74 (37.0)	312 (28.6)	111 (34.4)	106 (30.5)	95 (23.3)	44 (37.9)	356 (29.8)
จำไม่ได้	8 (2.3)	3 (1.0)	3 (1.2)	3 (1.5)	17 (1.6)	4 (1.2)	1 (0.3)	4 (1.0)	10 (8.6)	19 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(66)	(70)	(82)	(153)	(371)	(51)	(85)	(125)	(94)	(355)
รวม	342(100.0)	305(100.0)	243(100.0)	200(100.0)	1090(100.0)	323(99.9)	348(100.0)	408(100.0)	116(99.9)	1195(99.9)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	298 (79.5)	286 (81.5)	256 (84.5)	249 (83.8)	1089 (82.1)	280 (77.1)	323 (79.6)	433 (85.4)	147 (83.5)	1183 (81.5)
เบียร์	307 (81.9)	304 (86.6)	279 (92.1)	245 (82.5)	1135 (85.6)	331 (91.2)	382 (94.1)	473 (93.3)	157 (89.2)	1343 (92.5)
Spy/ไวน์	215 (57.3)	203 (57.8)	185 (61.1)	148 (49.8)	751 (56.6)	209 (57.6)	295 (72.7)	334 (65.9)	102 (58.0)	940 (64.7)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	58 (15.5)	73 (20.8)	76 (25.1)	78 (26.3)	285 (21.5)	61 (16.8)	90 (22.2)	123 (24.3)	44 (25.0)	318 (21.9)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วิทยุ										
เคยเห็น*	166 (40.2)	162 (42.4)	86 (25.8)	162 (44.4)	576 (38.6)	114 (30.2)	142 (32.6)	157 (29.3)	99 (45.8)	512 (32.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	62 (45.9)	43 (32.1)	13 (21.0)	28 (41.8)	146 (36.7)	49 (51.0)	45 (41.7)	49 (40.8)	20 (44.4)	163 (44.2)
5-9 ครั้ง	21 (15.6)	17 (12.7)	13 (21.0)	9 (13.4)	60 (15.1)	12 (12.5)	8 (7.4)	11 (9.2)	3 (6.7)	34 (9.2)
≥10 ครั้ง	21 (15.6)	52 (38.8)	18 (29.0)	3 (4.5)	94 (23.6)	13 (13.5)	16 (14.8)	33 (27.5)	2 (4.4)	64 (17.3)
บางครั้ง	1 (0.7)	2 (1.5)	1 (1.6)	-	4 (1.0)	1 (1.0)	3 (2.8)	-	-	4 (1.1)
หลายครั้ง	27 (20.0)	18 (13.4)	16 (25.8)	24 (35.8)	85 (21.4)	19 (19.8)	35 (32.4)	25 (20.8)	17 (37.8)	96 (26.0)
จำไม่ได้	3 (2.2)	2 (1.5)	1 (1.6)	3 (4.5)	9 (2.3)	2 (2.1)	1 (0.9)	2 (1.7)	3 (6.7)	8 (2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(31)	(28)	(24)	(95)	(178)	(18)	(34)	(37)	(54)	(143)
รวม	135(100.0)	134(100.0)	62(100.0)	67(100.0)	398(100.1)	96(99.9)	108(100.0)	120(100.0)	45(100.0)	369(100.0)

ตารางที่ 2.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	85 (60.7)	90 (62.1)	52 (65.0)	93 (77.5)	320 (66.0)	60 (58.3)	74 (57.4)	85 (58.2)	40 (58.8)	259 (58.1)
เบียร์	106 (75.7)	123 (84.8)	63 (78.8)	84 (70.0)	376 (77.5)	75 (72.8)	105 (81.4)	111 (76.0)	53 (77.9)	344 (77.1)
Spy/ไวน์	51 (36.4)	66 (45.5)	39 (48.8)	42 (35.0)	198 (40.8)	30 (29.1)	58 (45.0)	64 (43.8)	25 (36.8)	177 (39.7)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	16 (11.4)	23 (15.9)	20 (25.0)	30 (25.0)	89 (18.4)	10 (9.7)	19 (14.7)	16 (11.0)	9 (13.2)	54 (12.1)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	277 (67.1)	265 (69.4)	193 (58.0)	247 (67.7)	982 (65.8)	230 (60.8)	295 (67.7)	352 (65.7)	142 (65.7)	1019 (65.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	105 (44.7)	83 (39.5)	56 (38.4)	51 (43.2)	295 (41.6)	87 (44.4)	99 (45.4)	122 (47.3)	25 (38.5)	333 (45.2)
5-9 ครั้ง	46 (19.6)	31 (14.8)	15 (10.3)	12 (10.2)	104 (14.7)	25 (12.8)	27 (12.4)	34 (13.2)	7 (10.8)	93 (12.6)
≥10 ครั้ง	44 (18.7)	68 (32.4)	37 (25.3)	11 (9.3)	160 (22.6)	31 (15.8)	33 (15.1)	52 (20.2)	4 (6.2)	120 (16.3)
บางครั้ง	2 (0.9)	2 (1.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	5 (0.7)	2 (1.0)	5 (2.3)	3 (1.2)	1 (1.5)	11 (1.5)
หลายครั้ง	34 (14.5)	22 (10.5)	36 (24.7)	41 (34.7)	133 (18.8)	48 (24.5)	53 (24.3)	45 (17.4)	25 (38.5)	171 (23.2)
จำไม่ได้	4 (1.7)	4 (1.9)	1 (0.7)	3 (2.5)	12 (1.7)	3 (1.5)	1 (0.5)	2 (0.8)	3 (4.6)	9 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(55)	(47)	(129)	(273)	(34)	(77)	(94)	(77)	(282)
รวม	235(100.1)	210(100.1)	146(100.1)	118(99.9)	709(100.1)	196(100.0)	218(100.0)	258(100.1)	65(100.1)	737(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	165 (66.8)	172 (71.1)	141 (77.9)	150 (75.8)	628 (72.4)	135 (61.9)	197 (71.9)	245 (74.0)	75 (71.4)	652 (70.3)
เบียร์	175 (70.9)	205 (84.7)	149 (82.3)	166 (83.8)	695 (80.1)	177 (81.2)	222 (81.0)	289 (87.3)	79 (75.2)	767 (82.7)
Spy/ไวน์	108 (43.7)	111 (45.9)	93 (51.4)	96 (48.5)	408 (47.0)	90 (41.3)	141 (51.5)	158 (47.7)	62 (59.0)	451 (48.6)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	29 (11.7)	35 (14.5)	31 (17.1)	42 (21.2)	137 (15.8)	16 (7.3)	39 (14.2)	52 (15.7)	19 (18.1)	126 (13.6)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นิตยสาร										
เคยเห็น*	171 (41.4)	195 (51.0)	128 (38.4)	173 (47.4)	667 (44.7)	164 (43.7)	214 (49.1)	279 (52.2)	112 (51.9)	769 (49.2)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	55 (41.4)	64 (42.1)	28 (30.1)	38 (49.4)	185 (40.7)	58 (42.3)	65 (44.8)	94 (48.2)	15 (30.0)	232 (44.0)
5-9 ครั้ง	19 (14.3)	18 (11.8)	22 (23.7)	11 (14.3)	70 (15.4)	26 (19.0)	11 (7.6)	22 (11.3)	6 (12.0)	65 (12.3)
≥10 ครั้ง	33 (24.8)	49 (32.2)	21 (22.6)	5 (6.5)	108 (23.7)	19 (13.9)	36 (24.8)	36 (18.5)	5 (10.0)	96 (18.2)
บางครั้ง	-	3 (2.0)	1 (1.1)	-	4 (0.9)	3 (2.2)	3 (2.1)	1 (0.5)	1 (2.0)	8 (1.5)
หลายครั้ง	21 (15.8)	16 (10.5)	20 (21.5)	21 (27.3)	78 (17.1)	28 (20.4)	30 (20.7)	40 (20.5)	20 (40.0)	118 (22.4)
จำไม่ได้	5 (3.8)	2 (1.3)	1 (1.1)	2 (2.6)	10 (2.2)	3 (2.2)	-	2 (1.0)	3 (6.0)	8 (1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(38)	(43)	(35)	(96)	(212)	(27)	(69)	(84)	(62)	(242)
รวม	133(100.1)	152(99.9)	93(100.1)	77(100.1)	455(100.0)	137(100.0)	145(100.0)	195(100.0)	50(100.0)	527(99.9)

ตารางที่ 2.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	77 (55.8)	109 (63.0)	89 (76.1)	97 (74.6)	372 (66.7)	87 (56.9)	113 (59.2)	178 (69.0)	54 (65.9)	432 (63.2)
เบียร์	91 (65.9)	133 (76.9)	92 (78.6)	97 (74.6)	413 (74.0)	104 (68.0)	153 (80.1)	199 (77.1)	59 (72.0)	515 (75.3)
Spy/ไวน์	70 (50.7)	92 (53.2)	73 (62.4)	63 (48.5)	298 (53.4)	87 (56.9)	131 (68.6)	155 (60.1)	48 (58.5)	421 (61.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	12 (8.7)	36 (20.8)	32 (27.4)	33 (25.4)	113 (20.3)	24 (15.7)	37 (19.4)	63 (24.4)	18 (22.0)	142 (20.8)
อื่นๆ เช่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผ่านป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	251 (60.8)	253 (66.2)	183 (55.0)	219 (60.0)	906 (60.7)	228 (60.3)	285 (65.4)	336 (62.7)	132 (61.1)	981 (62.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	100 (47.8)	83 (41.3)	61 (43.6)	43 (37.7)	287 (43.2)	98 (50.5)	100 (46.9)	129 (53.3)	30 (47.6)	357 (50.1)
5-9 ครั้ง	28 (13.4)	31 (15.4)	17 (12.1)	13 (11.4)	89 (13.4)	32 (16.5)	32 (15.0)	20 (8.3)	4 (6.3)	88 (12.4)
≥10 ครั้ง	36 (17.2)	62 (30.8)	28 (20.0)	22 (19.3)	148 (22.3)	25 (12.9)	31 (14.6)	41 (16.9)	5 (7.9)	102 (14.3)
บางครั้ง	1 (0.5)	1 (0.5)	1 (0.7)	2 (1.8)	5 (0.8)	1 (0.5)	5 (2.3)	5 (2.1)	1 (1.6)	12 (1.7)
หลายครั้ง	38 (18.2)	22 (10.9)	31 (22.1)	31 (27.2)	122 (18.4)	35 (18.0)	44 (20.7)	45 (18.6)	20 (31.7)	144 (20.2)
จำไม่ได้	6 (2.9)	2 (1.0)	2 (1.4)	3 (2.6)	13 (2.0)	3 (1.5)	1 (0.5)	2 (0.8)	3 (4.8)	9 (1.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(52)	(43)	(105)	(242)	(34)	(72)	(94)	(69)	(269)
รวม	209(100.0)	201(99.9)	140(99.9)	114(100.0)	664(100.1)	194(99.9)	213(100.0)	242(100.0)	63(99.9)	712(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	129 (58.6)	159 (69.1)	122 (71.8)	121 (71.2)	531 (67.2)	126 (58.3)	183 (68.8)	225 (72.6)	69 (69.7)	603 (67.7)
เบียร์	180 (81.8)	192 (83.5)	144 (84.7)	144 (84.7)	660 (83.5)	182 (84.3)	240 (90.2)	267 (86.1)	78 (78.8)	767 (86.1)
Spy/ไวน์	97 (44.1)	110 (47.8)	86 (50.6)	82 (48.2)	375 (47.5)	98 (45.4)	153 (57.5)	159 (51.3)	55 (55.6)	465 (52.2)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	35 (15.9)	34 (14.8)	41 (24.1)	33 (19.4)	143 (18.1)	28 (13.0)	41 (15.4)	61 (19.7)	19 (19.2)	149 (16.7)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผ่านปลิว										
เคยเห็น*	122 (29.5)	132 (34.6)	46 (13.8)	130 (35.7)	430 (28.8)	85 (22.5)	86 (19.7)	81 (15.1)	73 (33.8)	325 (20.8)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	49 (48.5)	42 (41.6)	16 (50.0)	28 (51.9)	135 (46.9)	38 (51.4)	21 (36.8)	31 (51.7)	13 (43.3)	103 (46.6)
5-9 ครั้ง	12 (11.9)	9 (8.9)	6 (18.8)	5 (9.3)	32 (11.1)	8 (10.8)	8 (14.0)	2 (3.3)	3 (10.0)	21 (9.5)
≥10 ครั้ง	18 (17.8)	39 (38.6)	4 (12.5)	2 (3.7)	63 (21.9)	7 (9.5)	11 (19.3)	11 (18.3)	1 (3.3)	30 (13.6)
บางครั้ง	1 (1.0)	1 (1.0)	-	-	2 (0.7)	2 (2.7)	1 (1.8)	-	1 (3.3)	4 (1.8)
หลายครั้ง	17 (16.8)	9 (8.9)	5 (15.6)	17 (31.5)	48 (16.7)	17 (23.0)	15 (26.3)	16 (26.7)	9 (30.0)	57 (25.8)
จำไม่ได้	4 (4.0)	1 (1.0)	1 (3.1)	2 (3.7)	8 (2.8)	2 (2.7)	1 (1.8)	-	3 (10.0)	6 (2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(31)	(14)	(76)	(142)	(11)	(29)	(21)	(43)	(104)
รวม	101(100.0)	101(100.1)	32(100.0)	54(100.1)	288(100.1)	74(100.1)	57(100.0)	60(100.0)	30(99.9)	221(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	59 (58.4)	76 (63.9)	30 (68.2)	58 (67.4)	223 (63.7)	48 (60.8)	51 (68.9)	50 (70.4)	25 (50.0)	174 (63.5)
เบียร์	66 (65.3)	93 (78.2)	34 (77.3)	66 (76.7)	259 (74.0)	55 (69.6)	59 (79.7)	56 (78.9)	33 (66.0)	203 (74.1)
Spy/ไวน์	42 (41.6)	47 (39.5)	31 (70.5)	32 (37.2)	152 (43.4)	49 (62.0)	42 (56.8)	42 (59.2)	24 (48.0)	157 (57.3)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	12 (11.9)	20 (16.8)	8 (18.2)	18 (20.9)	58 (16.6)	9 (11.4)	14 (18.9)	13 (18.3)	11 (22.0)	47 (17.2)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ผ่านปิดประกาศ										
เคยเห็น*	126 (30.5)	133 (34.8)	67 (20.1)	136 (37.3)	462 (30.9)	84 (22.2)	91 (20.9)	96 (17.9)	73 (33.8)	344 (22.0)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	44 (45.8)	35 (33.3)	13 (28.9)	24 (42.1)	116 (38.3)	32 (45.1)	29 (45.3)	39 (53.4)	10 (35.7)	110 (46.6)
5-9 ครั้ง	10 (10.4)	16 (15.2)	6 (13.3)	6 (10.5)	38 (12.5)	8 (11.3)	3 (4.7)	3 (4.1)	2 (7.1)	16 (6.8)
≥10 ครั้ง	20 (20.8)	39 (37.1)	10 (22.2)	5 (8.8)	74 (24.4)	17 (23.9)	14 (21.9)	14 (19.2)	1 (3.6)	46 (19.5)
บางครั้ง	2 (2.1)	1 (1.0)	-	-	3 (1.0)	1 (1.4)	1 (1.6)	-	1 (3.6)	3 (1.3)
หลายครั้ง	16 (16.7)	13 (12.4)	15 (33.3)	20 (35.1)	64 (21.1)	11 (15.5)	17 (26.6)	17 (23.3)	11 (39.3)	56 (23.7)
จำไม่ได้	4 (4.2)	1 (1.0)	1 (2.2)	2 (3.5)	8 (2.6)	2 (2.8)	-	-	3 (10.7)	5 (2.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(28)	(22)	(79)	(159)	(13)	(27)	(23)	(45)	(108)
รวม	96(100.0)	105(100.0)	45(99.9)	57(100.0)	303(99.9)	71(100.0)	64(100.1)	73(100.0)	28(100.0)	236(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	57 (55.9)	89 (74.8)	44 (72.1)	64 (72.7)	254 (68.6)	45 (59.2)	54 (65.9)	66 (75.0)	32 (68.1)	197 (67.2)
เบียร์	74 (72.5)	87 (73.1)	53 (86.9)	70 (79.5)	284 (76.8)	55 (72.4)	70 (85.4)	74 (84.1)	33 (70.2)	232 (79.2)
Spy/ไวน์	46 (45.1)	53 (44.5)	36 (59.0)	35 (39.8)	170 (45.9)	35 (46.1)	50 (61.0)	50 (56.8)	27 (57.4)	162 (55.3)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	14 (13.7)	23 (19.3)	14 (23.0)	18 (20.5)	69 (18.6)	11 (14.5)	16 (19.5)	15 (17.0)	12 (25.5)	54 (18.4)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	240 (58.1)	230 (60.2)	168 (50.5)	190 (52.1)	828 (55.5)	188 (49.7)	226 (51.8)	282 (52.6)	125 (57.9)	821 (52.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	85 (43.8)	60 (33.3)	37 (32.2)	34 (43.0)	216 (38.0)	74 (47.1)	68 (42.0)	86 (41.3)	16 (30.2)	244 (42.1)
5-9 ครั้ง	24 (12.4)	26 (14.4)	13 (11.3)	8 (10.1)	71 (12.5)	23 (14.7)	14 (8.6)	18 (8.7)	7 (13.2)	62 (10.7)
≥10 ครั้ง	39 (20.1)	69 (38.3)	28 (24.3)	6 (7.6)	142 (25.0)	25 (15.9)	38 (23.5)	48 (23.1)	4 (7.5)	115 (19.8)
บางครั้ง	1 (0.5)	-	1 (0.9)	-	2 (0.4)	1 (0.6)	3 (1.9)	4 (1.9)	2 (3.8)	10 (1.7)
หลายครั้ง	41 (21.1)	24 (13.3)	35 (30.4)	28 (35.4)	128 (22.5)	31 (19.7)	39 (24.1)	51 (24.5)	21 (39.6)	142 (24.5)
จำไม่ได้	4 (2.1)	1 (0.6)	1 (0.9)	3 (3.8)	9 (1.6)	3 (1.9)	-	1 (0.5)	3 (5.7)	7 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(46)	(50)	(53)	(111)	(260)	(31)	(64)	(74)	(72)	(241)
รวม	194(100.0)	180(99.9)	115(100.0)	79(99.9)	568(100.0)	157(99.9)	162(100.1)	208(100.0)	53(100.0)	580(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	151 (71.9)	159 (75.0)	130 (83.3)	115 (82.7)	555 (77.4)	132 (72.5)	153 (74.6)	209 (79.8)	78 (82.1)	572 (76.9)
เบียร์	156 (74.3)	176 (83.0)	135 (86.5)	113 (81.3)	580 (80.9)	142 (78.0)	171 (83.4)	231 (88.2)	79 (83.2)	623 (83.7)
Spy/ไวน์	125 (59.5)	132 (62.3)	110 (70.5)	74 (53.2)	441 (61.5)	116 (63.7)	155 (75.6)	192 (73.3)	69 (72.6)	532 (71.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	44 (21.0)	61 (28.8)	54 (34.6)	50 (36.0)	209 (29.1)	46 (25.3)	64 (31.2)	89 (34.0)	33 (34.7)	232 (31.2)
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 2.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเห็น/ได้ยินโฆษณาทงวิทยุ/โทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น)*										
16.00-20.00 น.	135 (35.5)	81 (22.8)	40 (12.6)	78 (23.6)	334 (24.1)	144 (41.0)	88 (21.7)	81 (15.7)	49 (24.0)	362 (24.5)
20.00-24.00 น.	146 (38.4)	176 (49.6)	157 (49.4)	134 (40.5)	613 (44.3)	143 (40.7)	227 (55.9)	292 (56.6)	86 (42.2)	748 (50.6)
24.00-04.00 น.	56 (14.7)	72 (20.3)	109 (34.3)	100 (30.2)	337 (24.3)	38 (10.8)	75 (18.5)	119 (23.1)	50 (24.5)	282 (19.1)
04.00-08.00 น.	6 (1.6)	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.6)	10 (0.7)	5 (1.4)	1 (0.2)	2 (0.4)	2 (1.0)	10 (0.7)
08.00-12.00 น.	17 (4.5)	7 (2.0)	3 (0.9)	7 (2.1)	34 (2.5)	8 (2.3)	5 (1.2)	6 (1.2)	10 (4.9)	29 (2.0)
12.00-16.00 น.	20 (5.3)	18 (5.1)	8 (2.5)	10 (3.0)	56 (4.0)	13 (3.7)	10 (2.5)	16 (3.1)	7 (3.4)	46 (3.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(38)	(27)	(15)	(34)	(114)	(28)	(30)	(22)	(15)	(95)
รวม	380(100.0)	355(100.1)	318(100.0)	331(100.0)	1384(99.9)	351(99.9)	406(100.0)	516(100.1)	204(100.0)	1477(100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	194 (49.6)	171 (46.7)	100 (30.2)	167 (47.9)	632 (44.0)	169 (46.2)	187 (44.3)	155 (29.2)	91 (44.2)	602 (39.5)
จำได้	197 (50.4)	195 (53.3)	231 (69.8)	182 (52.1)	805 (56.0)	197 (53.8)	235 (55.7)	376 (70.8)	115 (55.8)	923 (60.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(16)	(2)	(16)	(61)	(13)	(14)	(7)	(13)	(47)
รวม	391(100.0)	366(100.0)	331(100.0)	349(100.0)	1437(100.0)	366(100.0)	422(100.0)	531(100.0)	206(100.0)	1525(100.0)
เครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง	ข้าง
อันดับ2	รีเจนซี่/สปาย ไวน์คูลเลอร์	ลิโอ/ ไฮนาเกิน	รีเจนซี่	ลิโอ/รีเจนซี่	รีเจนซี่	รีเจนซี่	รีเจนซี่	รีเจนซี่	รีเจนซี่	รีเจนซี่
อันดับ3	ลิโอ	สิงห์	จอห์นนี่วอค เกอร์	จอห์นนี่วอค เกอร์	ลิโอ	สิงห์	สปายไวน์คูล เลอร์	สิงห์	ลิโอ	สิงห์
เครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	สปายไวน์คูล เลอร์	ข้าง	จอห์นนี่วอค เกอร์	จอห์นนี่วอค เกอร์	จอห์นนี่วอค เกอร์	สปายไวน์คูล เลอร์	สปายไวน์คูล เลอร์	สปายไวน์คูล เลอร์	สปายไวน์คูล เลอร์	สปายไวน์คูล เลอร์
อันดับ2	ข้าง	จอห์นนี่วอค เกอร์	สปายไวน์คูล เลอร์	ลิโอ	ข้าง	จอห์นนี่/ รีเจนซี่/ข้าง	ไฮนาเกิน	ไฮนาเกิน	รีเจนซี่	ไฮนาเกิน
อันดับ3	จอห์นนี่วอค เกอร์	ลิโอ	ข้าง/ไวน์	เหล่าขาว	สปายไวน์คูล เลอร์	สิงห์/อาซา/ ไวน์	บาคาดี	จอห์นนี่/ บาคาดี	ไฮนาเกิน	จอห์นนี่วอค เกอร์

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ

ประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดที่รู้จักและเคยเห็นของจริง

ตารางที่ 2.15 ชนิดของสิ่งเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา) (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด 3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ฝิ่น	ฝิ่น	เฮโรอีน	กระท่อม	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	เฮโรอีน	ฝิ่น	ฝิ่น
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	กระท่อม	กัญชา	ยาบ้า	กัญชา	กัญชา	กระท่อม/ กัญชา	สารระเหย	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	ยาบ้า	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	สารระเหย	ยาบ้า	สารระเหย	กัญชา	สารระเหย
อันดับ 3	ยาบ้า	สารระเหย	เฮโรอีน	กระท่อม	กระท่อม	ยาบ้า	กัญชา	เฮโรอีน	กระท่อม	กัญชา
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดครั้งสุดท้าย										
ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	ตำรวจ
อันดับ 2	ตำรวจ	ญาติ/คนใน ครอบครัว	โรงเรียน	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ตำรวจ	นิทรรศการ/ โรงเรียน	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	นิทรรศการ
อันดับ 3	ญาติ/คนใน ครอบครัว	เพื่อนใช้	นิทรรศการ	แถวบ้าน เพื่อน	เพื่อนใช้	นิทรรศการ	เพื่อนใช้/ นิทรรศการ	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	คนขายสารฯ	แถวบ้านมีชาย มีคินใช้
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมีชาย มีคินใช้
อันดับ 2	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้าน เพื่อน	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ญาติ/คนใน ครอบครัว	นิทรรศการ	นิทรรศการ	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้
อันดับ 3	นิทรรศการ	ญาติ/คนใน ครอบครัว	ญาติ/คนใน ครอบครัว	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้าน เพื่อน	นิทรรศการ	ญาติ/คนใน ครอบครัว	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้าน เพื่อน	นิทรรศการ
สารระเหย : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด	ร้านค้าทั่วไป/ ร้านซอมรด
อันดับ 2	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ญาติ/คนใน ครอบครัว	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	แถวบ้านมีชาย มีคินใช้
อันดับ 3	ตำรวจ	ญาติฯ/เพื่อน	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชายมีคินใช้	ญาติ/คนใน ครอบครัว	ญาติ/คนใน ครอบครัว	-	ญาติ/คนใน ครอบครัว

ตารางที่ 2.16 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	50 (9.5)	76 (16.3)	61 (15.6)	181 (42.4)	368 (20.3)	21 (4.8)	34 (6.9)	37 (6.1)	43 (17.2)	135 (7.5)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	16 (3.0)	18 (3.9)	8 (2.0)	23 (5.4)	65 (3.6)	8 (1.8)	8 (1.6)	8 (1.3)	11 (4.4)	35 (2.0)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	2 (0.4)	8 (1.7)	9 (2.3)	15 (3.5)	34 (1.9)	5 (1.1)	8 (1.6)	11 (1.8)	8 (3.2)	32 (1.8)
d. ยานอนหลับ	20 (3.8)	25 (5.4)	20 (5.1)	24 (5.6)	89 (4.9)	24 (5.4)	35 (7.1)	45 (7.4)	30 (12.1)	134 (7.5)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	5 (0.9)	12 (2.6)	7 (1.8)	49 (11.5)	73 (4.0)	-	3 (0.6)	2 (0.3)	7 (2.8)	12 (0.7)
f. กัญชา	7 (1.3)	17 (3.6)	14 (3.6)	82 (19.2)	120 (6.6)	2 (0.5)	6 (1.2)	4 (0.7)	9 (3.6)	21 (1.2)
g. ฝิ่น	3 (0.6)	3 (0.6)	0 (0.0)	11 (2.6)	17 (0.9)	-	2 (0.4)	1 (0.2)	2 (0.8)	5 (0.3)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	3 (0.6)	4 (0.9)	1 (0.3)	12 (2.8)	20 (1.1)	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.3)	2 (0.8)	6 (0.3)
i. ยาเค (เคตามีน)	-	1 (0.2)	-	7 (1.7)	8 (0.4)	-	-	-	2 (0.8)	2 (0.1)
j. โคเคน	-	1 (0.2)	-	4 (0.9)	5 (0.3)	-	-	-	2 (0.8)	2 (0.1)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	1 (0.2)	2 (0.4)	-	8 (1.9)	11 (0.6)	-	1 (0.2)	-	2 (0.8)	3 (0.2)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	6 (1.1)	7 (1.5)	1 (0.3)	16 (3.8)	30 (1.7)	6 (1.4)	1 (0.2)	3 (0.5)	2 (0.8)	12 (0.7)
m. ยาบ้า	-	7 (1.5)	3 (0.8)	38 (9.0)	48 (2.7)	-	1 (0.2)	-	7 (2.8)	8 (0.4)
n. ไอซ์	1 (0.2)	3 (0.6)	1 (0.3)	15 (3.6)	20 (1.1)	-	1 (0.2)	2 (0.3)	4 (1.6)	7 (0.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 2.17 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	38 (7.2)	60 (12.9)	45 (11.5)	152 (35.9)	295 (16.3)	14 (3.2)	30 (6.1)	18 (3.0)	29 (11.6)	91 (5.1)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	8 (1.5)	12 (2.6)	4 (1.0)	5 (1.2)	29 (1.6)	4 (0.9)	6 (1.2)	5 (0.8)	4 (1.6)	19 (1.1)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.5)	4 (0.9)	12 (0.7)	4 (0.9)	4 (0.8)	9 (1.5)	3 (1.2)	20 (1.1)
d. ยานอนหลับ	10 (1.9)	16 (3.4)	11 (2.8)	11 (2.6)	48 (2.7)	19 (4.3)	24 (4.8)	27 (4.4)	17 (6.9)	87 (4.9)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	3 (0.6)	9 (1.9)	4 (1.0)	24 (5.6)	40 (2.2)	-	1 (0.2)	2 (0.3)	2 (0.8)	5 (0.3)
f. กัญชา	4 (0.8)	10 (2.2)	7 (1.8)	59 (13.9)	80 (4.4)	1 (0.2)	5 (1.0)	2 (0.3)	7 (2.8)	15 (0.8)
g. ฝิ่น	-	1 (0.2)	-	2 (0.5)	3 (0.2)	-	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.4)	3 (0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	-	2 (0.4)	-	4 (0.9)	6 (0.3)	1 (0.2)	-	2 (0.3)	1 (0.4)	4 (0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	-	-	-	1 (0.2)	1 (0.1)	-	-	-	1 (0.4)	1 (0.1)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	-	-	-	1 (0.2)	1 (0.1)	-	-	-	1 (0.4)	1 (0.1)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	4 (0.8)	2 (0.4)	1 (0.3)	8 (1.9)	15 (0.8)	5 (1.1)	-	1 (0.2)	1 (0.4)	7 (0.4)
l. ยาบ้า	-	4 (0.9)	2 (0.5)	28 (6.6)	34 (1.9)	-	1 (0.2)	-	3 (1.2)	4 (0.2)
m. ไอซ์	-	-	-	7 (1.6)	7 (0.4)	-	1 (0.2)	2 (0.3)	1 (0.4)	4 (0.2)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 2.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	11 (28.9)	21 (35.0)	27 (60.0)	78 (51.3)	137 (46.4)	5 (35.7)	9 (30.0)	8 (44.4)	14 (48.3)	36 (39.6)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	2 (25.0)	3 (25.0)	-	-	5 (17.2)	1 (25.0)	1 (16.7)	1 (20.0)	-	3 (15.8)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	-	1 (100.0)	-	2 (50.0)	3 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)	1 (11.1)	1 (33.3)	5 (25.0)
d. ยานอนหลับ	3 (30.0)	3 (18.8)	3 (27.3)	3 (27.3)	12 (25.0)	8 (42.1)	4 (16.7)	4 (14.8)	7 (41.2)	23 (26.4)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	-	3 (33.3)	-	9 (37.5)	12 (30.0)	-	-	-	-	-
f. กัญชา	2 (50.0)	2 (20.0)	2 (28.6)	23 (39.0)	29 (36.3)	1 (100.0)	2 (40.0)	-	-	3 (20.0)
g. ฝิ่น	-	1 (100.0)	-	-	1 (33.3)	-	-	-	-	-
h. ยาอี/ยาเลิฟ	-	-	-	-	-	-	-	1 (50.0)	-	1 (25.0)
i. ยาเค (เคตารีน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j. ผงขาว/เฮโรอีน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1 (25.0)	2 (100.0)	-	-	3 (20.0)	4 (80.0)	-	-	-	4 (57.1)
l. ยาบ้า	-	1 (25.0)	2 (100.0)	15 (53.6)	18 (52.9)	-	1 (100.0)	-	-	1 (25.0)
m. ไอซ์	-	-	-	4 (57.1)	4 (57.1)	-	1 (100.0)	-	-	1 (25.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

ตารางที่ 2.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	307 (61.6)	306 (69.9)	262 (71.4)	236 (65.9)	1111 (66.9)	237 (55.9)	274 (57.6)	376 (63.2)	101 (47.6)	988 (57.9)
มี	191 (38.4)	132 (30.1)	105 (28.6)	122 (34.1)	550 (33.1)	187 (44.1)	202 (42.4)	219 (36.8)	111 (52.4)	719 (42.1)
ไม่ระบุ(จำนวน)	(32)	(34)	(28)	(91)	(185)	(20)	(20)	(15)	(47)	(102)
รวม	498(100.0)	438(100.0)	367(100.0)	358(100.0)	1661(100.0)	424(100.0)	476(100.0)	595(100.0)	212(100.0)	1707(100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
แม่	31 (16.2)	15 (11.4)	11 (10.5)	16 (13.1)	73 (13.3)	38 (20.3)	19 (9.4)	21 (9.6)	18 (16.2)	96 (13.4)
พ่อ	120 (62.8)	65 (49.2)	55 (52.4)	66 (54.1)	306 (55.6)	115 (61.5)	118 (58.4)	126 (57.5)	66 (59.5)	425 (59.1)
แม่เลี้ยง	2 (1.0)	5 (3.8)	(0.0)	1 (0.8)	8 (1.5)	1 (0.5)	1 (0.5)	2 (0.9)	1 (0.9)	5 (0.7)
พ่อเลี้ยง	1 (0.5)	4 (3.0)	1 (1.0)	1 (0.8)	7 (1.3)	4 (2.1)	2 (1.0)	3 (1.4)	4 (3.6)	13 (1.8)
พี่น้อง	35 (18.3)	17 (12.9)	11 (10.5)	33 (27.0)	96 (17.5)	38 (20.3)	49 (24.3)	34 (15.5)	29 (26.1)	150 (20.9)
ปู่/ย่า	26 (13.6)	22 (16.7)	6 (5.7)	18 (14.8)	72 (13.1)	25 (13.4)	25 (12.4)	22 (10.0)	8 (7.2)	80 (11.1)
ตา/ยาย	25 (13.1)	29 (22.0)	11 (10.5)	23 (18.9)	88 (16.0)	31 (16.6)	29 (14.4)	21 (9.6)	12 (10.8)	93 (12.9)
ญาติฝ่ายพ่อ	65 (34.0)	44 (33.3)	32 (30.5)	42 (34.4)	183 (33.3)	100 (53.5)	83 (41.1)	80 (36.5)	48 (43.2)	311 (43.3)
ญาติฝ่ายแม่	52 (27.2)	41 (31.1)	30 (28.6)	39 (32.0)	162 (29.5)	73 (39.0)	65 (32.2)	70 (32.0)	41 (36.9)	249 (34.6)
แฟน	5 (2.6)	7 (5.3)	6 (5.7)	15 (12.3)	33 (6.0)	20 (10.7)	21 (10.4)	15 (6.8)	33 (29.7)	89 (12.4)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	8 (4.2)	5 (3.8)	4 (3.8)	7 (5.7)	24 (4.4)	4 (2.1)	7 (3.5)	7 (3.2)	3 (2.7)	21 (2.9)
พ่อ	81 (42.4)	53 (40.2)	51 (48.6)	52 (42.6)	237 (43.1)	85 (45.5)	80 (39.6)	102 (46.6)	55 (49.5)	322 (44.8)
แม่เลี้ยง	-	4 (3.0)	-	-	4 (0.7)	-	1 (0.5)	-	-	1 (0.1)
พ่อเลี้ยง	-	1 (0.8)	-	1 (0.8)	2 (0.4)	2 (1.1)	1 (0.5)	2 (0.9)	2 (1.8)	7 (1.0)
พี่น้อง	20 (10.5)	12 (9.1)	9 (8.6)	28 (23.0)	69 (12.5)	25 (13.4)	37 (18.3)	24 (11.0)	25 (22.5)	111 (15.4)
ปู่/ย่า	19 (9.9)	14 (10.6)	9 (8.6)	13 (10.7)	55 (10.0)	9 (4.8)	18 (8.9)	11 (5.0)	9 (8.1)	47 (6.5)
ตา/ยาย	15 (7.9)	14 (10.6)	7 (6.7)	10 (8.2)	46 (8.4)	12 (6.4)	19 (9.4)	12 (5.5)	9 (8.1)	52 (7.2)
ญาติฝ่ายพ่อ	49 (25.7)	33 (25.0)	26 (24.8)	32 (26.2)	140 (25.5)	46 (24.6)	67 (33.2)	67 (30.6)	37 (33.3)	217 (30.2)
ญาติฝ่ายแม่	39 (20.4)	32 (24.2)	21 (20.0)	25 (20.5)	117 (21.3)	34 (18.2)	47 (23.3)	55 (25.1)	26 (23.4)	162 (22.5)
แฟน	1 (0.5)	3 (2.3)	0 (0.0)	5 (4.1)	9 (1.6)	12 (6.4)	17 (8.4)	12 (5.5)	28 (25.2)	69 (9.6)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	-	-	-	5 (4.1)	5 (0.9)	-	1 (0.5)	-	-	1 (0.1)
พ่อ	-	-	1 (1.0)	6 (4.9)	7 (1.3)	1 (0.5)	4 (2.0)	2 (0.9)	-	7 (1.0)
แม่เลี้ยง	-	-	-	-	-	-	1 (0.5)	-	-	1 (0.1)
พ่อเลี้ยง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พี่น้อง	2 (1.0)	1 (0.8)	-	5 (4.1)	8 (1.5)	4 (2.1)	4 (2.0)	1 (0.5)	4 (3.6)	13 (1.8)
ปู่/ย่า	-	1 (0.8)	-	4 (3.3)	5 (0.9)	-	3 (1.5)	-	1 (0.9)	4 (0.6)
ตา/ยาย	-	1 (0.8)	-	4 (3.3)	5 (0.9)	-	2 (1.0)	-	1 (0.9)	3 (0.4)
ญาติฝ่ายพ่อ	2 (1.0)	1 (0.8)	-	5 (4.1)	8 (1.5)	4 (2.1)	2 (1.0)	-	3 (2.7)	9 (1.3)
ญาติฝ่ายแม่	3 (1.6)	1 (0.8)	1 (1.0)	5 (4.1)	10 (1.8)	-	-	4 (1.8)	2 (1.8)	6 (0.8)
แฟน	-	2 (1.5)	-	4 (3.3)	6 (1.1)	2 (1.1)	5 (2.5)	1 (0.5)	3 (2.7)	11 (1.5)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 2.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้ เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	348 (67.7)	335 (72.8)	289 (74.5)	252 (59.6)	1224 (68.6)	345 (78.6)	370 (74.7)	478 (79.0)	180 (73.5)	1373 (77.0)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	345 (67.1)	328 (71.3)	271 (70.0)	247 (58.4)	1191 (66.8)	344 (78.4)	352 (71.1)	429 (70.9)	177 (72.2)	1302 (73.0)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	313 (60.9)	302 (65.7)	277 (71.6)	218 (51.7)	1110 (62.3)	299 (68.1)	323 (65.3)	412 (68.2)	166 (67.8)	1200 (67.3)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	360 (70.0)	343 (74.6)	313 (80.9)	253 (59.8)	1269 (71.1)	344 (78.4)	390 (78.8)	487 (80.5)	195 (79.6)	1416 (79.4)
e. ยานอนหลับ	329 (64.0)	298 (64.9)	282 (72.7)	229 (54.3)	1138 (63.8)	297 (67.7)	337 (68.1)	406 (67.1)	169 (69.0)	1209 (67.8)
f. กระเทียม หรือ 4X100	372 (72.4)	365 (79.3)	336 (86.6)	264 (62.4)	1337 (74.9)	359 (81.8)	418 (84.4)	541 (89.4)	193 (78.8)	1511 (84.7)
g. กัญชา	388 (75.5)	378 (82.2)	341 (87.9)	275 (65.0)	1382 (77.4)	369 (84.1)	431 (87.1)	558 (92.2)	200 (81.6)	1558 (87.3)
h. ฝิ่น	387 (75.3)	376 (81.7)	343 (88.4)	284 (67.1)	1390 (77.9)	371 (84.5)	432 (87.3)	559 (92.4)	196 (80.0)	1558 (87.3)
i. ยาอี/ยาเอดส์	385 (74.9)	375 (81.5)	348 (89.7)	284 (67.1)	1392 (78.0)	373 (85.0)	436 (88.1)	557 (92.1)	201 (82.0)	1567 (87.8)
j. ยาเค (เคตามีน)	384 (74.7)	374 (81.3)	350 (90.2)	286 (67.6)	1394 (78.1)	372 (84.7)	434 (87.7)	556 (91.9)	201 (82.0)	1563 (87.6)
k. โคเคน	382 (74.3)	373 (81.1)	350 (90.2)	289 (68.3)	1394 (78.1)	369 (84.1)	435 (87.9)	556 (91.9)	205 (83.7)	1565 (87.7)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	384 (74.7)	374 (81.3)	349 (89.9)	292 (69.0)	1399 (78.4)	368 (83.8)	435 (87.9)	558 (92.2)	202 (82.4)	1563 (87.6)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	382 (74.5)	361 (78.5)	341 (87.9)	282 (66.7)	1366 (76.6)	361 (82.2)	428 (86.5)	543 (89.8)	201 (82.0)	1533 (85.9)
n. ยาบ้า	389 (75.7)	376 (81.7)	349 (90.2)	295 (69.7)	1409 (79.0)	377 (85.9)	439 (88.7)	560 (92.6)	204 (83.3)	1580 (88.6)
o. ไอซ์	383 (74.5)	371 (80.7)	344 (88.7)	285 (67.4)	1383 (77.5)	362 (82.5)	428 (86.5)	556 (91.9)	201 (82.0)	1547 (86.7)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 2.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจ ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	253 (49.5)	207 (45.1)	186 (47.9)	101 (24.0)	747 (42.0)	254 (57.9)	234 (47.3)	305 (50.2)	103 (42.2)	896 (50.2)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	241 (47.2)	177 (38.5)	127 (32.7)	81 (19.2)	626 (35.2)	213 (48.5)	190 (38.4)	201 (33.2)	70 (28.8)	674 (37.8)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	242 (47.4)	198 (43.0)	183 (47.2)	113 (26.8)	736 (41.3)	228 (51.9)	210 (42.4)	282 (46.5)	107 (43.9)	827 (46.3)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	271 (53.0)	221 (48.0)	201 (51.8)	123 (29.2)	816 (45.8)	246 (56.0)	236 (47.7)	313 (51.6)	128 (52.5)	923 (51.7)
e. ยานอนหลับ	194 (38.0)	159 (34.6)	134 (34.5)	99 (23.5)	586 (32.9)	160 (36.4)	149 (30.1)	191 (31.5)	85 (34.8)	585 (32.8)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	322 (62.8)	287 (62.3)	265 (68.5)	137 (32.3)	1011 (56.6)	320 (72.7)	341 (68.9)	472 (77.8)	144 (58.5)	1277 (71.4)
g. กล้วยชา	343 (66.9)	295 (64.0)	271 (70.0)	144 (34.0)	1053 (59.0)	331 (75.2)	349 (70.5)	480 (79.1)	146 (59.3)	1306 (73.0)
h. ฝิ่น	347 (67.6)	301 (65.3)	278 (71.8)	164 (38.7)	1090 (61.1)	332 (75.5)	353 (71.3)	486 (80.1)	153 (62.2)	1324 (74.0)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	346 (67.4)	304 (65.9)	280 (72.4)	164 (38.7)	1094 (61.3)	328 (74.5)	359 (72.5)	490 (80.7)	155 (63.0)	1332 (74.5)
j. ยาเค (เคตามีน)	334 (65.1)	305 (66.2)	280 (72.4)	167 (39.4)	1086 (60.8)	331 (75.2)	360 (72.7)	493 (81.2)	156 (63.4)	1340 (74.9)
k. โคเคน	339 (66.1)	306 (66.4)	280 (72.4)	169 (39.9)	1094 (61.3)	328 (74.5)	356 (71.9)	494 (81.4)	154 (62.6)	1332 (74.5)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	339 (66.1)	308 (66.8)	284 (73.4)	172 (40.6)	1103 (61.8)	324 (73.6)	358 (72.3)	495 (81.5)	159 (64.6)	1336 (74.7)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	340 (66.3)	299 (64.9)	275 (71.1)	176 (41.5)	1090 (61.1)	325 (73.9)	357 (72.1)	485 (79.9)	155 (63.0)	1322 (73.9)
n. ยาบ้า	351 (68.4)	305 (66.2)	287 (74.2)	177 (41.7)	1120 (62.7)	332 (75.5)	363 (73.3)	499 (82.2)	159 (64.6)	1353 (75.7)
o. ไอซ์	342 (66.8)	298 (64.6)	281 (72.8)	163 (38.8)	1084 (60.9)	327 (74.3)	357 (72.3)	483 (80.1)	151 (61.4)	1318 (73.9)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 2.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	37 (7.3)	35 (7.6)	21 (5.4)	31 (7.3)	124 (7.0)	28 (6.4)	29 (5.9)	25 (4.1)	16 (6.5)	98 (5.5)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	43 (8.4)	38 (8.2)	21 (5.4)	29 (6.8)	131 (7.3)	30 (6.9)	29 (5.9)	26 (4.3)	16 (6.5)	101 (5.7)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	125 (24.5)	97 (21.0)	59 (15.2)	69 (16.2)	350 (19.6)	92 (21.1)	86 (17.4)	86 (14.2)	45 (18.3)	309 (17.3)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	168 (32.9)	146 (31.7)	103 (26.5)	112 (26.4)	529 (29.7)	130 (29.8)	121 (24.4)	167 (27.5)	83 (33.7)	501 (28.1)
e. ยานอนหลับ	99 (19.4)	101 (21.9)	74 (19.1)	74 (17.4)	348 (19.5)	80 (18.3)	83 (16.8)	78 (12.9)	45 (18.3)	286 (16.0)
f. กระเทียม หรือ 4X100	217 (42.5)	202 (43.8)	213 (54.9)	121 (28.5)	753 (42.2)	188 (43.2)	225 (45.5)	336 (55.4)	105 (42.7)	854 (47.9)
g. กัญชา	233 (45.6)	214 (46.4)	214 (55.2)	125 (29.4)	786 (44.0)	196 (45.0)	229 (46.3)	352 (58.0)	104 (42.3)	881 (49.4)
h. ฝิ่น	251 (49.1)	238 (51.6)	238 (61.3)	178 (41.9)	905 (50.7)	205 (47.0)	254 (51.3)	374 (61.6)	127 (51.6)	960 (53.8)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	240 (47.0)	239 (51.8)	239 (61.6)	176 (41.4)	894 (50.1)	201 (46.1)	249 (50.3)	373 (61.4)	122 (49.6)	945 (53.0)
j. ยาเค (เคตามีน)	246 (48.1)	250 (54.2)	247 (63.7)	186 (43.8)	929 (52.0)	208 (47.7)	260 (52.5)	378 (62.3)	125 (51.0)	971 (54.5)
k. โคเคน	247 (48.3)	247 (53.6)	248 (63.9)	194 (45.6)	936 (52.4)	203 (46.6)	261 (52.7)	383 (63.1)	126 (51.2)	973 (54.5)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	236 (46.2)	242 (52.5)	239 (61.6)	182 (42.9)	899 (50.4)	188 (43.1)	239 (48.3)	372 (61.3)	121 (49.2)	920 (51.6)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	204 (39.9)	188 (40.8)	177 (45.6)	121 (28.5)	690 (38.7)	155 (35.6)	186 (37.7)	257 (42.3)	100 (40.7)	698 (39.2)
n. ยาบ้า	235 (46.0)	223 (48.4)	223 (57.5)	132 (31.1)	813 (45.5)	191 (43.8)	243 (49.1)	341 (56.2)	112 (45.5)	887 (49.7)
o. ไอซ์	241 (47.3)	237 (51.4)	240 (61.9)	168 (39.5)	886 (49.7)	195 (44.7)	250 (50.5)	368 (60.6)	126 (51.2)	939 (52.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 2.23 นักเรียนคิดว่า การดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ประหม่า เกือบเงิน สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	153 (29.5)	166 (36.1)	149 (38.2)	175 (41.4)	643 (35.9)	109 (24.8)	152 (30.7)	225 (37.1)	104 (41.9)	590 (33.0)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	78 (15.1)	114 (24.8)	134 (34.4)	150 (35.4)	476 (26.6)	46 (10.5)	88 (17.8)	138 (22.7)	63 (25.4)	335 (18.7)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	86 (16.6)	110 (23.9)	97 (24.9)	154 (36.3)	447 (24.9)	60 (13.7)	93 (18.8)	123 (20.3)	68 (27.4)	344 (19.3)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	76 (14.7)	99 (21.5)	94 (24.2)	167 (39.4)	436 (24.4)	33 (7.5)	52 (10.5)	104 (17.2)	58 (23.5)	247 (13.8)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	102 (19.7)	119 (25.9)	123 (31.5)	191 (45.0)	535 (29.9)	56 (12.8)	89 (18.0)	159 (26.2)	78 (31.5)	382 (21.4)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	108 (20.8)	132 (28.7)	137 (35.1)	196 (46.2)	573 (32.0)	72 (16.4)	101 (20.4)	200 (32.9)	78 (31.5)	451 (25.2)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	76 (14.6)	87 (18.9)	71 (18.1)	144 (33.6)	378 (21.0)	49 (11.2)	66 (13.3)	101 (16.6)	52 (21.0)	268 (15.0)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	159 (30.6)	179 (38.8)	184 (46.9)	249 (58.0)	771 (42.8)	110 (25.2)	172 (34.7)	265 (43.7)	98 (39.7)	645 (36.1)
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	111 (21.4)	108 (23.4)	111 (28.3)	173 (40.3)	503 (27.9)	53 (12.1)	74 (14.9)	112 (18.5)	60 (24.3)	299 (16.7)
j. ทำให้กินอาหารได้อร่อยมากขึ้น	75 (14.5)	87 (18.9)	86 (21.9)	135 (31.5)	383 (21.3)	49 (11.2)	69 (14.0)	91 (15.0)	49 (19.8)	258 (14.5)
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	86 (16.6)	86 (18.7)	92 (23.5)	147 (34.3)	411 (22.8)	52 (11.9)	62 (12.6)	82 (13.5)	48 (19.4)	244 (13.7)
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	55 (10.6)	54 (11.7)	59 (15.1)	107 (24.9)	275 (15.3)	41 (9.4)	46 (9.3)	65 (10.7)	35 (14.2)	187 (10.5)
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	39 (7.5)	54 (11.7)	49 (12.5)	101 (23.5)	243 (13.5)	29 (6.6)	28 (5.7)	38 (6.3)	30 (12.1)	125 (7.0)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	174 (33.5)	159 (34.5)	177 (45.2)	208 (48.5)	718 (39.9)	134 (30.7)	168 (34.0)	223 (36.8)	84 (34.0)	609 (34.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข้อมูลโรงเรียนภาคกลาง

จำนวนตัวอย่างแยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

จังหวัด	จำนวน โรงเรียน	ม. 1 (n=3951)		ม. 3 (n=3827)		ม. 5 (n=3582)		ปวช. 2 (n=1803)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. จังหวัดชัยนาท	5 โรงเรียน	164	244	211	163	118	278	136	63	1377
2. จังหวัดระยอง	5 โรงเรียน	238	118	203	155	171	269	52	147	1353
3. จังหวัดนครนายก	7 โรงเรียน	170	142	216	252	104	181	122	56	1243
4. จังหวัดอยุธยา	5 โรงเรียน	156	249	136	263	120	274	93	104	1395
5. จังหวัดชลบุรี	5 โรงเรียน	160	250	121	243	76	237	74	111	1272
6. จังหวัดกาญจนบุรี	5 โรงเรียน	260	124	235	133	183	217	87	2	1241
7. จังหวัดราชบุรี	5 โรงเรียน	278	124	267	109	207	175	56	145	1361
8. จังหวัดสมุทรสงคราม	5 โรงเรียน	244	222	204	211	117	200	102	93	1393
9. จังหวัดสระบุรี	5 โรงเรียน	144	272	134	165	105	220	102	96	1238
10. จังหวัดสระแก้ว	6 โรงเรียน	173	219	179	227	90	240	96	66	1290
รวม	53 โรงเรียน	1987	1964	1906	1921	1291	2291	920	883	13163

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ชัยนาทพิทยาคม	45	101	47	77	38	103	-	-	411
ครูประชาสรรค์	50	78	114	14	39	88	-	-	383
หันคาพิทยาคม	69	65	50	72	41	87	-	-	384
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท	-	-	-	-	-	-	121	30	151
พาณิชย์การชัยนาท	-	-	-	-	-	-	15	33	48
รวมจังหวัดชัยนาท	164	244	211	163	118	278	136	63	1377
ระยองวิทยาคม	80	74	58	89	31	114	-	-	446
แก่งวิทยสถาวร	52	43	56	64	59	68	-	-	342
อัสสัมชัญระยอง	106	-	90	-	81	89	-	-	366
วิทยาลัยเทคนิคระยอง	-	-	-	-	-	-	48	51	99
พาณิชย์การระยอง	-	-	-	-	-	-	4	96	100
รวมจังหวัดระยอง	238	117	204	153	171	271	52	147	1353
ปิยะชาติพัฒนา	41	13	59	89	38	53	-	-	293
บ้านนานายกพิทยากร	22	18	36	31	22	47	-	-	176
ปากพลีพิทยาคม	39	35	42	44	21	25	-	-	206
นวมราชานุสรณ์	68	76	79	88	23	56	-	-	390
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	-	-	-	-	-	-	92	3	95
เทคโนโลยีวีรพัฒน์	-	-	-	-	-	-	24	22	46
เทคโนโลยีพาณิชย์การนครนายก	-	-	-	-	-	-	6	31	37
รวมจังหวัดนครนายก	170	142	216	252	104	181	122	56	1243
อยุธยาวิทยาลัย	103	33	87	41	77	56	-	-	397
จอมสุรางค์อุปถัมภ์	-	133	-	135	-	131	-	-	399
เสนา(เสนาประสิทธิ์)	53	83	49	87	43	87	-	-	402
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา	-	-	-	-	-	-	7	91	98
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา	-	-	-	-	-	-	86	13	99
รวมจังหวัดอยุธยา	156	249	136	263	120	274	93	104	1395
ชลกัลยานุกูล	-	109	-	101	6	100	-	-	316
ศรีราชา	61	62	65	78	40	86	-	-	392
ดาราสมุทร	99	79	56	64	30	51	-	-	379
เทคโนโลยีแหลมฉบัง	-	-	-	-	-	-	53	29	82
ชลพินิจพาณิชย์การ	-	-	-	-	-	-	21	82	103
รวมจังหวัดชลบุรี	160	250	121	243	76	237	74	111	1272
เทพมงคลรังสี	143	19	120	11	81	59	-	-	433
วิสุทธิรังสี	70	72	63	79	45	98	-	-	427
บ่อพลอยรัศดาภิเษก	47	33	52	43	57	60	-	-	292
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี	-	-	-	-	-	-	87	2	89

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
รวมจังหวัดกาญจนบุรี	260	124	235	133	183	217	87	2	1241
รัตนราษฎร์บำรุง	62	88	67	51	20	115	-	-	403
ท่ามะขามวิทยา	79	36	74	58	57	60	-	-	364
สารสิทธิ์พิทยาลัย	137	-	126	-	130	-	-	-	393
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี	-	-	-	-	-	-	15	85	100
บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	41	60	101
รวมจังหวัดราชบุรี	278	124	267	109	207	175	56	145	1361
ศรัทธาสมุทร	67	85	65	79	52	93	-	-	441
วัดท้ายหาด	66	39	36	39	17	38	-	-	235
อัมพวันวิทยาลัย	99	88	95	85	46	58	-	-	471
เมธีชูณหะวันวิทยาลัย	12	10	8	8	2	11	-	-	51
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-	102	93	195
รวมจังหวัดสมุทรสงคราม	244	222	204	211	117	200	102	93	1393
สระบุรีวิทยาคม	19	112	12	35	29	55	-	-	262
แก่งคอยวิทยาลัย	69	72	49	79	29	86	-	-	384
เสาให้"วิมลวิทยานุกูล"	56	88	73	51	47	79	-	-	394
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี	-	-	-	-	-	-	97	3	100
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี	-	-	-	-	-	-	5	93	98
รวมจังหวัดสระบุรี	144	272	134	165	105	220	102	96	1238
สระแก้ว	53	87	62	80	30	89	-	-	401
วังหลังวิทยาคม	66	50	46	56	10	32	-	-	260
ตาพระยา	54	82	71	91	50	119	-	-	467
วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว	-	-	-	-	-	-	21	38	59
ไฮเทค-เทคโนโลยีสระแก้ว	-	-	-	-	-	-	75	28	103
รวมจังหวัดสระแก้ว	173	219	179	227	90	240	96	66	1290

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดชัยนาท :									
ในเขต	45	101	47	77	38	103	136	63	610
นอกเขต	119	143	164	86	80	175	-	-	767
ประเภท									
รัฐบาล	164	244	211	163	118	278	136	63	1377
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายการเขียน									
สามัญ	164	244	211	163	118	278	-	-	1178
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	136	63	199
จังหวัดระยอง:									
ในเขต	80	74	58	89	31	114	52	147	645
นอกเขต	158	43	146	64	140	157	-	-	708
ประเภท									
รัฐบาล	132	117	114	153	90	182	48	51	887
เอกชน	106	-	90	-	81	89	4	96	466
สายการเขียน									
สามัญ	238	117	204	153	171	271	-	-	1154
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	52	147	199
จังหวัดนครนายก :									
ในเขต	109	89	138	177	61	109	122	56	861
นอกเขต	61	53	78	75	43	72	-	-	382
ประเภท									
รัฐบาล	170	142	216	252	104	181	92	3	1160
เอกชน	-	-	-	-	-	-	30	53	83
สายการเขียน									
สามัญ	170	142	216	252	104	181	-	-	1065
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	122	56	178
จังหวัดอยุธยา									
ในเขต	103	166	87	176	77	187	93	104	993
นอกเขต	53	83	49	87	43	87			402
ประเภท									
รัฐบาล	156	249	136	263	120	274	93	104	1395
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายการเขียน									
สามัญ	156	249	136	263	120	274	-	-	1198
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	93	104	197

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

เขตที่ตั้ง	ม.1		ม.3		ม.5		ปวช.2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดชลบุรี :									
ในเขต	-	109	-	101	6	100	74	111	501
นอกเขต	160	141	121	142	70	137	-	-	771
ประเภท									
รัฐบาล	61	171	65	179	46	186	53	29	790
เอกชน	99	79	56	64	30	51	21	82	482
สหายกรเรียน									
สามัญ	160	250	121	243	76	237	-	-	1087
อาชีพะ	-	-	-	-	-	-	74	111	185
จังหวัดกาญจนบุรี :									
ในเขต	143	19	120	11	81	59	87	2	522
นอกเขต	117	105	115	122	102	158	-	-	719
ประเภท									
รัฐบาล	260	124	235	133	183	217	87	2	1241
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สหายกรเรียน									
สามัญ	260	124	235	133	183	217	-	-	1152
อาชีพะ	-	-	-	-	-	-	87	2	89
จังหวัดราชบุรี :									
ในเขต	62	88	67	51	20	115	15	85	503
นอกเขต	216	36	200	58	187	60	41	60	858
ประเภท									
รัฐบาล	141	124	141	109	77	175	15	85	867
เอกชน	137	-	126	-	130	-	41	60	494
สหายกรเรียน									
สามัญ	278	124	267	109	207	175	-	-	1160
อาชีพะ	-	-	-	-	-	-	56	145	201
จังหวัดสมุทรสงคราม :									
ในเขต	133	124	101	118	69	131	102	93	871
นอกเขต	111	98	103	93	48	69	-	-	522
ประเภท									
รัฐบาล	244	222	204	211	117	200	102	93	1393
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สหายกรเรียน									
สามัญ	244	222	204	211	117	200	-	-	1198
อาชีพะ	-	-	-	-	-	-	102	93	195

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

เขตที่ตั้ง	ม.1		ม.3		ม.5		ปวช.2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดสระบุรี:									
ในเขต	19	112	12	35	29	55	102	96	460
นอกเขต	125	160	122	130	76	165	-	-	778
ประเภท									
รัฐบาล	144	272	134	165	105	220	102	96	1238
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สหายกรเรียน									
สามัญ	144	272	134	165	105	220	-	-	1040
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	102	96	198
จังหวัดสระแก้ว:									
ในเขต	53	87	62	80	30	89	96	66	563
นอกเขต	120	132	117	147	60	151	-	-	727
ประเภท									
รัฐบาล	173	219	179	227	90	240	21	38	1187
เอกชน	-	-	-	-	-	-	75	28	103
สหายกรเรียน									
สามัญ	173	219	179	227	90	240	-	-	1128
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	96	66	162

ภาคผนวก 3.

สรุปผลการศึกษาของภาคกลาง

ตารางที่ 3.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=3950)	ม. 3 (n=3826)	ม. 5 (n=3584)	ปวช. 2 (n=1803)	รวม (n=13163)
อายุ: mean±sd	12.9 ± 0.7	14.8±0.6	16.8±0.7	17.0±0.9	15.1±1.8
median (พิสัย)	13(11-19)	15(10-21)	17(11-21)	17(11-25)	15(11-25)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(14)	(9)	(9)	(48)
รวม	3934	3812	3575	1794	13115
เพศ: ชาย (%)	1987(50.3)	1907(49.8)	1291(36.0)	920(51.0)	6105(46.4)
หญิง (%)	1963(49.7)	1919(50.2)	2293(64.0)	883(49.0)	7058(53.6)
ไม่ตอบ	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	3950(100.0)	3826(100.0)	3584(100.0)	1803(100.0)	13163(100.0)
ศาสนา : พุทธ	3826(97.0)	3769(98.6)	3511(98.2)	1750(97.2)	12856(97.8)
อิสลาม	37(0.9)	20(0.5)	20(0.6)	33(1.8)	110(0.8)
คริสต์และอื่นๆ	74(1.9)	33(0.9)	42(1.2)	18(1.0)	167(0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(4)	(11)	(2)	(30)
รวม	3937(100.0)	3822(100.0)	3573(100.0)	1801(100.0)	13133(100.0)
สถานที่เกิด : กรุงเทพฯ	134(3.5)	132(3.6)	157(4.5)	49(2.8)	472(3.7)
ปริมณฑล	9(0.2)	25(0.7)	22(0.6)	21(1.2)	77(0.6)
ภาคกลาง	3194(83.1)	3023(81.4)	2828(81.8)	1408(81.0)	10453(82.0)
ภาคเหนือ	46(1.2)	62(1.7)	45(1.3)	40(2.3)	193(1.5)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	426(11.1)	425(11.4)	362(10.5)	204(11.7)	1417(11.1)
ภาคใต้	33(.9)	41(1.1)	44(1.3)	16(0.9)	134(1.1)
ต่างประเทศ	0(0.0)	4(0.1)	1(0.0)	0(0.0)	5(0.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(108)	(114)	(125)	(65)	(412)
รวม	3842(100.0)	3712(100.0)	3459(100.0)	1738(100.0)	12751(100.0)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน :					
ไทย	3752(94.9)	3675(96.1)	3454(96.4)	1712(94.9)	12593(95.7)
ไทยท้องถิ่น	489(12.4)	396(10.4)	427(11.9)	225(12.5)	1537(11.7)
จีน	50(1.3)	64(1.7)	87(2.4)	14(0.8)	215(1.6)
มลายู/ยาवी	8(0.2)	6(0.2)	7(0.2)	6(0.3)	27(0.2)
สปป.ลาว	54(1.4)	40(1.0)	28(0.8)	9(0.5)	131(1.0)
เขมร	47(1.2)	74(1.9)	72(2.0)	9(0.5)	202(1.5)
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	118(3.0)	108(2.8)	136(3.8)	40(2.2)	402(3.0)
จำนวนทั้งหมด	3950	3826	3584	1803	13163

ตารางที่ 3.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=3950)	ม. 3 (n=3826)	ม. 5 (n=3584)	ปวช. 2 (n=1803)	รวม (n=13163)
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	3397(86.8)	3406(89.5)	3234(90.8)	1496(83.2)	11533(88.2)
หอพักของโรงเรียน	63(1.6)	30(0.8)	43(1.2)	32(1.8)	168(1.3)
หอพักนอกโรงเรียน	27(0.7)	14(0.4)	19(0.5)	47(2.6)	107(0.8)
บ้านเช่า	263(6.7)	208(5.5)	164(4.6)	176(9.8)	811(6.2)
อื่นๆ	164(4.2)	149(3.9)	100(2.8)	46(2.6)	459(3.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(19)	(24)	(6)	(85)
รวม	3914(100.0)	3807(100.0)	3560(100.0)	1797(100.0)	13078(100.0)
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว					
พ่อ แม่	58(1.5)	14(0.4)	24(0.7)	40(2.2)	136(1.0)
เพื่อน	3042(77.4)	3172(83.1)	2993(83.9)	1395(77.6)	10602(80.9)
ญาติพี่น้อง	44(1.1)	25(0.7)	45(1.3)	87(4.8)	201(1.5)
ญาติพี่น้อง	594(15.1)	470(12.3)	399(11.2)	218(12.1)	1681(12.8)
อื่นๆ	191(4.9)	135(3.5)	108(3.0)	58(3.2)	492(3.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(10)	(15)	(5)	(51)
รวม	3929(100.0)	3816(100.0)	3569(100.0)	1798(100.0)	13112(100.0)
ผลการเรียน: เกรตเฉลี่ย mean±sd					
เกรต 0.1-1.0	3.1±0.6	2.9±0.7	2.9±0.6	2.8±0.6	2.9±0.7
เกรต 0.1-1.0	42(1.1)	39(1.1)	28(0.8)	15(0.9)	124(1.0)
เกรต 1.1-2.0	169(4.5)	445(12.4)	220(6.6)	198(11.8)	1032(8.4)
เกรต 2.1-3.0	1071(28.3)	1359(38.0)	1496(45.1)	809(48.4)	4735(38.4)
เกรต 3.1-4.0	2496(66.1)	1738(48.5)	1571(47.4)	650(38.9)	6455(52.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(172)	(245)	(269)	(131)	(817)
รวม	3778(100.0)	3581(100.0)	3315(100.0)	1672(100.0)	12346(100.0)
ทำงานเพื่อหารายได้ : ไม่ทำ					
ทำ	3082(79.3)	2884(76.5)	2655(74.8)	1182(66.5)	9803(75.5)
ไม่ทำ	805(20.7)	887(23.5)	895(25.2)	595(33.5)	3182(24.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(63)	(55)	(34)	(26)	(178)
รวม	3887(100.0)	3771(100.0)	3550(100.0)	1777(100.0)	12985(100.0)

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 3.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	629(32.0)	673(35.6)	402(31.5)	405(44.5)	2109(34.9)	717(36.7)	680(35.7)	735(32.3)	305(34.8)	2437(34.8)
มีเล็กน้อย	918(46.7)	840(44.5)	570(44.6)	344(37.8)	2672(44.2)	911(46.6)	790(41.5)	1015(44.6)	355(40.5)	3071(43.8)
มีปานกลาง	328(16.7)	314(16.6)	253(19.8)	134(14.7)	1029(17.0)	284(14.5)	375(19.7)	457(20.1)	169(19.3)	1285(18.3)
มีปัญหามาก	92(4.7)	61(3.2)	52(4.1)	27(3.0)	232(3.8)	41(2.1)	58(3.0)	68(3.0)	48(5.5)	215(3.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(20)	(19)	(14)	(10)	(63)	(10)	(16)	(18)	(6)	(50)
รวม	1967(100.0)	1888(100.0)	1277(100.0)	910(100.0)	6042(100.0)	1953(100.0)	1903(100.0)	2275(100.0)	877(100.0)	7008(100.0)
การใช้ยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	1517(77.0)	1277(67.8)	691(54.2)	531(58.2)	4016(66.5)	1468(75.4)	1169(61.5)	1295(56.9)	461(52.6)	4393(62.7)
มีเล็กน้อย	326(16.6)	463(24.6)	404(31.7)	249(27.3)	1442(23.9)	380(19.5)	504(26.5)	666(29.2)	269(30.7)	1819(26.0)
มีปานกลาง	91(4.6)	120(6.4)	133(10.4)	95(10.4)	439(7.3)	80(4.1)	170(8.9)	238(10.5)	112(12.8)	600(8.6)
มีปัญหามาก	35(1.8)	24(1.3)	48(3.8)	37(4.1)	144(2.4)	20(1.0)	59(3.1)	78(3.4)	35(4.0)	192(2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(18)	(23)	(15)	(8)	(64)	(15)	(17)	(16)	(6)	(54)
รวม	1969(100.0)	1884(100.0)	1276(100.0)	912(100.0)	6041(100.0)	1948(100.0)	1902(100.0)	2277(100.0)	877(100.0)	7004(100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	1873(95.0)	1807(95.9)	1186(92.9)	841(92.4)	5707(94.4)	1842(94.4)	1795(94.4)	2117(93.1)	776(88.6)	6530(93.2)
มีเล็กน้อย	63(3.2)	57(3.0)	73(5.7)	46(5.1)	239(4.0)	91(4.7)	91(4.8)	145(6.4)	81(9.2)	408(5.8)
มีปานกลาง	14(0.7)	10(0.5)	8(0.6)	9(1.0)	41(0.7)	12(0.6)	10(0.5)	8(0.4)	11(1.3)	41(0.6)
มีปัญหามาก	22(1.1)	10(0.5)	10(0.8)	14(1.5)	56(0.9)	6(0.3)	6(0.3)	5(0.2)	8(0.9)	25(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(23)	(14)	(10)	(62)	(12)	(17)	(18)	(7)	(54)
รวม	1972(100.0)	1884(100.0)	1277(100.0)	910(100.0)	6043(100.0)	1951(100.0)	1902(100.0)	2275(100.0)	876(100.0)	7004(100.0)
ข่มขืน กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	1776(90.2)	1692(89.8)	1099(86.3)	729(79.9)	5296(87.7)	1771(90.7)	1653(87.0)	2005(88.2)	723(82.4)	6152(87.8)
มีเล็กน้อย	145(7.4)	168(8.9)	144(11.3)	135(14.8)	592(9.8)	152(7.8)	216(11.4)	241(10.6)	121(13.8)	730(10.4)
มีปานกลาง	23(1.2)	17(0.9)	19(1.5)	27(3.0)	86(1.4)	23(1.2)	25(1.3)	21(0.9)	21(2.4)	90(1.3)
มีปัญหามาก	24(1.2)	8(0.4)	12(0.9)	21(2.3)	65(1.1)	6(0.3)	7(0.4)	6(0.3)	12(1.4)	31(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(22)	(17)	(8)	(66)	(11)	(18)	(20)	(6)	(55)
รวม	1968(100.0)	1885(100.0)	1274(100.0)	912(100.0)	6039(100.0)	1952(100.0)	1901(100.0)	2273(100.0)	877(100.0)	7003(100.0)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	1502(76.2)	1272(67.3)	646(50.6)	423(46.4)	3843(63.5)	1417(72.6)	1197(62.8)	1257(55.4)	409(46.7)	4280(61.1)
มีเล็กน้อย	396(19.7)	466(24.7)	440(34.5)	285(31.3)	1587(26.2)	437(22.4)	510(26.8)	695(30.6)	275(31.4)	1917(27.4)
มีปานกลาง	51(2.6)	123(6.5)	159(12.5)	144(15.8)	477(7.9)	84(4.3)	163(8.6)	265(11.7)	137(15.6)	649(9.3)
มีปัญหามาก	22(1.1)	28(1.5)	32(2.5)	60(6.6)	142(2.3)	14(0.7)	35(1.8)	53(2.3)	55(6.3)	157(2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(18)	(14)	(8)	(56)	(11)	(14)	(23)	(7)	(55)
รวม	1971(100.0)	1889(100.0)	1277(100.0)	912(100.0)	6049(100.0)	1952(100.0)	1905(100.0)	2270(100.0)	876(100.0)	7003(100.0)

ตารางที่ 3.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	998(50.6)	827(43.8)	430(33.8)	397(43.5)	2652(43.9)	839(43.0)	708(37.2)	737(32.4)	307(35.0)	2591(37.0)
มีเล็กน้อย	649(32.9)	695(36.8)	515(40.4)	321(35.2)	2180(36.1)	754(38.6)	660(34.7)	902(39.7)	294(33.5)	2610(37.3)
มีปานกลาง	244(12.4)	266(14.1)	255(20.0)	129(14.1)	894(14.8)	254(13.0)	382(20.1)	480(21.1)	182(20.7)	1298(18.5)
มีปัญหามาก	81(4.1)	100(5.3)	74(5.8)	65(7.1)	320(5.3)	105(5.4)	151(7.9)	154(6.8)	95(10.8)	505(7.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(19)	(17)	(8)	(59)	(11)	(18)	(20)	(5)	(54)
รวม	1972(100.0)	1888(100.0)	1274(100.0)	912(100.0)	6046(100.0)	1952(100.0)	1901(100.0)	2273(100.0)	878(100.0)	7004(100.0)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	621(31.5)	577(30.6)	317(24.9)	325(35.7)	1840(30.5)	501(25.7)	445(23.4)	445(19.6)	185(21.1)	1576(22.5)
มีเล็กน้อย	854(43.4)	782(41.4)	526(41.3)	356(39.1)	2518(41.7)	900(46.1)	722(37.9)	915(40.3)	339(38.6)	2876(41.1)
มีปานกลาง	359(18.2)	377(20.0)	318(25.0)	160(17.6)	1214(20.1)	366(18.8)	475(25.0)	633(27.9)	217(24.7)	1691(24.1)
มีปัญหามาก	136(6.9)	151(8.0)	113(8.9)	70(7.7)	470(7.8)	184(9.4)	261(13.7)	278(12.2)	137(15.6)	860(12.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(20)	(17)	(9)	(63)	(12)	(16)	(22)	(5)	(55)
รวม	1970(100.0)	1887(100.0)	1274(100.0)	911(100.0)	6042(100.0)	1951(100.0)	1903(100.0)	2271(100.0)	878(100.0)	7003(100.0)

ตารางที่ 3.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียน/เพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	1705(85.8)	1408(73.9)	911(70.6)	342(37.2)	4366(71.5)	1626(82.8)	1377(71.8)	1584(69.1)	432(48.9)	5019(71.1)
41-60%	180(9.1)	309(16.2)	231(17.9)	296(32.2)	1016(16.6)	189(9.6)	328(17.1)	377(16.4)	245(27.7)	1139(16.1)
>60 %	102(5.1)	189(9.9)	149(11.5)	282(30.7)	722(11.8)	148(7.5)	214(11.2)	332(14.5)	206(23.3)	900(12.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	1830(92.1)	1532(80.4)	876(67.9)	420(45.7)	4658(76.3)	1821(92.8)	1630(85.0)	1821(79.4)	595(67.4)	5867(83.1)
41-60%	63(3.2)	196(10.3)	200(15.5)	213(23.2)	672(11.0)	61(3.1)	164(8.6)	241(10.5)	140(15.9)	606(8.6)
>60 %	94(4.7)	178(9.3)	215(16.7)	286(31.1)	773(12.7)	81(4.1)	124(6.5)	231(10.1)	148(16.8)	584(8.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(1)	(2)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	919(100.0)	6103(100.0)	1963(100.0)	1918(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7057(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1846(92.9)	1710(89.7)	1155(89.5)	661(71.8)	5372(88.0)	1809(92.2)	1724(89.8)	2013(87.8)	695(78.7)	6241(88.4)
41-60%	70(3.5)	105(5.5)	79(6.1)	176(19.1)	430(7.0)	69(3.5)	109(5.7)	145(6.3)	110(12.5)	433(6.1)
>60 %	71(3.6)	91(4.8)	57(4.4)	83(9.0)	302(4.9)	85(4.3)	86(4.5)	135(5.9)	78(8.8)	384(5.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1987	1906	1291	920	6104	1963	1919	2293	883	7058
	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

ตารางที่ 3.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดีมีสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดีมีสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1887(95.0)	1725(90.5)	1154(89.4)	703(76.4)	5469(89.6)	1885(95.1)	1775(92.5)	2079(90.7)	760(86.1)	6479(91.8)
41-60%	46(2.3)	90(4.7)	68(5.3)	146(15.9)	350(5.7)	31(1.6)	74(3.9)	95(4.1)	62(7.0)	262(3.7)
>60 %	54(2.7)	91(4.8)	69(5.3)	71(7.7)	285(4.7)	66(3.4)	70(3.6)	118(5.1)	61(6.9)	315(4.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(1)	(0)	(2)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1962(100.0)	1919(100.0)	2292(100.0)	883(100.0)	7056(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	1514(76.2)	1299(68.2)	895(69.3)	279(30.3)	3987(65.3)	1591(81.0)	1297(67.6)	1625(70.9)	456(51.7)	4969(70.4)
41-60%	257(12.9)	317(16.6)	214(16.6)	246(26.7)	1034(16.9)	215(11.0)	329(17.1)	326(14.2)	197(22.3)	1067(15.1)
>60 %	216(10.9)	290(15.2)	182(14.1)	395(42.9)	1083(17.7)	157(8.0)	293(15.3)	342(14.9)	229(26.0)	1021(14.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(19)	(0)	(1)	(1)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	882(100.0)	7057(100.0)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	1809(91.0)	1535(80.5)	1005(77.8)	459(49.9)	4808(78.8)	1818(92.6)	1612(84.0)	1937(84.5)	636(72.0)	6003(85.1)
41-60%	91(4.6)	199(10.4)	137(10.6)	207(22.5)	634(10.4)	56(2.9)	170(8.9)	171(7.5)	128(14.5)	525(7.4)
>60 %	87(4.4)	172(9.0)	149(11.5)	254(27.6)	662(10.8)	89(4.5)	137(7.1)	185(8.1)	119(13.5)	530(7.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1901(95.7)	1765(92.6)	1203(96.2)	760(82.6)	5629(92.2)	1867(95.1)	1764(91.8)	2113(92.2)	765(86.6)	6509(92.2)
41-60%	31(1.6)	66(3.5)	42(3.3)	108(11.7)	247(4.0)	30(1.5)	68(3.5)	81(3.5)	74(8.4)	253(3.6)
>60 %	55(2.8)	75(3.9)	46(3.6)	52(5.7)	228(3.7)	66(3.4)	87(4.5)	99(4.3)	44(5.0)	296(4.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1916(96.4)	1787(93.8)	1200(93.0)	788(85.7)	5691(93.2)	1888(96.2)	1811(94.4)	2159(94.2)	802(90.8)	6660(94.4)
41-60%	19(1.0)	51(2.7)	51(4.0)	90(9.8)	211(3.5)	19(1.0)	37(1.9)	49(2.1)	46(5.2)	151(2.1)
>60 %	52(2.6)	68(3.6)	40(3.1)	42(4.6)	202(3.3)	56(2.9)	71(3.7)	85(3.7)	35(4.0)	247(3.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1987(100.0)	1906(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6104(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)

ตารางที่ 3.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	1132(57.2)	1087(57.3)	644(50.3)	457(50.2)	3320(54.7)	1159(59.3)	1183(62.0)	1312(57.7)	437(49.7)	4091(58.3)
ไม่ใช่	481(24.3)	438(23.1)	377(29.5)	219(24.1)	1515(25.0)	545(27.9)	461(24.1)	709(31.2)	258(29.4)	1973(28.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	367(18.5)	371(19.6)	259(20.2)	234(25.7)	1231(20.3)	250(12.8)	265(13.9)	253(11.1)	184(20.9)	952(13.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(7)	(11)	(11)	(10)	(39)	(9)	(10)	(19)	(4)	(42)
รวม	1980(100.0)	1896(100.0)	1280(100.0)	910(100.0)	6066(100.0)	1954(100.0)	1909(100.0)	2274(100.0)	879(100.0)	7016(100.0)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	173(8.7)	212(11.1)	148(11.5)	216(23.7)	749(12.3)	112(5.7)	124(6.5)	131(5.8)	130(14.8)	497(7.1)
ไม่ใช่	1533(77.5)	1415(74.4)	950(74.0)	511(56.0)	4409(72.5)	1561(79.8)	1530(80.1)	1889(82.9)	589(67.1)	5569(79.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	273(13.8)	276(14.5)	185(14.4)	186(20.4)	920(15.1)	284(14.5)	257(13.4)	258(11.3)	159(18.1)	958(13.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(4)	(8)	(7)	(27)	(6)	(8)	(15)	(5)	(34)
รวม	1979(100.0)	1903(100.0)	1283(100.0)	913(100.0)	6078(100.0)	1957(100.0)	1911(100.0)	2278(100.0)	878(100.0)	7024(100.0)
โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	205(10.4)	248(13.0)	199(15.5)	304(33.4)	956(15.7)	161(8.2)	177(9.3)	289(12.7)	269(30.6)	896(12.8)
ไม่ใช่	1456(73.6)	1339(70.4)	861(67.2)	405(44.5)	4061(66.9)	1472(75.4)	1361(71.4)	1531(67.3)	389(44.3)	4753(67.8)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	316(16.0)	314(16.5)	222(17.3)	202(22.2)	1054(17.4)	320(16.4)	369(19.3)	455(20.0)	221(25.1)	1365(19.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(6)	(9)	(9)	(34)	(10)	(12)	(18)	(4)	(44)
รวม	1977(100.0)	1901(100.0)	1282(100.0)	911(100.0)	6071(100.0)	1953(100.0)	1907(100.0)	2275(100.0)	879(100.0)	7014(100.0)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	219(11.1)	267(14.1)	205(16.0)	168(18.5)	859(14.2)	89(4.6)	121(6.3)	181(7.9)	99(11.3)	490(7.0)
ไม่ใช่	1357(68.6)	1249(65.8)	821(64.1)	524(57.6)	3951(65.1)	1558(79.9)	1438(75.4)	1759(77.2)	587(66.8)	5342(76.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	401(20.3)	381(20.1)	255(19.9)	218(24.0)	1255(20.7)	304(15.6)	349(18.3)	338(14.8)	193(22.0)	1184(16.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(10)	(10)	(10)	(40)	(12)	(11)	(15)	(4)	(42)
รวม	1977(100.0)	1901(100.0)	1282(100.0)	911(100.0)	6071(100.0)	1953(100.0)	1907(100.0)	2275(100.0)	879(100.0)	7014(100.0)
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	1059(53.6)	914(48.1)	625(48.9)	414(45.4)	3012(49.7)	1193(61.4)	1013(53.3)	1344(59.1)	510(58.2)	4060(58.0)
ไม่ใช่	869(44.4)	1447(76.2)	946(73.8)	601(66.1)	3863(63.6)	1603(82.1)	1571(82.3)	1878(82.4)	675(77.7)	4657(66.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	492(24.9)	512(27.0)	374(29.2)	255(28.0)	1633(26.9)	380(19.5)	450(23.7)	489(21.5)	197(22.5)	1516(21.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(8)	(12)	(9)	(39)	(19)	(18)	(17)	(6)	(60)
รวม	1987(100.0)	1907(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6105(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	1201(61.3)	1113(59.0)	682(53.4)	528(58.7)	3524(58.5)	1243(63.9)	1136(59.7)	1355(59.6)	586(67.1)	4320(61.8)
ไม่ใช่	215(11.0)	275(14.6)	262(20.5)	154(17.1)	906(15.0)	104(5.3)	185(9.7)	288(12.7)	93(10.7)	670(9.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	543(27.7)	498(26.4)	333(26.1)	218(24.2)	1592(26.4)	599(30.8)	581(30.5)	629(27.7)	194(22.2)	2003(28.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(21)	(14)	(20)	(83)	(17)	(17)	(20)	(21)	(65)
รวม	1987(100.0)	1907(100.0)	1291(100.0)	920(100.0)	6105(100.0)	1963(100.0)	1919(100.0)	2293(100.0)	883(100.0)	7058(100.0)

ตารางที่ 3.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	1059(53.6)	914(48.1)	625(48.9)	414(45.4)	3012(49.7)	1193(61.4)	1013(53.3)	1344(59.1)	510(58.2)	4060(58.0)
ไม่ใช่	492(24.9)	512(27.0)	374(29.2)	255(28.0)	1633(26.9)	380(19.5)	450(23.7)	489(21.5)	197(22.5)	1516(21.7)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	426(21.5)	473(24.9)	280(21.9)	242(26.6)	1421(23.4)	230(19.3)	254(19.3)	178(15.7)	80(14.8)	742(17.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(8)	(12)	(9)	(39)	(19)	(18)	(17)	(6)	(60)
รวม	1977(100.0)	1899(100.0)	1279(100.0)	911(100.0)	6066(100.0)	1944(100.0)	1901(100.0)	2276(100.0)	877(100.0)	6998(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	1201(61.3)	1113(59.0)	682(53.4)	528(58.7)	3524(58.5)	1243(63.9)	1136(59.7)	1355(59.6)	586(67.1)	4320(61.8)
ไม่ใช่	215(11.0)	275(14.6)	262(20.5)	154(17.1)	906(15.0)	104(5.3)	185(9.7)	288(12.7)	93(10.7)	670(9.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	543(27.7)	498(26.4)	333(26.1)	218(24.2)	1592(26.4)	599(30.8)	581(30.5)	629(27.7)	194(22.2)	2003(28.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(21)	(14)	(20)	(83)	(17)	(17)	(21)	(10)	(65)
รวม	1959(100.0)	1886(100.0)	1277(100.0)	900(100.0)	6022(100.0)	1946(100.0)	1902(100.0)	2272(100.0)	873(100.0)	6993(100.0)

ตารางที่ 3.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง										
ไม่เคยเลย	1914(96.4)	1798(94.7)	1219(95.1)	828(90.6)	5759(94.7)	1944(99.3)	1890(98.8)	2253(98.7)	863(98.0)	6950(98.8)
เคย 1 ครั้ง	48(2.4)	76(4.0)	39(3.0)	47(5.1)	210(3.5)	10(0.5)	15(0.8)	16(0.7)	11(1.2)	52(0.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	24(1.2)	25(1.3)	24(1.9)	39(4.3)	112(1.8)	4(0.2)	8(0.4)	13(0.6)	7(0.8)	32(0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(8)	(9)	(6)	(24)	(5)	(6)	(11)	(2)	(24)
รวม	1986(100.0)	1899(100.0)	1282(100.0)	914(100.0)	6081(100.0)	1958(100.0)	1913(100.0)	2282(100.0)	881(100.0)	7034(100.0)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	1891(95.5)	1780(93.7)	1207(94.1)	817(89.4)	5695(93.7)	1935(98.9)	1877(98.2)	2236(98.0)	867(98.4)	6915(98.4)
เคย 1 ครั้ง	69(3.5)	79(4.2)	52(4.1)	66(7.2)	266(4.4)	12(0.6)	26(1.4)	33(1.4)	11(1.2)	82(1.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	21(1.1)	41(2.2)	24(1.9)	31(3.4)	117(1.9)	9(0.5)	8(0.4)	13(0.6)	3(0.3)	33(0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(7)	(8)	(6)	(27)	(7)	(8)	(11)	(2)	(28)
รวม	1981(100.0)	1900(100.0)	1283(100.0)	914(100.0)	6078(100.0)	1956(100.0)	1911(100.0)	2282(100.0)	881(100.0)	7030(100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนกำลังดื่มสุราก็										
ไม่เคยเลย	1902(96.4)	1760(93.4)	1151(90.1)	746(82.0)	5559(92.0)	1919(98.4)	1822(96.0)	2171(95.4)	809(91.8)	6721(95.9)
เคย 1 ครั้ง	51(2.6)	70(3.7)	67(5.2)	94(10.3)	282(4.7)	23(1.2)	57(3.0)	69(3.0)	53(6.0)	202(2.9)
เคย 2- 3 ครั้ง	20(1.0)	55(2.9)	59(4.6)	70(7.7)	204(3.4)	9(0.5)	18(0.9)	36(1.6)	19(2.2)	82(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(22)	(14)	(10)	(60)	(12)	(22)	(17)	(2)	(53)
รวม	1973(100.0)	1885(100.0)	1277(100.0)	910(100.0)	6045(100.0)	1951(100.0)	1897(100.0)	2276(100.0)	881(100.0)	7005(100.0)
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	1925(97.3)	1807(95.6)	1206(94.4)	828(90.7)	5766(95.2)	1915(98.1)	1833(96.1)	2165(95.0)	825(94.0)	6738(96.1)
เคย 1 ครั้ง	45(2.3)	69(3.6)	56(4.4)	67(7.3)	237(3.9)	31(1.6)	60(3.1)	95(4.2)	45(5.1)	231(3.3)
เคย 2- 3 ครั้ง	8(0.4)	15(0.8)	15(1.2)	18(2.0)	56(0.9)	6(0.3)	14(0.7)	18(0.8)	8(0.9)	46(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(16)	(14)	(7)	(46)	(11)	(12)	(15)	(5)	(43)
รวม	1978(100.0)	1891(100.0)	1277(100.0)	913(100.0)	6059(100.0)	1952(100.0)	1907(100.0)	2278(100.0)	878(100.0)	7015(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(1147)	(1114)	(727)	(396)	(3384)	(1412)	(1411)	(1752)	(543)	(5118)
ไม่เคยเลย	770(92.3)	676(86.1)	459(83.0)	421(80.9)	2326(86.4)	532(97.2)	464(93.4)	498(93.9)	309(92.2)	1803(94.5)
เคย 1 ครั้ง	40(4.8)	69(8.8)	57(10.3)	52(10.0)	218(8.1)	8(1.5)	22(4.4)	21(3.9)	20(6.0)	71(3.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	24(2.9)	40(9.1)	37(6.7)	47(9.1)	148(5.5)	7(1.3)	11(2.2)	11(2.2)	6(1.8)	35(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(8)	(11)	(4)	(29)	(4)	(11)	(11)	(5)	(31)
รวม	834(100.0)	785(100.0)	553(100.0)	520(100.0)	2692(100.0)	547(100.0)	497(100.0)	530(100.0)	335(100.0)	1909(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(1180)	(1172)	(869)	(471)	(3692)	(1447)	(1499)	(1893)	(623)	(5462)
ไม่เคยเลย	716(89.4)	579(79.5)	349(84.7)	331(74.7)	1975(82.8)	499(97.6)	399(97.8)	377(97.4)	241(94.9)	1516(97.2)
เคย 1 ครั้ง	63(7.9)	89(12.2)	27(6.6)	64(14.7)	243(10.2)	8(1.6)	7(1.7)	5(1.3)	6(2.4)	26(1.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	22(2.7)	60(8.3)	36(8.7)	48(10.8)	166(7.0)	4(0.8)	2(0.5)	5(1.3)	7(2.7)	18(1.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(7)	(10)	(6)	(29)	(5)	(12)	(13)	(6)	(36)
รวม	801(100.0)	728(100.0)	412(100.0)	443(100.0)	2384(100.0)	511(100.0)	408(100.0)	387(100.0)	254(100.0)	1560(100.0)

ตารางที่ 3.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะขาดมสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ได้มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้										
สารเสพติด(จำนวน)	(1161)	(1159)	(798)	(434)	(3552)	(1430)	(1456)	(1829)	(604)	(5319)
ไม่เคยเลย	790(96.1)	679(91.9)	448(92.6)	436(90.4)	2353(93.1)	526(99.6)	443(98.2)	442(97.8)	269(97.5)	1680(98.4)
เคย 1 ครั้ง	22(2.7)	51(6.9)	31(6.4)	37(7.7)	141(5.6)	0(0.0)	7(1.6)	8(1.8)	5(1.8)	20(1.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	10(1.2)	9(1.2)	5(1.0)	9(1.9)	33(1.3)	2(0.4)	1(0.2)	2(0.4)	2(0.7)	7(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(9)	(9)	(4)	(26)	(5)	(12)	(12)	(3)	(32)
รวม	822(100.0)	739(100.0)	484(100.0)	482(100.0)	2527(100.0)	528(100.0)	451(100.0)	452(100.0)	276(100.0)	1707(100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ได้มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้										
สารเสพติด(จำนวน)	(1134)	(1130)	(790)	(428)	(3482)	(1415)	(1451)	(1822)	(596)	(5284)
ไม่เคยเลย	830(97.9)	740(96.3)	484(98.4)	464(95.1)	2518(97.0)	540(99.6)	455(99.6)	457(99.6)	278(98.2)	1730(99.4)
เคย 1 ครั้ง	12(1.4)	23(3.0)	6(1.2)	18(3.7)	59(2.3)	1(0.2)	2(0.4)	1(0.2)	4(1.4)	8(0.5)
เคย 2- 3 ครั้ง	6(0.7)	5(0.7)	2(0.4)	6(1.2)	19(0.7)	1(0.2)	0(0.0)	1(0.2)	1(0.4)	3(0.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(9)	(9)	(4)	(27)	(6)	(11)	(12)	(4)	(33)
รวม	848(100.0)	768(100.0)	492(100.0)	488(100.0)	2596(100.0)	542(100.0)	457(100.0)	459(100.0)	283(100.0)	1741(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 3.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่ง										
รถ(จำนวน)	(280)	(184)	(90)	(57)	(611)	(265)	(225)	(222)	(71)	(783)
ไม่เคยเลย	513(31.0)	372(22.6)	170(14.5)	110(13.4)	1165(22.0)	468(28.3)	390(23.7)	369(18.2)	189(24.0)	1416(23.1)
นานๆครั้ง	749(45.2)	752(45.8)	478(40.7)	235(28.6)	2214(41.8)	789(47.7)	831(50.5)	1043(51.4)	386(49.0)	3049(49.8)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	394(23.8)	519(31.6)	527(44.8)	476(58.0)	1919(36.2)	396(24.0)	424(25.8)	618(30.4)	213(27.0)	1651(27.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(48)	(80)	(26)	(42)	(196)	(45)	(49)	(41)	(24)	(159)
รวม	1656(100.0)	1643(100.0)	1175(100.0)	821(100.0)	5298(100.0)	1653(100.0)	1645(100.0)	2030(100.0)	788(100.0)	6116(100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่ง										
รถ(จำนวน)	(245)	(212)	(159)	(137)	(753)	(208)	(202)	(266)	(113)	(789)
ไม่เคยเลย	501(29.6)	398(24.8)	181(16.5)	162(22.1)	1242(24.2)	405(23.7)	388(23.4)	386(19.5)	215(28.9)	1394(22.9)
นานๆครั้ง	596(35.2)	612(38.2)	429(39.1)	269(36.6)	1906(37.2)	667(39.1)	696(42.1)	805(40.6)	305(41.0)	2473(40.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	595(35.2)	594(37.0)	487(44.4)	303(41.3)	1979(38.6)	634(37.2)	572(34.5)	792(39.9)	224(30.1)	2222(36.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(50)	(91)	(35)	(49)	(225)	(49)	(61)	(44)	(26)	(180)
รวม	1692(100.0)	1604(100.0)	1097(100.0)	734(100.0)	5127(100.0)	1706(100.0)	1656(100.0)	1983(100.0)	744(100.0)	6089(100.0)
ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากที่พักดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	1776(93.1)	1551(87.9)	1007(80.5)	580(65.8)	4914(84.7)	1132(99.0)	1241(96.6)	1038(93.9)	455(89.7)	3866(95.7)
นานๆครั้ง	90(4.7)	177(10.0)	194(15.5)	232(36.3)	693(11.9)	7(0.6)	42(3.3)	56(5.1)	42(8.3)	147(3.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	28(1.4)	35(2.0)	47(3.7)	64(7.2)	174(3.0)	5(0.3)	11(0.6)	19(0.8)	17(2.6)	52(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(80)	(142)	(40)	(39)	(301)	(87)	(84)	(64)	(35)	(270)
รวม	1907(100.0)	1765(100.0)	1251(100.0)	881(100.0)	5804(100.0)	1876(100.0)	1835(100.0)	2229(100.0)	848(100.0)	6788(100.0)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	1601(83.4)	1435(80.4)	1039(82.9)	667(75.7)	4742(81.2)	17505(92.5)	1672(90.9)	2030(90.7)	754(88.8)	6206(91.0)
นานๆครั้ง	242(12.6)	296(16.6)	166(13.2)	160(18.2)	864(14.8)	117(6.2)	139(7.6)	162(7.2)	69(8.1)	487(7.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	69(3.6)	53(3.0)	45(3.6)	51(5.8)	218(3.8)	19(1.0)	24(1.3)	38(1.7)	23(2.7)	104(1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(68)	(122)	(38)	(39)	(267)	(72)	(79)	(55)	(34)	(240)
รวม	1919(100.0)	1785(100.0)	1253(100.0)	881(100.0)	5838(100.0)	1891(100.0)	1840(100.0)	2238(100.0)	849(100.0)	6818(100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	1794(93.5)	1671(93.8)	1143(91.1)	748(85.4)	5356(91.8)	1864(98.6)	1810(98.4)	2199(98.3)	824(97.3)	6697(98.3)
นานๆครั้ง	92(4.8)	87(4.9)	88(7.0)	99(11.3)	366(6.3)	19(1.0)	19(1.0)	22(1.0)	18(2.1)	78(1.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	25(1.3)	23(1.3)	21(1.7)	26(2.9)	95(1.6)	2(0.2)	5(0.3)	9(0.4)	3(0.4)	19(0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(68)	(125)	(36)	(44)	(273)	(73)	(79)	(55)	(36)	(243)
รวม	1919(100.0)	1782(100.0)	1255(100.0)	876(100.0)	5832(100.0)	1890(100.0)	1840(100.0)	2238(100.0)	847(100.0)	6815(100.0)

ตารางที่ 3.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต้อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	1302(67.9)	1262(70.9)	955(76.0)	596(67.9)	4115(70.6)	1697(89.8)	1663(90.6)	2068(92.4)	738(86.8)	6166(90.5)
นานๆครั้ง	542(28.3)	445(25.0)	263(20.9)	242(27.6)	1492(25.6)	168(8.9)	153(8.3)	142(6.3)	102(12.0)	565(8.3)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	67(3.5)	72(1.4)	36(2.9)	39(4.4)	214(3.6)	22(1.2)	14(0.8)	21(0.9)	8(0.9)	65(0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(70)	(127)	(35)	(42)	(274)	(73)	(83)	(55)	(33)	(244)
รวม	1917(100.0)	1780(100.0)	1256(100.0)	878(100.0)	5831(100.0)	1890(100.0)	1836(100.0)	2238(100.0)	850(100.0)	6814(100.0)
ชกต้อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	1759(91.4)	1612(90.5)	1144(91.3)	744(84.9)	5259(90.1)	1854(97.9)	1795(97.7)	2191(97.9)	815(95.9)	6655(97.6)
นานๆครั้ง	132(6.9)	140(7.9)	89(7.1)	108(12.3)	469(8.0)	32(1.7)	31(1.7)	31(1.4)	29(3.4)	123(1.8)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	26(1.4)	28(1.6)	18(1.5)	23(2.6)	95(1.6)	3(0.2)	5(0.3)	9(0.4)	4(0.5)	21(0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(63)	(126)	(38)	(44)	(271)	(70)	(82)	(54)	(33)	(239)
รวม	1924(100.0)	1781(100.0)	1253(100.0)	876(100.0)	5834(100.0)	1893(100.0)	1837(100.0)	2239(100.0)	850(100.0)	6819(100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(1326)	(1083)	(651)	(314)	(3374)	(1535)	(1204)	(1219)	(236)	(4194)
ไม่เคยเลย	590(91.6)	731(90.5)	540(85.7)	505(85.2)	2366(88.4)	397(96.1)	668(95.7)	993(93.7)	591(92.1)	2649(94.2)
เคย	54(8.4)	77(9.5)	90(14.3)	88(14.8)	309(11.6)	16(3.9)	30(4.3)	67(6.3)	51(7.9)	164(5.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(15)	(10)	(13)	(55)	(15)	(17)	(14)	(5)	(51)
รวม	644(100.0)	808(100.0)	630(100.0)	593(100.0)	2675(100.0)	413(100.0)	698(100.0)	1060(100.0)	642(100.0)	2813(100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมี										
เพศสัมพันธ์	(1444)	(1295)	(807)	(333)	(3879)	(1678)	(1537)	(1754)	(440)	(5409)
ไม่เคยถูกบังคับ	488(96.3)	547(93.5)	435(92.6)	510(90.4)	1980(93.1)	260(98.1)	343(95.5)	473(93.7)	390(90.1)	1466(93.9)
เคย	19(3.7)	38(6.5)	35(7.4)	54(9.6)	146(6.9)	5(1.9)	16(4.5)	32(6.3)	43(9.9)	96(6.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(27)	(14)	(23)	(100)	(20)	(23)	(34)	(10)	(87)
รวม	507(100.0)	585(100.0)	470(100.0)	564(100.0)	2126(100.0)	265(100.0)	359(100.0)	505(100.0)	433(100.0)	1562(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขบขัน/ซอมนั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 3.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	1801(91.2)	1659(78.9)	1068(83.6)	765(84.0)	5293(87.5)	1797(92.1)	1688(88.5)	1897(83.4)	719(81.6)	6101(87.0)
เคย	172(8.7)	228(12.1)	210(16.4)	146(16.0)	756(12.5)	154(7.9)	220(11.5)	377(16.6)	162(18.4)	913(13.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(20)	(13)	(9)	(55)	(12)	(11)	(19)	(2)	(44)
รวม	1974(100.0)	1887(100.0)	1278(100.0)	911(100.0)	6050(100.0)	1951(100.0)	1908(100.0)	2274(100.0)	881(100.0)	7014(100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	1914(96.7)	1819(96.1)	1212(94.7)	848(93.3)	5793(95.6)	1897(97.2)	1814(95.1)	2143(94.1)	801(90.9)	6655(94.8)
เคย	66(3.3)	73(3.9)	68(5.3)	61(6.7)	268(4.4)	54(2.8)	93(4.9)	135(5.9)	80(9.1)	362(5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(7)	(15)	(11)	(11)	(44)	(12)	(12)	(15)	(2)	(41)
รวม	1980(100.0)	1892(100.0)	1280(100.0)	909(100.0)	6061(100.0)	1951(100.0)	1907(100.0)	2278(100.0)	881(100.0)	7017(100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	1914(96.6)	1804(95.4)	1199(93.9)	845(93.2)	5762(95.1)	1878(96.3)	1803(94.6)	2106(92.8)	808(91.8)	6595(94.1)
เคย	67(3.4)	87(4.6)	78(6.1)	62(6.8)	294(4.9)	73(3.7)	103(5.4)	163(7.2)	72(8.2)	411(5.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(16)	(14)	(13)	(49)	(12)	(13)	(24)	(3)	(52)
รวม	1981(100.0)	1891(100.0)	1277(100.0)	907(100.0)	6056(100.0)	1951(100.0)	1906(100.0)	2269(100.0)	880(100.0)	7006(100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	1907(96.5)	1814(96.2)	1216(95.0)	840(92.7)	5777(95.5)	1881(96.5)	1809(95.0)	2140(94.1)	805(91.4)	6635(94.7)
เคย	70(3.5)	72(3.8)	64(5.0)	66(7.3)	272(4.5)	68(3.6)	96(5.0)	134(5.9)	76(8.6)	374(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(21)	(11)	(14)	(56)	(14)	(14)	(19)	(2)	(49)
รวม	1977(100.0)	1886(100.0)	1280(100.0)	906(100.0)	6049(100.0)	1949(100.0)	1905(100.0)	2274(100.0)	881(100.0)	7009(100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	51(72.9)	57(79.2)	48(75.0)	46(69.7)	202(74.3)	52(76.5)	81(84.4)	109(81.4)	66(86.8)	308(82.3)
3-5 ครั้ง	6(8.5)	5(6.9)	9(14.1)	8(12.1)	28(10.3)	9(13.2)	4(4.2)	16(11.9)	6(7.9)	35(9.4)
> 5 ครั้ง	13(18.6)	10(13.9)	7(10.9)	12(18.2)	42(15.4)	7(10.3)	11(11.4)	9(6.7)	4(5.3)	31(8.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	70(100.0)	72(100.0)	64(100.0)	66(100.0)	272(100.0)	68(100.0)	96(100.0)	134(100.0)	76(100.0)	374(100.0)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	51(72.9)	60(83.3)	47(73.4)	46(69.7)	204(75.0)	55(80.9)	76(79.2)	106(79.1)	58(76.3)	295(78.9)
เคย	19(27.1)	12(16.7)	17(26.6)	20(30.3)	68(25.0)	13(19.1)	20(20.8)	28(20.9)	18(23.7)	79(21.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	70(100.0)	72(100.0)	64(100.0)	66(100.0)	272(100.0)	68(100.0)	96(100.0)	134(100.0)	76(100.0)	374(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 3.8 พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	1845(96.1)	1691(91.4)	1062(83.7)	547(61.5)	5145(86.8)	1870(99.6)	1786(96.1)	2091(92.8)	608(70.1)	6355(92.7)
เคยมี	74(3.9)	160(8.6)	207(16.3)	342(38.5)	783(13.2)	8(0.4)	73(3.9)	163(7.2)	259(29.9)	503(7.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(68)	(54)	(22)	(31)	(175)	(85)	(58)	(38)	(16)	(197)
รวม	1919(100.0)	1851(100.0)	1269(100.0)	889(100.0)	5928(100.0)	1878(100.0)	1859(100.0)	2254(100.0)	867(100.0)	6858(100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	12.3±1.5	13.8±1.3	15.2±1.4	15±1.8	14.6±1.8	11.5±2.1	14.3±0.6	15.7±1.1	15.8±1.1	15.4±1.4
median (พิสัย)	12(9-18)	14(9-16)	15(9-18)	15(9-18)	15(9-18)	15(9-15)	14(13-16)	16(12-18)	16(9-19)	16 (9-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(28)	(32)	(41)	(120)	(3)	(66)	(146)	(242)	(457)
รวม	55	132	175	301	663	5	7	17	17	46
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	35(49.3)	57(37.3)	83(41.3)	119(35.1)	294(38.5)	2(28.6)	44(62.0)	105(67.6)	164(64.8)	315(64.2)
2 คน	12(16.9)	28(18.3)	33(16.4)	54(15.9)	127(16.6)	0(0.0)	11(15.5)	25(15.6)	35(13.8)	71(14.5)
3 คน	7(9.9)	18(11.8)	23(11.4)	45(13.3)	93(12.2)	3(42.9)	5(7.0)	11(6.9)	22(8.7)	41(8.4)
4 คน	1(1.4)	5(3.3)	15(7.5)	22(6.5)	43(5.6)	0(0.0)	2(2.8)	4(2.5)	9(3.6)	15(3.1)
5 คน	1(1.4)	5(3.3)	6(3.0)	18(5.3)	30(3.9)	0(0.0)	5(7.0)	5(3.1)	6(2.4)	16(3.3)
6 คน ขึ้นไป	15(21.1)	40(26.1)	41(20.4)	81(23.9)	177(23.2)	2(28.6)	4(5.6)	10(6.3)	17(6.7)	33(6.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(7)	(6)	(3)	(19)	(1)	(2)	(3)	(6)	(12)
รวม	71(100.0)	153(100.0)	201(100.0)	339(100.0)	764(100.0)	7(100.0)	71(100.0)	160(100.0)	253(100.0)	491(100.0)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	54(76.1)	116(76.8)	170(84.6)	275(81.8)	615(81.0)	5(71.4)	61(89.7)	143(89.9)	236(94.8)	445(92.1)
เคย	17(23.9)	35(23.2)	31(15.4)	61(18.2)	144(19.0)	2(28.6)	7(10.3)	16(10.1)	13(5.2)	38(7.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(9)	(6)	(6)	(24)	(1)	(5)	(4)	(10)	(20)
รวม	71(100.0)	151(100.0)	201(100.0)	336(100.0)	759(100.0)	7(100.0)	68(100.0)	159(100.0)	249(100.0)	483(100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	26(35.6)	25(16.3)	31(15.2)	62(18.39)	144(18.8)	3(42.9)	16(22.9)	32(20.1)	47(18.5)	98(20.0)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	2(2.7)	4(2.6)	8(3.9)	30(8.9)	44(5.7)	1(14.3)	4(5.7)	12(7.5)	50(19.7)	67(13.7)
ถุงยางอนามัย	39(53.4)	91(59.5)	111(54.4)	159(47.0)	400(52.1)	3(42.9)	29(41.4)	51(32.1)	67(26.4)	150(30.6)
ยาฉีดคุมกำเนิด	1(1.4)	1(0.7)	1(0.5)	3(0.9)	6(0.8)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.3)	8(3.1)	10(2.0)
หลังภายนอก	2(2.7)	18(11.8)	29(14.2)	49(14.5)	98(12.8)	0(0.0)	13(18.6)	42(26.4)	60(23.6)	115(23.5)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	0(0.0)	5(3.3)	7(3.4)	14(4.1)	26(3.4)	0(0.0)	3(4.3)	12(7.5)	19(7.5)	34(6.9)
วิธีการอื่นๆ	0(0.0)	0(0.0)	3(1.5)	2(0.6)	5(0.7)	0(0.0)	2(2.9)	5(3.1)	1(0.4)	8(1.6)
ไม่แน่ใจ	3(4.1)	9(5.9)	14(6.9)	19(5.6)	45(5.9)	0(0.0)	3(4.3)	3(1.9)	2(0.8)	8(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(7)	(3)	(4)	(15)	(1)	(3)	(4)	(5)	(13)
รวม	73(100.0)	153(100.0)	204(100.0)	338(100.0)	768(100.0)	7(100.0)	70(100.0)	159(100.0)	254(100.0)	490(100.0)

ตารางที่ 3.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การตั้งครรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรภ์*										
ไม่เคย	56(78.9)	117(78.5)	173(85.2)	279(83.3)	625(82.5)	7(87.5)	63(91.3)	137(86.7)	224(88.2)	431(88.1)
1 ครั้ง	6(8.5)	6(4.0)	11(5.4)	28(8.4)	51(6.7)	0(0.0)	2(2.9)	12(7.6)	17(6.7)	31(6.3)
≥2 ครั้ง	4(5.6)	13(8.7)	1(0.5)	6(1.8)	24(3.2)	1(12.5)	2(2.9)	4(2.5)	4(1.6)	11(2.2)
ไม่แน่ใจ	5(7.0)	13(8.7)	18(8.9)	22(6.6)	58(7.7)	0(0.0)	2(2.9)	5(3.2)	9(3.5)	16(3.3)
ไม่ตอบ (จำนวน)	(3)	(11)	(4)	(7)	(25)	(0)	(4)	(5)	(5)	(14)
รวม	71(100.0)	149(100.0)	203(100.0)	335(100.0)	758(100.0)	8(100.0)	69(100.0)	158(100.0)	254(100.0)	489(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 3.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	406(21.1)	308(17.0)	127(10.3)	151(17.3)	992(17.0)	235(12.4)	142(7.7)	92(4.1)	85(10.0)	554(8.1)
เคย	1355(70.5)	1367(75.4)	1059(85.7)	648(74.1)	4429(75.8)	1491(78.6)	1568(85.3)	2065(92.9)	715(84.3)	5839(85.8)
ไม่แน่ใจ	162(8.4)	138(7.6)	50(4.0)	75(8.6)	425(7.3)	172(9.1)	129(7.0)	67(3.0)	48(5.7)	416(6.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(64)	(94)	(55)	(46)	(259)	(65)	(80)	(69)	(35)	(249)
รวม	1923(100.0)	1813(100.0)	1236(100.0)	874(100.0)	5846(100.0)	1898(100.0)	1839(100.0)	2224(100.0)	848(100.0)	6809(100.0)

พฤติกรรมกรรมการตีมสุรา

ตารางที่ 3.10 พฤติกรรมการตีมสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	1584(81.1)	1271(67.5)	704(55.3)	373(41.1)	3932(65.4)	1768(91.2)	1487(77.9)	1697(74.6)	545(62.3)	5497(78.6)
เคยตีมสุรา	369(18.9)	612(32.5)	568(44.7)	534(58.9)	2083(34.6)	170(8.8)	421(22.1)	579(25.4)	330(37.7)	1500(21.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(24)	(19)	(13)	(90)	(25)	(11)	(17)	(8)	(61)
รวม	1953(100.0)	1883(100.0)	1272(100.0)	907(100.0)	6015(100.0)	1939(100.0)	1908(100.0)	2276(100.0)	875(100.0)	6997(100.0)
อายุเมื่อตีมสุราครั้งแรก										
mean±sd	10.54±2.1	12.48±2.1	14±2.3	14.1±2	12±2.5	11.14±1.6	12.9±1.6	14.5±1.8	14.8±1.6	13.8±2.1
median (พิสัย)	11(5-17)	13(5-16)	15(5-18)	15(5-18)	13 (5-18)	12(5-15)	13(6-15)	15(5-18)	15(8-19)	14(5-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(348)	(267)	(109)	(156)	(880)	(166)	(408)	(349)	(202)	(1125)
รวม	21	345	459	378	1203	4	13	230	128	375
สถานที่ที่มักจะตีมสุรา*										
งานฉลอง/รื่นเริง	125(34.5)	247(41.0)	250(44.2)	179(33.7)	801(38.9)	84(50.6)	184(44.1)	243(42.7)	161(49.4)	672(45.5)
บ้าน	121(39.8)	194(34.4)	143(26.2)	171(33.4)	629(32.7)	57(35.5)	171(42.3)	217(39.3)	78(24.3)	523(36.4)
หอพัก	3(1.0)	5(0.9)	9(1.7)	31(6.1)	48(2.5)	2(1.3)	5(1.2)	6(1.1)	12(3.7)	25(1.7)
งานโรงเรียน	11(3.6)	13(2.3)	12(2.2)	8(1.6)	44(2.3)	6(3.8)	16(4.0)	12(2.2)	9(2.8)	43(3.0)
ร้านค้า ร้านอาหาร										
รอบบริเวณโรงเรียน										
รัศมีไม่เกิน 500 เมตร	8(2.6)	13(2.3)	20(3.7)	21(4.1)	62(3.2)	1(0.6)	3(0.7)	6(1.1)	7(2.2)	17(1.2)
ร้านค้า ร้านอาหาร										
รอบบริเวณโรงเรียน										
รัศมีเกิน 500 เมตร	8(2.6)	38(6.7)	68(12.5)	66(12.9)	180(9.4)	7(4.4)	7(1.7)	42(7.6)	42(13.1)	98(6.8)
ร้านน้ำชา	0(0.0)	2(0.4)	5(0.9)	4(0.8)	11(0.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
สวน/ไร่นา	12(3.9)	12(2.1)	8(1.5)	8(1.6)	40(2.1)	0(0.0)	6(1.5)	1(0.2)	1(0.3)	8(0.6)
อื่นๆ	16(5.3)	40(7.1)	30(5.5)	24(4.7)	110(5.7)	3(1.9)	12(3.0)	25(4.5)	11(3.4)	51(3.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(65)	(48)	(23)	(22)	(158)	(10)	(17)	(27)	(9)	(63)
รวม	304(100.0)	564(100.0)	545(100.0)	512(100.0)	1925(100.0)	160(100.0)	404(100.0)	552(100.0)	321(100.0)	1437(100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยตีมสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการตีมครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	256(69.8)	395(64.9)	309(54.9)	245(46.2)	1205(58.2)	114(67.9)	295(70.6)	429(74.4)	209(64.9)	1047(70.5)
1-2 ครั้ง	76(20.7)	133(21.9)	162(28.8)	158(29.8)	529(25.6)	43(25.6)	88(21.1)	113(19.6)	73(22.7)	317(21.3)
3-5 ครั้ง	17(4.6)	44(7.2)	49(8.7)	61(11.5)	171(8.3)	7(4.2)	24(5.7)	20(3.5)	29(9.0)	80(5.4)
6-9 ครั้ง	3(0.8)	11(1.8)	12(2.1)	22(4.2)	48(2.3)	1(0.6)	7(1.7)	6(1.0)	6(1.9)	20(1.3)
10 ครั้ง ขึ้นไป	15(4.1)	26(4.3)	31(5.5)	44(8.3)	116(5.6)	3(1.8)	4(1.0)	9(1.6)	5(1.6)	21(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(5)	(4)	(14)	(2)	(3)	(2)	(8)	(15)
รวม	367(100.0)	609(100.0)	563(100.0)	530(100.0)	2069(100.0)	168(100.0)	418(100.0)	577(100.0)	322(100.0)	1485(100.0)

ตารางที่ 3.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	59(35.8)	60(15.9)	69(16.0)	45(11.4)	233(17.0)	23(24.7)	67(26.0)	99(26.8)	37(17.3)	226(24.2)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	25(15.2)	87(23.0)	89(20.6)	75(19.0)	276(20.1)	13(14.0)	67(26.0)	118(32.0)	46(21.5)	244(26.1)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	31(18.8)	95(25.1)	124(28.7)	75(19.0)	325(23.7)	31(33.3)	64(24.8)	87(23.6)	63(29.4)	245(26.2)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	50(30.3)	136(36.0)	150(34.7)	200(50.6)	536(39.1)	26(28.0)	60(23.3)	65(17.6)	68(31.8)	219(23.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(204)	(234)	(136)	(139)	(713)	(77)	(163)	(210)	(116)	(566)
รวม	165(100.0)	378(100.0)	432(100.0)	395(100.0)	1370(100.0)	93(100.0)	258(100.0)	369(100.0)	214(100.0)	934(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	49(69.0)	139(62.3)	146(56.2)	118(44.7)	452(55.3)	43(79.6)	90(75.6)	119(83.2)	86(70.5)	338(77.2)
3-5 ครั้ง	11(15.5)	44(19.7)	65(25.0)	61(23.1)	181(22.1)	7(13.0)	21(17.6)	19(13.3)	18(14.8)	65(14.8)
6-9 ครั้ง	2(2.8)	17(7.6)	23(8.8)	31(11.7)	73(8.9)	0(0.0)	2(1.7)	4(2.8)	7(5.7)	13(3.0)
10-19 ครั้ง	5(7.0)	8(3.6)	9(3.5)	33(12.5)	56(6.7)	3(5.6)	5(4.2)	1(0.7)	5(4.1)	14(3.2)
20 ครั้ง ขึ้นไป	4(5.6)	15(6.7)	17(6.5)	21(8.0)	57(7.0)	1(1.9)	1(0.8)	0(0.0)	6(4.9)	8(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(8)	(14)	(11)	(43)	(3)	(5)	(9)	(9)	(26)
รวม	71(100.0)	223(100.0)	260(100.0)	264(100.0)	818(100.0)	54(100.0)	119(100.0)	143(100.0)	122(100.0)	438(100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	35(50.7)	87(39.9.6)	90(34.6)	93(35.4)	305(37.6)	38(60.4)	61(52.6)	70(49.3)	55(44.0)	224(51.6)
3-5 หน่วย	23(33.3)	74(34.0)	82(31.5)	89(33.8)	268(33.1)	12(22.3)	37(29.1)	52(36.6)	39(31.2)	140(32.2)
6-8 หน่วย	7(9.6)	28(12.3)	33(12.7)	30(11.3)	98(12.1)	1(1.9)	9(7.8)	11(7.7)	13(10.4)	34(7.8)
9 หน่วย ขึ้นไป	4(5.8)	29(13.3)	55(21.1)	51(19.4)	139(17.2)	3(5.6)	9(7.8)	9(6.3)	15(14.4)	36(8.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(5)	(0)	(1)	(8)	(0)	(3)	(1)	(1)	(4)
รวม	69(100.0)	218(100.0)	260(100.0)	263(100.0)	810(100.0)	54(100.0)	116(100.0)	142(100.0)	122(100.0)	434(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	42(51.9)	119(51.5)	131(47.8)	92(33.7)	384(44.7)	30(52.6)	69(56.1)	92(60.5)	67(51.1)	258(55.7)
1-2 ครั้ง	31(38.3)	81(35.1)	90(32.8)	124(45.4)	326(38.0)	22(38.6)	45(36.6)	57(37.5)	49(37.4)	173(37.4)
3-5 ครั้ง	3(3.7)	22(9.5)	35(12.8)	25(9.2)	85(9.9)	5(8.8)	7(5.7)	2(1.3)	10(7.6)	24(5.2)
6-9 ครั้ง	1(1.2)	3(1.3)	9(3.3)	9(3.3)	22(2.6)	0(0.0)	1(0.8)	0(0.0)	2(1.5)	3(0.6)
10-19 ครั้ง	0(0.0)	2(0.9)	6(2.2)	16(5.9)	24(2.8)	0(0.0)	1(0.8)	1(0.7)	1(0.8)	3(0.6)
20 ครั้ง ขึ้นไป	4(4.9)	4(1.7)	3(1.1)	7(2.6)	18(2.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.5)	2(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(2)	(2)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
รวม	81(100.0)	231(100.0)	274(100.0)	273(100.0)	859(100.0)	57(100.0)	123(100.0)	152(100.0)	131(100.0)	463(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 3.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	143(7.3)	269(14.4)	280(22.0)	318(35.1)	1010(16.9)	83(4.3)	185(9.8)	201(8.9)	177(20.4)	646(9.3)
ซื้อเองโดยใช้บัตรประจำตัวของคนอื่น	62(3.2)	73(3.9)	73(5.7)	131(14.5)	339(5.7)	12(0.6)	20(1.1)	28(1.2)	50(5.8)	110(1.6)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	235(12.1)	368(19.7)	352(27.7)	378(41.7)	1333(22.3)	116(6.0)	233(12.4)	308(13.7)	223(25.7)	880(12.7)
ซื้อเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตรประจำตัว	143(7.4)	283(15.2)	281(22.2)	344(38.1)	1051(17.6)	79(4.1)	177(9.4)	182(8.1)	162(18.6)	600(8.7)
เอามาจากบ้าน (ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	135(6.9)	191(10.2)	161(12.7)	174(19.2)	661(11.0)	92(4.8)	160(8.5)	187(8.3)	107(12.3)	546(7.9)
ซื้อเอง/ได้จากคนอื่นที่ได้มาจากร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน รัศมีไม่เกิน 500 เมตร	105(5.4)	156(8.4)	159(12.6)	236(26.1)	656(11.0)	44(2.3)	90(4.8)	96(4.3)	122(14.1)	352(5.1)
เวลาเฉลี่ยในการซื้อ/หาสุรา										
mean±sd	13.3±13.6	12.6±11.6	13.1±11.5	13.3±10.9	13.3±12.1	12.7±11.8	13.2±11.4	14.1±12.0	12.6±9.0	13.3±11.5
median (พิสัย)	10(0-90)	10(0-70)	10(0-65)	10(0-60)	10(0-90)	10(0-60)	10(0-60)	10(0-90)	10(0-60)	10(0-90)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(997)	(896)	(571)	(400)	(2864)	(1090)	(1093)	(1234)	(527)	(3944)
รวม	990	1011	720	520	3241	873	826	1059	356	3114

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการติ่มสุราชของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมาค้าง *										
ไม่เลย	316(85.9)	464(76.2)	387(68.1)	323(60.6)	1490(71.7)	138(81.2)	337(80.2)	444(76.9)	229(69.4)	1148(76.7)
เคย	52(14.1)	145(23.8)	181(31.9)	210(39.4)	588(28.3)	32(18.8)	83(19.8)	133(23.1)	101(30.6)	349(23.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(0)	(1)	(5)	(0)	(1)	(2)	(0)	(3)
รวม	368(100.0)	609(100.0)	568(100.0)	533(100.0)	2078(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	34(65.4)	90(62.1)	87(48.1)	101(48.1)	312(53.1)	25(78.1)	56(67.5)	102(76.7)	47(46.5)	230(65.9)
2-3 ครั้ง	12(23.1)	33(22.8)	71(39.2)	66(31.4)	182(31.0)	5(15.6)	24(28.9)	25(18.8)	44(43.6)	98(28.1)
4 ครั้งขึ้นไป	6(11.5)	22(15.2)	23(12.7)	43(20.5)	94(16.0)	2(6.3)	3(3.6)	6(4.5)	10(9.9)	21(6.0)
รวม	52(100.0)	145(100.0)	181(100.0)	210(100.0)	588(100.0)	32(100.0)	83(100.0)	133(100.0)	101(100.0)	349(100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เลย	248(67.6)	423(69.2)	398(70.1)	345(65.0)	1414(68.1)	127(74.7)	327(77.8)	440(76.3)	247(74.8)	1141(76.2)
เคย	119(32.4)	188(30.8)	170(29.9)	186(35.0)	663(31.9)	43(25.3)	93(22.2)	137(23.7)	83(25.2)	356(23.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(0)	(3)	(6)	(0)	(1)	(2)	(0)	(3)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	531(100.0)	2077(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	75(63.0)	103(54.8)	74(43.5)	105(56.5)	257(53.8)	24(55.8)	49(52.7)	82(59.9)	36(43.4)	191(53.7)
2-3 ครั้ง	28(23.5)	6(31.9)	60(35.3)	58(31.2)	206(31.1)	6(14.0)	36(38.7)	32(23.4)	32(38.6)	106(29.8)
4 ครั้งขึ้นไป	16(13.4)	25(13.3)	36(21.2)	23(12.4)	100(15.1)	13(30.2)	8(8.6)	23(16.8)	15(18.1)	59(16.6)
รวม	119(100.0)	188(100.0)	170(100.0)	186(100.0)	663(100.0)	43(100.0)	93(100.0)	137(100.0)	83(100.0)	356(100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เลย	299(81.0)	511(90.1)	474(86.8)	412(82.8)	1696(88.4)	136(95.4)	377(95.4)	523(95.2)	286(91.8)	1322(94.8)
เคย	67(18.1)	99(9.9)	94(13.3)	120(17.2)	380(11.6)	34(4.6)	42(4.5)	54(4.8)	44(8.2)	174(5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(2)	(0)	(2)	(7)	(0)	(2)	(2)	(0)	(4)
รวม	366(100.0)	610(100.0)	568(100.0)	532(100.0)	2076(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1496(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	47(70.1)	52(52.5)	57(60.6)	73(60.8)	229(60.3)	23(67.6)	21(50.0)	31(57.4)	27(61.4)	102(58.6)
2-3 ครั้ง	11(16.4)	34(34.3)	26(27.7)	35(29.2)	106(27.9)	7(20.6)	15(35.7)	13(24.1)	10(22.7)	45(25.9)
4 ครั้งขึ้นไป	9(13.4)	13(13.1)	11(11.7)	12(10.0)	45(11.8)	4(11.8)	6(14.3)	10(18.5)	7(15.9)	27(15.5)
รวม	67(100.0)	99(100.0)	94(100.0)	120(100.0)	380(100.0)	34(100.0)	42(100.0)	54(100.0)	44(100.0)	174(100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เลย	320(87.0)	546(89.4)	526(92.6)	470(88.7)	1862(89.6)	150(88.2)	402(95.9)	548(94.8)	316(95.8)	1416(94.6)
เคย	48(13.0)	65(10.6)	42(7.4)	60(11.3)	215(10.4)	20(11.8)	17(4.1)	30(5.2)	14(4.2)	81(5.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(0)	(4)	(6)	(0)	(2)	(1)	(0)	(3)
รวม	368(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	530(100.0)	2077(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	29(60.4)	38(58.5)	22(52.4)	31(51.7)	120(55.8)	15(75.0)	12(70.6)	19(63.3)	11(78.6)	57(70.4)
2-3 ครั้ง	10(20.8)	19(29.2)	13(31.0)	19(31.7)	61(28.4)	3(15.0)	5(29.4)	7(23.3)	2(14.3)	17(21.0)
4 ครั้งขึ้นไป	9(18.8)	8(12.3)	7(16.7)	10(16.7)	34(15.8)	2(10.0)	0(0.0)	4(13.3)	1(7.1)	7(8.6)
รวม	48(100.0)	65(100.0)	42(100.0)	60(100.0)	215(100.0)	20(100.0)	17(100.0)	30(100.0)	14(100.0)	81(100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เลย	253(68.9)	442(72.5)	454(79.9)	377(71.0)	1526(73.5)	133(78.2)	368(87.6)	534(92.4)	281(85.2)	1316(87.9)
เคย	114(31.1)	168(27.5)	114(20.1)	154(29.0)	550(26.5)	37(21.8)	52(12.4)	44(7.6)	49(14.8)	182(12.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(0)	(3)	(7)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	367(100.0)	610(100.0)	568(100.0)	531(100.0)	2076(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1498(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	55(48.2)	92(54.8)	65(57.0)	78(50.6)	290(52.7)	17(45.9)	32(61.5)	29(65.9)	25(51.0)	103(56.6)
2-3 ครั้ง	27(23.7)	49(29.2)	33(28.9)	55(35.7)	164(29.8)	11(29.7)	13(25.0)	10(22.7)	19(38.8)	53(29.1)
4 ครั้งขึ้นไป	32(28.1)	27(16.1)	16(14.0)	21(13.6)	96(17.5)	9(24.3)	7(13.5)	5(11.4)	5(10.2)	26(14.3)
รวม	114(100.0)	168(100.0)	114(100.0)	154(100.0)	550(100.0)	37(100.0)	52(100.0)	44(100.0)	49(100.0)	182(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
คลื่นไส้ อาเจียน*										
ไม่เคย	254(69.2)	373(61.0)	347(61.3)	282(53.1)	1256(60.5)	103(60.6)	271(64.5)	376(65.1)	186(56.4)	936(62.5)
เคย	113(30.8)	238(39.0)	219(38.7)	249(46.9)	819(39.5)	67(39.4)	149(35.5)	202(34.9)	144(43.6)	562(37.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(2)	(3)	(8)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	566(100.0)	531(100.0)	2075(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1498(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	70(61.9)	136(57.1)	121(55.3)	128(51.4)	455(55.6)	39(58.2)	91(61.1)	143(70.8)	77(53.5)	350(62.3)
2-3 ครั้ง	24(21.2)	67(28.2)	70(32.0)	92(36.9)	253(30.9)	22(32.8)	44(29.5)	43(21.3)	55(38.2)	164(29.2)
4 ครั้งขึ้นไป	19(16.8)	35(14.7)	28(12.8)	29(11.6)	111(13.6)	6(9.0)	14(9.4)	16(7.9)	12(8.3)	48(8.5)
รวม	113(100.0)	238(100.0)	219(100.0)	249(100.0)	819(100.0)	67(100.0)	149(100.0)	202(100.0)	144(100.0)	562(100.0)
ขับขี้รด หลังดื่มสุรา*										
ไม่เคย	305(82.9)	444(72.9)	362(63.8)	279(52.4)	1390(67.0)	137(80.6)	340(81.1)	487(84.3)	252(76.4)	1216(81.2)
เคย	63(17.1)	165(27.1)	205(36.2)	253(47.6)	686(33.0)	33(19.4)	79(18.9)	91(15.7)	78(23.6)	281(18.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(1)	(2)	(7)	(0)	(2)	(1)	(0)	(3)
รวม	368(100.0)	609(100.0)	567(100.0)	532(100.0)	2076(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	35(55.6)	86(52.1)	79(38.5)	101(39.9)	301(43.9)	22(66.7)	48(60.8)	61(67.0)	39(50.0)	170(60.5)
2-3 ครั้ง	15(23.8)	50(30.3)	76(37.1)	80(31.6)	221(32.2)	10(30.3)	21(26.6)	21(23.1)	24(30.8)	76(27.0)
4 ครั้งขึ้นไป	13(20.6)	29(17.6)	50(24.4)	72(28.5)	164(23.9)	1(3.0)	10(12.7)	9(9.9)	15(19.2)	35(12.5)
รวม	63(100.0)	165(100.0)	205(100.0)	253(100.0)	686(100.0)	33(100.0)	79(100.0)	91(100.0)	78(100.0)	281(100.0)
ขาดเรียน*										
ไม่เคย	254(69.2)	410(67.1)	434(76.7)	321(60.5)	1419(68.4)	116(68.2)	321(76.4)	464(80.3)	237(71.8)	1138(76.0)
เคย	113(30.8)	201(32.9)	132(23.3)	210(39.5)	656(31.6)	54(31.8)	99(23.6)	114(19.7)	93(28.2)	360(24.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(2)	(3)	(8)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	566(100.0)	531(100.0)	2075(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1498(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	43(38.1)	90(44.8)	55(41.7)	92(43.8)	280(42.7)	24(44.4)	39(39.4)	46(40.4)	34(36.6)	143(39.7)
2-3 ครั้ง	45(39.8)	58(28.9)	50(37.9)	75(35.7)	228(34.8)	22(40.7)	44(44.4)	44(38.6)	35(37.6)	145(40.3)
4 ครั้งขึ้นไป	25(22.1)	53(26.4)	27(20.5)	43(20.5)	148(22.6)	8(14.8)	16(16.2)	24(21.1)	24(25.8)	72(20.0)
รวม	113(100.0)	201(100.0)	132(100.0)	210(100.0)	656(100.0)	54(100.0)	99(100.0)	114(100.0)	93(100.0)	360(100.0)
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*										
ไม่เคย	249(68.0)	404(66.3)	377(66.5)	323(60.9)	1353(65.3)	111(65.3)	302(72.1)	415(71.8)	205(62.1)	1033(69.0)
เคย	117(32.0)	205(33.7)	190(33.5)	207(39.1)	719(34.7)	59(34.7)	117(27.9)	163(28.2)	125(37.9)	464(31.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(4)	(11)	(0)	(2)	(1)	(0)	(3)
รวม	366(100.0)	609(100.0)	567(100.0)	530(100.0)	2072(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	54(46.2)	114(55.6)	105(55.3)	100(48.3)	373(51.9)	33(55.9)	76(65.0)	104(63.8)	73(58.4)	286(61.6)
2-3 ครั้ง	38(32.5)	62(30.2)	58(30.5)	74(35.7)	232(32.3)	18(30.5)	33(28.2)	41(25.2)	35(28.0)	127(27.4)
4 ครั้งขึ้นไป	25(21.4)	29(14.1)	27(14.2)	33(15.9)	114(15.9)	8(13.6)	8(6.8)	18(11.0)	17(13.6)	51(11.0)
รวม	117(100.0)	205(100.0)	190(100.0)	207(100.0)	719(100.0)	59(100.0)	117(100.0)	163(100.0)	125(100.0)	464(100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เลย	314(85.3)	518(84.8)	498(87.7)	412(77.6)	1742(83.8)	149(88.2)	371(88.3)	531(92.0)	286(86.9)	1337(89.4)
เคย	54(14.7)	93(15.2)	70(12.3)	119(22.4)	336(16.2)	20(11.8)	49(11.7)	46(8.0)	43(13.1)	158(10.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(0)	(3)	(5)	(1)	(1)	(2)	(1)	(5)
รวม	368(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	531(100.0)	2078(100.0)	169(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	329(100.0)	1495(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	26(48.1)	60(64.5)	36(51.4)	73(61.3)	195(58.0)	10(50.0)	41(83.7)	32(69.6)	27(62.8)	110(69.6)
2-3 ครั้ง	18(33.3)	22(23.7)	27(38.6)	29(24.4)	96(28.6)	9(45.0)	6(12.2)	9(19.6)	9(20.9)	33(20.9)
4 ครั้งขึ้นไป	10(18.5)	11(11.8)	7(10.0)	17(14.3)	45(13.4)	1(5.0)	2(4.1)	5(10.9)	7(16.3)	15(9.5)
รวม	54(100.0)	93(100.0)	70(100.0)	119(100.0)	336(100.0)	20(100.0)	49(100.0)	46(100.0)	43(100.0)	158(100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	243(66.4)	431(70.5)	433(76.2)	361(67.9)	1468(70.7)	113(66.5)	307(73.1)	463(80.1)	246(74.8)	1129(75.4)
เคย	123(33.6)	180(29.5)	135(23.8)	171(32.1)	609(29.3)	57(33.5)	113(26.9)	115(19.9)	83(25.2)	368(24.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(1)	(0)	(2)	(6)	(0)	(1)	(1)	(1)	(3)
รวม	366(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	532(100.0)	2077(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	329(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	56(45.5)	104(57.8)	79(58.5)	91(53.2)	330(54.2)	23(40.4)	63(55.8)	70(60.9)	43(51.8)	199(54.1)
2-3 ครั้ง	48(39.0)	47(26.1)	38(28.1)	64(37.4)	197(32.3)	24(42.1)	38(33.9)	30(26.1)	27(32.5)	119(32.3)
4 ครั้งขึ้นไป	19(15.4)	29(16.1)	18(13.3)	16(9.4)	82(13.5)	10(17.5)	12(10.6)	15(13.0)	13(15.7)	50(13.6)
รวม	123(100.0)	180(100.0)	135(100.0)	171(100.0)	609(100.0)	57(100.0)	113(100.0)	115(100.0)	83(100.0)	368(100.0)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เลย	276(75.2)	452(74.0)	403(71.0)	356(6.9)	1487(71.6)	122(71.8)	312(74.3)	445(77.0)	233(70.6)	1112(74.2)
เคย	91(24.8)	159(26.0)	165(29.0)	176(33.1)	591(28.4)	48(28.2)	108(25.7)	133(23.0)	97(29.4)	386(25.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(0)	(2)	(5)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	532(100.0)	2078(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1498(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	47(51.6)	94(59.1)	88(53.3)	96(54.5)	325(55.0)	21(43.8)	58(53.7)	73(54.9)	45(46.4)	197(51.0)
2-3 ครั้ง	22(24.2)	44(27.7)	54(32.7)	49(27.8)	169(28.6)	16(33.3)	37(34.3)	39(29.3)	38(39.2)	130(33.7)
4 ครั้งขึ้นไป	22(24.2)	21(13.2)	23(13.9)	31(17.6)	97(16.4)	11(22.9)	13(12.0)	21(15.8)	14(14.4)	59(15.3)
รวม	91(100.0)	159(100.0)	165(100.0)	176(100.0)	591(100.0)	48(100.0)	108(100.0)	133(100.0)	97(100.0)	386(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีตราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกจับเพราะข้อพิพาทขณะเมาสุรา*										
ไม่เคย	341(92.9)	575(94.3)	548(96.5)	480(90.4)	1944(93.6)	167(98.2)	416(99.3)	567(98.1)	319(96.7)	1469(98.1)
เคย	26(7.1)	35(5.7)	20(3.5)	51(9.6)	132(6.4)	3(1.8)	3(0.7)	11(1.9)	11(3.3)	28(1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(0)	(3)	(7)	(0)	(2)	(1)	(0)	(3)
รวม	367(100.0)	610(100.0)	568(100.0)	531(100.0)	2076(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	16(61.5)	23(65.7)	11(55.0)	26(51.0)	76(57.6)	2(66.7)	1(33.3)	8(72.7)	8(72.7)	19(67.9)
2-3 ครั้ง	4(15.4)	5(14.3)	6(30.0)	16(31.4)	31(23.5)	1(33.3)	1(33.3)	2(18.2)	1(9.1)	5(17.9)
4 ครั้งขึ้นไป	6(23.1)	7(20.0)	3(15.0)	9(17.6)	25(18.9)	0(0.0)	1(33.3)	1(9.1)	2(18.2)	4(14.3)
รวม	26(100.0)	35(100.0)	20(100.0)	51(100.0)	132(100.0)	3(100.0)	3(100.0)	11(100.0)	11(100.0)	28(100.0)
ถูกลวนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เคย	339(92.6)	563(92.4)	534(94.0)	471(88.7)	1907(91.9)	166(97.6)	405(96.4)	558(96.5)	314(95.2)	1443(96.3)
เคย	27(7.4)	46(7.6)	34(6.0)	60(11.3)	167(8.1)	4(2.4)	15(3.6)	20(3.5)	16(4.8)	55(3.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(0)	(3)	(9)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)
รวม	366(100.0)	609(100.0)	568(100.0)	531(100.0)	2074(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	578(100.0)	330(100.0)	1498(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	15(55.6)	24(52.2)	19(55.9)	30(50.0)	88(52.7)	2(50.0)	9(60.0)	13(65.0)	15(93.8)	39(70.9)
2-3 ครั้ง	9(33.3)	9(19.6)	5(14.7)	16(26.7)	39(23.4)	2(50.0)	6(40.0)	3(15.0)	1(6.3)	12(21.8)
4 ครั้งขึ้นไป	3(11.1)	13(28.3)	10(29.4)	14(23.3)	40(24.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(20.0)	0(0.0)	4(7.3)
รวม	27(100.0)	46(100.0)	34(100.0)	60(100.0)	167(100.0)	4(100.0)	15(100.0)	20(100.0)	16(100.0)	55(100.0)
ลวนลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เคย	334(91.0)	556(91.1)	526(92.6)	472(89.1)	1888(91.0)	164(96.5)	404(96.2)	561(97.2)	320(97.0)	1449(96.8)
เคย	33(9.0)	54(8.9)	42(7.4)	58(10.9)	187(9.0)	6(3.5)	16(3.8)	16(2.8)	10(3.0)	48(3.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(0)	(4)	(8)	(0)	(1)	(2)	(0)	(3)
รวม	367(100.0)	610(100.0)	568(100.0)	530(100.0)	2075(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	16(48.5)	30(55.6)	24(57.1)	26(44.8)	96(51.3)	3(50.0)	11(68.8)	12(75.0)	8(80.0)	34(70.8)
2-3 ครั้ง	10(30.3)	15(27.8)	9(21.4)	17(29.3)	51(27.3)	2(33.3)	4(25.0)	2(12.5)	2(20.0)	10(20.8)
4 ครั้งขึ้นไป	7(21.2)	9(16.7)	9(21.4)	15(25.9)	40(21.4)	1(16.7)	1(6.3)	2(12.5)	0(0.0)	4(8.3)
รวม	33(100.0)	54(100.0)	42(100.0)	58(100.0)	187(100.0)	6(100.0)	16(100.0)	16(100.0)	10(100.0)	48(100.0)
พยายามที่จะเลิกตีตราแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เคย	314(85.8)	516(84.5)	481(84.7)	399(75.3)	1710(82.4)	143(84.6)	369(88.1)	531(92.0)	288(87.5)	1331(89.1)
เคย	52(14.2)	95(15.5)	87(15.3)	131(24.7)	365(17.6)	26(15.4)	50(11.9)	46(8.0)	41(12.5)	163(10.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(1)	(0)	(4)	(8)	(1)	(2)	(2)	(1)	(6)
รวม	366(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	530(100.0)	2075(100.0)	169(100.0)	419(100.0)	577(100.0)	329(100.0)	1494(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	26(50.0)	54(56.8)	48(55.2)	63(48.1)	191(52.3)	19(73.1)	34(68.0)	31(67.4)	22(53.7)	106(65.0)
2-3 ครั้ง	18(34.6)	23(24.2)	20(23.0)	43(32.8)	104(28.5)	4(15.4)	10(20.0)	8(17.4)	11(26.8)	33(20.2)
4 ครั้งขึ้นไป	8(15.4)	18(18.9)	19(21.8)	25(19.1)	70(19.2)	3(11.5)	6(12.0)	7(15.2)	8(19.5)	24(14.7)
รวม	52(100.0)	95(100.0)	87(100.0)	131(100.0)	365(100.0)	26(100.0)	50(100.0)	46(100.0)	41(100.0)	163(100.0)
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*										
ไม่เลย	342(93.2)	578(94.6)	542(95.6)	486(91.5)	1948(93.8)	161(94.7)	405(96.7)	553(95.8)	315(95.5)	1434(95.9)
เคย	25(6.8)	33(5.4)	25(4.4)	45(8.5)	128(6.2)	9(5.3)	14(3.3)	24(4.2)	15(4.5)	62(4.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(1)	(3)	(7)	(0)	(2)	(2)	(0)	(4)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	567(100.0)	531(100.0)	2076(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1496(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	13(52.0)	22(66.7)	13(52.0)	25(55.6)	73(57.0)	5(55.6)	11(78.6)	13(54.2)	12(80.0)	41(66.1)
2-3 ครั้ง	7(28.0)	4(12.1)	6(24.0)	11(24.4)	28(21.9)	3(33.3)	2(14.3)	7(29.2)	2(13.3)	14(22.6)
4 ครั้งขึ้นไป	5(20.0)	7(21.2)	6(24.0)	9(20.0)	27(21.1)	1(11.1)	1(7.1)	4(16.7)	1(6.7)	7(11.3)
รวม	25(100.0)	33(100.0)	25(100.0)	45(100.0)	128(100.0)	9(100.0)	14(100.0)	24(100.0)	15(100.0)	62(100.0)
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*										
ไม่เลย	339(92.4)	572(93.6)	542(95.4)	486(91.4)	1939(93.3)	156(91.8)	402(95.7)	548(95.0)	312(94.5)	1418(94.7)
เคย	28(7.6)	39(6.4)	26(4.6)	46(8.6)	139(6.7)	14(8.2)	18(4.3)	29(5.0)	18(5.5)	79(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(0)	(2)	(5)	(0)	(1)	(2)	(0)	(3)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	532(100.0)	2078(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	14(50.0)	19(48.7)	15(57.7)	24(52.2)	72(51.8)	10(71.4)	9(50.0)	17(58.6)	12(66.7)	48(60.8)
2-3 ครั้ง	8(28.6)	12(30.8)	4(15.4)	16(34.8)	40(28.8)	3(21.4)	6(33.3)	7(24.1)	6(33.3)	22(27.8)
4 ครั้งขึ้นไป	6(21.4)	8(20.5)	7(26.9)	6(13.0)	27(19.4)	1(7.1)	3(16.7)	5(17.2)	0(0.0)	9(11.4)
รวม	28(100.0)	39(100.0)	26(100.0)	46(100.0)	139(100.0)	14(100.0)	18(100.0)	29(100.0)	18(100.0)	79(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	277(75.5)	473(77.5)	474(83.7)	391(73.5)	1615(77.8)	132(77.6)	348(83.1)	508(88.0)	278(84.2)	1266(84.6)
เคย	90(24.5)	137(22.5)	92(16.3)	141(26.5)	460(22.2)	38(22.4)	71(16.9)	69(12.0)	52(15.8)	230(15.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(2)	(2)	(2)	(8)	(0)	(2)	(2)	(0)	(4)
รวม	367(100.0)	610(100.0)	566(100.0)	532(100.0)	2075(100.0)	170(100.0)	419(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1496(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	35(38.9)	73(53.3)	57(62.0)	80(56.7)	245(53.3)	25(65.8)	46(64.8)	43(62.3)	24(46.2)	138(60.0)
2-3 ครั้ง	30(33.3)	48(35.0)	27(29.3)	49(34.8)	154(33.5)	8(21.1)	21(29.6)	19(27.5)	23(44.2)	71(30.9)
4 ครั้งขึ้นไป	25(27.8)	16(11.7)	8(8.7)	12(8.5)	61(13.3)	5(13.2)	4(5.6)	7(10.1)	5(9.6)	21(9.1)
รวม	90(100.0)	137(100.0)	92(100.0)	141(100.0)	460(100.0)	38(100.0)	71(100.0)	69(100.0)	52(100.0)	230(100.0)

ตารางที่ 3.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการติ่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เคย	342(93.2)	574(93.9)	551(97.0)	490(92.1)	1957(94.2)	165(97.1)	415(98.8)	567(98.3)	317(96.1)	1464(97.8)
เคย	25(6.8)	37(6.1)	17(3.0)	42(7.9)	121(5.8)	5(2.9)	5(1.2)	10(1.7)	13(3.9)	33(2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(0)	(2)	(5)	(0)	(1)	(2)	(0)	(3)
รวม	367(100.0)	611(100.0)	568(100.0)	532(100.0)	2078(100.0)	170(100.0)	420(100.0)	577(100.0)	330(100.0)	1497(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	11(44.0)	27(73.0)	12(70.6)	26(61.9)	76(62.8)	3(60.0)	4(80.0)	8(80.0)	11(84.6)	26(78.8)
2-3 ครั้ง	10(40.0)	5(13.5)	2(11.8)	10(23.8)	27(22.3)	0(0.0)	1(20.0)	1(10.0)	0(0.0)	2(6.1)
4 ครั้งขึ้นไป	4(16.0)	5(13.5)	3(17.6)	6(14.3)	18(14.9)	2(40.0)	0(0.0)	1(10.0)	2(15.4)	5(15.2)
รวม	25(100.0)	37(100.0)	17(100.0)	42(100.0)	121(100.0)	5(100.0)	5(100.0)	10(100.0)	13(100.0)	33(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยติ่มสุรา **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 3.13 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการติ่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เคย	1552(78.9)	1562(82.8)	1098(85.9)	752(83.1)	4964(82.2)	1718(88.2)	1677(88.7)	2069(91.1)	752(85.6)	6216(88.9)
เคย	415(21.1)	324(17.2)	180(14.1)	153(16.9)	1072(17.8)	230(11.8)	213(11.3)	203(8.9)	127(14.4)	773(11.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(20)	(21)	(13)	(15)	(69)	(15)	(29)	(21)	(4)	(69)
รวม	1967(100.0)	1886(100.0)	1278(100.0)	905(100.0)	6036(100.0)	1948(100.0)	1890(100.0)	2272(100.0)	879(100.0)	6989(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	244(58.8)	187(57.7)	108(60.0)	93(60.8)	632(59.0)	136(59.1)	130(61.0)	125(61.6)	72(56.7)	463(59.9)
2-3 ครั้ง	99(23.9)	83(25.6)	40(22.2)	37(24.2)	259(24.2)	55(23.9)	55(25.8)	52(25.6)	38(29.9)	200(25.9)
4 ครั้งขึ้นไป	72(17.3)	54(16.7)	32(17.8)	23(15.0)	181(16.9)	39(17.0)	28(13.1)	26(12.8)	17(13.4)	110(14.2)
รวม	415(100.0)	324(100.0)	180(100.0)	153(100.0)	1072(100.0)	230(100.0)	213(100.0)	203(100.0)	127(100.0)	773(100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง										
ไม่เคย	1637(83.3)	1605(85.1)	1110(86.8)	718(79.3)	5070(84.0)	1799(92.3)	1729(91.4)	2093(92.2)	783(89.2)	6404(91.6)
เคย	328(16.7)	282(15.0)	169(13.2)	187(20.7)	966(16.0)	150(7.6)	163(8.7)	178(7.8)	95(10.8)	586(8.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(22)	(20)	(12)	(15)	(69)	(14)	(27)	(22)	(5)	(68)
รวม	1965(100.0)	1887(100.0)	1279(100.0)	905(100.0)	6036(100.0)	1949(100.0)	1892(100.0)	2271(100.0)	878(100.0)	6990(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	213(64.9)	167(59.2)	104(61.5)	120(64.2)	604(62.5)	96(64.0)	92(56.4)	113(63.5)	49(51.6)	350(59.7)
2-3 ครั้ง	70(21.3)	72(25.5)	46(27.2)	50(26.7)	238(24.6)	36(24.0)	49(30.1)	46(25.8)	38(40.0)	169(28.8)
4 ครั้งขึ้นไป	45(13.7)	43(15.2)	19(11.2)	17(9.1)	124(12.8)	18(12.0)	22(13.5)	19(10.7)	8(8.4)	67(11.4)
รวม	328(100.0)	282(100.0)	169(100.0)	187(100.0)	966(100.0)	150(100.0)	163(100.0)	178(100.0)	95(100.0)	586(100.0)

ตารางที่ 3.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการตีมูลค่าของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เลย	1673(84.2)	1668(87.5)	1176(91.1)	775(84.2)	5292(86.7)	1867(95.1)	1800(93.8)	2188(95.4)	825(93.4)	6680(94.6)
เคย	292(14.7)	218(11.4)	103(8.0)	130(14.1)	743(12.2)	82(4.2)	90(4.7)	83(3.6)	54(6.1)	309(4.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(22)	(20)	(12)	(15)	(69)	(14)	(27)	(22)	(5)	(68)
รวม	1965(100.0)	1887(100.0)	1279(100.0)	905(100.0)	6036(100.0)	1949(100.0)	1892(100.0)	2271(100.0)	878(100.0)	6990(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	192(65.8)	130(59.6)	64(62.1)	79(60.8)	465(62.6)	51(62.2)	62(68.9)	53(63.9)	29(53.7)	195(63.1)
2-3 ครั้ง	59(20.2)	51(23.4)	27(26.2)	39(30.0)	176(23.7)	21(25.6)	18(20.0)	18(21.7)	18(33.3)	75(24.3)
4 ครั้งขึ้นไป	41(14.0)	37(17.0)	12(11.7)	12(9.2)	102(13.7)	10(12.2)	10(11.1)	12(14.5)	7(13.0)	39(12.6)
รวม	292(100.0)	218(100.0)	103(100.0)	130(100.0)	743(100.0)	82(100.0)	90(100.0)	83(100.0)	879(100.0)	309(100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เลย	1867(95.1)	1807(95.8)	1216(95.0)	836(92.6)	5726(94.9)	1914(98.2)	1844(97.7)	2227(98.1)	859(97.7)	6844(98.0)
เคย	96(5.0)	80(4.2)	64(5.1)	67(7.5)	307(5.0)	35(1.8)	44(2.3)	42(1.9)	20(2.3)	141(2.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(20)	(11)	(17)	(72)	(14)	(31)	(24)	(4)	(73)
รวม	1963(100.0)	1887(100.0)	1280(100.0)	903(100.0)	6033(100.0)	1949(100.0)	1888(100.0)	2269(100.0)	879(100.0)	6985(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	60(62.5)	62(77.5)	42(65.6)	44(65.7)	208(67.8)	25(71.4)	27(61.4)	31(73.8)	14(70.0)	97(68.8)
2-3 ครั้ง	17(17.7)	8(10.0)	16(25.0)	14(20.9)	55(17.9)	6(17.1)	13(29.5)	5(11.9)	6(30.0)	30(21.3)
4 ครั้งขึ้นไป	19(19.8)	10(12.5)	6(9.4)	9(13.4)	44(14.3)	4(11.4)	4(9.1)	6(14.3)	0(0.0)	14(9.9)
รวม	96(100.0)	80(100.0)	64(100.0)	67(100.0)	307(100.0)	35(100.0)	44(100.0)	42(100.0)	20(100.0)	141(100.0)
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เลย	1830(93.1)	1706(90.4)	1065(83.3)	717(79.4)	5318(88.1)	1865(95.7)	1747(92.4)	2051(90.3)	745(84.8)	6408(91.7)
เคย	135(6.8)	181(9.6)	214(16.7)	186(20.6)	716(11.8)	83(4.2)	143(7.6)	221(9.7)	134(15.2)	581(8.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(22)	(20)	(12)	(17)	(71)	(15)	(29)	(21)	(4)	(69)
รวม	1965(100.0)	1887(100.0)	1279(100.0)	903(100.0)	6034(100.0)	1948(100.0)	1890(100.0)	2272(100.0)	879(100.0)	6989(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	99(73.3)	120(66.3)	102(47.7)	102(54.8)	423(59.1)	57(68.7)	88(61.5)	134(60.6)	71(53.0)	350(60.2)
2-3 ครั้ง	24(17.8)	36(19.9)	76(35.5)	59(31.7)	195(27.2)	18(21.7)	42(29.4)	66(29.9)	53(39.6)	179(30.8)
4 ครั้งขึ้นไป	12(8.9)	25(13.8)	36(16.8)	25(13.4)	98(13.7)	8(9.6)	13(9.1)	21(9.5)	10(7.5)	52(9.0)
รวม	135(100.0)	181(100.0)	214(100.0)	186(100.0)	716(100.0)	83(100.0)	143(100.0)	221(100.0)	134(100.0)	581(100.0)
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เลย	1593(81.1)	1587(84.1)	1079(84.7)	704(77.8)	4963(82.3)	1661(85.3)	1585(83.9)	1933(85.2)	712(81.1)	5891(84.3)
เคย	372(19.0)	301(16.0)	195(15.3)	201(22.2)	1069(17.7)	286(14.7)	305(16.1)	337(14.8)	166(18.9)	1094(15.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(22)	(19)	(17)	(15)	(73)	(16)	(29)	(23)	(5)	(73)
รวม	1965(100.0)	1888(100.0)	1274(100.0)	905(100.0)	6032(100.0)	1947(100.0)	1890(100.0)	2270(100.0)	878(100.0)	6985(100.0)

ตารางที่ 3.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการติ่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	218(58.6)	154(51.2)	90(46.2)	93(46.3)	555(51.9)	146(51.0)	152(49.8)	177(52.5)	67(40.4)	542(49.5)
2-3 ครั้ง	92(24.7)	86(28.6)	70(35.9)	67(33.3)	315(29.5)	96(33.6)	98(32.1)	109(32.3)	66(39.8)	369(33.7)
4 ครั้งขึ้นไป	62(16.7)	61(20.3)	35(17.9)	41(20.4)	199(18.6)	44(15.4)	55(18.0)	51(15.1)	33(19.9)	183(16.7)
รวม	372(100.0)	301(100.0)	195(100.0)	201(100.0)	1069(100.0)	286(100.0)	305(100.0)	337(100.0)	166(100.0)	1094(100.0)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยไม่ต้องการ										
ไม่เลย	1751(89.2)	1691(89.7)	1126(88.0)	773(85.6)	5341(88.5)	1793(92.0)	1708(90.5)	2002(88.2)	710(80.8)	6213(88.9)
เคย	213(10.9)	195(10.4)	153(11.9)	130(14.4)	691(11.5)	156(8.0)	179(9.5)	269(11.8)	169(19.3)	773(11.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(21)	(12)	(17)	(73)	(14)	(32)	(22)	(4)	(72)
รวม	1964(100.0)	1886(100.0)	1279(100.0)	903(100.0)	6032(100.0)	1949(100.0)	1887(100.0)	2271(100.0)	879(100.0)	6986(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	117(54.9)	103(52.8)	81(52.9)	63(48.5)	364(52.7)	65(41.7)	90(50.3)	118(43.9)	65(38.5)	338(43.7)
2-3 ครั้ง	51(23.9)	43(22.1)	32(20.9)	35(26.9)	161(23.3)	50(32.16)	58(32.4)	105(39.0)	70(41.4)	283(36.6)
4 ครั้งขึ้นไป	45(21.1)	49(25.1)	40(26.1)	32(24.6)	166(24.0)	41(26.3)	31(17.3)	46(17.1)	34(20.1)	152(19.7)
รวม	213(100.0)	195(100.0)	153(100.0)	130(100.0)	691(100.0)	156(100.0)	179(100.0)	269(100.0)	169(100.0)	773(100.0)
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เลย	1900(96.7)	1813(96.2)	1232(96.3)	842(93.2)	5787(95.9)	1929(99.0)	1864(98.7)	2245(99.0)	850(96.6)	6888(98.6)
เคย	65(3.3)	72(3.8)	48(3.7)	61(6.7)	246(4.0)	20(1.1)	25(1.3)	22(0.9)	30(3.3)	97(1.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(22)	(22)	(11)	(17)	(72)	(14)	(30)	(26)	(3)	(73)
รวม	1965(100.0)	1885(100.0)	1280(100.0)	903(100.0)	6033(100.0)	1949(100.0)	1889(100.0)	2267(100.0)	880(100.0)	6985(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	39(60.0)	42(58.3)	30(62.5)	35(57.4)	146(69.3)	13(65.0)	16(64.0)	12(54.5)	18(60.0)	59(60.8)
2-3 ครั้ง	12(18.5)	10(13.9)	4(8.3)	13(21.3)	39(15.9)	6(30.0)	7(28.0)	7(31.8)	10(33.3)	30(30.9)
4 ครั้งขึ้นไป	14(21.5)	20(27.8)	14(29.2)	13(21.3)	61(24.8)	1(5.0)	2(8.0)	3(13.6)	2(6.7)	8(8.2)
รวม	65(100.0)	72(100.0)	48(100.0)	61(100.0)	246(100.0)	20(100.0)	25(100.0)	22(100.0)	30(100.0)	97(100.0)

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 3.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	474(25.5)	479(27.0)	266(21.5)	173(19.6)	1392(24.2)	342(18.6)	342(18.7)	332(15.0)	122(14.1)	1138(16.9)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณาเครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง	1386(74.5)	1296(73.0)	972(78.5)	711(80.4)	4365(75.8)	1492(81.4)	1488(81.3)	1885(85.0)	746(85.9)	5611(83.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(127)	(132)	(53)	(36)	(348)	(129)	(89)	(76)	(15)	(309)
รวม	1860(100.0)	1775(100.0)	1238(100.0)	884(100.0)	5757(100.0)	1834(100.0)	1830(100.0)	2271(100.0)	868(100.0)	6749(100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	1330(98.3)	1257(99.0)	959(99.0)	687(98.0)	4233(98.6)	1470(99.4)	1459(99.3)	1857(99.3)	735(99.9)	5521(99.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	325(38.8)	279(34.5)	202(34.1)	122(39.9)	928(36.5)	362(36.1)	312(35.4)	455(38.1)	107(27.4)	1236(35.6)
5-9 ครั้ง	115(13.7)	131(16.2)	81(13.7)	35(11.4)	362(14.2)	195(19.4)	174(19.7)	179(15.0)	53(13.6)	601(17.3)
≥10 ครั้ง	203(24.2)	168(20.8)	129(21.8)	73(23.9)	573(22.5)	205(20.4)	175(19.8)	219(18.3)	152(38.9)	751(21.6)
หลายครั้ง	168(20.0)	215(26.6)	170(28.7)	75(24.5)	628(24.7)	216(21.5)	202(22.9)	327(27.4)	75(19.2)	820(23.6)
จำไม่ได้	27(3.2)	15(1.9)	10(1.7)	1(0.3)	53(2.1)	26(2.6)	19(2.2)	15(1.3)	4(1.0)	64(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(492)	(449)	(367)	(381)	(1689)	(466)	(577)	(662)	(344)	(2046)
รวม	838(100.0)	808(100.0)	592(100.0)	306(100.0)	2544(100.0)	1004(100.0)	882(100.0)	1195(100.0)	391(100.0)	3472(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น**										
เหล้า	835(69.5)	906(77.2)	753(82.9)	454(71.2)	2948(75.2)	1007(71.7)	1037(74.3)	1474(82.2)	566(81.1)	4084(77.2)
เบียร์	922(76.8)	960(82.0)	770(84.8)	456(71.5)	3108(79.3)	1192(84.8)	1200(86.0)	1628(90.7)	611(87.5)	4631(87.5)
Spy/ไวน์	558(46.5)	626(53.4)	491(54.1)	237(36.2)	1906(48.6)	716(50.9)	779(55.8)	1079(60.1)	359(51.4)	2933(55.4)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	157(13.1)	186(15.9)	217(23.9)	88(13.8)	648(16.5)	205(14.6)	218(15.6)	370(20.6)	110(15.8)	903(17.1)
อื่นๆ	9(0.8)	7(0.6)	8(0.9)	4(0.6)	28(0.7)	7(0.5)	4(0.3)	6(0.3)	3(0.4)	20(0.4)
วิทยุ										
เคยเห็น*	667(40.1)	463(30.7)	331(31.0)	368(46.4)	1828(36.3)	535(31.5)	472(27.7)	551(42.1)	290(36.9)	1848(29.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	182(58.3)	134(57.3)	80(48.5)	63(52.5)	459(55.2)	166(53.2)	150(62.0)	141(47.5)	47(38.2)	504(51.7)
5-9 ครั้ง	32(10.3)	22(9.4)	22(13.3)	14(11.7)	90(10.8)	42(13.5)	28(11.6)	37(12.5)	12(9.8)	119(12.2)
≥10 ครั้ง	39(12.5)	38(16.2)	26(15.8)	13(10.8)	116(14.0)	26(8.3)	21(8.7)	35(11.8)	45(36.6)	127(13.0)
หลายครั้ง	53(17.0)	36(15.4)	33(20.0)	29(24.2)	151(18.2)	70(22.4)	35(14.5)	72(24.2)	17(13.8)	194(19.9)
จำไม่ได้	6(1.9)	4(1.7)	4(2.4)	1(0.8)	15(1.8)	8(2.6)	8(3.3)	12(4.0)	2(1.6)	30(3.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(355)	(229)	(166)	(248)	(997)	(223)	(230)	(254)	(167)	(874)
รวม	312(100.0)	234(100.0)	165(100.0)	120(100.0)	831(100.0)	312(100.0)	242(100.0)	297(100.0)	123(100.0)	974(100.0)

ตารางที่ 3.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ที่เห็น**										
เหล่านี้	269(51.6)	216(56.5)	171(59.2)	178(54.8)	834(55.0)	241(50.7)	244(56.7)	327(64.2)	158(60.5)	970(57.9)
เบียร์	273(52.4)	225(58.7)	188(65.13)	166(50.9)	852(56.1)	310(65.3)	259(60.2)	350(68.8)	175(67.0)	1094(65.3)
Spy/ไวน์	113(21.7)	94(24.6)	80(27.7)	60(18.4)	347(22.9)	115(24.2)	129(30.0)	168(33.0)	85(32.6)	497(29.7)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	49(9.4)	39(10.2)	42(14.5)	33(10.1)	163(10.7)	47(9.9)	47(10.9)	71(13.9)	24(9.2)	189(11.3)
อื่นๆ	6(1.2)	6(1.6)	3(1.0)	1(0.3)	16(1.1)	5(1.1)	2(0.5)	2(0.2)	3(1.1)	11(0.7)
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	992(79.7)	867(80.1)	671(78.6)	540(89.3)	3070(81.1)	1009(81.6)	992(85.8)	1239(79.4)	489(83.4)	3729(82.2)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	276(52.1)	246(49.7)	176(47.6)	122(57.0)	820(51.0)	387(59.4)	317(56.0)	379(51.4)	112(44.8)	1195(54.2)
5-9 ครั้ง	67(12.6)	72(14.5)	46(12.4)	21(9.8)	206(12.8)	80(12.3)	73(12.9)	92(12.5)	38(15.2)	283(12.8)
≥10 ครั้ง	79(14.9)	56(11.3)	63(17.0)	27(12.6)	225(14.0)	61(9.4)	59(10.4)	74(10.0)	63(25.2)	257(11.7)
หลายครั้ง	88(16.6)	111(22.4)	76(20.5)	43(20.1)	318(19.8)	111(17.1)	99(17.5)	176(23.8)	34(13.6)	420(19.0)
จำไม่ได้	20(3.8)	10(2.0)	9(2.4)	1(0.5)	40(2.5)	12(1.8)	18(3.2)	17(2.3)	3(1.2)	50(2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(462)	(372)	(301)	(326)	(1461)	(358)	(426)	(501)	(239)	(1524)
รวม	530(100.0)	495(100.0)	370(100.0)	214(100.0)	1609(100.0)	651(100.0)	566(100.0)	738(100.0)	250(100.0)	2205(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ที่เห็น**										
เหล่านี้	484(57.2)	501(64.7)	452(72.7)	308(62.1)	1745(63.7)	540(57.4)	584(62.8)	856(72.6)	310(68.4)	2290(65.4)
เบียร์	538(63.4)	547(70.5)	471(75.7)	331(66.7)	1887(68.8)	692(73.6)	696(75.0)	949(80.5)	355(78.4)	2694(76.9)
Spy/ไวน์	263(31.0)	306(39.5)	271(43.6)	152(30.6)	992(36.2)	348(37.0)	406(43.6)	548(46.5)	192(42.4)	1494(42.6)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	84(9.9)	96(12.4)	109(17.5)	47(9.5)	336(12.3)	81(8.6)	109(11.7)	172(14.6)	43(9.5)	405(11.6)
อื่นๆ	6(0.7)	7(0.9)	2(0.3)	5(1.0)	20(0.7)	4(0.4)	3(0.3)	3(0.3)	2(0.4)	12(0.3)
นิตยสาร										
เคยเห็น*	712(62.8)	604(64.8)	475(63.0)	393(77.7)	2184(65.7)	704(63.5)	705(71.5)	860(60.9)	338(66.3)	2607(64.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	212(60.1)	174(55.8)	113(47.5)	85(59.4)	584(55.8)	265(60.8)	220(57.0)	261(55.2)	63(41.2)	809(55.9)
5-9 ครั้ง	33(9.3)	41(13.1)	32(13.4)	14(9.8)	120(11.5)	62(14.2)	52(13.5)	46(9.7)	20(13.1)	180(12.4)
≥10 ครั้ง	35(9.9)	28(9.0)	39(16.4)	13(9.1)	115(11.0)	33(7.6)	32(8.3)	38(8.02)	47(30.7)	150(10.4)
หลายครั้ง	59(16.7)	64(20.5)	50(21.0)	31(21.7)	204(19.5)	68(15.6)	65(16.8)	115(24.3)	20(13.1)	268(18.5)
จำไม่ได้	14(4.0)	5(1.6)	4(1.7)	0(0.0)	23(2.2)	8(1.8)	17(4.4)	13(2.7)	3(2.0)	41(2.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(359)	(292)	(237)	(250)	(1138)	(268)	(319)	(387)	(185)	(1159)
รวม	353(100.0)	312(100.0)	238(100.0)	143(100.0)	1046(100.0)	436(100.0)	386(100.0)	473(100.0)	153(100.0)	1448(100.0)

ตารางที่ 3.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น**										
เหล้า	273(47.6)	273(53.3)	263(61.9)	178(51.3)	987(53.1)	335(53.3)	345(52.8)	495(62.3)	184(59.2)	1359(56.9)
เบียร์	276(48.1)	327(63.7)	299(70.4)	187(53.9)	1089(58.6)	416(66.2)	443(67.6)	593(74.7)	219(70.4)	1671(70.0)
Spy/ไวน์	233(40.6)	209(40.8)	218(51.3)	115(33.1)	775(41.7)	289(46.0)	351(53.6)	465(58.6)	157(50.5)	1262(52.9)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	58(10.1)	69(13.5)	98(23.1)	30(8.6)	255(13.7)	74(11.8)	82(12.5)	160(20.2)	41(13.2)	357(14.9)
อื่นๆ	6(1.0)	4(0.8)	3(0.7)	2(0.6)	15(0.8)	4(0.6)	2(0.3)	7(0.9)	1(0.3)	14(0.6)
ผ่านป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	1001(80.0)	832(78.5)	596(73.5)	481(84.5)	2910(78.8)	983(77.9)	908(81.7)	1083(71.8)	442(76.7)	3416(76.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	303(55.8)	265(55.1)	171(50.9)	98(52.7)	837(54.1)	371(58.3)	282(54.3)	357(55.2)	97(45.3)	1107(54.9)
5-9 ครั้ง	72(13.3)	47(9.8)	36(10.7)	27(14.5)	182(11.8)	91(14.3)	74(14.3)	73(11.3)	28(13.1)	266(13.2)
≥10 ครั้ง	66(12.2)	54(11.2)	53(15.8)	21(11.3)	194(12.5)	52(8.2)	43(8.3)	45(7.0)	56(26.2)	196(9.7)
หลายครั้ง	85(15.7)	103(21.4)	70(20.8)	40(21.5)	298(19.3)	106(16.7)	98(18.9)	158(24.4)	31(14.5)	393(19.5)
จำไม่ได้	17(3.1)	12(2.5)	6(1.8)	0(0.0)	35(2.3)	16(2.5)	22(4.2)	14(2.2)	2(0.9)	54(2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(458)	(351)	(260)	(295)	(1364)	(347)	(389)	(436)	(228)	(1400)
รวม	543(100.0)	481(100.0)	336(100.0)	186(100.0)	1546(100.0)	636(100.0)	519(100.0)	647(100.0)	214(100.0)	2016(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น**										
เหล้า	486(56.9)	480(64.4)	38(70.0)	253(58.8)	1607(62.2)	506(55.5)	517(61.0)	724(70.3)	272(66.7)	2016(63.1)
เบียร์	563(65.9)	552(73.9)	455(82.1)	281(65.3)	1851(71.6)	690(75.7)	662(78.0)	849(82.7)	324(79.4)	2525(79.1)
Spy/ไวน์	289(33.8)	282(37.9)	265(47.8)	134(31.2)	970(37.6)	370(40.6)	351(41.3)	485(47.3)	165(40.4)	1371(42.9)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	82(9.6)	94(12.6)	104(18.8)	53(12.3)	333(12.9)	87(9.5)	121(14.3)	158(15.4)	51(12.5)	417(13.1)
อื่นๆ	8(0.9)	7(0.9)	4(0.7)	0(0.0)	19(0.7)	4(0.4)	3(0.4)	3(0.3)	1(0.2)	11(0.3)
ผ่านปลิว										
เคยเห็น*	566(53.0)	410(48.4)	247(37.0)	287(65.5)	1510(50.0)	423(43.7)	379(48.2)	346(28.7)	204(48.2)	1352(39.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	146(58.2)	120(60.6)	56(50.0)	58(59.8)	380(57.8)	138(60.5)	134(68.7)	97(53.3)	41(45.1)	410(58.9)
5-9 ครั้ง	32(12.7)	18(9.1)	10(8.9)	8(8.2)	68(10.3)	28(12.3)	11(5.6)	18(9.9)	12(13.2)	69(9.9)
≥10 ครั้ง	23(9.2)	23(11.6)	19(17.0)	7(7.2)	72(10.9)	12(5.3)	12(6.2)	13(7.1)	23(25.3)	60(8.6)
หลายครั้ง	41(16.3)	35(17.7)	25(22.3)	23(23.7)	124(18.8)	46(20.2)	31(15.9)	46(25.3)	14(15.4)	137(19.7)
จำไม่ได้	9(3.6)	2(1.0)	2(1.8)	1(1.0)	14(2.1)	4(1.8)	7(3.6)	8(4.4)	1(1.1)	20(2.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(315)	(212)	(135)	(190)	(852)	(195)	(184)	(164)	(113)	(656)
รวม	251(100.0)	198(100.0)	112(100.0)	97(100.0)	658(100.0)	228(100.0)	195(100.0)	182(100.0)	91(100.0)	696(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น**										
เหล้า	220(50.1)	178(53.1)	140(66.0)	113(46.3)	651(52.9)	213(58.2)	187(55.0)	206(66.2)	115(63.2)	721(60.1)
เบียร์	215(49.0)	182(54.2)	141(66.5)	116(47.5)	654(53.1)	228(62.3)	206(60.6)	227(73.0)	117(64.3)	778(64.9)
Spy/ไวน์	132(30.1)	114(34.0)	88(41.5)	67(27.5)	401(32.6)	140(38.3)	127(37.4)	166(53.4)	77(42.3)	510(42.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	46(10.5)	44(13.1)	47(22.2)	27(11.1)	164(13.3)	51(13.9)	47(13.8)	69(22.2)	18(9.9)	185(15.4)
อื่นๆ	7(1.6)	9(2.7)	2(0.9)	0(0.0)	18(1.5)	2(0.5)	2(0.6)	1(0.3)	2(1.1)	7(0.6)

ตารางที่ 3.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มนแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
แผ่นปิดประกาศ										
เคยเห็น*	641(58.3)	457(52.6)	273(40.0)	306(68.2)	1677(54.1)	434(44.2)	394(49.4)	411(33.4)	208(49.1)	1447(42.2)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	172(61.6)	123(56.7)	62(48.4)	64(57.1)	421(57.2)	143(62.2)	126(61.5)	117(52.2)	40(46.5)	426(57.2)
5-9 ครั้ง	30(10.8)	31(14.3)	18(14.1)	11(9.8)	90(12.2)	23(10.0)	19(9.3)	22(9.8)	10(11.6)	74(9.9)
≥10 ครั้ง	24(8.6)	23(10.6)	21(16.4)	11(9.8)	79(10.7)	17(7.4)	15(7.3)	19(8.5)	24(27.9)	75(10.1)
หลายครั้ง	45(16.1)	39(18.0)	26(20.3)	26(23.2)	136(18.5)	44(19.1)	38(18.5)	59(26.3)	11(12.8)	152(20.4)
จำไม่ได้	8(2.9)	1(0.5)	1(0.8)	0(0.0)	10(1.4)	3(1.3)	7(3.4)	7(3.1)	1(1.2)	18(2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(362)	(240)	(145)	(194)	(941)	(204)	(189)	(187)	(122)	(702)
รวม	279(100.0)	217(100.0)	128(100.0)	112(100.0)	736(100.0)	230(100.0)	205(100.0)	224(100.0)	86(100.0)	745(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มที่เห็น**										
เหล้า	241(48.0)	209(55.1)	163(68.8)	129(49.0)	742(53.7)	217(57.9)	207(58.3)	257(69.1)	113(61.4)	794(61.7)
เบียร์	270(53.8)	230(60.4)	170(71.1)	138(52.5)	808(58.4)	250(66.7)	233(65.6)	290(78.0)	131(71.2)	904(70.3)
Spy/ไวน์	147(29.3)	132(34.8)	104(43.9)	68(25.9)	451(32.7)	152(40.5)	129(36.3)	184(49.5)	81(44.0)	546(42.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	45(9.0)	48(12.7)	45(19.0)	30(11.5)	168(12.2)	52(13.9)	44(12.4)	77(20.7)	19(10.4)	192(14.9)
อื่นๆ	7(1.4)	9(2.4)	2(0.8)	0(0.0)	18(1.3)	2(0.5)	1(0.3)	1(0.3)	0(0.0)	4(0.3)
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	887(73.5)	745(74.6)	526(66.7)	402(78.7)	2559(73.1)	756(66.8)	769(74.1)	906(63.7)	347(67.5)	2778(67.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	228(49.8)	170(40.7)	117(43.8)	68(45.3)	583(45.1)	242(52.8)	196(47.2)	220(43.1)	56(36.1)	714(46.4)
5-9 ครั้ง	63(13.8)	62(14.8)	36(13.5)	21(14.0)	182(14.1)	62(13.5)	67(16.1)	77(15.1)	16(10.3)	222(14.4)
≥10 ครั้ง	84(18.3)	75(17.9)	44(16.5)	28(18.7)	231(17.9)	51(11.1)	62(14.9)	66(12.9)	61(39.4)	240(15.6)
หลายครั้ง	64(14.0)	104(24.9)	66(24.7)	29(19.3)	263(20.3)	93(20.3)	78(18.8)	133(26.0)	21(13.5)	325(21.1)
จำไม่ได้	19(4.1)	7(1.7)	4(1.5)	4(2.7)	34(2.6)	10(2.2)	12(2.9)	15(2.9)	1(0.6)	38(2.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(429)	(327)	(259)	(252)	(1266)	(298)	(354)	(395)	(192)	(1239)
รวม	458(100.0)	418(100.0)	267(100.0)	150(100.0)	1293(100.0)	458(100.0)	415(100.0)	511(100.0)	155(100.0)	1539(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มที่เห็น**										
เหล้า	433(58.7)	460(70.2)	360(69.8)	213(60.3)	1466(65.8)	464(67.3)	482(68.0)	663(78.1)	242(75.6)	1851(72.1)
เบียร์	462(62.6)	478(72.8)	378(78.4)	203(57.5)	1521(68.2)	499(72.3)	535(75.2)	697(82.1)	252(78.8)	1981(77.1)
Spy/ไวน์	345(46.7)	357(53.9)	298(61.8)	133(37.7)	1129(50.7)	408(59.1)	433(61.1)	593(69.8)	190(59.4)	1624(63.2)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	130(17.6)	152(23.2)	169(35.1)	62(17.6)	513(23.0)	145(21.0)	145(20.5)	281(33.0)	73(22.8)	643(25.0)
อื่นๆ	9(1.2)	10(1.5)	5(1.0)	0(0.0)	24(1.1)	4(0.6)	3(0.4)	5(0.6)	1(0.3)	13(0.5)

ตารางที่ 3.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ช่วงเวลาที่มักจะเห็น/ได้ยินโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น)*										
16.00-20.00 น.	474(38.5)	338(28.7)	187(20.3)	170(26.5)	1169(29.4)	446(33.4)	394(28.6)	391(21.8)	158(23.0)	1389(26.8)
20.00-24.00 น.	419(34.0)	495(42.1)	382(41.4)	236(36.8)	1532(38.6)	601(45.0)	646(46.9)	877(48.9)	277(40.4)	2401(46.2)
24.00-04.00 น.	169(13.7)	241(20.5)	297(32.2)	189(29.5)	896(22.6)	135(10.1)	223(16.2)	421(23.5)	187(27.3)	966(18.6)
04.00-08.00 น.	28(2.3)	20(1.7)	7(0.8)	8(1.2)	63(1.6)	22(1.6)	7(0.5)	7(0.4)	5(0.7)	41(0.8)
08.00-12.00 น.	77(6.3)	35(3.0)	19(2.1)	16(2.5)	147(3.7)	56(4.2)	48(3.5)	41(2.3)	22(3.2)	167(3.2)
12.00-16.00 น.	64(5.2)	48(4.1)	30(3.3)	22(3.4)	164(4.1)	75(5.6)	60(4.4)	56(3.1)	37(5.4)	228(4.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(155)	(119)	(50)	(70)	(394)	(157)	(110)	(92)	(60)	(419)
รวม	1231(100.0)	1177(100.0)	922(100.0)	641(100.0)	3971(100.0)	1335(100.0)	1378(100.0)	1793(100.0)	686(100.0)	5192(100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	654(51.2)	549(45.0)	372(40.0)	338(51.0)	1913(46.8)	702(49.9)	636(45.1)	692(37.9)	292(40.9)	2322(43.3)
จำได้	623(48.8)	671(55.0)	558(60.0)	325(49.0)	2177(53.2)	706(50.1)	773(54.9)	1134(62.1)	422(59.1)	3035(56.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(109)	(76)	(42)	(48)	(275)	(84)	(79)	(59)	(32)	(254)
รวม	1277(100.0)	1220(100.0)	930(100.0)	663(100.0)	4090(100.0)	1408(100.0)	1409(100.0)	1826(100.0)	714(100.0)	5357(100.0)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดจำหน่ายหรือขอโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง
อันดับ2	ลิโอ	รีเจนท์	รีเจนท์	ลิโอ	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์
อันดับ3	รีเจนท์	ลิโอ	Spy wine cooler/ Bacardi	รีเจนท์	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	Spy wine cooler/ Bacardi	แสงโสม	Spy wine cooler/ Bacardi
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	จอห์นนี่	ช้าง	ช้าง	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi
อันดับ2	Spy wine cooler/ Bacardi	จอห์นนี่	ช้าง	จอห์นนี่	Spy wine cooler/ Bacardi	ช้าง	ช้าง	Heineken	Heineken	Heineken
อันดับ3	ลิโอ	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	Spy wine cooler/ Bacardi	จอห์นนี่	ลิโอ	Heineken	รีเจนท์	รีเจนท์	ช้าง

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ

ประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดที่รู้จักและเคยเห็นของจริง

ตารางที่ 3.15 ชนิดของสิ่งเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา)(ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง					รวม
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด	3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	
อันดับ 3	ยาอี	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด	3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	
อันดับ 3	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	ยาอี	
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดครั้งสุดท้าย	ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	เพื่อนใช้	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	เพื่อนใช้	ตำรวจ	
อันดับ 2	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	
อันดับ 3	เพื่อนใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	คนขายสารฯ	เพื่อนใช้	ญาติ	ญาติ	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก											
อันดับ 1	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	
อันดับ 2	ตำรวจ	ตำรวจ	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	เพื่อนใช้	ตำรวจ	เพื่อนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมีคนใช้	
อันดับ 3	เพื่อนใช้	ญาติ	ตำรวจ	คนขายสารฯ	ตำรวจ	ตำรวจ	ญาติ	ตำรวจ	ญาติ	ตำรวจ	
ยาอี/ยาเลิฟ : สถานที่ 3 อันดับแรก											
อันดับ 1	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	
อันดับ 2	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	แถวบ้านมีคนใช้	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	ตำรวจ	
อันดับ 3	ญาติ	แถวบ้านมีคนใช้	แถวบ้านมีคนใช้	คนขายสารฯ	แถวบ้านมีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป	ญาติ	แถวบ้านมีคนใช้	เพื่อนใช้	ร้านค้าทั่วไป	

ตารางที่ 3.16 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	202(10.4)	305(16.5)	246(19.4)	311(34.9)	1064(17.9)	27(1.4)	85(4.5)	90(4.0)	89(10.2)	291(4.2)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	68(3.5)	52(2.8)	36(2.8)	52(5.8)	208(3.5)	21(1.1)	24(1.3)	33(1.5)	24(2.8)	102(1.5)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเครีียด	27(1.4)	28(1.5)	24(1.9)	33(3.7)	112(1.9)	12(0.6)	20(1.1)	53(2.4)	23(2.6)	108(1.6)
d. ยานอนหลับ	108(5.6)	97(5.3)	74(5.8)	70(7.8)	349(5.9)	81(4.2)	98(5.2)	185(8.2)	90(10.3)	454(6.5)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	29(1.5)	41(2.2)	34(2.7)	66(7.4)	170(2.9)	2(0.1)	6(0.3)	5(0.2)	8(0.9)	21(0.3)
f. กัญชา	41(2.1)	74(4.0)	73(5.8)	130(14.6)	318(5.3)	2(0.1)	12(0.6)	17(0.8)	22(2.5)	53(0.8)
g. ฟีน	16(0.8)	16(0.9)	12(0.9)	25(2.8)	69(1.2)	3(0.2)	6(0.3)	3(0.1)	5(0.6)	17(0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	16(0.8)	15(0.8)	11(0.9)	22(2.5)	64(1.1)	2(0.1)	6(0.3)	5(0.2)	5(0.6)	18(0.3)
i. ยาเค (เคตามีน)	15(0.8)	10(0.5)	4(0.3)	22(2.5)	51(0.9)	2(0.1)	5(0.3)	4(0.2)	3(0.3)	14(0.2)
j. โคเคน	16(0.8)	9(0.5)	8(0.6)	21(2.4)	54(0.9)	2(0.1)	3(0.2)	1(0.0)	3(0.3)	9(0.1)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	18(0.9)	12(0.7)	7(0.6)	21(2.4)	58(1.0)	3(0.2)	7(0.4)	5(0.2)	5(0.6)	20(0.3)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	33(1.7)	21(1.1)	9(0.7)	27(3.0)	90(1.5)	6(0.3)	8(0.4)	10(0.4)	4(0.5)	28(0.4)
m. ยาบ้า	21(1.1)	27(1.5)	32(2.5)	67(7.5)	147(2.5)	2(0.1)	7(0.4)	8(0.4)	12(1.4)	29(0.4)
n. ไอซ์	18(0.9)	12(0.7)	18(1.4)	41(4.6)	89(1.5)	2(0.1)	6(0.3)	8(0.4)	11(1.3)	27(0.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 3.17 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	198(10.2)	254(14.0)	179(14.4)	284(32.2)	915(15.6)	36(1.9)	73(3.9)	67(3.0)	61(7.0)	237(3.4)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	72(3.7)	53(2.9)	33(2.7)	40(4.5)	198(3.4)	24(1.2)	23(1.2)	22(1.0)	17(2.0)	86(1.2)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเครีียด	24(1.2)	24(1.3)	23(1.8)	23(2.6)	94(1.6)	10(0.5)	15(0.8)	34(1.5)	11(1.3)	70(1.0)
d. ยานอนหลับ	86(4.4)	80(4.4)	50(4.0)	51(5.8)	267(4.5)	57(3.0)	74(4.0)	125(5.6)	65(7.5)	321(4.6)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	28(1.4)	38(2.1)	25(2.0)	43(4.9)	134(2.3)	0(0.0)	6(0.3)	7(0.3)	5(0.6)	18(0.3)
f. กัญชา	41(2.1)	66(3.6)	53(4.3)	98(11.1)	258(4.4)	1(0.1)	11(0.6)	11(0.5)	15(1.7)	38(0.5)
g. ฟีน	21(1.1)	17(0.9)	12(1.0)	20(2.3)	70(1.2)	0(0.0)	7(0.4)	4(0.2)	4(0.5)	15(0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	19(1.0)	16(0.9)	10(0.8)	22(2.5)	67(1.1)	0(0.0)	7(0.4)	4(0.2)	2(0.2)	13(0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	19(1.0)	13(0.7)	9(0.7)	16(1.8)	57(1.0)	0(0.0)	5(0.3)	3(0.1)	2(0.2)	10(0.1)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	19(1.0)	14(0.8)	11(0.9)	18(2.0)	62(1.1)	0(0.0)	6(0.3)	4(0.2)	3(0.3)	13(0.2)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	33(1.7)	26(1.4)	12(1.0)	20(2.3)	91(1.5)	1(0.1)	9(0.5)	7(0.3)	3(0.3)	20(0.3)
l. ยาบ้า	20(1.0)	30(1.7)	24(1.9)	51(5.8)	125(2.1)	0(0.0)	10(0.5)	8(0.4)	9(1.0)	27(0.4)
m. ไอซ์	21(1.1)	22(1.2)	14(1.1)	27(3.1)	84(1.4)	0(0.0)	8(0.4)	7(0.3)	11(1.3)	26(0.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 3.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	65(32.8)	91(35.8)	100(55.9)	164(57.7)	420(45.9)	14(38.9)	19(26.0)	24(35.8)	24(39.3)	81(34.2)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	17(23.6)	11(20.8)	5(15.2)	11(27.5)	44(22.2)	10(41.7)	6(26.1)	6(27.3)	3(17.7)	25(29.1)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเคี้ยว	9(37.5)	10(41.7)	11(47.8)	6(26.1)	36(38.3)	4(40.0)	3(20.0)	15(44.1)	4(36.4)	26(37.1)
d. ยานอนหลับ	20(23.3)	25(31.3)	18(36.0)	12(23.5)	75(28.1)	17(29.8)	22(29.7)	36(28.8)	14(21.9)	89(27.7)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	10(35.7)	13(34.2)	10(40.0)	12(27.9)	45(33.6)	1(0.0)	1(16.7)	3(42.9)	1(20.0)	6(33.3)
f. กัญชา	12(29.3)	23(34.9)	19(35.9)	35(35.7)	89(34.5)	1(100.0)	1(9.1)	6(54.5)	2(13.3)	10(26.3)
g. ฝิ่น	7(28.6)	10(58.8)	4(33.3)	6(30.0)	27(38.6)	1(100.0)	1(14.3)	3(75.0)	1(25.0)	6(40.0)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	5(26.3)	8(50.0)	3(30.0)	6(27.3)	22(32.8)	0(0.0)	1(14.3)	3(75.0)	0(0.0)	4(30.8)
i. ยาเค (เคตามีน)	6(31.6)	8(61.5)	3(33.3)	6(37.5)	23(40.3)	0(0.0)	1(20.0)	3(100.0)	0(0.0)	4(40.0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	6(31.6)	8(57.1)	4(36.4)	4(22.2)	22(35.5)	0(0.0)	1(16.7)	4(100.0)	0(0.0)	5(38.5)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	17(51.5)	12(46.1)	3(25.0)	5(25.0)	37(40.7)	2(50.0)	4(44.4)	3(42.9)	1(33.3)	10(76.9)
l. ยาบ้า	7(35.0)	14(46.7)	5(20.8)	13(25.5)	39(31.2)	0(0.0)	1(10.0)	4(50.0)	2(22.2)	7(25.9)
m. ไอซ์	7(33.3)	12(54.5)	3(21.4)	8(29.6)	30(35.7)	0(0.0)	2(25.0)	2(28.6)	3(27.3)	10(38.5)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการติ่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สิ่งเสพติด

ตารางที่ 3.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	916(55.3)	952(59.5)	740(64.5)	465(59.3)	3073(59.2)	969(55.0)	975(57.3)	1221(58.2)	427(52.9)	3592(56.4)
มี	740(44.7)	648(40.5)	407(35.5)	319(40.7)	2114(40.8)	794(45.0)	726(42.7)	876(41.8)	380(47.1)	2776(43.6)
ไม่ระบุ (จำนวน)	(331)	(307)	(144)	(136)	(918)	(200)	(218)	(196)	(76)	(690)
รวม	1656(100.0)	1600(100.0)	1147(100.0)	784(100.0)	5187(100.0)	1763(100.0)	1701(100.0)	2097(100.0)	807(100.0)	6368(100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการติ่มสุรา*										
แม่	117(15.8)	103(15.9)	51(12.5)	58(18.2)	329(15.6)	142(17.9)	113(15.6)	129(14.7)	65(17.1)	449(16.2)
พ่อ	427(57.7)	362(55.9)	241(59.2)	182(57.0)	1212(57.3)	501(63.1)	436(60.1)	516(58.9)	219(57.6)	1672(60.2)
แม่เลี้ยง	20(2.7)	10(1.5)	8(2.0)	8(2.5)	46(2.2)	19(2.4)	18(2.5)	13(1.5)	7(1.8)	57(2.0)
พ่อเลี้ยง	36(4.9)	25(3.9)	11(2.7)	11(3.4)	83(3.9)	41(5.2)	30(4.1)	24(2.7)	26(6.8)	121(4.4)
พี่น้อง	99(13.4)	121(18.7)	60(14.7)	76(23.8)	356(16.8)	122(15.4)	144(19.8)	173(19.7)	91(23.9)	530(19.1)
ปู่/ย่า	114(15.4)	83(12.8)	33(8.1)	48(15.0)	278(13.1)	114(14.3)	75(10.3)	65(7.4)	32(8.4)	286(10.3)
ตา/ยาย	120(16.2)	79(12.2)	34(8.3)	47(14.7)	280(13.2)	106(13.3)	104(14.3)	75(8.6)	43(11.3)	328(11.8)
ญาติฝ่ายพ่อ	237(32.0)	212(32.7)	118(29.0)	103(32.3)	670(31.7)	314(39.5)	283(39.0)	331(37.8)	131(34.5)	1059(38.1)
ญาติฝ่ายแม่	191(25.8)	185(28.5)	114(28.0)	87(27.3)	577(27.3)	281(35.4)	254(35.0)	302(34.5)	125(32.9)	962(34.6)
แฟน	35(4.7)	31(4.8)	14(3.4)	24(7.5)	104(4.9)	37(4.7)	92(12.7)	97(11.1)	90(23.7)	316(11.4)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	38(5.1)	20(3.1)	19(4.7)	23(7.2)	100(4.7)	27(3.4)	30(4.1)	29(5.3)	20(5.3)	106(3.8)
พ่อ	293(39.6)	221(34.1)	157(38.6)	124(38.9)	795(37.6)	375(47.2)	309(42.6)	399(45.5)	162(42.6)	1245(44.8)
แม่เลี้ยง	8(1.1)	5(0.8)	3(0.7)	11(3.4)	27(1.3)	4(0.5)	3(0.4)	6(0.7)	1(0.3)	14(0.5)
พ่อเลี้ยง	23(3.1)	17(2.6)	8(2.0)	17(5.3)	65(3.1)	32(4.0)	20(2.7)	24(2.7)	16(4.2)	92(3.3)
พี่น้อง	88(11.9)	62(9.6)	36(8.8)	60(18.8)	246(11.6)	84(10.6)	105(14.5)	137(15.6)	82(21.6)	408(14.7)
ปู่/ย่า	84(11.3)	44(6.8)	23(5.6)	35(11.0)	186(8.8)	67(8.4)	63(8.7)	51(5.8)	21(5.5)	202(7.3)
ตา/ยาย	83(11.2)	47(7.2)	23(5.6)	35(11.0)	188(8.9)	76(9.6)	66(9.1)	63(7.2)	29(7.6)	234(8.4)
ญาติฝ่ายพ่อ	164(22.2)	142(21.9)	80(19.7)	67(21.0)	453(21.4)	204(25.7)	200(27.5)	227(25.9)	97(25.5)	728(26.2)
ญาติฝ่ายแม่	128(17.3)	102(15.7)	70(17.2)	50(15.7)	350(16.6)	166(20.9)	157(21.6)	204(23.3)	87(22.2)	614(22.1)
แฟน	15(2.0)	9(1.4)	9(2.2)	16(5.0)	49(2.3)	36(4.5)	68(9.4)	80(9.1)	80(21.0)	264(9.5)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	5(0.7)	4(0.6)	5(1.2)	18(5.6)	32(1.5)	3(0.4)	7(1.0)	7(0.8)	2(0.5)	19(0.7)
พ่อ	6(0.8)	6(0.9)	5(1.2)	13(4.1)	30(1.4)	5(0.6)	4(0.5)	6(0.7)	2(0.5)	17(0.6)
แม่เลี้ยง	4(0.5)	7(1.1)	3(0.7)	11(3.4)	25(1.2)	1(0.1)	6(0.8)	4(0.5)	1(0.3)	12(0.4)
พ่อเลี้ยง	6(0.8)	5(0.8)	3(0.7)	9(2.8)	23(1.1)	3(0.4)	5(0.7)	4(0.5)	2(0.5)	14(0.5)
พี่น้อง	10(1.3)	8(1.2)	5(1.2)	15(4.7)	38(1.8)	9(1.1)	14(1.9)	10(1.1)	7(1.8)	40(1.4)
ปู่/ย่า	10(1.3)	7(1.1)	2(0.5)	11(3.4)	30(1.4)	4(0.5)	4(0.5)	5(0.6)	1(0.3)	14(0.5)
ตา/ยาย	11(1.5)	8(1.2)	3(0.7)	11(3.4)	33(1.6)	6(0.8)	4(0.5)	6(0.7)	0(0.0)	16(0.6)
ญาติฝ่ายพ่อ	12(1.6)	8(1.2)	3(0.7)	15(4.7)	38(1.8)	7(0.9)	4(0.5)	11(1.3)	3(0.8)	25(0.9)
ญาติฝ่ายแม่	12(1.6)	10(1.5)	3(0.7)	13(4.1)	38(1.8)	5(0.6)	4(0.5)	9(1.0)	2(0.5)	20(0.7)
แฟน	12(1.6)	8(1.2)	4(1.0)	16(5.0)	40(1.9)	7(0.9)	8(1.1)	9(1.0)	11(2.9)	35(1.3)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการติ่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 3.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	1344(70.0)	1238(68.7)	922(73.4)	565(63.8)	4069(69.4)	1535(79.9)	1449(77.5)	1800(79.6)	655(75.6)	5439(78.6)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	1345(69.7)	1221(67.0)	876(69.6)	575(64.9)	4017(68.1)	1547(80.3)	1413(75.2)	1711(75.6)	647(74.5)	5318(76.7)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	1199(62.2)	1119(61.5)	841(66.9)	511(57.7)	3670(62.3)	1303(67.6)	1285(68.5)	1563(69.0)	540(62.1)	4691(67.6)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	1341(69.6)	1284(70.6)	967(76.9)	586(66.2)	4178(70.9)	1575(81.7)	1535(81.7)	1881(83.0)	689(79.3)	5680(81.9)
e. ยานอนหลับ	1245(64.6)	1152(63.3)	872(69.4)	554(62.6)	3823(64.9)	1394(72.3)	1347(71.7)	1617(71.4)	587(67.5)	4945(71.3)
f. กระเทียม หรือ 4X100	1408(73.0)	1372(75.5)	1033(82.2)	623(70.3)	4436(75.3)	1594(82.7)	1608(85.6)	2005(88.6)	724(83.3)	5931(85.5)
g. กัญชา	1450(75.2)	1390(76.4)	1046(83.2)	636(71.8)	4522(76.8)	1654(85.8)	1624(86.5)	2039(90.0)	741(85.3)	6058(87.3)
h. ฝิ่น	1440(74.7)	1389(76.4)	1069(85.0)	638(72.1)	4536(77.0)	1658(86.0)	1640(87.4)	2038(90.0)	745(85.7)	6081(87.6)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1447(75.1)	1395(76.7)	1076(85.6)	644(72.8)	4562(77.5)	1647(85.5)	1636(87.2)	2053(90.6)	748(86.1)	6084(87.7)
j. ยาเค (เคตามีน)	1429(74.1)	1402(77.1)	1077(85.7)	645(72.9)	4553(77.3)	1633(84.7)	1634(87.1)	2058(90.9)	750(86.3)	6075(87.6)
k. โคเคน	1429(74.2)	1407(77.4)	1072(85.3)	651(73.6)	4559(77.4)	1611(83.6)	1627(86.7)	2055(90.7)	751(86.4)	6044(87.1)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1433(74.3)	1407(77.4)	1080(85.9)	651(73.6)	4571(77.6)	1638(85.0)	1635(87.1)	2063(91.1)	753(86.7)	6089(87.8)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาวเบนซิน)	1400(72.7)	1381(75.9)	1059(84.2)	650(73.4)	4490(76.3)	1617(83.9)	1592(84.8)	2013(88.9)	745(85.7)	5967(86.0)
n. ยาบ้า	1472(76.4)	1428(78.5)	1080(85.9)	660(74.5)	4640(78.8)	1683(87.3)	1654(88.1)	2081(91.9)	754(86.8)	6172(89.0)
o. ไอซ์	1421(73.8)	1393(76.6)	1071(85.2)	650(73.5)	4535(77.0)	1615(83.8)	1616(86.2)	2048(90.4)	745(85.7)	6024(86.9)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การร้องเกี่ยการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 3.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะร้องเกี่ย ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	1085(56.5)	840(46.2)	543(43.2)	219(24.8)	2687(45.7)	1237(64.4)	1029(55.0)	1187(52.5)	349(40.2)	3802(55.0)
b. สุรา –เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	1055(54.9)	706(38.8)	424(33.7)	175(19.8)	2360(40.1)	1150(59.9)	860(45.9)	904(40.0)	250(28.8)	3164(45.7)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	1045(54.4)	844(46.5)	565(44.9)	248(28.1)	2702(46.0)	1086(56.6)	981(52.5)	1069(47.4)	312(36.0)	3448(49.9)
d. ยากล่อมประสาท/ยาคลาย										
เครียด	1134(59.0)	913(50.3)	625(49.6)	287(32.6)	2959(50.4)	1221(63.6)	1096(58.7)	1243(55.1)	408(47.1)	3968(57.4)
e. ยานอนหลับ	887(46.1)	722(39.8)	466(37.0)	209(23.7)	2284(38.9)	847(44.1)	739(39.5)	733(32.5)	267(30.8)	2586(37.4)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	1298(67.3)	1120(61.7)	799(63.5)	358(40.4)	3575(60.7)	1430(74.3)	1330(70.9)	1667(73.6)	549(63.4)	4976(71.8)
g. กัญชา	1348(70.7)	1155(63.6)	824(65.5)	380(42.9)	3707(63.0)	1482(77.0)	1371(73.1)	1713(75.6)	561(64.8)	5127(74.0)
h. ฝิ่น	1349(70.0)	1182(65.1)	851(67.6)	408(46.1)	3790(64.4)	1490(77.4)	1374(73.3)	1727(76.2)	572(66.1)	5163(74.5)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1354(70.2)	1193(65.7)	866(68.8)	424(47.9)	3837(65.2)	1491(77.5)	1389(74.1)	1743(77.0)	573(66.2)	5196(75.0)
j. ยาเค (เคตามีน)	1352(70.1)	1198(66.0)	869(69.1)	434(49.0)	3853(65.4)	1481(77.0)	1385(73.9)	1741(76.9)	575(66.4)	5182(74.8)
k. โคเคน	1351(70.1)	1209(66.6)	877(69.7)	432(48.8)	3869(65.7)	1480(76.9)	1383(73.8)	1741(76.9)	581(67.1)	5185(74.8)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1358(70.4)	1208(66.5)	878(69.8)	435(49.2)	3879(65.9)	1481(77.0)	1391(74.2)	1736(76.6)	581(67.1)	5189(74.9)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว										
เบนซิน)	1341(69.6)	1197(65.9)	867(68.9)	438(49.5)	3843(65.3)	1460(75.9)	1368(73.0)	1721(76.0)	584(67.4)	5133(74.1)
n. ยาบ้า	1378(71.5)	1214(66.9)	881(70.0)	440(49.7)	3913(66.5)	1498(77.9)	1402(74.8)	1755(77.5)	589(68.0)	5244(75.7)
o. ไอซ์	1335(69.8)	1194(66.1)	864(68.9)	424(48.3)	3817(65.2)	1458(76.3)	1360(73.3)	1713(75.9)	574(66.4)	5105(74.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 3.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	122(6.3)	104(5.7)	62(4.9)	44(4.9)	332(5.6)	115(6.0)	103(5.5)	81(3.6)	40(4.6)	339(4.9)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	144(7.5)	105(5.8)	69(5.5)	50(5.6)	368(6.3)	129(6.7)	100(5.3)	70(3.1)	38(4.4)	337(4.9)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	388(20.2)	343(18.9)	221(17.6)	142(16.0)	1094(18.6)	432(22.5)	298(15.9)	322(14.2)	111(12.8)	1163(16.8)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	585(30.4)	536(29.5)	381(30.3)	253(28.5)	1755(29.8)	618(32.2)	532(28.5)	631(27.9)	260(30.0)	2041(29.5)
e. ยานอนหลับ	372(19.4)	366(20.2)	256(20.4)	169(19.0)	1163(19.8)	351(18.3)	288(15.4)	314(13.9)	148(17.1)	1101(15.9)
f. กระเทียม หรือ 4X100	847(44.1)	818(45.1)	631(50.2)	350(39.4)	2646(45.0)	905(47.1)	889(47.5)	1237(54.6)	407(47.0)	3438(49.7)
g. กัญชา	880(45.8)	831(45.8)	600(47.7)	332(37.3)	2643(44.9)	948(49.3)	900(48.1)	1247(55.1)	379(43.7)	3474(50.2)
h. ฟีน	915(47.6)	906(49.9)	701(55.7)	442(49.7)	2964(50.4)	979(50.9)	937(50.1)	1328(58.7)	439(50.6)	3683(53.2)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	908(47.2)	913(50.3)	719(57.1)	452(50.8)	2992(50.8)	954(49.7)	918(49.1)	1317(58.1)	437(50.5)	3626(52.4)
j. ยาเค (เคตามีน)	920(47.9)	937(51.6)	724(57.5)	458(51.5)	3039(51.6)	971(50.5)	956(51.2)	1349(59.6)	455(52.5)	3731(53.9)
k. โคเคน	919(47.8)	940(51.8)	733(58.2)	470(52.9)	3062(52.0)	967(50.3)	945(50.5)	1346(59.5)	457(52.7)	3715(53.7)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	917(47.7)	917(50.5)	712(56.6)	459(51.6)	3005(51.1)	940(48.9)	929(49.7)	1306(57.7)	447(51.6)	3622(52.3)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาวเบนซิน)	708(36.9)	691(38.1)	529(42.0)	341(38.4)	2269(38.6)	725(37.7)	679(36.3)	991(43.8)	330(38.1)	2725(39.4)
n. ยาบ้า	872(45.4)	836(46.1)	615(48.8)	359(40.4)	2682(45.6)	939(48.9)	871(46.6)	1192(52.7)	377(43.5)	3379(48.8)
o. ไอซ์	894(46.5)	894(49.4)	686(54.5)	450(50.8)	2924(49.8)	937(48.8)	927(49.6)	1311(57.9)	434(50.1)	3609(52.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 3.23 นักเรียนคิดว่ากรตี๋มสุรารอจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการตี๋มสุรารอ	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ปะระหมา ก่อเชิน สร้ง ควมสัมพันธ์กับคนอื่นได้	564(29.4)	649(35.4)	526(41.7)	432(48.5)	2171(36.8)	556(28.8)	568(30.1)	774(34.1)	310(35.6)	2208(31.7)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	308(16.1)	437(23.8)	386(30.6)	336(37.8)	1467(24.8)	183(9.5)	274(14.5)	476(21.0)	193(22.2)	1126(16.2)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือ ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	346(18.0)	467(25.4)	355(28.1)	353(39.7)	1521(25.8)	256(13.3)	329(17.4)	455(20.1)	232(26.6)	1272(18.3)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	306(16.0)	436(23.8)	357(28.3)	370(41.6)	1469(24.9)	181(9.4)	251(13.3)	336(14.8)	184(21.1)	952(13.7)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	365(19.1)	519(28.3)	439(34.8)	405(45.6)	1728(29.3)	237(12.3)	347(18.4)	489(21.6)	242(27.8)	1315(18.9)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	378(19.7)	560(30.5)	478(37.8)	433(48.7)	1849(31.3)	296(15.4)	406(21.5)	577(25.4)	248(28.5)	1527(22.0)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	261(13.6)	400(21.8)	290(22.9)	321(36.0)	1272(21.5)	203(10.5)	280(14.9)	359(15.8)	182(20.8)	1024(14.7)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	526(27.3)	768(41.8)	621(49.1)	535(60.0)	2450(41.4)	435(22.6)	636(33.7)	892(39.3)	369(42.3)	2332(33.5)
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	374(19.4)	538(29.3)	395(31.2)	393(44.1)	1700(28.7)	233(12.1)	338(17.9)	371(16.4)	203(23.3)	1145(16.5)
j. ทำให้กินอาหารได้ร่อยมากขึ้น	307(15.9)	435(23.7)	284(22.5)	300(33.7)	1326(22.4)	209(10.9)	244(13.0)	330(14.6)	155(17.8)	938(13.5)
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	306(15.9)	464(25.3)	308(24.4)	352(39.6)	1430(24.2)	203(10.5)	249(13.2)	325(14.3)	153(17.5)	930(13.4)
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	212(11.0)	317(17.3)	208(16.5)	246(27.6)	983(16.6)	166(8.6)	200(10.6)	273(12.0)	119(13.6)	758(10.9)
m. ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ขึ้น	206(10.7)	296(16.1)	186(14.7)	235(26.3)	923(15.6)	113(5.9)	134(7.1)	183(8.1)	90(10.3)	520(7.5)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมี เพศสัมพันธ์	518(26.9)	743(40.4)	556(44.0)	461(51.7)	2278(38.5)	560(29.1)	639(33.9)	856(37.8)	295(33.8)	2350(33.8)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข้อมูลโรงเรียนภาคเหนือ

จำนวนตัวอย่างแยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

จังหวัด	จำนวนโรงเรียน	ม. 1 (n=3042)		ม. 3 (n=2993)		ม. 5 (n=2789)		ปวช. 2 (n=1564)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1.เชียงใหม่	5 โรงเรียน	221	171	229	189	138	251	101	95	1395
2.อุดรดิตถ์	5 โรงเรียน	186	157	161	198	87	161	80	114	1144
3.แพร่	5 โรงเรียน	252	139	230	190	192	192	111	89	1395
4.พะเยา	5 โรงเรียน	227	180	197	136	182	166	98	112	1298
5.แม่ฮ่องสอน	5 โรงเรียน	176	247	178	212	124	219	128	83	1367
6.นครสวรรค์	5 โรงเรียน	189	164	114	138	117	220	94	63	1099
7.พิจิตร	5 โรงเรียน	143	198	142	199	125	242	115	83	1247
8.เพชรบูรณ์	5 โรงเรียน	212	160	269	202	159	201	121	74	1398
รวม	40 โรงเรียน	1606	1416	1520	1464	1124	1652	848	713	10343

*ไม่ระบุเพศ 45 คน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
กาวิละวิทยาลัย	64	87	47	101	45	110	-	-	454
มงฟอร์ตวิทยาลัย	105	0	141	0	63	35	-	-	344
สันป่าตองวิทยาคม	52	84	41	88	30	106	-	-	401
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	98	0	98
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	-	-	-	-	-	-	3	95	98
รวมจังหวัดเชียงใหม่	221	171	229	189	138	251	101	95	1395
อุดรดิตถ์วิทยา	69	73	64	79	45	62	-	-	392
น้ำริดวิทยา	55	46	41	33	30	45	-	-	250
ลับแลพิทยาคม	62	38	56	86	12	54	-	-	308
วิทยาลัยเทคนิคอุดรดิตถ์	-	-	-	-	-	-	77	9	86
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรดิตถ์	-	-	-	-	-	-	3	105	108
รวมจังหวัดอุดรดิตถ์	186	157	161	198	87	161	80	114	1144
พิริยาลัย	126	24	93	26	112	62	-	-	443
เจริญราษฎร์	78	62	55	51	3	2	-	-	251
สูงเม่นชนูปถัมภ์	48	53	82	113	77	128	-	-	501
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	-	-	-	-	-	-	11	89	100
วิทยาลัยเทคนิคแพร่	-	-	-	-	-	-	100	0	100
รวมจังหวัดแพร่	252	139	230	190	192	192	111	89	1395
พะเยาพิทยาคม	53	66	59	61	80	40	-	-	359

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
พินิตประสาธน์	89	24	99	24	66	36	-	-	338
ดอกคำใต้วิทยาคม	85	90	39	51	36	90	-	-	391
บริหารธุรกิจพะเยา	-	-	-	-	-	-	50	61	111
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา	-	-	-	-	-	-	48	51	99
รวมจังหวัดพะเยา	227	180	197	136	182	166	98	112	1298
พายัพวิทยาคาร	64	86	67	82	49	86	-	-	434
ศึกษาสงเคราะห์	49	73	29	68	25	56	-	-	300
ห้องสอนศึกษา	63	88	82	62	50	77	-	-	422
วิทยาลัยการอาชีพพนมทราขินี	-	-	-	-	-	-	52	48	100
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง	-	-	-	-	-	-	76	35	111
รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	176	247	178	212	124	219	128	83	1367
นวมิตราวุฒิศ มัชฌิม	28	46	27	41	22	93	-	-	257
โพธิสารศึกษา	90	71	24	19	52	51	-	-	307
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	71	47	63	78	43	76	-	-	378
สหนครสวรรค์พิณชยการ	-	-	-	-	-	-	5	52	57
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์	-	-	-	-	-	-	89	11	100
รวมจังหวัดนครสวรรค์	189	164	114	138	117	220	94	63	1099
สระหลวงพิทยาคม	49	69	42	81	38	81	-	-	360
ตะพานหิน	41	52	42	54	16	50	-	-	255
พิจิตรพิทยาคม	53	77	58	64	71	111	-	-	434
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร	-	-	-	-	-	-	48	49	97
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร	-	-	-	-	-	-	67	34	101
รวมจังหวัดพิจิตร	143	198	142	199	125	242	115	83	1247
เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์	47	51	76	114	32	64	-	-	384
เพชรพิทยาคม	103	21	142	0	72	50	-	-	388
หล่มสักพิทยาคม	62	88	51	88	55	87	-	-	431
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีปัญญาภิบาล	-	-	-	-	-	-	69	25	94
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์	-	-	-	-	-	-	52	49	101
รวมจังหวัดเพชรบูรณ์	212	160	269	202	159	201	121	74	1398

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

ตัวแปร	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดเชียงใหม่ :	222	171	393	189	137	326	101	95	1395
ในเมือง	158	84	182	88	92	141	101	95	745
ชนบท	64	87	47	101	45	110	-	-	454
ประเภท									
รัฐบาล	116	171	88	189	75	216	101	95	1051
เอกชน	106	0	141	0	62	35	-	-	344
สายการเรียน									
สามัญ	222	171	229	189	137	251	0	0	1199
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	101	95	196
จังหวัดอุตรดิตถ์ :	186	158	344	198	87	285	80	114	1144
ในเมือง	124	119	105	112	75	107	80	114	642
ชนบท	62	39	56	86	12	53	-	-	308
ประเภท									
รัฐบาล	186	158	161	198	87	160	80	114	1144
เอกชน	-	-	-	-	-	-			
สายการเรียน									
สามัญ	186	158	161	198	87	160	0	0	950
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	80	114	194
จังหวัดแพร่ :	252	140	230	190	192	191	111	89	1395
ในเมือง	204	86	148	77	115	64	111	89	694
ชนบท	48	54	82	113	77	127	-	-	501
ประเภท									
รัฐบาล	174	78	175	139	189	189	111	89	1144
เอกชน	78	62	55	51	3	2	-	-	251
สายการเรียน									
สามัญ	252	140	230	190	192	191	0	0	1195
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	111	89	200
จังหวัดพะเยา	227	180	197	136	182	166	98	112	1298
ในเมือง	142	90	158	85	146	76	98	112	697
ชนบท	85	90	39	51	36	90	-	-	391
ประเภท									
รัฐบาล	138	156	98	112	116	130	98	112	960
เอกชน	89	24	99	24	66	36	-	-	338
สายการเรียน									
สามัญ	227	180	197	136	182	166	0	0	1088
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	98	112	110

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

ตัวแปร	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน :	176	247	178	212	124	219	128	83	1367
ในเมือง	112	161	111	130	75	133	128	83	933
ชนบท	64	86	67	82	49	86	-	-	434
ประเภท									
รัฐบาล	176	247	178	212	124	219	128	83	1367
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	
สหายกรเรียน									
สามัญ	176	247	178	212	124	219	0	0	1156
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	128	83	211
จังหวัดนครสวรรค์ :	191	164	114	138	115	220	94	63	1099
ในเมือง	118	117	51	60	74	144	94	63	564
ชนบท	73	47	63	78	41	76	-	-	378
ประเภท									
รัฐบาล	101	93	90	119	63	169	94	63	792
เอกชน	90	71	24	19	52	51	-	-	307
สหายกรเรียน									
สามัญ	191	164	114	138	115	220	0	0	942
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	94	63	157
จังหวัดพิจิตร:	143	199	142	199	125	241	115	83	1247
ในเมือง	102	146	100	145	109	192	115	83	794
ชนบท	41	53	42	54	16	49	-	-	255
ประเภท									
รัฐบาล	143	199	142	199	125	241	115	83	1247
เอกชน	-	-	-	-	-	-			
สหายกรเรียน									
สามัญ	143	199	142	199	125	241	0	0	1049
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	115	83	198
จังหวัดเพชรบูรณ์:	212	160	269	202	159	201	121	74	1398
ในเมือง	150	72	218	114	104	114	52	49	772
ชนบท	62	88	51	88	55	87	69	25	431
ประเภท									
รัฐบาล	165	109	193	88	127	137	121	74	1014
เอกชน	47	51	76	114	32	64	-	-	384
สหายกรเรียน									
สามัญ	212	160	269	202	159	201	0	0	1203
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	121	74	195

ภาคผนวก 4.

สรุปผลการศึกษาของภาคเหนือ

ตารางที่ 4.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม. 1 (n=3042)	ม. 3 (n=2993)	ม. 5 (n=2789)	ปวช. 2 (n=1564)	รวม (n=10388)
อายุ : mean±sd	12.9±0.7	14.8±0.6	16.8±0.7	17.1±0.9	15.2±1.9
median (พิสัย)	13(11-17)	15(12-19)	17(14-21)	17(15-24)	15(11-24)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(7)	(21)	(8)	(57)
รวม	3021	2986	2768	1556	10331
เพศ : ชาย (%)	1606 (53.1)	1520(50.9)	1124(40.5)	848(54.3)	5098(49.3)
หญิง (%)	1416 (46.9)	1464(49.1)	1652(59.5)	713(45.7)	5245(50.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(20)	(9)	(13)	(3)	(45)
รวม	3022 (100.0)	2984(100.0)	2789(100.0)	1561(100.0)	10343(100.0)
ศาสนา : พุทธ	2940 (97.0)	2901 (97.0)	2676(96.5)	1497(95.7)	10014(96.7)
อิสลาม	9 (0.3)	9(0.3)	5(0.2)	2(0.1)	25(0.2)
คริสต์และอื่นๆ	83 (2.7)	80(2.7)	93(3.4)	65(4.2)	321(3.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(3)	(15)	(0)	(28)
รวม	3032 (100.0)	2990(100.0)	2774(100.0)	1564 (100.0)	10360(100.0)
สถานที่เกิด : ภาคเหนือ	2644(90.9)	2614(91.1)	2492(92.7)	1430(94.1)	9180(91.9)
กรุงเทพ	22(0.8)	15(0.5)	9(0.3)	4(0.3)	50(0.5)
ภาคกลาง	197(6.8)	192(6.7)	144(5.4)	64(4.2)	597(6.0)
ภาคใต้	20(0.7)	36(1.3)	33(1.2)	13(0.9)	102(1.0)
ภาคอีสาน	27(0.9)	13(0.5)	10(0.4)	9(0.6)	59(0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(132)	(123)	(101)	(44)	(400)
รวม	2910 (100.0)	2870 (100.0)	2688 (100.0)	1520 (100.0)	9988(100.0)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน* :					
ไทย	2202(59.3)	2250(57.9)	2096(56.8)	1132(60.0)	7680(58.3)
ไทยท้องถิ่น	1422(38.3)	1514(39.0)	1391(37.7)	719(38.1)	5046(38.3)
จีน	37(1.0)	35(0.9)	43(1.2)	7(0.4)	122(0.9)
มลายู/ยาวี	2(0.1)	7(0.2)	-	1(0.1)	10(0.1)
สปป.ลาว	9(0.2)	21(0.5)	14(0.4)	1(0.1)	45(0.3)
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	43(1.2)	57(1.5)	146(4.0)	28(1.5)	274(2.1)
* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา					
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	2643 (88.0)	2675(89.9)	2424(87.7)	1184(76.2)	8926(86.7)
หอพักของโรงเรียน	142(4.7)	96 (3.2)	105(3.8)	36(2.3)	379(3.7)
หอพักนอกโรงเรียน	38 (1.3)	38(1.3)	107(3.9)	218(14.0)	401(3.9)
บ้านเช่า	102 (3.4)	96(3.2)	90(3.3)	97(6.2)	385(3.7)
อื่นๆ	80 (2.7)	71(2.4)	39(1.4)	19(1.2)	209(2.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(37)	(17)	(24)	(10)	(88)
รวม	3005 (100.0)	2976(100.0)	2765(100.0)	1554(100.0)	10300(100.0)

ตารางที่ 4. 1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ	ม. 1 (n=3042)	ม. 3 (n=2993)	ม. 5 (n=2789)	ปวช. 2 (n=1564)	รวม (n=10388)
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว	40(1.3)	25(0.8)	53(1.9)	91(5.8)	209(2.0)
พ่อแม่	2315(76.7)	2364(79.3)	2170(78.9)	1006(64.5)	7855(76.2)
เพื่อน	134(4.4)	107(3.6)	147(5.3)	213(13.7)	601(5.8)
ญาติพี่น้อง	420(13.9)	397(13.3)	325(11.8)	223(14.3)	1365(13.2)
อื่นๆ	110(3.6)	89(3.0)	55(2.0)	26(1.7)	280(2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(11)	(39)	(5)	(78)
รวม	3019(100.0)	2982(100.0)	2750 (100.0)	1559(100.0)	10310(100.0)
ผลการเรียน:เกรดเฉลี่ย mean±sd	3.2±0.6	3.0±0.6	2.9±0.6	2.8±0.6	2.9±0.6
เกรด 0.1-1.0	2(0.1)	5(0.2)	15(0.6)	11(0.8)	33(0.4)
เกรด 1.1-2.0	79(5.3)	212(8.7)	233(9.6)	123(9.1)	647(8.4)
เกรด 2.1-3.0	516(34.7)	1044(42.9)	1212(50.1)	765(56.3)	3537(45.9)
เกรด 3.1-4.0	892(59.9)	1172(48.2)	958(39.6)	459(33.8)	3481(45.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1553)	(560)	(371)	(206)	(2690)
รวม	1489(100.0)	2433(100.0)	2418 (100.0)	1358(100.0)	7698(100.0)
ทำงานเพื่อหารายได้ : ไม่ทำ	2464(82.7)	2323(78.6)	2077(75.6)	1096(70.8)	7960(77.8)
ทำ	516(17.3)	631(21.4)	669(24.4)	452(29.2)	2268(22.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(62)	(39)	(43)	(16)	(160)
รวม	2980(100.0)	2954(100.0)	2746(100.0)	1548(100.0)	10228(100.0)

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 4.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	570(36.2)	513(34.1)	384(34.4)	325(38.6)	1792(35.6)	513(36.6)	459(31.6)	506(30.8)	247 (34.8)	1725(33.1)
มีเล็กน้อย	725(46.0)	666(44.3)	494(44.3)	355 (42.2)	2240(44.5)	597(42.6)	625(43.0)	698(42.5)	285(40.1)	2205(42.3)
มีปานกลาง	232(14.7)	267(17.8)	201(18.0)	135(16.1)	835(16.6)	250(17.8)	292(20.1)	358(21.8)	132(18.6)	1032(19.8)
มีปัญหามาก	49(3.1)	57(3.8)	37(3.3)	26(3.1)	169(3.4)	42(3.0)	77(5.3)	82(5.0)	46(6.5)	247(4.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(17)	(8)	(7)	(62)	(14)	(11)	(8)	(3)	(36)
รวม	1576(100.0)	1503(100.0)	1116(100.0)	841(100.0)	5036(100.0)	1402(100.0)	1453(100.0)	1644(100.0)	710(100.0)	5209(100.0)
การเข้ายาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	1247(79.2)	1086(72.2)	733(66.0)	488(58.0)	3554(70.7)	1049(74.7)	946(65.2)	946(57.6)	396(55.8)	3337(64.0)
มีเล็กน้อย	234(14.9)	303(20.1)	288(25.9)	243(28.9)	1068(21.2)	287(20.4)	364(25.1)	500(30.4)	197(27.7)	1348(25.9)
มีปานกลาง	74(4.7)	86(5.7)	68(6.1)	82(9.8)	310(6.2)	57(4.1)	116(8.0)	145(8.8)	92(13.0)	410(7.9)
มีปัญหามาก	19(1.2)	29(1.9)	22(2.0)	28(3.3)	98(1.9)	12(0.9)	26(1.8)	52(3.2)	25(3.5)	115(2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(32)	(16)	(13)	(7)	(68)	(11)	(12)	(9)	(3)	(35)
รวม	1574(100.0)	1504(100.0)	1111(100.0)	841(100.0)	5030(100.0)	1405(100.0)	1452(100.0)	1643(100.0)	710(100.0)	5210(100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	1518(96.6)	1421(94.6)	1075(96.1)	782(93.0)	4796(95.3)	1315(94.0)	1328(91.6)	1479(90.1)	641(90.5)	4763(91.6)
มีเล็กน้อย	44(2.8)	65(4.3)	42(3.8)	44(5.2)	195(3.9)	79(5.6)	113(7.8)	152(9.3)	58(8.2)	402(7.7)
มีปานกลาง	3(0.2)	7(0.5)	2(0.2)	7(0.8)	19(0.4)	4(0.3)	3(0.2)	10(0.6)	5(0.7)	22(0.4)
มีปัญหามาก	7(0.4)	9(0.6)	0(0.0)	8(1.0)	24(0.5)	1(0.1)	6(0.4)	1(0.1)	4(0.6)	12(0.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(18)	(5)	(7)	(64)	(17)	(24)	(10)	(5)	(46)
รวม	1572(100.0)	1502(100.0)	1119(100.0)	841(100.0)	5034(100.0)	1399(100.0)	1450(100.0)	1642(100.0)	708(100.0)	5199(100.0)
ข่มขืน กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	1384(88.4)	1310(87.0)	975(87.3)	668(79.5)	4337(86.3)	1224(87.3)	1269(87.4)	1362(82.9)	580(81.9)	4435(85.2)
มีเล็กน้อย	153(9.8)	160(10.6)	125(11.2)	131(15.6)	569(11.3)	149(10.6)	161(11.1)	235(14.3)	97(13.7)	642(12.3)
มีปานกลาง	18(1.1)	24(1.6)	15(1.3)	22(2.6)	79(1.6)	22(1.6)	12(0.8)	41(2.5)	21(3.0)	96(1.8)
มีปัญหามาก	11(0.7)	11(0.7)	2(0.2)	19(2.3)	43(0.9)	7(0.5)	10(0.7)	5(0.3)	10(1.4)	32(0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(40)	(15)	(7)	(8)	(70)	(14)	(12)	(9)	(5)	(40)
รวม	1566(100.0)	1505(100.0)	1117(100.0)	840(100.0)	5028(100.0)	1402(100.0)	1452(100.0)	1643(100.0)	708(100.0)	5205(100.0)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	1064(67.7)	802(53.4)	516(46.2)	279(33.2)	2661(52.9)	824(58.6)	750(51.8)	716(43.6)	284(39.9)	2574(49.4)
มีเล็กน้อย	351(22.3)	492(32.8)	399(35.8)	320(38.1)	1562(31.1)	423(30.1)	457(31.5)	524(31.9)	228(32.1)	1632(31.3)
มีปานกลาง	131(8.3)	165(11.0)	141(12.6)	177(21.1)	614(12.2)	123(8.7)	185(12.8)	303(18.5)	131(18.4)	742(14.3)
มีปัญหามาก	26(1.7)	42(2.8)	60(5.4)	64(7.6)	192(3.8)	36(2.6)	57(3.9)	98(6.0)	68(9.6)	259(5.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(19)	(8)	(8)	(69)	(0)	(15)	(11)	(2)	(28)
รวม	1572(100.0)	1501(100.0)	1116(100.0)	840(100.0)	5029(100.0)	1406(100.0)	1449(100.0)	1641(100.0)	711(100.0)	5207(100.0)

ตารางที่ 4.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	749(47.7)	575(38.3)	408(36.5)	330(39.3)	2062(41.0)	492(35.0)	423(29.1)	414(25.2)	250(35.2)	1579(30.3)
มีเล็กน้อย	500(31.8)	548(36.5)	444(39.7)	338(40.3)	1830(36.4)	513 (36.5)	538(37.1)	612(37.2)	221(31.1)	1884(36.1)
มีปานกลาง	233(14.8)	274(18.3)	201(18.0)	123(14.7)	831(16.5)	273(19.4)	313(21.6)	433(26.3)	142 (20.0)	1161(22.3)
มีปัญหามาก	89(5.7)	103(6.9)	66(5.9)	48(5.7)	306(6.1)	127(9.0)	178(12.3)	186(11.3)	98(13.8)	589(11.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(35)	(20)	(5)	(9)	(69)	(11)	(12)	(7)	(2)	(32)
รวม	1571(100.0)	1500(100.0)	1119(100.0)	839(100.0)	5029(100.0)	1405(100.0)	1452(100.0)	1645(100.0)	711(100.0)	5213(100.0)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	543(34.5)	394(26.2)	286(25.6)	264(31.4)	1487(29.5)	337(24.0)	256(17.6)	297(18.1)	176(24.8)	1066(20.5)
มีเล็กน้อย	624(39.6)	646(43.0)	502(45.0)	360(42.9)	2132(42.4)	537(38.2)	571(39.3)	612(37.2)	250(35.2)	1970(37.8)
มีปานกลาง	296(18.8)	335(22.3)	244(21.9)	163 (19.4)	1038(20.6)	339(24.1)	386(26.6)	479(29.2)	163(23.0)	1367(26.2)
มีปัญหามาก	112(7.1)	128(8.5)	84(7.5)	53(6.3)	377(7.5)	192(13.7)	240(16.5)	255(15.5)	121(17.0)	808(15.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(31)	(17)	(8)	(8)	(64)	(11)	(11)	(9)	(3)	(34)
รวม	1575(100.0)	1503(100.0)	1116(100.0)	840(100.0)	5034(100.0)	1405(100.0)	1453(100.0)	1643(100.0)	710(100.0)	5211(100.0)

ตารางที่ 4.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	1233(76.8)	997(65.6)	593(52.8)	223(26.3)	3046(59.8)	1035(73.1)	874(59.7)	784(47.5)	235(33.0)	2928(55.8)
41-60%	230(14.3)	303(19.9)	284(25.3)	246(29.0)	1063(20.9)	216(15.2)	335(22.9)	449(27.2)	175(24.5)	1175(22.4)
>60 %	142(8.8)	220(14.5)	247(22.0)	379(44.7)	988(19.4)	165(11.7)	255(17.4)	419(25.4)	303(42.5)	1142(21.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1605(100.0)	1520(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5097(100.0)	1416(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5245(100.0)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	1440(89.7)	1110(73.0)	582(51.8)	285(33.6)	3417(67.0)	1277(90.2)	1104(75.4)	1003(60.7)	335(47.0)	3719(70.9)
41-60%	63(3.9)	190(12.5)	223(19.8)	217(25.6)	693(13.6)	68(4.8)	194(13.3)	321(19.4)	154(21.6)	737(14.1)
>60 %	102(6.4)	220(14.5)	319(28.4)	346(40.8)	987(19.4)	70(4.9)	166(11.3)	328(19.9)	224(31.4)	788(15.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
รวม	1605(100.0)	1520(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5097(100.0)	1415(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5244(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1407(87.7)	1309(86.2)	944(84.0)	560(66.0)	4220 (82.8)	1236(87.3)	1239(84.6)	1342(81.2)	494(69.3)	4311(82.2)
41-60%	95(5.9)	129(8.5)	105(9.3)	176(20.8)	505(9.9)	83(5.9)	124(8.5)	192(11.6)	130(18.2)	529(10.1)
>60 %	103(6.4)	81(5.3)	75(6.7)	112(13.2)	371(7.3)	97(6.9)	101(6.9)	118(7.1)	89(12.5)	405(7.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1605(100.0)	1519(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5096(100.0)	1416(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5245(100.0)

ตารางที่ 4.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1466 (91.3)	1338(88.0)	961(85.5)	620(73.1)	4385(86.0)	1318(93.1)	1324(90.4)	1445(87.5)	574(80.5)	4661(88.9)
41-60%	52(3.2)	99(6.5)	83(7.4)	125(14.7)	359(7.0)	28(2.0)	72(4.9)	118(7.1)	72(10.1)	290(5.5)
>60 %	88(5.5)	83(5.5)	80(7.1)	103(12.1)	354(6.9)	69(4.9)	68(4.6)	89(5.4)	67(9.4)	293(5.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
รวม	1606(100.0)	1520(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5098(100.0)	1415(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5244(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	1182(73.6)	1012(66.6)	664(59.1)	230(27.1)	3088(60.6)	1090(77.0)	978(66.8)	999(60.5)	349(48.9)	3416(65.1)
41-60%	225(14.0)	250(16.5)	212(18.9)	230(27.1)	917(18.0)	173(12.2)	250(17.1)	319(19.3)	156(21.9)	898(17.1)
>60 %	199(12.4)	257(16.9)	248(22.1)	388(45.8)	1092(21.4)	153(10.8)	235(16.1)	334(20.2)	208(29.2)	930 (17.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	1416	(1)	(0)	(0)	(1)
รวม	1606(100.0)	1519(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5097(100.0)	1416(100.0)	1463(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5244(100.0)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	1430(89.2)	1202(79.1)	809(72.0)	384(45.3)	3825(75.1)	1304(92.1)	1238(84.6)	1321(80.0)	515(72.3)	4378(83.5)
41-60%	75(4.7)	149(9.8)	141(12.5)	193(22.8)	558(10.9)	45(3.2)	117(8.0)	174(10.5)	103(14.5)	439(8.4)
>60 %	99(6.2)	169(11.1)	174(15.5)	271(32.0)	713(14.0)	67(4.7)	109(7.4)	157(9.5)	94(13.2)	427(8.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	1604(100.0)	1520(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5096(100.0)	1416(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	712(100.0)	5244(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1495(93.1)	1408(92.7)	1053(93.7)	722(85.1)	4678(91.8)	1324(93.6)	1373(93.8)	1528(92.5)	616(86.4)	4841(92.3)
41-60%	29(1.8)	47(3.1)	35(3.1)	83(9.8)	194(3.8)	31(2.2)	46(3.1)	74(4.5)	60(8.4)	211(4.0)
>60 %	82(5.1)	64(4.2)	36(3.2)	43(5.1)	225(4.4)	60(4.2)	45(3.1)	50(3.0)	37(5.2)	192(3.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(1)	1124	(0)	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
รวม	1606(100.0)	1519(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5097(100.0)	1415(100.0)	1464(100.0)	1652(100.0)	713(100.0)	5244(100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1510(94.0)	1419(93.4)	1060(94.3)	738(87.0)	4727(92.7)	1348(95.2)	1396(95.4)	1569(95.1)	646(90.6)	4959(94.6)
41-60%	20(1.2)	44(2.9)	34(3.0)	71(8.4)	169(3.3)	15(1.1)	25(1.7)	37(2.2)	34(4.8)	111(2.1)
>60 %	76(4.7)	57(3.8)	30(2.7)	39(4.6)	202(4.0)	53(3.7)	42(2.9)	43(2.6)	33(4.6)	171(3.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(3)	(0)	(4)
รวม	1606(100.0)	1520(100.0)	1124(100.0)	848(100.0)	5098(100.0)	1416(100.0)	1463(100.0)	1649(100.0)	713(100.0)	5241(100.0)

ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	873(55.4)	867(57.3)	595(53.2)	425(50.6)	2760(54.7)	783(55.7)	883(60.7)	952(57.8)	390(54.8)	3008(57.6)
ไม่ใช่	408(25.9)	357(23.6)	282(25.2)	188(22.4)	1235(24.5)	400(28.4)	361(24.8)	451(27.4)	217(30.5)	1429(27.4)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	296(18.8)	288(19.0)	241(21.6)	227(27.0)	1052(20.8)	223(15.9)	211(14.5)	244(14.8)	105(14.7)	783(15.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(29)	(8)	(6)	(8)	(51)	(10)	(9)	(5)	(1)	(25)
รวม	1577(100.0)	1512(100.0)	1118(100.0)	840(100.0)	5047(100.0)	1406(100.0)	1455(100.0)	1647(100.0)	712(100.0)	5220(100.0)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	135(8.5)	191(12.6)	164(14.7)	250(29.7)	740(14.6)	77(5.5)	113(7.8)	169(10.3)	168(23.6)	527(10.1)
ไม่ใช่	1191(75.3)	1115(73.6)	773(69.3)	411(48.8)	3490(69.1)	1100(78.0)	1133(78.0)	1260(76.5)	422(59.3)	3915(74.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	256(16.2)	208(13.7)	179(16.0)	181(21.5)	824(16.3)	234(16.6)	207(14.2)	219(13.3)	122(17.1)	782(15.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(6)	(8)	(6)	(44)	(5)	(11)	(4)	(1)	(21)
รวม	1582(100.0)	1514(100.0)	1116(100.0)	842(100.0)	5054(100.0)	1411(100.0)	1453(100.0)	1648(100.0)	712(100.0)	5224(100.0)
โรงเรียนแนะนำให้ให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	155(9.8)	237(15.6)	210(18.8)	319(37.9)	921(18.2)	93(6.6)	171(11.8)	253(15.4)	221(31.0)	738(14.1)
ไม่ใช่	1146(72.3)	1015(67.0)	722(64.6)	350(41.6)	3233(63.9)	1054(74.7)	1032(71.1)	1076(65.3)	317(44.5)	3479(66.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	284(17.9)	263(17.4)	186(16.6)	172(20.5)	905(17.9)	264(18.7)	249(17.1)	318(19.3)	174(24.4)	1005(19.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(11)	(5)	(6)	(7)	(39)	(5)	(12)	(5)	(1)	(23)
รวม	1585(100.0)	1515(100.0)	1118(100.0)	841(100.0)	5059(100.0)	1411(100.0)	1452(100.0)	1647(100.0)	712(100.0)	5222(100.0)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	185(11.7)	200(13.2)	163(14.6)	131(15.6)	679(13.5)	68(4.8)	94(6.5)	145(8.8)	79(11.1)	386(7.4)
ไม่ใช่	1031(65.3)	992(65.6)	718(64.2)	497(59.3)	3238(64.2)	1068(75.9)	1081(74.4)	1201(73.0)	517(72.6)	3867(74.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	362(22.9)	320(21.2)	237(21.2)	210(25.1)	1129(22.4)	271(19.3)	277(19.1)	300(18.2)	116(16.3)	964(18.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(8)	(6)	(10)	(52)	(9)	(12)	(6)	(1)	(28)
รวม	1578(100.0)	1512(100.0)	1118(100.0)	838(100.0)	5046(100.0)	1407(100.0)	1452(100.0)	1646(100.0)	712(100.0)	5217(100.0)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	1183(75.1)	1119(74.2)	814(72.8)	614(73.2)	3730(74.0)	1131(80.3)	1201(82.8)	1308(79.6)	559(78.5)	4199(80.5)
ไม่ใช่	125(7.9)	128(8.5)	121(10.8)	83(9.9)	457(9.1)	59(4.2)	79(5.4)	108(6.6)	51(7.2)	297(5.7)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	267(17.0)	261(17.3)	183(16.4)	142(16.9)	853(16.9)	219(15.5)	171(11.8)	227(13.8)	102(14.3)	719(13.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(31)	(12)	(6)	(9)	(58)	(7)	(13)	(9)	(1)	(30)
รวม	1575(100.0)	1508(100.0)	1118(100.0)	839(100.0)	5040(100.0)	1409(100.0)	1451(100.0)	1643(100.0)	712(100.0)	5215(100.0)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด										
ใช่	954(60.5)	1036(68.8)	837(74.9)	569(67.7)	3396(67.4)	824(58.5)	994(68.5)	1212(73.9)	516(72.9)	3546(68.1)
ไม่ใช่	260(16.5)	184(12.2)	108(9.7)	100(11.9)	652(12.9)	176(12.5)	136(9.4)	134(8.2)	55(7.8)	501(9.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	362(23.0)	286(19.0)	172(15.4)	171(20.4)	991(19.7)	408(29.0)	321(22.1)	294(17.9)	137(19.4)	1160(22.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(14)	(7)	(8)	(59)	(8)	(13)	(12)	(5)	(38)
รวม	1576(100.0)	1506(100.0)	1117(100.0)	840(100.0)	5039(100.0)	1408(100.0)	1451(100.0)	1640(100.0)	708(100.0)	5207(100.0)

ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	875(55.4)	803(53.3)	620(55.5)	480(57.0)	2778(55.1)	862(61.5)	852(58.8)	1002(61.0)	472(66.4)	3188(61.3)
ไม่ใช่	327(20.7)	346(23.0)	276(24.7)	172(20.4)	1121(22.2)	249(17.8)	278(19.2)	335(20.4)	121(17.0)	983(18.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	377(23.9)	358(23.8)	221(19.8)	190(22.6)	1146(22.7)	290(20.7)	320(22.1)	305(18.6)	118(16.6)	1033(19.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(13)	(7)	(6)	(53)	(15)	(14)	(10)	(2)	(41)
รวม	1579(100.0)	1507(100.0)	1117(100.0)	842(100.0)	5045(100.0)	1401(100.0)	1450(100.0)	1642(100.0)	711(100.0)	5204(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	1008(64.5)	968(64.5)	690(62.0)	501(59.9)	3167(63.2)	847(60.6)	910(62.8)	972(59.3)	488(68.9)	3217(61.9)
ไม่ใช่	168(10.7)	171(11.4)	174(15.6)	122(14.6)	635(12.7)	82(5.9)	170(11.7)	242(14.8)	75(10.6)	569(11.0)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	388(24.8)	361(24.1)	249(22.4)	213(25.5)	1211(24.2)	468(33.5)	370(25.5)	425(25.9)	145(20.5)	1408(27.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(20)	(11)	(12)	(85)	(19)	(14)	(13)	(5)	(41)
รวม	1564(100.0)	1500(100.0)	1113(100.0)	836(100.0)	5013(100.0)	1397(100.0)	1450(100.0)	1639(100.0)	708(100.0)	5194(100.0)

ตารางที่ 4.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง										
ไม่เคยเลย	1559(97.9)	1438(94.9)	1048(93.5)	771(91.2)	4816(94.9)	1395(98.9)	1424(97.7)	1626(98.6)	704(98.7)	5149(98.4)
เคย 1 ครั้ง	24(1.5)	52(3.4)	52(4.6)	50(5.9)	178(3.5)	9(.6)	27(1.9)	16(1.0)	7(1.0)	59(1.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	10(.6)	25 (1.7)	21(1.9)	24(2.8)	80(1.6)	7(.5)	7(.5)	7(.4)	2(.3)	23(.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(5)	(3)	(3)	(24)	(5)	(6)	(3)	(0)	(14)
รวม	1593(100.0)	1515(100.0)	1121(100.0)	845(100.0)	5074(100.0)	1411(100.0)	1458(100.0)	1649(100.0)	713(100.0)	5231(100.0)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	1541(96.8)	1419(93.8)	1042(93.0)	764(90.4)	4766(94.0)	1388(98.6)	1405(96.4)	1602(97.3)	699(98.0)	5094(97.5)
เคย 1 ครั้ง	35(2.2)	64(4.2)	52(4.6)	47(5.6)	198(3.9)	10(.7)	35(2.4)	30(1.8)	10(1.4)	85(1.6)
เคย 2- 3 ครั้ง	16(1.0)	30(2.0)	26(2.3)	34(4.0)	106(2.1)	10(.7)	18(1.2)	14(.9)	4(.6)	46(.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(7)	(4)	(3)	(28)	(8)	(6)	(6)	(0)	(20)
รวม	1592(100.0)	1513(100.0)	1120(100.0)	845(100.0)	5070(100.0)	1408(100.0)	1458(100.0)	1646(100.0)	713(100.0)	5225(100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนๆกำลังดื่มสุรากัน										
ไม่เคยเลย	1486(94.2)	1346(89.7)	892(80.1)	587(69.6)	4311(85.6)	1357(96.9)	1331(91.9)	1458(89.4)	573(80.5)	4719(90.9)
เคย 1 ครั้ง	65(4.1)	86(5.7)	106(9.5)	120(14.2)	377(7.5)	28(2.0)	80(5.5)	94(5.8)	66(9.3)	268(5.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	27(1.7)	69(4.6)	115(10.3)	136(16.1)	347(6.9)	15(1.1)	37(2.6)	78(4.8)	73(10.3)	203(3.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(19)	(11)	(5)	(63)	(16)	(16)	(22)	(1)	55(1.0)
รวม	1578(100.0)	1501(100.0)	1113(100.0)	843(100.0)	5035(100.0)	1400(100.0)	1448(100.0)	1630(100.0)	712(100.0)	5190(100.0)

ตารางที่ 4.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามึนนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	1517(96.0)	1404(93.4)	1039(93.3)	773(92.0)	4733(93.9)	1324(94.4)	1323(91.4)	1518(93.0)	665(93.3)	4830(93.0)
เคย 1 ครั้ง	59(3.7)	81(5.4)	55(4.9)	55(6.5)	250(5.0)	71(5.1)	110(7.6)	91(5.6)	42(5.9)	314(6.0)
เคย 2- 3 ครั้ง	4(3)	19(1.3)	20(1.8)	12(1.4)	55(1.1)	8(6)	15(1.0)	23(1.4)	6(8)	52(1.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(16)	(10)	(8)	(60)	(13)	(16)	(20)	(0)	(49)
รวม	1580(100.0)	1504(100.0)	1114(100.0)	840(100.0)	5038(100.0)	1403(100.0)	1448(100.0)	1632(100.0)	713(100.0)	5196(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(907)	(845)	(498)	(246)	(2496)	(949)	(962)	(1045)	(342)	(3298)
ไม่เคยเลย	645(94.2)	549(82.4)	496(79.5)	488(81.5)	2178(84.6)	441(95.5)	455(91.5)	554(91.6)	327(88.6)	1777(91.9)
เคย 1 ครั้ง	34(5.0)	63(9.5)	69(11.1)	71 (11.9)	237(9.2)	16(3.5)	29(5.8)	36(6.0)	24(6.5)	105(5.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	6(0.9)	54(8.1)	59(9.5)	40(6.7)	159(6.2)	5(1.1)	13(2.6)	15(2.5)	18(4.9)	51(2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(9)	(2)	(3)	(28)	(5)	(5)	(2)	(2)	(14)
รวม	685(100.0)	666(100.0)	624(100.0)	599(100.0)	2574(100.0)	462(100.0)	497(100.0)	605(100.0)	369(100.0)	1933(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(900)	(938)	(655)	(342)	(2835)	(992)	(1093)	(1274)	(464)	(3823)
ไม่เคยเลย	650(93.9)	467(81.2)	363(78.1)	384(76.5)	1864(83.4)	411(98.3)	352(96.2)	361(96.5)	228(91.9)	1352(96.2)
เคย 1 ครั้ง	30(4.3)	64(11.1)	59(12.7)	72(14.3)	225(10.1)	4(1.0)	10(2.7)	11(2.9)	9(3.6)	34(2.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	12(1.7)	44(7.7)	43(9.2)	46(9.2)	145(6.5)	3(7)	4(1.1)	2(5)	11(4.4)	20(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(7)	(4)	(4)	(29)	(6)	(5)	(4)	(1)	(16)
รวม	692(100.0)	575(100.0)	465(100.0)	502(100.0)	2234(100.0)	418(100.0)	366(100.0)	374(100.0)	248(100.0)	1406(100.0)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(903)	(917)	(568)	(296)	(2684)	(972)	(1044)	(1175)	(411)	(3602)
ไม่เคยเลย	679(98.7)	549(92.3)	512(92.6)	498(90.9)	2238(93.9)	433(98.9)	406(97.6)	459(96.6)	287(95.7)	1585(97.3)
เคย 1 ครั้ง	7(1.0)	26(4.4)	31(5.6)	38(6.9)	102 (4.3)	5(1.1)	10(2.4)	15(3.2)	9(3.0)	39(2.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	2(3)	20(3.4)	10(1.8)	12(2.2)	44(1.8)	0(0)	0(0)	1(2)	4(1.3)	5(3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(8)	(3)	(4)	(30)	(6)	(4)	(2)	(2)	(14)
รวม	688(100.0)	595(100.0)	553(100.0)	548(100.0)	2384(100.0)	438(100.0)	416(100.0)	475(100.0)	300(100.0)	1629(100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อให้ไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(867)	(882)	(562)	(294)	(2605)	(943)	(1029)	(1165)	(399)	(3536)
ไม่เคยเลย	719(99.3)	606(96.0)	544(97.8)	531(96.7)	2400(97.6)	466(99.6)	430(100.0)	483(99.8)	312(99.7)	1691(99.8)
เคย 1 ครั้ง	5(7)	17(2.7)	10(1.8)	13(2.4)	45(1.8)	2(4)	0(0)	0(0)	1(3)	3(2)
เคย 2- 3 ครั้ง	0(0)	8(1.3)	2(4)	5(9)	15 (.6)	0(0)	0(0)	1(2)	0(0)	1(1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(7)	(6)	(5)	(33)	(5)	(5)	(3)	(1)	(14)
รวม	724(100.0)	631(100.0)	556(100.0)	549(100.0)	2460(100.0)	468(100.0)	430(100.0)	484(100.0)	313(100.0)	1695(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 4.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ (จำนวน)	(142)	(114)	(36)	(17)	(309)	(94)	(50)	(56)	(27)	(227)
ไม่เคยเลย	277(20.8)	194(14.8)	88(8.5)	74(9.5)	633(14.2)	259(20.5)	185(13.5)	178(11.4)	95(14.1)	717(14.7)
นานๆครั้ง	557(41.8)	554(42.2)	399(38.7)	292(37.7)	1802(40.5)	627(49.6)	759(55.4)	721(46.0)	284(42.3)	2391(49.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	497(37.3)	566(43.1)	543(52.7)	409(52.8)	2015(45.3)	377(29.8)	426(31.1)	667(42.6)	293(43.6)	1763(36.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(133)	(92)	(58)	(56)	(339)	(59)	(44)	(30)	(14)	(147)
รวม	1331(100.0)	1314(100.0)	1030(100.0)	775(100.0)	4450(100.0)	1263(100.0)	1370(100.0)	1566(100.0)	672(100.0)	4871(100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ (จำนวน)	(151)	(173)	(125)	(119)	(568)	(139)	(167)	(194)	(126)	(626)
ไม่เคยเลย	332(25.3)	275(22.0)	162(17.5)	159(23.9)	928(22.3)	270(22.2)	303(24.3)	276(19.4)	149(26.4)	998(22.4)
นานๆครั้ง	445(33.9)	480(38.4)	359(38.8)	249(37.5)	1533(36.9)	528(43.3)	583(46.8)	600(42.2)	234(41.5)	1945(43.7)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	537(40.9)	496(39.6)	404(43.7)	256(38.6)	1693(40.8)	420(34.5)	359(28.8)	547(38.4)	181(32.1)	1507(33.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(141)	(96)	(74)	(65)	(376)	(59)	(52)	(35)	(23)	(169)
รวม	1314(100.0)	1251(100.0)	925(100.0)	664(100.0)	4154(100.0)	1218(100.0)	1245(100.0)	1423(100.0)	564(100.0)	4450(100.0)
ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากที่พักดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	1333(94.8)	1131(81.5)	701(66.9)	399(51.7)	3564(77.3)	1281(97.6)	1266(90.5)	1363(86.8)	514(75.0)	4424(89.1)
นานๆครั้ง	43(3.1)	197(14.2)	303(28.9)	304(39.4)	847(18.4)	24(1.8)	120(8.6)	182(11.6)	142(20.7)	468(9.4)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	30(2.1)	59(4.3)	44(4.2)	69(8.9)	202(4.4)	8(0.6)	13(0.9)	25(1.6)	29(4.2)	75(1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(200)	(133)	(76)	(76)	(485)	(103)	(65)	(82)	(28)	(278)
รวม	1406(100.0)	1387(100.0)	1048(100.0)	772(100.0)	4613(100.0)	1313(100.0)	1399(100.0)	1570(100.0)	685(100.0)	4967(100.0)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	1257(88.3)	1119(80.0)	866(82.6)	582(75.4)	3824(82.4)	1254(94.0)	1287(91.9)	1455(91.6)	629(91.8)	4625(92.3)
นานๆครั้ง	131(9.2)	220(15.7)	151(14.4)	164(21.2)	666(14.3)	58(4.3)	98(7.0)	107(6.7)	46(6.7)	309(6.2)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	35(2.5)	60(4.3)	32(3.1)	26(3.4)	153(3.3)	22(1.6)	16(1.1)	27(1.7)	10(1.5)	75(1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(183)	(121)	(75)	(76)	(455)	(82)	(63)	(63)	(28)	(236)
รวม	1423(100.0)	1399(100.0)	1049(100.0)	772(100.0)	4643(100.0)	1334(100.0)	1401(100.0)	1589(100.0)	685(100.0)	5009(100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	1342(94.6)	1283(91.8)	949(90.6)	658(86.1)	4232(91.5)	1320(99.2)	1391(98.9)	1566(98.6)	662(96.6)	4939(98.6)
นานๆครั้ง	59(4.2)	96(6.9)	87(8.3)	93(12.2)	335(7.2)	7(0.5)	15(1.1)	20(1.3)	20(2.9)	62(1.2)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	17(1.2)	18(1.3)	12(1.1)	13(1.7)	60(1.3)	4(0.3)	0(0)	3(0.2)	3(0.4)	10(0.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(188)	(123)	(76)	(84)	(471)	(85)	(58)	(63)	(28)	(234)
รวม	1418(100.0)	1397(100.0)	1048(100.0)	764(100.0)	4627(100.0)	1331(100.0)	1406(100.0)	1589(100.0)	685(100.0)	5011(100.0)

ตารางที่ 4.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	1069(75.3)	963(69.1)	762 (72.5)	519(67.4)	3313(71.5)	1208(90.6)	1218(86.6)	1422(89.3)	579(84.3)	4427(88.2)
นานๆครั้ง	311(21.9)	366(26.3)	253(24.1)	215(27.9)	1145(24.7)	114(8.6)	167(11.9)	156(9.8)	93(13.5)	530(10.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	39(2.7)	65(4.7)	36(3.4)	36(4.7)	176(3.8)	11(0.8)	21(1.5)	15(0.9)	15(2.2)	62(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(187)	(126)	(73)	(78)	(464)	(83)	(58)	(59)	(26)	(226)
รวม	1419(100.0)	1394(100.0)	1051(100.0)	770(100.0)	4634(100.0)	1333(100.0)	1406(100.0)	1593(100.0)	687(100.0)	5019(100.0)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	1342(94.6)	1269(90.7)	958(91.4)	668(87.0)	4237(91.5)	1313(98.6)	1376(97.9)	1549(97.5)	653(94.9)	4891(97.6)
นานๆครั้ง	58(4.1)	105(7.5)	83(7.9)	83(10.8)	329(7.1)	14(1.1)	27(1.9)	34(2.1)	29(4.2)	104(2.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	18(1.3)	25(1.8)	7(0.7)	17(2.2)	67(1.4)	5(0.4)	2(0.1)	5(0.3)	6(0.9)	18(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(188)	(121)	(76)	(80)	(465)	(84)	(59)	(64)	(25)	(232)
รวม	1418(100.0)	1399(100.0)	1048(100.0)	768(100.0)	4633(100.0)	1332(100.0)	1405(100.0)	1588(100.0)	688(100.0)	5013(100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(1132)	(900)	(503)	(313)	(2848)	(1156)	(891)	(851)	(241)	(3139)
ไม่เคยเลย	409(94.0)	549(90.7)	530(87.0)	465(88.2)	1953(89.8)	247(97.6)	531(93.8)	733(93.1)	429(91.3)	1940(93.4)
เคย	26(6.0)	56(9.3)	79(13.0)	62(11.8)	223(10.2)	6(2.4)	35(6.2)	54(6.9)	41(8.7)	136(6.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(15)	(12)	(8)	(74)	(7)	(7)	(14)	(2)	(30)
รวม	435(100.0)	605(100.0)	609(100.0)	527(100.0)	2176(100.0)	253(100.0)	566(100.0)	787(100.0)	470(100.0)	2076(100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(1158)	(1021)	(637)	(285)	(3101)	(1212)	(1153)	(1253)	(392)	(4010)
ไม่เคยถูกบังคับ	392(96.6)	440(91.5)	441(93.6)	510(92.4)	1783(93.4)	183(97.3)	277(93.3)	351(92.9)	292(92.1)	1103(93.5)
เคย	14(3.4)	41(8.5)	30(6.4)	42(7.6)	127(6.6)	5(2.7)	20(6.7)	27(7.1)	25(7.9)	77(6.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(18)	(16)	(11)	(87)	(16)	(14)	(21)	(4)	(55)
รวม	406(100.0)	481(100.0)	471(100.0)	552(100.0)	1910(100.0)	188(100.0)	297(100.0)	378(100.0)	317(100.0)	1180(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขับขี/ซ้อนนั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 4.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	1472(93.3)	1314(87.3)	960(86.5)	707(84.1)	4453(88.5)	1310(93.0)	1257(86.5)	1403(85.7)	602(84.6)	4572(87.7)
เคย	105(6.7)	192(12.7)	150(13.5)	134(15.9)	581(11.5)	98(7.0)	197(13.5)	234(14.3)	110(15.4)	639(12.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(29)	(14)	(14)	(7)	(64)	(8)	(10)	(15)	(1)	(34)
รวม	1577(100.0)	1506(100.0)	1110(100.0)	841(100.0)	5034(100.0)	1408(100.0)	1454(100.0)	1637(100.0)	712(100.0)	5211(100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	1553(98.4)	1437(95.1)	1056(94.8)	802(95.4)	4848(96.1)	1357(96.5)	1363(93.7)	1564(95.1)	655(92.0)	4939(94.7)
เคย	25(1.6)	74(4.9)	58(5.2)	39(4.6)	196(3.9)	49(3.5)	91(6.3)	80(4.9)	57(8.0)	277(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(9)	(10)	(7)	(54)	(10)	(10)	(8)	(1)	(29)
รวม	1578(100.0)	1511(100.0)	1114(100.0)	841(100.0)	5044(100.0)	1406(100.0)	1454(100.0)	1644(100.0)	712(100.0)	5216(100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	1553(98.4)	1437(95.1)	1056(94.8)	802(95.4)	4848(96.1)	1357(96.5)	1363(93.7)	1564(95.1)	655(92.0)	4939(94.7)
เคย	25(1.6)	74(4.9)	58(5.2)	39(4.6)	196(3.9)	49(3.5)	91(6.3)	80(4.9)	57(8.0)	277(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(9)	(10)	(7)	(54)	(10)	(10)	(8)	(1)	(29)
รวม	1578(100.0)	1511(100.0)	1114(100.0)	841(100.0)	5044(100.0)	1406(100.0)	1454(100.0)	1644(100.0)	712(100.0)	5216(100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	1544(98.1)	1428(94.6)	1040(93.6)	788(94.1)	4800(95.4)	1351(96.1)	1347(92.8)	1522(92.8)	648(91.1)	4868(93.5)
เคย	30(1.9)	81(5.4)	71(6.4)	49(5.9)	231(4.6)	55(3.9)	105(7.2)	118(7.2)	63(8.9)	341(6.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(32)	(11)	(13)	(11)	(67)	(10)	(12)	(12)	(2)	(36)
รวม	1574(100.0)	1509(100.0)	1111(100.0)	837(100.0)	5031(100.0)	1406(100.0)	1452(100.0)	1640(100.0)	711(100.0)	5209(100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	26(86.6)	47(69.1)	38(65.5)	32(78.0)	144(72.7)	33(73.3)	64(74.4)	84(90.3)	57(91.9)	238(83.2)
3-5 ครั้ง	2(6.7)	8(11.8)	8(13.8)	3(7.3)	21(10.6)	11(24.4)	15(17.4)	7(7.5)	4(6.5)	37(12.9)
> 5 ครั้ง	2(6.7)	13(19.1)	12(20.7)	6(14.6)	33(16.7)	1(2.2)	7(8.1)	2(2.2)	1(1.6)	11(3.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(13)	(13)	(8)	(33)	(10)	(19)	(25)	(1)	(55)
รวม	30(100.0)	68(100.0)	58(100.0)	41(100.0)	198(100.0)	45(100.0)	86(100.0)	93(100.0)	62(100.0)	286(100.0)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	27(90.0)	70(86.4)	57(80.3)	40(81.6)	194(84.0)	52(94.5)	95(91.3)	103(87.3)	53(84.1)	303(89.1)
เคย	3(10.0)	11(13.6)	14(19.7)	9(18.4)	37(16.0)	3(5.5)	9(8.7)	15(12.7)	10(15.9)	37(10.9)
รวม	30(100.0)	81(100.0)	71(100.0)	49(100.0)	231(100.0)	55(100.0)	105(100.0)	118(100.0)	63(100.0)	341(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 4.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	1435(98.6)	1295(89.9)	855(78.9)	470(57.0)	4055(84.4)	1288(99.6)	1325(95.3)	1472(91.5)	517(74.0)	4602(92.2)
เคยมี	20(1.4)	146(10.1)	228(21.1)	354(43.0)	748(15.6)	5(4)	66(4.7)	137(8.5)	182(26.0)	390(7.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(151)	(79)	(41)	(24)	(295)	(123)	(73)	(43)	(14)	(253)
รวม	1455(100.0)	1441(100.0)	1083(100.0)	824(100.0)	4803(100.0)	1293(100.0)	1391(100.0)	1609(100.0)	699(100.0)	4992(100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean ± sd	12.5±1.5	13.7±1.6	14.9±1.6	15.1±1.6	14.7±1.7	14.0±1.4	14.1±1.2	15.5±1.0	15.9±1.07	15.4±1.3
median (พิสัย)	13(9-15)	14(7-16)	15(8-18)	15(8-20)	15 (7-20)	14(13-15)	14(10-17)	16(11-17)	16(11-18)	16 (10-18)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(21)	(36)	(61)	(123)	(3)	(3)	(6)	(15)	(27)
รวม	15	125	192	293	625	2	63	131	167	363
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	11(61.1)	67(46.9)	78(34.8)	115(32.9)	271(36.9)	2(50.0)	33(50.0)	79(58.5)	106(58.9)	220(57.1)
2 คน	2(11.1)	15(10.5)	34(15.2)	57(16.3)	108(14.7)	1(25.0)	13(19.7)	39(28.9)	26(14.4)	79(20.5)
3 คน	2(11.1)	13(9.1)	25(11.2)	32(9.1)	72(9.8)	0(0)	6(9.1)	7(5.2)	13(7.2)	26(6.8)
4 คน	0(0)	7(4.9)	15(6.7)	25(7.1)	47(6.4)	1(25.0)	3(4.5)	4(3.0)	8(4.4)	16(4.2)
5 คน	1(5.6)	2(1.4)	10(4.5)	15(4.3)	28(3.8)	0(0)	5(7.6)	0(0)	9(5.0)	14(3.6)
6 คน ขึ้นไป	2(11.1)	39(27.3)	62(27.7)	106(30.3)	209(28.4)	0(0)	6(9.1)	6(4.4)	18(10.0)	30(7.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(4)	(4)	(13)	(1)	(0)	(2)	(2)	(5)
รวม	18(100.0)	143(100.0)	224(100.0)	350(100.0)	735(100.0)	4(100.0)	66(100.0)	135(100.0)	180(100.0)	385(100.0)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	16(88.9)	97(70.3)	170(76.2)	258(75.4)	541(75.0)	4(80.0)	49(76.6)	120(88.2)	152(86.4)	325(85.3)
เคย	2(11.1)	41(29.7)	53(23.8)	84(24.6)	180(25.0)	1(20.0)	15(23.4)	16(11.8)	24(13.6)	56(14.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(8)	(5)	(12)	(27)	(0)	(2)	(1)	(6)	(9)
รวม	18(100.0)	138(100.0)	223(100.0)	342(100.0)	721(100.0)	5(100.0)	64(100.0)	136(100.0)	176(100.0)	381(100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	6(33.3)	29(20.0)	49(21.6)	55(15.6)	139(18.7)	0(0)	12(18.2)	32(24.1)	32(17.9)	76(19.8)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	1(5.6)	3(2.1)	7(3.1)	25(7.1)	36(4.9)	0(0)	9(13.6)	17(12.8)	25(14.0)	51(13.3)
ถุงยางอนามัย	6(33.3)	79(54.5)	113(49.8)	195(55.4)	393(53.0)	3(60.0)	28(42.4)	30(22.6)	57(31.8)	118(30.8)
ยาฉีดคุมกำเนิด	0(0)	0(0)	1(4)	4(1.1)	5(7)	0(0)	1(1.5)	2(1.5)	4(2.2)	7(1.8)
หลังภายนอก	2(11.1)	22(15.2)	39(17.2)	40(11.4)	103(13.9)	0(0)	12(18.2)	40(30.1)	43(24.0)	95(24.8)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	0(0)	1(7)	4(1.8)	11(3.1)	16(2.2)	1(20.0)	1(1.5)	6(4.5)	11(6.1)	19(5.0)
วิธีการอื่นๆ	1(5.6)	3(2.1)	3(1.3)	4(1.1)	11(1.5)	0(0)	0(0)	3(2.3)	4(2.2)	7(1.8)
ไม่แน่ใจ	2(11.1)	8(5.5)	11(4.8)	18(5.1)	39(5.3)	1(20.0)	3(4.5)	3(2.3)	3(1.7)	10(2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(1)	(1)	(2)	(6)	(0)	(0)	(4)	(3)	(7)
รวม	18(100.0)	145(100.0)	227(100.0)	352(100.0)	742(100.0)	5(100.0)	66(100.0)	133(100.0)	179(100.0)	383(100.0)

ตารางที่ 4.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การตั้งครรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรภ์*										
ไม่เคย	16(84.2)	121(84.0)	196(87.9)	273(78.4)	606(82.6)	5(100.0)	58(89.2)	128(95.5)	148(83.6)	339(89.0)
1 ครั้ง	0(.0)	2(1.4)	8(3.6)	24(6.9)	34(4.6)	0(.0)	1(1.5)	3(2.2)	16(9.0)	20(5.2)
≥2 ครั้ง	2(10.5)	10(6.9)	7(3.1)	11(3.2)	30(4.1)	0(.0)	4(6.2)	3(2.2)	6(3.4)	13(3.4)
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	1(5.3)	11(7.6)	12(5.4)	40(11.5)	64(8.7)	0(.0)	2(3.1)	0(.0)	7(4.0)	9(2.4)
รวม	19(100.0)	144(100.0)	223(100.0)	348(100.0)	734(100.0)	5(100.0)	65(100.0)	134(100.0)	177(100.0)	381(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 4.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	350(23.9)	196(13.6)	93(8.7)	113(14.0)	752(15.7)	192(14.3)	84(6.0)	89(5.6)	55(8.1)	420(8.4)
เคย	948(64.8)	1124(78.0)	924(86.5)	657(81.1)	3653(76.4)	978(73.1)	1241(88.6)	1435(90.6)	595(87.8)	4249(85.0)
ไม่แน่ใจ	164(11.2)	121(8.4)	51(4.8)	40(4.9)	376(7.9)	168(12.6)	75(5.4)	60(3.8)	28(4.1)	331 (6.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(144)	(79)	(56)	(38)	(317)	(78)	(64)	(68)	(35)	(245)
รวม	1462(100.0)	1441(100.0)	1068(100.0)	810(100.0)	4781(100.0)	1338(100.0)	1400(100.0)	1584(100.0)	678(100.0)	5000(100.0)

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา

ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
	1606	1520	1124	848	5098	1416	1464	1652	713	5245
ไม่เคย	1346(86.3)	966(64.3)	419(37.8)	237(28.2)	2968(59.2)	1275(91.1)	1067(73.3)	997(60.7)	338(47.5)	3677
เคยดื่มสุรา	214(13.7)	537(35.7)	689(62.2)	603(71.8)	2043(40.8)	125(8.9)	388(26.7)	645(39.3)	373(52.5)	1531(29.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(46)	(17)	(16)	(8)	(87)	(16)	(9)	(10)	(2)	(37)
รวม	1560(100.0)	1503(100.0)	1108(100.0)	840(100.0)	5011(100.0)	1400(100.0)	1455(100.0)	1642(100.0)	711(100.0)	5208(100.0)
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก										
mean±sd	11.1±2.0	12.0±1.9	14.4±1.8	14.2±1.9	13.5±2.2	11.5±1.7	13.1±1.6	14.8±1.5	14.8±1.5	14.1±1.9
median (พิสัย)	12(4-14)	13(3-16)	15(5-18)	15(5-19)	14 (3-19)	12(4-14)	13(3-17)	15(7-18)	15(7-19)	14(3-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(19)	(25)	(27)	(85)	(3)	(10)	(32)	(15)	(60)
รวม	200(100.0)	518(100.0)	664(100.0)	576(100.0)	1958(100.0)	122(100.0)	378(100.0)	613(100.0)	358(100.0)	1471(100.0)
สถานที่ที่มักจะดื่มสุรา*										
งานอดจรง/รื่นเริง	74(41.1)	227(45.0)	284(43.1)	162(27.6)	747(38.7)	68(57.6)	206(54.8)	323(51.6)	133(35.8)	730(48.9)
บ้าน	6(3.3)	7(1.4)	7(1.1)	5(0.9)	25(1.3)	4(3.4)	11(2.9)	3(0.5)	3(0.8)	21(1.4)
หอพัก	4(2.2)	17(3.4)	35(5.3)	88(15.0)	144(7.5)	2(1.7)	15(4.0)	42(6.7)	54(14.5)	113(7.6)
งานโรงเรียน	70(38.9)	141(28.0)	231(35.1)	221(37.6)	663(34.4)	38(32.2)	113(30.1)	207(33.1)	126(33.9)	484(32.4)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ รร. รัศมีไม่เกิน 500 ม.	3(1.7)	12(2.4)	14(2.1)	20(3.4)	49(2.5)	1(0.8)	4(1.1)	3(0.5)	12(3.2)	20(1.3)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ รร. รัศมีเกิน 500 เมตร	2(1.1)	33(6.5)	53(8.0)	47(8.0)	135(7.0)	1(0.8)	7(1.9)	30(4.8)	34(9.1)	72(4.8)
ร้านน้ำชา	0(0)	2(0.4)	2(0.3)	2(0.3)	6(0.3)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0.3)	1(0.1)
สวน/ไร่นา	12(6.7)	24(4.8)	16(2.4)	32(5.5)	84(4.4)	1(0.8)	4(1.1)	0(0)	1(0.3)	6(0.4)
อื่นๆ	9(5.0)	41(8.1)	17(2.6)	10(1.7)	77(4.0)	3(2.5)	16(4.3)	18(2.9)	8(2.2)	45(3.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(33)	(30)	(16)	(113)	(7)	(12)	(19)	(1)	(39)
รวม	180(100.0)	504(100.0)	659(100.0)	587(100.0)	1930(100.0)	118(100.0)	376(100.0)	626(100.0)	372(100.0)	1492(100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	127(61.1)	283(53.4)	302(44.5)	216(36.1)	928(46.1)	89(71.2)	223(57.9)	385(59.9)	192(51.8)	889(58.3)
1-2 ครั้ง	59(28.3)	133(25.0)	197(29.0)	194(32.4)	583(28.9)	27(21.6)	100(26.0)	168(26.1)	107(28.8)	402(26.4)
3-5 ครั้ง	14(6.7)	47(8.9)	78(11.5)	79(13.2)	218(10.8)	8(6.4)	39(10.1)	53(8.2)	44(11.9)	144(9.4)
6-9 ครั้ง	1(0.5)	15(2.8)	30(4.4)	29(4.8)	75(3.7)	1(0.8)	6(1.6)	12(1.9)	5(1.3)	24(1.6)
10 ครั้ง ขึ้นไป	7(3.4)	52(9.8)	71(10.5)	81(13.5)	211(10.5)	0(0)	17(4.4)	25(3.9)	23(6.2)	65(4.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(7)	(11)	(4)	(28)	(0)	(3)	(2)	(2)	(7)
รวม	208(100.0)	530(100.0)	678(100.0)	599(100.0)	2015(100.0)	125(100.0)	385(100.0)	643(100.0)	371(100.0)	1524(100.0)

ตารางที่ 4.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	31(29.2)	55(14.9)	50(9.2)	46(9.3)	182(12.0)	10(15.9)	44(16.5)	76(16.3)	46(15.8)	176(16.2)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	22(20.8)	65(17.7)	96(17.6)	64(12.9)	247(16.3)	12(19.0)	68(25.6)	93(20.0)	63(21.6)	236(21.7)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	19(17.9)	71(19.3)	75(13.8)	86(17.4)	251(16.6)	13(20.6)	57(21.4)	93(20.0)	67(23.0)	230(21.2)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	34(32.1)	177(48.1)	324(59.4)	299(60.4)	834(55.1)	28(44.4)	97(36.5)	204(43.8)	115(39.5)	444(40.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(108)	(169)	(144)	(108)	(529)	(62)	(122)	(179)	(82)	(445)
รวม	106(100.0)	368(100.0)	545(100.0)	495(100.0)	1514(100.0)	63(100.0)	266(100.0)	466(100.0)	291(100.0)	1086(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน + ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	34(64.2)	118(48.4)	192(48.7)	144(37.6)	488(45.4)	32(78.0)	96(62.7)	193(65.2)	100(55.6)	421(62.8)
3-5 ครั้ง	6(11.3)	59(24.2)	99(25.1)	103(26.9)	267(24.9)	7(17.1)	28(18.3)	60(20.3)	44(24.4)	139(20.7)
6-9 ครั้ง	4(7.5)	31(12.7)	48(12.2)	54(14.1)	137(12.8)	0(0)	12(7.8)	22(7.4)	15(8.3)	49(7.3)
10-19 ครั้ง	2(3.8)	9(3.7)	21(5.3)	35(9.1)	67(6.2)	0(0)	9(5.9)	8(2.7)	12(6.7)	29(4.3)
20 ครั้ง ขึ้นไป	1(1.9)	23(9.4)	25(6.3)	37(9.7)	86(8.0)	0(0)	5(3.3)	2(0.7)	4(2.2)	11(1.60)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(4)	(5)	(2)	(11)	(0)	(1)	(1)	(2)	(4)
รวม	53(100.0)	244(100.0)	394(100.0)	383(100.0)	1074(100.0)	41(100.0)	153(100.0)	296(100.0)	180(100.0)	670(100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	30(68.2)	86(36.4)	122(31.7)	100(27.3)	338(32.8)	26(66.7)	71(46.4)	110(38.1)	58(32.8)	265(40.3)
3-5 หน่วย	9(20.5)	67(28.4)	109(28.3)	128(35.0)	313(30.4)	11(28.2)	42(27.5)	93(32.2)	56(31.6)	202(30.7)
6-8 หน่วย	1(2.3)	17(7.2)	26(6.8)	31(8.5)	75(7.3)	0(0)	13(8.5)	23(8.0)	19(10.7)	55(8.4)
9 หน่วย ขึ้นไป	4(9.1)	66(28.0)	128(33.2)	107(29.2)	305(29.6)	2(5.1)	27(17.6)	63(21.8)	44(24.9)	136(20.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(12)	(14)	(19)	(54)	(2)	(1)	(8)	(5)	(16)
รวม	44(100.0)	236(100.0)	385(100.0)	366(100.0)	1031(100.0)	39(100.0)	153(100.0)	289(100.0)	177(100.0)	658(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน + ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	28(52.8)	105(42.7)	145(36.4)	93(24.2)	371(34.3)	24(58.5)	79(51.3)	152(51.2)	65(35.7)	320(47.5)
1-2 ครั้ง	22(41.5)	86(35.0)	169(42.5)	163(42.3)	440(40.7)	16(39.0)	53(34.4)	119(40.1)	91(50.0)	279(41.4)
3-5 ครั้ง	1(1.9)	26(10.6)	39(9.8)	74(19.2)	140(12.9)	1(2.4)	13(8.4)	20(6.7)	18(9.9)	52(7.7)
6-9 ครั้ง	1(1.9)	14(5.7)	17(4.3)	25(6.5)	57(5.3)	0(0)	5(3.2)	4(1.3)	4(2.2)	13(1.9)
10-19 ครั้ง	1(1.9)	8(3.3)	12(3.0)	16(4.2)	37(3.4)	(0)	3(1.9)	1(0.3)	3(1.6)	7(1.0)
20 ครั้ง ขึ้นไป	0(0)	7(2.8)	16(4.0)	14(3.6)	37(3.4)	0(0)	1(0.6)	1(0.3)	1(0.5)	3(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(0)	(2)	(1)	(0)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	53(100.0)	246(100.0)	398(100.0)	385(100.0)	1082(100.0)	41(100.0)	154(100.0)	297(100.0)	182(100.0)	674(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 4.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง*	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	102(6.6)	306(20.6)	375(34.2)	339(40.7)	1122(22.6)	78(5.8)	233(16.4)	312(19.3)	215(30.5)	838 (16.4)
ซื้อเองโดยใช้บัตรประจำตัวของคนอื่น	31(2.0)	83(5.6)	79(7.2)	111(13.3)	304(6.1)	11(0.8)	18(1.3)	43(2.7)	42(6.0)	114(2.2)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	131(8.5)	356(24.1)	428(39.0)	432(51.9)	1347(27.2)	70(5.2)	208(14.6)	356(22.0)	242(34.3)	876(17.2)
ซื้อเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตรประจำตัว	91(5.9)	267(18.1)	362(32.9)	392(47.0)	1112(22.5)	45(3.3)	171(12.0)	256(15.8)	188(26.7)	660(13.0)
เอามาจากบ้าน (ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	80(5.2)	169(11.4)	185(16.9)	168(20.2)	602(12.2)	40 (3.0)	115(8.1)	175(10.8)	76(10.8)	406(8.0)
ซื้อเอง/ได้จากคนอื่นที่ได้มาจากร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน	47(3.0)	155(10.5)	208(19.0)	226(27.2)	636(12.9)	30(2.2)	84(5.9)	135(8.4)	127(18.0)	376(7.4)
รัศมีไม่เกิน 500 เมตร										
เวลาเฉลี่ยในการซื้อ/หาสุรา (นาที)										
mean \pm sd	14.7 \pm 14.4	14.6 \pm 13.7	15.0 \pm 13.3	14.6 \pm 10.8	14.8 \pm 13.0	16.2 \pm 12.9	15.4 \pm 11.7	15.4 \pm 11.9	15.1 \pm 11.2	15.5 \pm 11.8
median (พิสัย)	10(1-90)	10(1-90)	10(1-90)	10(1-60)	10(1-90)	10(1-60)	10(1-60)	10(1-60)	10(1-90)	10(1-90)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1339)	(1025)	(571)	(367)	(3302)	(1240)	(1067)	(1048)	(382)	(3737)
รวม	267(100.0)	495(100.0)	553(100.0)	481(100.0)	1796(100.0)	176(100.0)	397(100.0)	604(100.0)	331(100.0)	1508(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีมูลค่าของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมาค้าง*										
ไม่เคย	160(75.8)	325(61.2)	358(52.2)	243(40.4)	1086(53.5)	101(80.8)	242(62.4)	411(63.7)	198(53.1)	952(62.2)
เคย	51(24.2)	206(38.8)	328(47.8)	359(59.6)	944(46.5)	24(19.2)	146(37.6)	234(36.3)	175(46.9)	579(37.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(6)	(3)	(1)	(13)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	211(100.0)	531(100.0)	686(100.0)	602(100.0)	2030(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	39(76.5)	94(45.6)	147(44.8)	126(35.1)	406(43.0)	19(79.2)	88(60.3)	137(58.5)	87(49.7)	331(57.2)
2-3 ครั้ง	10(19.6)	66(32.0)	108(32.9)	138(38.4)	322(34.1)	5(20.8)	46(31.5)	76(32.5)	64(36.6)	191(33.0)
4 ครั้งขึ้นไป	2(3.9)	46(22.3)	73(22.3)	95(26.5)	216(22.9)	0(0)	12(8.2)	21(9.0)	24(13.7)	57(9.8)
รวม	51(100.0)	206(100.0)	328(100.0)	359(100.0)	944(100.0)	24(100.0)	146(100.0)	234(100.0)	175(100.0)	579(100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เคย	160 (75.80)	347(66.00)	422(61.50)	344(57.10)	1273(62.90)	96(76.80)	288(74.20)	473(73.30)	220(59.10)	1077(70.40)
เคย	51(24.2)	179(34.0)	264(38.5)	258(42.9)	752(37.1)	29(23.2)	100(25.8)	172(26.7)	152(40.9)	453(29.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(11)	(3)	(1)	(18)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	211(100.0)	526(100.0)	686(100.0)	602(100.0)	2025(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	372(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	33(64.7)	98(54.7)	123(46.6)	135(52.3)	389(51.7)	21(72.4)	52(52.0)	104(60.5)	72(47.4)	249(55.0)
2-3 ครั้ง	14(27.5)	53(29.6)	104(39.4)	94(36.4)	265(35.2)	6(20.7)	37(37.0)	51(29.7)	59(38.8)	153(33.8)
4 ครั้งขึ้นไป	4(7.8)	28(15.6)	37(14.0)	29(11.2)	98(13.0)	2(6.9)	11(11.0)	17(9.9)	21(13.8)	51(11.3)
รวม	51(100.0)	179(100.0)	264(100.0)	258(100.0)	752(100.0)	29(100.0)	100(100.0)	172(100.0)	152(100.0)	453(100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตาราง คู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เคย	195(92.90)	420(80.20)	570(83.30)	486(80.70)	1671(82.70)	115(92.00)	340(87.60)	584(90.50)	321(86.30)	1360(88.90)
เคย	15(7.1)	104(19.8)	114(16.7)	116(19.3)	349(17.3)	10(8.0)	48(12.4)	61(9.5)	51(13.7)	170(11.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(13)	(5)	(1)	(23)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	210(100.0)	524(100.0)	684(100.0)	602(100.0)	2020(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	372(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	9(60.0)	63(60.6)	70(61.4)	73(62.9)	215(61.6)	7(70.0)	28(58.3)	41(67.2)	31(60.8)	107(62.9)
2-3 ครั้ง	5(33.3)	25(24.0)	30(26.3)	36(31.0)	96(27.5)	3(30.0)	18(37.5)	16(26.2)	10(19.6)	47(27.6)
4 ครั้งขึ้นไป	1(6.7)	16(15.4)	14(12.3)	7(6.0)	38(10.9)	0(0)	2(4.2)	4(6.6)	10(19.6)	16(9.4)
รวม	15(100.0)	104(100.0)	114(100.0)	116(100.0)	349(100.0)	10(100.0)	48(100.0)	61(100.0)	51(100.0)	170(100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เคย	190(90.00)	477(91.00)	637(93.00)	542(90.00)	1846(91.30)	121(96.80)	370(95.40)	621(96.30)	355(95.20)	1467(95.80)
เคย	21(10.0)	47(9.0)	48(7.0)	60(10.0)	176(8.7)	4(3.2)	18(4.6)	24(3.7)	18(4.8)	64(4.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(13)	(4)	(1)	(21)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	211(100.0)	524(100.0)	685(100.0)	602(100.0)	2022(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	16(76.2)	30(63.8)	26(54.2)	39(65.0)	111(63.1)	3(75.0)	14(77.8)	18(75.0)	15(83.3)	50(78.1)
2-3 ครั้ง	4(19.0)	12(25.5)	14(29.2)	15(25.0)	45(25.6)	1(25.0)	1(5.6)	6(25.0)	1(5.6)	9(14.1)
4 ครั้งขึ้นไป	1(4.8)	5(10.6)	8(16.7)	6(10.0%)	20(11.)	0(0)	3(16.7)	0(0)	2(11.1)	5(7.8)
รวม	21(100.0)	47(100.0)	48(100.0)	60(100.0)	176(100.0)	4(100.0)	18(100.0)	24(100.0)	18(100.0)	64(100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เคย	158(74.90)	366(69.80)	513(74.80)	396(66.00)	1433(70.90)	104(83.20)	323(83.20)	555(86.00)	306(82.00)	1288(84.10)
เคย	53(25.1)	158(30.2)	173(25.02)	204(34.0)	588(29.1)	21(16.8)	65(16.8)	90(14.0)	67(18.0)	243(15.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(13)	(3)	(3)	(22)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	211(100.0)	524(100.0)	686(100.0)	600(100.0)	2021(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	29(54.7)	80(50.6)	78(45.1)	104(51.1)	291(49.5)	9(42.9)	43(66.2)	57(63.3)	38(56.7)	147(60.5)
2-3 ครั้ง	15(28.3)	41(25.9)	59(34.1)	73(35.8)	188(32.0)	9(42.9)	19(29.2)	26(28.9)	17(25.4)	71(29.2)
4 ครั้งขึ้นไป	9(17.0)	37(23.4)	36(20.8)	27(13.2)	109(18.5)	3(14.3)	3(4.6)	7(7.8)	12(17.9)	25(10.3)
รวม	53(100.0)	158(100.0)	173(100.0)	204(100.0)	588(100.0)	21(100.0)	65(100.0)	90(100.0)	67(100.0)	243(100.0)
คลื่นไส้ อาเจียน*										
ไม่เคย	125(59.20)	275(52.50)	324(47.30)	239(39.70)	963(47.60)	89(71.20)	194(50.00)	350(54.30)	153(41.00)	786(51.40)
เคย	86(40.8)	249(47.5)	361(52.7)	363(60.3)	1059(52.4)	36(28.8)	194(50.0)	294(45.7)	220(59.0)	744(48.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(13)	(4)	(1)	(21)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)
รวม	211(100.0)	524(100.0)	685(100.0)	602(100.0)	2022(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	644(100.0)	373(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	51(59.3)	129(51.8)	177(49.0)	172(47.4)	529(50.0)	22(61.1)	118(60.8)	166(56.5)	120(54.5)	426(57.3)
2-3 ครั้ง	22(25.6)	78(31.3)	124(34.3)	133(36.6)	357(33.7)	10(27.8)	62(32.0)	93(31.6)	67(30.5)	232(31.2)
4 ครั้งขึ้นไป	13(15.1)	42(16.9)	60(16.6)	58(16.0)	173(16.3)	4(11.1)	14(7.2)	35(11.9)	33(15.0)	86(11.6)
รวม	86(100.0)	249(100.0)	361(100.0)	363(100.0)	1059(100.0)	36(100.0)	194(100.0)	294(100.0)	220(100.0)	744(100.0)
ขี้ขลาด หลังดื่มสุรา*										
ไม่เคย	169(80.90)	312(59.50)	344(50.20)	219(36.4)	1044(51.70)	104(83.20)	244(62.90)	427(66.20)	209(56.00)	984(64.30)
เคย	40(19.1)	212(40.5)	341(49.8)	383(63.6)	976(48.3)	21(16.8)	144(37.1)	218(33.8)	164(44.0)	547(35.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(13)	(4)	(1)	(23)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	209(100.0)	524(100.0)	685(100.0)	602(100.0)	2020(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	22(55.0)	84(39.6)	131(38.4)	148(38.6)	385(39.4)	13(61.9)	79(54.9)	108(49.5)	64(39.0)	264(26.4)
2-3 ครั้ง	10(25.0)	60(28.3)	127(37.2)	137(35.8)	334(34.2)	7(33.3)	44(30.6)	74(33.9)	56(34.1)	181(33.1)
4 ครั้งขึ้นไป	8(20.0)	68(32.1)	83(24.3)	98(25.6)	257(26.3)	1(4.8)	21(14.6)	36(16.5)	44(26.8)	102(18.6)
รวม	40(100.0)	212(100.0)	341(100.0)	383(100.0)	976(100.0)	21(100.0)	144(100.0)	218(100.0)	164(100.0)	547(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขาดเรียน*										
ไม่เลย	136(64.80)	367(70.00)	459(66.90)	329(54.9)	1291(63.90)	99(79.80)	283(73.10)	482(75.00)	225(60.30)	1089(71.30)
เคย	74(35.2)	157(30.0)	227(33.1)	270(45.1)	728(36.1)	25(20.2)	104(26.9)	161(25.0)	148(39.7)	438(28.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(13)	(3)	(4)	(24)	(1)	(1)	(2)	(0)	(4)
รวม	210(100.0)	524(100.0)	686(100.0)	599(100.0)	2019(100.0)	124(100.0)	387(100.0)	643(100.0)	373(100.0)	1527(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	32(43.2)	57(36.3)	94(41.4)	109(40.4)	292(40.1)	7(28.0)	42(40.4)	73(45.3)	49(33.1)	171(39.0)
2-3 ครั้ง	27(36.5)	57(36.3)	85(37.4)	126(46.7)	295(40.5)	16(64.0)	39(37.5)	66(41.0)	69(46.6)	190(43.4)
4 ครั้งขึ้นไป	15(20.3)	43(27.4)	48(21.1)	35(13.0)	141(19.4)	2(8.0)	23(22.1)	22(13.7)	30(20.3)	77(17.6)
รวม	74(100.0)	157(100.0)	227(100.0)	270(100.0)	728(100.0)	25(100.0)	104(100.0)	161(100.0)	148(100.0)	438(100.0)
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*										
ไม่เลย	153(72.50)	337(64.30)	397(57.90)	342(56.80)	1229(60.80)	91(72.80)	233(60.10)	432(67.00)	225(60.50)	981(64.10)
เคย	58(27.5)	187(35.7)	289(42.1)	260(43.2)	794(39.2)	34(27.2)	155(39.9)	213(33.0)	147(39.5)	549(35.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(13)	(3)	(1)	(20)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	211(100.0)	524(100.0)	686(100.0)	602(100.0)	2023(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	372(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	39(67.2)	96(51.3)	144(49.8)	132(50.8)	411(51.8)	21(61.8)	86(55.5)	132(62.0)	70(47.6)	309(56.3)
2-3 ครั้ง	13(22.4)	56(29.9)	95(32.9)	88(33.8)	252(31.7)	7(20.6)	49(31.6)	59(27.7)	52(35.4)	167(30.4)
4 ครั้งขึ้นไป	6(10.3)	35(18.7)	50(17.3)	40(15.4)	131(16.5)	6(17.6)	20(12.9)	22(10.3)	25(17.0)	73(13.3)
รวม	58(100.0)	187(100.0)	289(100.0)	260(100.0)	794(100.0)	34(100.0)	155(100.0)	213(100.0)	147(100.0)	549(100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เลย	179(84.80)	416(79.70)	509(74.20)	437(72.70)	1541(76.30)	109(87.20)	321(82.70)	563(87.60)	301(80.70)	1294(84.60)
เคย	32(15.2)	106(20.3)	177(25.8)	164(27.3)	479(23.7)	16(12.8)	67(17.3)	80(12.4)	72(19.3)	235(15.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(15)	(3)	(2)	(23)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)
รวม	211(100.0)	522(100.0)	686(100.0)	601(100.0)	2020(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	643(100.0)	373(100.0)	1529(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	26(81.3)	65(61.3)	94(53.1)	102(62.2)	287(59.9)	10(62.5)	50(74.6)	54(67.5)	39(54.2)	153(65.1)
2-3 ครั้ง	3(9.4)	19(17.9)	52(29.4)	45(27.4)	119(24.8)	4(25.0)	13(19.4)	17(21.3)	22(30.6)	56(23.8)
4 ครั้งขึ้นไป	3(9.4)	22(20.8)	31(17.5)	17(10.4)	73(15.2)	2(12.5)	4(6.0)	9(11.3)	11(15.3)	26(11.1)
รวม	32(100.0)	106(100.0)	177(100.0)	164(100.0)	479(100.0)	16(100.0)	67(100.0)	80(100.0)	72(100.0)	235(100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	137(64.90)	363(69.50)	467(68.10)	372(61.90)	1339(66.30)	85(68.00)	280(72.20)	464(72.00)	256(68.80)	1085(71.00)
เคย	74(35.1)	159(30.5)	219(31.9)	229(38.1)	681(33.7)	40(32.0)	108(27.8)	180(28.0)	116(31.1)	444(29.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(15)	(3)	(2)	(23)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)
รวม	211(100.0)	522(100.0)	686(100.0)	601(100.0)	2020(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	643(100.0)	373(100.0)	1529(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	36(48.6)	82(51.6)	108(49.3)	125(54.6)	351(51.5)	22(55.0)	56(51.9)	99(55.0)	53(45.7)	230(51.8)
2-3 ครั้ง	22(29.7)	54(34.0)	78(35.6)	84(36.7)	238(34.9)	11(27.5)	38(35.2)	64(35.6)	44(37.9)	157(35.4)
4 ครั้งขึ้นไป	16(21.6)	23(14.5)	33(15.1)	20(8.7)	92(13.5)	7(17.5)	14(13.0)	17(9.4)	19(16.4)	57(12.8)
รวม	74(100.0)	159(100.0)	219(100.0)	229(100.0)	681(100.0)	40(100.0)	108(100.0)	180(100.0)	116(100.0)	444(100.0)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เคย	159(75.70)	372(17.40)	439(64.00)	374(62.20)	1344(66.60)	92(73.60)	265(68.30)	445(69.10)	220(59.00)	1022(66.80)
เคย	51(24.3)	149(28.6)	247(36.0)	227(37.8)	674(33.4)	33(26.4)	123(31.7)	199(30.9)	153(41.0)	508(33.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(16)	(3)	(2)	(25)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)
รวม	210(100.0)	521(100.0)	686(100.0)	601(100.0)	2018(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	644(100.0)	373(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	33(64.7)	78(52.3)	118(47.8)	116(51.1)	345(51.2)	22(66.7)	67(54.5)	92(46.2)	68(44.0)	249(49.0)
2-3 ครั้ง	12(23.5)	47(31.5)	91(36.8)	86(37.9)	236(35.5)	8(24.2)	40(32.5)	77(38.7)	58(37.9)	183(36.0)
4 ครั้งขึ้นไป	6(11.8)	24(16.1)	38(15.4)	25(11.0)	93(13.8)	3(9.1)	16(13.0)	30(15.1)	27(17.6)	76(15.0)
รวม	51(100.0)	149(100.0)	247(100.0)	227(100.0)	674(100.0)	33(100.0)	123(100.0)	199(100.0)	153(100.0)	508(100.0)
ถูกจับเพราะขับซึ่รถขณะเมาสุรา*										
ไม่เคย	207(98.10)	492(94.60)	646(94.40)	550(91.70)	1895(94.00)	122(97.60)	376(97.20)	638(98.90)	359(96.20)	1495(97.70)
เคย	4(1.9)	28(5.4)	38(5.6)	50(8.3)	120(6.0)	3(2.4)	11(2.8)	7(1.1)	14(3.8)	35(2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(17)	(5)	(3)	(28)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
รวม	211(100.0)	520(100.0)	684(100.0)	600(100.0)	2015(100.0)	125(100.0)	387(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	3(75.0)	17(60.7)	23(60.5)	29(58.0)	72(60.0)	1(33.3)	8(72.7)	7(100.0)	9(64.3)	25(71.4)
2-3 ครั้ง	1(25.0)	4(14.3)	7(18.4)	14(28.0)	26(21.7)	2(66.7)	3(27.3)	0(0)	2(14.3)	7(20.0)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0)	7(25.0)	8(21.1)	7(14.0)	22(18.3)	0(0)	0(0)	0(0)	3(21.4)	3(8.6)
รวม	4(100.0)	28(100.0)	38(100.0)	50(100.0)	120(100.0)	3(100.0)	11(100.0)	7(100.0)	14(100.0)	35(100.0)
ถูกลวนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เคย	201(95.30)	473(90.60)	621(90.70)	517(86.20)	1812(89.80)	124(99.20)	366(94.30)	615(95.60)	351(64.10)	1456(95.20)
เคย	10(4.7)	49(9.4)	64(9.3)	83(13.8)	206(10.2)	1(0.8)	22(5.7)	28(4.4)	22(5.9)	73(4.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(15)	(4)	(3)	(25)	(0)	(0)	(2)	(0)	(2)
รวม	211(100.0)	522(100.0)	685(100.0)	600(100.0)	2018(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	643(100.0)	373(100.0)	1529(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(80.0)	25(51.0)	33(51.6)	46(55.4)	112(54.4)	1(100.0)	14(63.6)	22(78.6)	15(68.2)	52(71.2)
2-3 ครั้ง	2(20.0)	15(30.6)	21(32.8)	25(30.1)	63(30.6)	0(0)	5(22.7)	6(21.4)	3(13.6)	14(19.2)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0)	9(18.4)	10(15.6)	12(14.5)	31(15.0)	0(0)	3(13.6)	0(0)	4(18.2)	7(9.6)
รวม	10(100.0)	49(100.0)	64(100.0)	83(100.0)	206(100.0)	1(100.0)	22(100.0)	28(100.0)	22(100.0)	73(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีตราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เคย	200(95.2)	464(88.9)	621(90.8)	503(83.7)	1788(88.6)	124(99.2)	374(96.4)	627(97.2)	355(95.2)	1480(96.7)
เคย	10(4.8)	58(11.1)	63(9.2)	98(16.3)	229(11.4)	1(0.8)	14(3.6)	18(2.8)	18(4.8)	51(3.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(15)	(5)	(2)	(26)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	210(100.0)	522(100.0)	684(100.0)	601(100.0)	2017(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(80.0)	24(41.4)	31(49.2)	48(49.0)	111(48.5)	1(100.0)	8(57.1)	13(72.2)	8(44.4)	30(58.8)
2-3 ครั้ง	1(10.0)	22(37.9)	21(33.3)	32(32.7)	76(33.2)	0(0)	2(14.3)	4(22.2)	6(33.3)	12(23.5)
4 ครั้งขึ้นไป	1(10.0)	12(20.7)	11(17.5)	18(18.4)	42(18.3)	0(0)	4(28.6)	1(5.6)	4(22.2)	9(17.6)
รวม	10(100.0)	58(100.0)	63(100.0)	98(100.0)	229(100.0)	1(100.0)	14(100.0)	18(100.0)	18(100.0)	51(100.0)
พยายามที่จะเลิกตีตราแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เคย	185(87.7)	401(77.3)	518(75.7)	400(66.9)	1504(74.8)	101(81.5)	334(86.1)	547(85.2)	281(75.3)	1263(82.7)
เคย	26(12.3)	118(22.7)	166(24.3)	198(33.1)	508(25.2)	23(18.5)	54(13.9)	95(14.8)	92(24.7)	264(17.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(18)	(5)	(5)	1(31)	(1)	(0)	(3)	(0)	(4)
รวม	211(100.0)	519(100.0)	684(100.0)	598(100.0)	2012(100.0)	124(100.0)	388(100.0)	642(100.0)	373(100.0)	1527(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	15(57.7)	57(48.3)	72(43.4)	95(48.0)	239(47.0)	19(82.6)	35(64.8)	52(54.7)	46(50.0)	152(57.6)
2-3 ครั้ง	7(26.9)	33(28.0)	54(32.5)	62(31.3)	156(30.7)	2(8.7)	8(14.8)	24(25.3)	25(27.2)	59(22.3)
4 ครั้งขึ้นไป	4(15.4)	28(23.7)	40(24.0)	41(20.7)	113(22.2)	2(8.7)	11(20.4)	19(20.0)	21(22.8)	53(20.1)
รวม	26(100.0)	118(100.0)	166(100.0)	198(100.0)	508(100.0)	23(100.0)	54(100.0)	95(100.0)	92(100.0)	264(100.0)
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*										
ไม่เคย	206(98.1)	495(94.8)	652(95.2)	561(93.2)	1914(94.8)	123(98.4)	368(94.8)	624(96.7)	352(94.4)	1467(95.8)
เคย	4(1.9)	27(5.2)	33(4.8)	41(6.8)	105(5.2)	2(1.6)	20(5.2)	21(3.3)	21(5.6)	64(4.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(15)	(4)	(1)	(24)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
รวม	210(100.0)	522(100.0)	685(100.0)	602(100.0)	2019(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	373(100.0)	1531(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4(100.0)	14(51.9)	21(63.6)	24(58.5)	63(60.0)	0(0)	12(60.0)	14(66.7)	14(66.7)	40(62.5)
2-3 ครั้ง	0(0)	6(22.0)	8(24.2)	9(22.0)	23(21.9)	1(50.0)	3(15.0)	6(28.6)	5(23.8)	15(23.4)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0)	7(25.9)	4(12.1)	8(19.5)	19(18.1)	1(50.0)	5(25.0)	1(4.8)	2(9.5)	9(14.1)
รวม	4(100.0)	27(100.0)	33(100.0)	41(100.0)	105(100.0)	2(100.0)	20(100.0)	21(100.0)	21(100.0)	64(100.0)
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*										
ไม่เคย	205(97.2)	496(95.2)	641(93.7)	563(93.8)	1905(94.5)	118(94.4)	363(93.6)	621(96.4)	345(93.0)	1447(94.7)
เคย	6(2.8)	25(4.8)	43(6.3)	37(6.2)	111(5.5)	7(5.6)	25(6.4)	23(3.6)	26(7.0)	81(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(16)	(5)	(3)	(27)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)
รวม	211(100.0)	521(100.0)	684(100.0)	600(100.0)	2016(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	644(100.0)	371(100.0)	1528(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4(66.7)	16(64.0)	35(81.4)	21(56.8)	76(68.5)	6(85.7)	13(52.2)	16(69.6)	15(57.7)	50(61.7)
2-3 ครั้ง	2(33.3)	5(20.0)	4(9.3)	12(32.4)	23(20.7)	0(0)	6(24.0)	7(30.4)	8(30.8)	21(25.9)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0)	4(16.0)	4(9.3)	4(10.8)	12(10.8)	1(14.3)	6(24.0)	0(0)	3(11.5)	10(12.3)
รวม	6(100.0)	25(100.0)	43(100.0)	37(100.0)	111(100.0)	7(100.0)	25(100.0)	23(100.0)	26(100.0)	81(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	149(71.0)	382(73.5)	523(76.5)	381(63.7)	1435(71.3)	99(79.2)	303(78.1)	524(81.2)	279(75.0)	1205(78.8)
เคย	61(29.0)	138(26.5)	161(23.5)	217(36.3)	577(28.7)	26(20.8)	85(21.9)	121(18.8)	93(25.0)	325(21.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(17)	(5)	(5)	(31)	(0)	(0)	(0)	(1)	(1)
รวม	210(100.0)	520(100.0)	684(100.0)	598(100.0)	2012(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	645(100.0)	372(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	33(54.1)	80(58.0)	103(64.0)	127(58.5)	343(59.4)	15(57.7)	48(56.5)	90(74.4)	50(53.8)	203(62.5)
2-3 ครั้ง	16(26.2)	42(30.4)	45(28.0)	68(31.3)	171(29.6)	6(23.1)	25(29.4)	28(23.1)	37(39.8)	96(29.5)
4 ครั้งขึ้นไป	12(19.7)	16(11.6)	13(8.1)	22(10.1)	63(10.9)	5(19.2)	12(14.1)	3(2.5)	6(6.5)	26(8.0)
รวม	61(100.0)	138(100.0)	161(100.0)	217(100.0)	577(100.0)	26(100.0)	85(100.0)	121(100.0)	93(100.0)	325(100.0)
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	206(97.6)	495(94.8)	650(94.9)	550(91.4)	1901(94.1)	120(96.0)	376(96.9)	634(98.4)	359(96.2)	1489(97.3)
เคย	5(2.4)	27(5.2)	35(5.1)	52(8.6)	119(5.9)	5(4.0)	12(3.1)	10(1.6)	14(3.8)	41(2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(15)	(4)	(1)	(23)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)
รวม	211(100.0)	522(100.0)	685(100.0)	602(100.0)	2020(100.0)	125(100.0)	388(100.0)	644(100.0)	373(100.0)	1530(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	3(60.0)	16(59.3)	25(71.4)	36(69.2)	80(67.2)	5(100.0)	8(66.7)	9(90.0)	9(64.3)	31(75.6)
2-3 ครั้ง	2(40.0)	4(14.8)	5(14.3)	11(21.2)	22(18.5)	0(0)	1(8.3)	1(10.0)	2(14.3)	4(9.8)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0)	7(25.9)	5(14.3)	5(9.6)	17(14.3)	0(0)	3(25.0)	0(0)	3(21.4)	6(14.6)
รวม	5(100.0)	27(100.0)	35(100.0)	52(100.0)	119(100.0)	5(100.0)	12(100.0)	10(100.0)	14(100.0)	41(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(47.1)	18(48.6)	41(77.4)	27(57.4)	94(61.0)	11(57.9)	15(55.6)	19(61.3)	21(61.8)	66(59.5)
2-3 ครั้ง	7(41.2)	10(27.0)	7(13.2)	15(31.9)	39(25.3)	5(26.3)	6(22.2)	10(32.3)	9(26.5)	30(27.0)
4 ครั้งขึ้นไป	2(11.8)	9(24.3)	5(9.4)	5(10.6)	21(13.6)	3(15.8)	6(22.2)	2(6.5)	4(11.8)	15(13.5)
รวม	17(100.0)	37(100.0)	53(100.0)	47(100.0)	154(100.0)	19(100.0)	27(100.0)	31(100.0)	34(100.0)	111(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	1245(84.6)	1202(84.2)	878(81.0)	570(68.4)	3895(80.9)	1095(90.1)	1144(87.5)	1330(86.9)	594(84.0)	4163(87.4)
เคย	227(15.4)	225(15.8)	206(19.0)	263(31.6)	921(19.1)	120(9.9)	164(12.5)	201(13.1)	113(16.0)	598(12.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(134)	(93)	(40)	(15)	(282)	(201)	(156)	(121)	(6)	(484)
รวม	1472(100.0)	1427(100.0)	1084(100.0)	833(100.0)	4816(100.0)	1215(100.0)	1308(100.0)	1531(100.0)	707(100.0)	4761(100.0)

ตารางที่ 4.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	126(55.5)	125(55.6)	123(59.7)	157(59.7)	531 (57.7)	71(59.2)	98(59.8)	148 (73.6)	61(54.0)	378 (63.2)
2-3 ครั้ง	64(28.2)	64(28.4)	67(32.5)	81(30.8)	276 (30.0)	34(28.3)	52(31.7)	47(23.4)	44(38.9)	177(29.6)
4 ครั้งขึ้นไป	37(16.3)	36(16.0)	16(7.8)	25(9.5)	114(12.4)	15(12.5)	14(8.5)	6(3.0)	8(7.1)	43(7.2)
รวม	227(100.0)	225(100.0)	206(100.0)	263(100.0)	921(100.0)	120(100.0)	164(100.0)	201(100.0)	113(100.0)	598(100.0)
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	1459(98.8)	1393(97.4)	1044(96.0)	776(92.6)	4672(96.7)	1210(99.3)	1293(98.9)	1517(99.2)	690(97.5)	4710(98.9)
เคย	18(1.2)	37(2.6)	43(4.0)	62(7.4)	160(3.3)	9(0.7)	15(1.1)	12(0.8)	18(2.5)	54(1.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(129)	(90)	(37)	(10)	(266)	(197)	(156)	(123)	(5)	(481)
รวม	1477(100.0)	1430(100.0)	1087(100.0)	838(100.0)	4832(100.0)	1219(100.0)	1308(100.0)	1529(100.0)	708(100.0)	4764(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	10(55.6)	23(62.2)	31(72.1)	43(69.4)	107(66.9)	8(88.9)	11(73.3)	11(91.7)	12(66.7)	42(77.8)
2-3 ครั้ง	6 (33.3)	5(13.5)	7(16.3)	13(21.0)	31(19.4)	0(0)	1(6.7)	1(8.3)	3(16.7)	5(9.3)
4 ครั้งขึ้นไป	2(11.1)	9(24.3)	5(11.6)	6(9.7)	22(13.8)	1(11.1)	3(20.0)	0(0)	3(16.7)	7(13.0)
รวม	18(100.0)	37(100.0)	43(100.0)	62(100.0)	160(100.0)	9(100.0)	15(100.0)	12(100.0)	18(100.0)	54(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่ม

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 4.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เลย	1295(82.5)	1238(82.9)	914(82.1)	656(78.2)	4103(81.8)	1203(86.5)	1266(87.8)	1422(86.9)	591(83.1)	4482(86.5)
เคย	275 (17.5)	256(17.1)	199(17.9)	183(21.8)	913(18.2)	188(13.5)	176(12.2)	214(13.1)	120(16.9)	698(13.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(26)	(11)	(9)	(82)	(25)	(22)	(16)	(2)	(65)
รวม	1570(100.0)	1494(100.0)	1113(100.0)	839(100.0)	5016(100.0)	1391(100.0)	1442(100.0)	1636(100.0)	711(100.0)	5180(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	177(64.4)	143(55.9)	123(61.8)	113(61.7)	556(60.9)	123(65.4)	117(66.5)	130(60.7)	60(50.0)	430(61.6)
2-3 ครั้ง	54(19.6)	63(24.6)	45(22.6)	47(25.7)	209(22.9)	42(22.3)	42(23.9)	61(28.5)	39(32.5)	184(26.4)
4 ครั้งขึ้นไป	44(16.0)	50(19.5)	31(15.6)	23(12.6)	148(16.2)	23(12.2)	17(9.7)	23(10.7)	21(17.5)	84(12.0)
รวม	275(100.0)	256(100.0)	199(100.0)	183(100.0)	913(100.0)	188(100.0)	176(100.0)	214(100.0)	120(100.0)	698(100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เสียหายรุนแรง										
ไม่เลย	1399(89.1)	1255(84.0)	927(83.3)	650(77.4)	4231(84.3)	1282(92.2)	1301(90.2)	1455(89.0)	610(85.8)	4648(89.7)
เคย	171(10.9)	239(16.0)	186(16.7)	190(22.6)	786(15.7)	109(7.8)	141(9.8)	180(11.0)	101(14.2)	531(10.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(26)	(11)	(8)	(81)	(25)	(22)	(17)	(2)	(66)
รวม	1570(100.0)	1494(100.0)	1113(100.0)	840(100.0)	5017(100.0)	1391(100.0)	1442(100.0)	1635(100.0)	711(100.0)	5179(100.0)

ตารางที่ 4.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุรานักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	109(63.7)	130(54.4)	108(58.1)	124(65.3)	471(59.9)	74(67.9)	75(53.2)	118(65.6)	54(53.5)	321(60.5)
2-3 ครั้ง	45(26.3)	63(26.4)	61(32.8)	50(26.3)	219(27.9)	24(22.0)	51(36.2)	53(29.4)	30(29.7)	158(29.8)
4 ครั้งขึ้นไป	17(9.9)	46(19.2)	17(9.1)	16(8.4)	96(12.2)	11(10.1)	15(10.6)	9(5.0)	17(16.8)	52(9.8)
รวม	171(100.0)	239(100.0)	186(100.0)	190(100.0)	786(100.0)	109(100.0)	141(100.0)	180(100.0)	101(100.0)	531(100.0)
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เคย	1424(90.7)	1290(86.5)	981(88.2)	699(83.3)	4394(87.7)	1340(96.4)	1360(94.3)	1550(94.7)	655(92.4)	4905(94.7)
เคย	146(9.3)	202(13.5)	131(11.8)	140(16.7)	619(12.3)	50(3.6)	82(5.7)	86(5.3)	54(7.6)	272(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(36)	(28)	(12)	(9)	(85)	(26)	(22)	(16)	(4)	(68)
รวม	1570(100.0)	1492(100.0)	1112(100.0)	839(100.0)	5013(100.0)	1390(100.0)	1442(100.0)	1636(100.0)	709(100.0)	5177(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	92(63.0)	126(62.4)	66(50.4)	90(64.3)	374(60.4)	36(72.0)	50(61.0)	63(73.3)	30(55.6)	179(65.8)
2-3 ครั้ง	32(21.9)	44(21.8)	46(35.1)	34(24.3)	156(25.2)	10(20.0)	25(30.5)	20(23.3)	16(29.6)	71(26.1)
4 ครั้งขึ้นไป	22(15.1)	32(15.8)	19(14.5)	16(11.4)	89(14.4)	4(8.0)	7(8.5)	3(3.5)	8(14.8)	22(8.1)
รวม	146(100.0)	202(100.0)	131(100.0)	140(100.0)	619(100.0)	50(100.0)	82(100.0)	86(100.0)	54(100.0)	272(100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เคย	1522(97.1)	1431(95.8)	1071(96.2)	778(92.6)	4802(95.8)	1376(99.0)	1418(98.4)	1603(98.0)	689(97.2)	5086(98.3)
เคย	45(2.9)	63(4.2)	42(3.8)	62(7.4)	212(4.2)	14(1.0)	23(1.6)	33(2.0)	20(2.8)	90(1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(26)	(11)	(8)	(84)	(26)	(23)	(16)	(4)	(69)
รวม	1567(100.0)	1494(100.0)	1113(100.0)	840(100.0)	5014(100.0)	1390(100.0)	1441(100.0)	1636(100.0)	709(100.0)	5176(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	32(71.1)	40(63.5)	32(76.2)	44(71.0)	148(69.8)	9(64.3)	16(69.6)	27(81.8)	13(65.0)	65(72.2)
2-3 ครั้ง	7(15.6)	13(20.6)	8(19.0)	12(19.4)	40(18.9)	5(35.7)	4(17.4)	6(18.2)	1(5.0)	16(17.8)
4 ครั้งขึ้นไป	6(13.3)	10(15.9)	2(4.8)	6(9.7)	24(11.3)	0(0)	3(13.0)	0(0)	6(30.0)	9(10.0)
รวม	45(100.0)	63(100.0)	42(100.0)	62(100.0)	212(100.0)	14(100.0)	23(100.0)	33(100.0)	20(100.0)	90(100.0)
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เคย	1490(95.1)	1244(83.4)	788(70.9)	552(65.8)	4074(81.3)	1294(93.1)	1170(81.2)	1238(75.8)	495(69.7)	4197(81.1)
เคย	77(4.9)	247(16.6)	324(29.1)	287(34.2)	935(18.7)	96(6.9)	271(18.8)	395(24.2)	215(30.3)	977(18.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(29)	(12)	(9)	(89)	(26)	(23)	(19)	(3)	(71)
รวม	1567(100.0)	1491(100.0)	1112(100.0)	839(100.0)	5009(100.0)	1390(100.0)	1441(100.0)	1633(100.0)	710(100.0)	5174(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	50(64.9)	136(55.1)	162(50.0)	141(49.1)	489(52.3)	75(78.1)	169(62.4)	210(53.2)	102(47.4)	556(56.9)
2-3 ครั้ง	20(26.0)	63(25.5)	105(32.4)	107(37.3)	295(31.6)	16(16.7)	80(29.5)	139(35.2)	74(34.4)	309(31.6)
4 ครั้งขึ้นไป	7(9.1)	48(19.4)	57(17.6)	39(13.6)	151(16.1)	5(5.2)	22(8.1)	46(11.6)	39(18.1)	112(11.5)
รวม	77(100.0)	247(100.0)	324(100.0)	287(100.0)	935(100.0)	96(100.0)	271(100.0)	395(100.0)	215(100.0)	977(100.0)

ตารางที่ 4.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุรานักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เลย	1339(85.4)	1186(79.5)	881(79.3)	605(72.1)	4011(80.1)	1134(81.6)	1141(79.2)	1215(74.6)	519(73.2)	4009(77.6)
เคย	229(14.6)	306(20.5)	230(20.7)	234(27.9)	999(19.9)	256(18.4)	299(20.8)	414(25.4)	190(26.8)	1159(22.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(38)	(28)	(13)	(9)	(88)	(26)	(24)	(23)	(4)	(77)
รวม	1568(100.0)	1492(100.0)	1111(100.0)	839(100.0)	5010(100.0)	1390(100.0)	1440(100.0)	1629(100.0)	709(100.0)	5168(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	120(52.4)	134(43.8)	114(49.6)	109(46.6)	477(47.7)	134(52.3)	154(51.5)	187(45.2)	74(38.9)	549(47.4)
2-3 ครั้ง	60(26.2)	96(31.4)	78(33.9)	84(35.9)	318(31.8)	80(31.3)	94(31.4)	155(37.4)	76(40.0)	405(34.9)
4 ครั้งขึ้นไป	49(21.4)	76(24.8)	38(16.5)	41(17.5)	204(20.4)	42(16.4)	51(17.1)	72(17.4)	40(21.1)	205(17.7)
รวม	229(100.0)	306(100.0)	230(100.0)	234(100.0)	999(100.0)	256(100.0)	299(100.0)	414(100.0)	190(100.0)	1159(100.0)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยที่ไม่ต้องการ										
ไม่เลย	1439(91.8)	1301(87.3)	917(82.5)	668(79.8)	4325(86.4)	1263(91.0)	1219(84.7)	1320(80.9)	546(76.9)	4348(84.1)
เคย	128(8.2)	190(12.7)	194(17.5)	169(20.2)	681(13.6)	125(9.0)	221(15.3)	312(19.1)	164(23.1)	822(15.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(29)	(13)	(11)	(92)	(28)	(24)	(20)	(3)	(75)
รวม	1567(100.0)	1491(100.0)	1111(100.0)	837(100.0)	5006(100.0)	1388(100.0)	1440(100.0)	1632(100.0)	710(100.0)	5170(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	64(50.0)	74(38.9)	89(45.9)	82(48.5)	309(45.4)	64(51.2)	104(47.1)	119(38.1)	60(36.6)	347(42.2)
2-3 ครั้ง	36(28.1)	55(28.9)	50(25.8)	50(29.6)	191(28.0)	39(31.2)	71(32.1)	130(41.7)	67(40.9)	307(37.3)
4 ครั้งขึ้นไป	28(21.9)	61(32.1)	55(28.4)	37(21.9)	181(26.6)	22(17.6)	46(20.8)	63(20.2)	37(22.6)	168(20.4)
รวม	128(100.0)	190(100.0)	194(100.0)	169(100.0)	681(100.0)	125(100.0)	221(100.0)	312(100.0)	164(100.0)	822(100.0)
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เลย	1540(98.3)	1433(96.0)	1066(95.9)	785(93.5)	4824(96.3)	1381(99.4)	1416(98.3)	1602(98.1)	697(98.3)	5096(98.5)
เคย	27(1.7)	59(4.0)	45(4.1)	55(6.5)	186(3.7)	9(0.6)	25(1.7)	31(1.9)	12(1.7)	77(1.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(28)	(13)	(8)	(88)	(26)	(23)	(19)	(4)	(72)
รวม	1567(100.0)	1492(100.0)	1111(100.0)	840(100.0)	5010(100.0)	1390(100.0)	1441(100.0)	1633(100.0)	709(100.0)	5173(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	22(81.5)	23(39.0)	27(60.0)	26(47.3)	98(52.7)	8(88.9)	17(68.0)	25(80.6)	9(75.0)	59(76.6)
2-3 ครั้ง	2(7.4)	16(27.1)	13(28.9)	13(23.6)	44(23.7)	1(11.1)	4(16.0)	4(12.9)	2(16.7)	11(14.3)
4 ครั้งขึ้นไป	3(11.1)	20(33.9)	5(11.1)	16(29.1)	44(23.7)	0(0)	4(16.0)	2(6.5)	1(8.3)	7(9.1)
รวม	27(100.0)	59(100.0)	45(100.0)	55(100.0)	186(100.0)	9(100.0)	25(100.0)	31(100.0)	12(100.0)	77(100.0)

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 4.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	352(24.8)	314 (22.0)	201(18.6)	116(14.2)	983(20.7)	295(22.3)	242(17.4)	252(15.8)	107(15.2)	896(17.9)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา เครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใด ชนิดหนึ่ง	1068(75.2)	1111(78.0)	882(81.4)	699(85.8)	3760(79.3)	1025 (77.7)	1147(82.6)	1346(84.2)	597(84.8)	4115(82.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(186)	(95)	(41)	(33)	(355)	(96)	(75)	(54)	(9)	(234)
รวม	1420(100.0)	1425(100.0)	1083(100.0)	815(100.0)	4743(100.0)	1320(100.0)	1389(100.0)	1598(100.0)	704(100.0)	5011(100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	1046(99.2)	1087(98.5)	863(98.7)	686(99.0)	3682(98.8)	1006(98.5)	1133(99.4)	1321(98.7)	585(98.7)	4045(98.8)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	110(17.9)	107(17.0)	100(22.2)	64(17.3)	381(18.5)	176(26.0)	164(24.3)	199(26.5)	85(25.6)	624(25.6)
5-9 ครั้ง	58(9.5)	90(14.3)	39(8.6)	39(10.6)	226(11.0)	79(11.7)	79(11.7)	86(11.4)	22(6.6)	266(10.9)
≥10 ครั้ง	445(72.6)	433(68.7)	312(69.2)	266(72.1)	1456(70.6)	421(62.3)	431(63.9)	467(62.1)	225(67.8)	1544(63.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(433)	(457)	(412)	(317)	(1619)	(330)	(459)	(569)	(253)	(1611)
รวม	613(100.0)	630(100.0)	451(100.0)	369(100.0)	2063(100.0)	676(100.0)	674(100.0)	752(100.0)	332(100.0)	2434(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	669(69.5)	792(78.0)	693(83.1)	493(77.6)	2647(76.8)	658(68.8)	815(74.7)	1014(79.3)	442(78.6)	2929(75.3)
เบียร์	763(79.1)	837(82.5)	715(85.7)	517(81.4)	2832(82.1)	808(84.2)	922(84.5)	1143(89.4)	483(85.9)	3356(86.2)
Spy/ไวน์	488(50.6)	563(55.5)	462(55.4)	281(44.3)	1794(52.0)	502(52.3)	610(55.9)	771(60.3)	328(58.4)	2211(56.8)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	137 (14.2)	219 (21.6)	191 (22.9)	84 (13.2)	631 (18.3)	102 (10.6)	166 (15.2)	246 (19.2)	87(15.5)	601 (15.4)
วิทยุ										
เคยเห็น*	457(49.2)	397(42.6)	249(33.2)	333(54.4)	1436(44.5)	330(37.0)	362(35.9)	436(38.4)	252(47.2)	1380(38.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	83(38.8)	70(36.8)	30(30.6)	49(35.5)	232(36.3)	94(45.9)	73(39.5)	95(39.9)	42(32.8)	304(40.2)
5-9 ครั้ง	18(8.4)	23(12.1)	7(7.1)	13(9.4)	61(9.5)	11(5.4)	19(10.3)	16(6.7)	7(5.5)	53(7.0)
≥10 ครั้ง	113(52.8)	97(51.1)	61(62.2)	76(55.1)	347(54.2)	100(48.8)	93(50.3)	127(53.4)	79(61.7)	399 (52.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(243)	(207)	(151)	(195)	(796)	(125)	(177)	(198)	(124)	(624)
รวม	214(100.0)	190(100.0)	98(100.0)	138(100.0)	640(100.0)	205(100.0)	185(100.0)	238(100.0)	128(100.0)	756(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	199(52.6)	196(56.3)	144(62.6)	158 (56.4)	697(56.4)	183 (61.2)	191(57.7)	253(62.0)	145(62.5)	772(60.8)
เบียร์	209(55.3)	232(66.7)	145(63.0)	173(61.8)	759(61.4)	194(64.7)	222(67.1)	282(69.1)	158 (68.4)	856(67.4)
Spy/ไวน์	85(22.5)	118(33.9)	66 (28.7)	72(25.7)	341(27.6)	73(24.3)	82 (24.8)	123(30.1)	74(32.0)	352(27.7)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	34(9.0)	52(14.9)	33(14.3)	24(8.6)	143(11.6)	19(6.3)	30(9.1)	56(13.7)	25(10.8)	130(10.2)

ตารางที่ 4.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็นได้ขึ้นโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	731(75.1)	780(75.4)	613(74.2)	504(77.9)	2628(75.5)	649(68.1)	769(70.9)	880 (70.7)	382(70.3)	2680(70.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	117(31.2)	138(32.5)	89(30.5)	81(32.5)	425(31.7)	148(37.3)	153(36.4)	190(40.9)	70(36.8)	561(38.1)
5-9 ครั้ง	29(7.7)	57(13.4)	27(9.2)	16(6.4)	129(9.6)	29(7.3)	45(10.7)	40(8.6)	21(11.1)	135(9.2)
≥10 ครั้ง	229(61.1)	229(54.0)	176(60.3)	152(61.0)	786(58.7)	220(55.4)	222(52.9)	235(50.5)	99(52.1)	776(52.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(356)	(356)	(321)	(255)	(1288)	(252)	(349)	(415)	(192)	(1208)
รวม	375(100.0)	424(100.0)	292(100.0)	249(100.0)	1340(100.0)	397(100.0)	420(100.0)	465(100.0)	190(100.0)	1472(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
हेल้า	385(59.0)	490(68.7)	437(75.1)	307(68.8)	1619(67.6)	377(61.9)	473(64.8)	607(71.9)	247(69.4)	1704(67.1)
เบียร์	439(67.2)	551(77.3)	448(77.0)	301(67.5)	1739(72.6)	430(70.6)	545(74.7)	668(79.1)	271(76.1)	1914(75.4)
Spy/ไวน์	239(36.6)	316(44.3)	278(47.8)	171(38.3)	1004(41.9)	230(37.8)	316(43.3)	419(49.6)	155(43.5)	1120(44.1)
हेล้าผสมพร้อมดื่ม	70(10.7)	97(13.6)	105(18.0)	56(12.6)	328(13.7)	51(8.4)	82(11.2)	136(16.1)	48(13.5)	317(12.5)
นิตยสาร										
เคยเห็น*	492(52.5)	551(55.8)	454(56.3)	371(59.5)	1868(55.7)	432(47.3)	559(53.3)	687(56.6)	277(52.7)	1955(52.8)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	79(37.3)	108(38.8)	63(33.3)	47(32.0)	297(36.0)	119(48.0)	109(36.6)	143(41.3)	50(40.3)	421(41.4)
5-9 ครั้ง	20(9.4)	24(8.6)	18(9.5)	11(7.5)	73(8.8)	9(3.6)	32(10.7)	22(6.4)	7(5.6)	70(6.9)
≥10 ครั้ง	113(53.3)	146(52.5)	108(57.1)	89(60.5)	456(55.2)	120(48.4)	157(52.7)	181(52.3)	67(54.0)	525(51.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(280)	(273)	(265)	(224)	(1042)	(184)	(261)	(341)	(153)	(939)
รวม	212(100.0)	278(100.0)	189(100.0)	147(100.0)	826(100.0)	248(100.0)	298(100.0)	346(100.0)	124(100.0)	1016(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
हेล้า	201(47.5)	293(60.3)	291(68.1)	191(60.1)	976(59.0)	214(52.8)	319(61.5)	402(61.6)	173(67.6)	1108(60.4)
เบียร์	254(60.0)	351(72.2)	308(72.1)	196(61.6)	1109(67.0)	255(63.0)	356(68.6)	461(70.6)	180(70.0)	1252(68.3)
Spy/ไวน์	179(42.3)	252(51.9)	225(52.7)	136(42.8)	792(47.9)	204(50.4)	287(55.3)	393(60.2)	143 (55.6)	1027(56.0)
हेล้าผสมพร้อมดื่ม	48(11.3)	84(17.3)	79(18.5)	45(14.2)	256(15.5)	45(11.1)	79(15.2)	125(19.1)	41(16.0)	290(15.8)
แผ่นป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	665(67.7)	691(68.2)	526(64.6)	473(74.5)	2355(68.4)	568(59.5)	649(60.4)	765(62.6)	348(64.1)	2330(61.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	112 (32.4)	119(33.1)	87(39.0)	74(33.5)	392(34.1)	134(38.5)	125(36.3)	157(38.8)	55(32.4)	471(37.2)
5-9 ครั้ง	47(13.6)	35(9.7)	15(6.7)	15(6.8)	112(9.7)	29(8.3)	41(11.9)	39(9.6)	16(9.4)	125(9.9)
≥10 ครั้ง	187(54.0)	206(57.2)	121(54.3)	132(59.7)	646(56.2)	185(53.2)	178(51.7)	209(51.6)	99(58.2)	671(53.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(319)	(331)	(303)	(252)	(1205)	(220)	(305)	(360)	(178)	(1063)
รวม	346(100.0)	360(100.0)	223(100.0)	221(100.0)	1150(100.0)	348(100.0)	344(100.0)	405(100.0)	170(100.0)	1267(100.0)

ตารางที่ 4.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็นได้ยืนยันโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	346(58.5)	421(67.0)	369(75.5)	281(67.4)	1417(66.7)	322(60.4)	397(65.2)	510(70.5)	233(72.8)	1462(66.9)
เบียร์	418(70.7)	489(77.9)	380(77.6)	298(71.5)	1585(74.6)	392(73.5)	485(79.6)	592(81.8)	246(76.9)	1715(78.5)
Spy/ไวน์	224(37.9)	301(47.9)	213(43.5)	154(36.9)	892(42.0)	236(44.3)	278(45.6)	357(49.3)	141(44.1)	1012(46.3)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	65(11.0)	114(18.2)	84(17.1)	56(13.4)	319(15.0)	58(10.9)	75(12.3)	124(17.1)	49(15.3)	306(14.0)
ผ่านปลิว										
เคยเห็น*	359(39.5)	338(36.2)	204(27.3)	251(42.6)	1152(36.2)	260(29.1)	258 (25.7)	295(26.4)	175(34.4)	988(28.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	61 (44.2)	66 (41.3)	25(37.3)	30(36.1)	182(40.6)	75(51.4)	53(43.8)	61(41.8)	27(35.1)	216(44.1)
5-9 ครั้ง	11(8.0)	8(5.0)	2(3.0)	6(7.2)	27 (6.0)	14(9.6)	7(5.8)	9(6.2)	9(11.7)	39(8.0)
≥10 ครั้ง	66(47.8)	86(53.8)	40(59.7)	47(56.6)	239(53.3)	57(39.0)	61(50.4)	76(52.1)	41(53.2)	235(48.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(221)	(178)	(137)	(168)	(704)	(114)	(137)	(149)	(98)	(498)
รวม	138(100.0)	160(100.0)	67(100.0)	83(100.0)	448(100.0)	146(100.0)	121(100.0)	146(100.0)	77(100.0)	490(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	135(46.7)	182(62.3)	106(57.9)	101(50.5)	524(54.4)	131(55.0)	139(61.0)	169(61.0)	103(66.5)	542(60.4)
เบียร์	162(56.1)	203(69.8)	116(63.4)	123(61.5)	604(62.7)	146(61.3)	150(65.8)	188(67.9)	106(68.4)	590(65.7)
Spy/ไวน์	100(34.6)	132(45.2)	72(39.3)	76(38.0)	380(39.4)	93(39.1)	104(45.6)	118(42.6)	60(38.7)	375(41.8)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	35(12.1)	57(19.5)	31(16.9)	26(13.0)	149(15.5)	19(8.0)	42(18.4)	65(23.5)	27(17.4)	153(17.0)
ผ่านปิดประกาศ										
เคยเห็น*	397(43.8)	347 (37.4)	225(30.3)	277(46.8)	1246(39.3)	238(27.2)	256(25.6)	283(25.6)	166(33.1)	943(27.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	67(39.4)	59(38.3)	24(30.4)	32(32.7)	182(36.3)	63(47.0)	38(34.5)	57(39.9)	27(38.0)	185(40.4)
5-9 ครั้ง	11(6.5)	10(6.5)	4(5.1)	4(4.1)	29(5.8)	6(4.5)	9(8.2)	11(7.7)	6(8.5)	32(7.0)
≥10 ครั้ง	92(54.1)	85(55.2)	51(64.6)	62(63.3)	290(57.9)	65(48.5)	63(57.3)	75(52.4)	38(53.5)	241(52.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(227)	(193)	(146)	(179)	(745)	(104)	(146)	(140)	(95)	(485)
รวม	170(100.0)	154(100.0)	79(100.0)	98(100.0)	501(100.0)	134(100.0)	110(100.0)	143(100.0)	71(100.0)	458(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	151(46.3)	192 (64.4)	134(66.3)	134(58.8)	611(58.0)	128(59.5)	143(63.3)	171(65.5)	105(71.9)	547(64.5)
เบียร์	191(58.6)	211(70.8)	134(66.3)	131(57.5)	667(63.3)	142(66.0)	162(71.7)	188(72.0)	104(71.2)	596(70.3)
Spy/ไวน์	114(35.0)	132(44.3)	81(40.1)	75(32.9)	402(38.1)	80(37.2)	100(44.2)	116(44.4)	64(43.8)	360(42.5)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	38(11.7)	53(17.8)	32(15.8)	32(14.0)	155(14.7)	20(9.3)	30(13.3)	61(23.4)	26(17.8)	137(16.2)

ตารางที่ 4.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	645(66.2)	660(65.2)	481(59.8)	395(62.4)	2181(63.7)	494(53.5)	591(55.9)	750(61.4)	313(57.7)	2148(57.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	79(24.7)	89(27.6)	47(24.)	27(16.4)	242(24.1)	103(35.8)	95(30.4)	125(32.0)	50(33.8)	373(32.7)
5-9 ครั้ง	28(8.8)	32(9.9)	15(7.7)	13(7.9)	88(8.8)	27(9.4)	43(13.8)	33(8.4)	12(8.1)	115(10.1)
≥10 ครั้ง	213(66.6)	201(62.4)	134(68.4)	125(75.8)	673(67.1)	158(54.9)	174(55.8)	233(59.6)	86(58.1)	651(57.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(325)	(338)	(285)	(230)	(1178)	(206)	(279)	(359)	(165)	(1009)
รวม	320(100.0)	322(100.0)	196(100.0)	165(100.0)	1003(100.0)	288(100.0)	312(100.0)	391(100.0)	148(100.0)	1139(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	351(61.7)	439(73.0)	356(78.6)	240(70.6)	1386(70.6)	315(69.4)	397(71.7)	565(78.8)	216(74.7)	1493(74.1)
เบียร์	398 (69.9)	463(76.9)	362(79.7)	240(70.6)	1463(74.5)	338(74.4)	424(76.5)	592(82.6)	216(74.7)	1570(78.0)
Spy/ไวน์	306(53.9)	369(61.3)	285(62.8)	180(52.9)	1140(58.0)	280(61.7)	368(66.4)	487(67.9)	189(65.4)	1324(65.7)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	126(22.2)	180(29.9)	135(29.7)	79(23.2)	520(26.5)	102(22.5)	138(24.9)	238(33.2)	69(23.9)	547(27.2)
ช่วงเวลาที่จะเห็น/ได้ยินโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น*)										
16.00-20.00 น.	321(36.2)	280(27.6)	167(20.3)	175(26.9)	943 (27.9)	360(40.3)	314(30.3)	330(26.2)	150(27.1)	1154(30.8)
20.00-24.00 น.	365(41.1)	426(41.9)	348(42.4)	233(35.8)	1372(40.7)	326(36.5)	476(45.9)	573(45.5)	245(44.3)	1620(43.3)
24.00-04.00 น.	89(10.0)	224(22.0)	251(30.6)	190(29.2)	754(22.3)	89(10.0)	176(17.0)	270(21.5)	122(22.1)	657(17.6)
04.00-08.00 น.	13(1.5)	7(.7)	5(.6)	5(.8)	30(.9)	13(1.5)	4(.4)	5(.4)	3(.5)	25(.7)
08.00-12.00 น.	42(4.7)	41(4.0)	21(2.6)	30(4.6)	134(4.0)	56(6.3)	30(2.9)	32(2.5)	15(2.7)	133(3.6)
12.00-16.00 น.	57(6.4)	38 (3.7)	29(3.5)	18(2.8)	142(4.2)	50(5.6)	37(3.6)	48(3.8)	18(3.3)	153(4.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	181	95	61	48	385	131	110	88	44	373
รวม	887(100.0)	1016(100.0)	821(100.0)	651(100.0)	3375(100.0)	894(100.0)	1037(100.0)	1258(100.0)	553(100.0)	3742(100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	526(55.2)	488(46.8)	332(39.2)	326(49.5)	1672(47.8)	578(60.0)	572(52.4)	544(42.2)	291(50.3)	1985(50.6)
จำได้	427 (44.8)	554(53.2)	514(60.8)	333(50.5)	1828(52.2)	385(40.0)	519(47.6)	746(57.8)	288(49.7)	1938(49.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	115	69	36	40	260	62	56	56	18	192
รวม	953(100.0)	1042(100.0)	846(100.0)	659(100.0)	3500(100.0)	963(100.0)	1091(100.0)	1290(100.0)	579(100.0)	3923(100.0)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง
อันดับ2	ลีโอบ	Regency	Regency	Regency	Regency	Regency	Regency	Regency	Regency	Regency
อันดับ3	แสงไสม	แสงไสม	แสงไสม	แสงไสม	แสงไสม	ลีโอบ	สิงห์	สิงห์	สิงห์	สิงห์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	Johny walker	Johny walker	Johny walker	ช้าง	Spy Wine	Spy Wine	Spy Wine	Spy Wine
อันดับ2	ลีโอบ	Johny walker	ช้าง	regency	ช้าง	Spy Wine	Spy Wine	Spy Wine	ไวน์	Spy Wine
อันดับ3	Spy Wine	regency	regency	ลีโอบ	ลีโอบ	ลีโอบ	ลีโอบ	Johnny Walker	Walker	ช้าง

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

ประสบการณ์การใช้สิ่งเสพติด สิ่งเสพติดที่รู้จักและเคยเห็นของจริง

ตารางที่ 4.15 ชนิดของสิ่งเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา)(ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด 3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดครั้งสุดท้าย										
ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	เพื่อนใช้	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	ตำรวจ	เพื่อนใช้	ตำรวจ
อันดับ 2	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ
อันดับ 3	ตำรวจ	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ	ตำรวจ	เพื่อนใช้	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	นิทรรศการ/ การแสดง ต่างๆ
อันดับ 2	แถวบ้าน/ข้าง บ้าน/ในชุมชน ปลูก	ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	เพื่อนใช้
อันดับ 3	ตำรวจ	แถวบ้าน/ ข้างบ้าน/ใน ชุมชน ปลูก	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	ใช้เอง	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	บندوق	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	นิทรรศการ/ ตำรวจ	เพื่อนใช้	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้
ฝิ่น : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้ 1	นิทรรศการ/ ตำรวจ	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ ตำรวจ	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	นิทรรศการ/ ตำรวจ
อันดับ 2	นิทรรศการ/ การแสดงต่างๆ	-	เพื่อนใช้	-	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้ 2	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้ 2	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้	ตำรวจ	-	บندوق
อันดับ 3	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	-	-	-	แถวบ้านมีชาย /มีคนใช้	บندوق	บندوق	บندوق	-	แถวบ้านมี ชาย/มีคนใช้

ตารางที่ 4.16 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	106(7.0)	267(18.4)	284(26.1)	352 (42.3)	1009(20.6)	14(1.0)	83(5.9)	102 (6.4)	115(16.3)	314(6.2)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดรม	22(1.4)	38(2.6)	35(3.2)	41(5.0)	136(2.8)	10(0.7)	12(0.8)	20(1.2)	14(2.0)	56(1.1)
c. ยาแก้ลมประสาท/ยากลายเครียด	8(0.5)	25(1.7)	20(1.8)	22(2.7)	75(1.5)	3(0.2)	14(1.0)	41(2.6)	22(3.1)	80(1.6)
d. ยานอนหลับ	41(2.7)	79(5.4)	78(7.2)	70 (8.5)	268(5.5)	72(5.3)	106(7.5)	146(9.1)	79(11.2)	403 (7.9)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	5(0.3)	26 (1.8)	40(3.7)	60(7.2)	131(2.7)	0(0)	3(0.2)	1(0.1)	3(0.4)	7 (0.1)
f. กัญชา	13(0.9)	53(3.6)	87(8.0)	115(13.9)	268(5.5)	0(0)	8(0.6)	12(0.7)	26 (3.7)	46(0.9)
g. ฝิ่น	6(0.4)	17(1.2)	20(1.8)	20(2.4)	63(1.3)	0(0)	0(0)	2(0.1)	3(0.4)	5(0.1)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	1(0.1)	10(0.7)	13(1.2)	8(1.0)	32(0.7)	0(0)	1(0.1)	1(0.1)	2(0.3)	4(0.1)
i. ยาเค (เคตามีน)	3(0.2)	8 (0.5)	9(0.8)	7(0.8)	27(0.6)	0(0)	0(0)	1(0.1)	3(0.4)	4(0.1)
j. โคเคน	4(0.3)	6(0.4)	10(0.9)	4(0.5)	24(0.5)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0.1)	1(0.0)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	2(0.1)	9(0.6)	14(1.3)	16(1.9)	41 (0.8)	0(0)	1(0.1)	0(0)	1(0.1)	2(0.0)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	7(0.5)	33(2.3)	44(4.1)	32 (3.9)	116(2.4)	3(0.2)	8(0.6)	5(0.3)	4(0.6)	20(0.4)
m. ยาบ้า	3(0.2)	19(1.3)	36(3.3)	50(6.0)	108(2.2)	1(0.1)	1(0.1)	4(0.2)	17(2.4)	23(0.5)
n. ไอซ์	4(0.3)	11(0.8)	18(1.7)	11(1.3)	44(0.9)	0(0)	0(0)	2(0.1)	4(0.6)	6(0.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 4.17 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	107(7.1)	236(16.6)	237(22.3)	298(37.3)	878(18.4)	19(1.4)	77 (5.5)	98(6.1)	93(13.3)	287(5.7)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดลัม	25(1.7)	31(2.2)	30(2.8)	34(4.2)	120(2.5)	17(1.2)	11(0.8)	14(0.9)	13(1.9)	55(1.1)
c. ยาแก้ไอผสมประสาท/ยาคลายเครียด	8(0.5)	14(1.0)	17(1.6)	21(2.6)	60(1.2)	7(0.5)	18(1.3)	28 (1.8)	16(2.3)	69(1.4)
d. ยานอนหลับ	31(2.1)	48(3.4)	54(5.1)	48(6.0)	181(3.8)	61(4.4)	72(5.1)	107(6.7)	54(7.7)	294(5.8)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	5(0.3)	17(1.2)	22(2.1)	37(4.6)	81(1.7)	1(0.1)	6(0.4)	0 (0)	6(0.9)	13(0.3)
f. กัญชา	11(0.7)	47(3.3)	53(5.0)	88(10.9)	199(4.1)	1(0.1)	8(0.6)	3(0.2)	18(2.6)	30(0.6)
g. ฝิ่น	2(0.1)	13(0.9)	9(0.8)	21(2.6)	45(0.9)	1(0.1)	1(0.1)	0(0)	4(0.6)	5 (0.1)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	2(0.1)	9(0.6)	5(0.5)	12(1.5)	28(0.6)	1(0.1)	2(0.1)	0(0)	3(0.4)	4(0.1)
i. ยาเค (เคตามีน)	3(0.2)	9(0.6)	5(0.5)	9(1.1)	26(0.5)	1(0.1)	1(0.1)	0(0)	3(0.4)	2(0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	2(0.1)	8(0.6)	5(0.5)	14(1.7)	29(0.6)	2(0.1)	2(0.1)	0(0)	4(0.6)	5(0.1)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	8(0.5)	26 (1.8)	22(2.1)	32(4.0)	88(1.8)	6(0.4)	8(0.6)	2(0.1)	5(0.7)	21(0.4)
l. ยาบ้า	1(0.1)	16(1.1)	20(1.9)	36(4.5)	73(1.5)	1(0.1)	2(0.1)	1(0.1)	12(1.7)	16(0.3)
m. ไอซ์	3(0.2)	14(1.0)	8(0.7)	17(2.1)	42 (0.9)	1 (0.1)	2 (0.1)	0(0)	3(0.4)	5(0.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 4.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	30(28.0)	94(39.8)	90 (38.0)	116(38.9)	330(37.6)	6(31.6)	41(53.2)	37(37.8)	46(49.5)	130(45.3)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	6(24.0)	8(25.8)	6(20.0)	8(23.5)	28(23.3)	9(52.9)	5(45.5)	6(42.9)	2(15.4)	22 (40.0)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเครียด	0(0)	5(35.7)	5(29.4)	6(28.6)	16(26.7)	4(57.1)	7(38.9)	13(46.4)	6(37.5)	30(43.5)
d. ยานอนหลับ	11(35.5)	17 (35.4)	9(16.7)	17(35.4)	54(29.8)	32(52.5)	30(41.7)	22(20.6)	29(53.7)	113(38.4)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม										
เช่น 4X100	1(20.0)	7(41.2)	3(13.6)	7(18.9)	18(22.2)	0(0)	3(50.0)	0(0)	1(16.7)	8(61.5)
f. กัญชา	3(27.3)	14(29.8)	8(15.1)	24(27.3)	49(24.6)	0(0)	3(37.5)	3(100.0)	6(33.3)	14(46.7)
g. ฝิ่น	0(0)	3(23.1)	2(22.2)	5(23.8)	10(22.2)	0(0)	0(0)	0(0)	1(25.0)	4(80.0)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0(0)	4(44.4)	1(20.0)	2(16.7)	7(25.0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(33.3)	4(100.0)
i. ยาเค (เคตามีน)	0(0)	4(44.4)	0(0)	2(22.2)	6(23.1)	0(0)	0(0)	0(0)	1(33.3)	4(200.0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0(0)	4(50.0)	0(0)	2(14.3)	6(20.7)	2(100.0)	0(0)	0(0)	2(50.0)	5(100.0)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1(12.5)	10(38.5)	5(22.7)	5(15.6)	21(23.9)	4(66.7)	1(12.5)	1(50.0)	2(40.0)	8(38.1)
l. ยาบ้า	0(0)	8(50.0)	1(5.0)	8(22.2)	17(23.3)	0(0)	5 (50.0)	2(20.0)	2(16.7)	7(43.8)
m. ไอซ์	1(33.3)	4 (28.6)	0(0)	2(11.8)	7(16.7)	0(0)	0(0)	0(0)	1(33.3)	4(80.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

ตารางที่ 4.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	525(44.9)	640(52.9)	538(57.6)	410(57.5)	2113(52.5)	574(48.4)	589(47.3)	807(55.0)	325(50.6)	2295(50.5)
มี	645(55.1)	570(47.1)	396(42.4)	303(42.5)	1914(47.5)	612(51.6)	657(52.7)	660(45.0)	317(49.4)	2246(49.5)
ไม่ระบุ(จำนวน)	(436)	(310)	(190)	(135)	(1071)	(230)	(218)	(185)	(71)	(704)
รวม	1170(100.0)	1210(100.0)	934(100.0)	713(100.0)	4027(100.0)	1186(100.0)	1246(100.0)	1467(100.0)	642(100.0)	4541(100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
แม่	174(27.0)	161(28.2)	98(24.7)	92(30.4)	525(27.4)	186(30.4)	157(23.9)	154(23.3)	84(26.5)	581(25.)
พ่อ	459(71.2)	386(67.7)	280(70.7)	203(67.0)	1328(69.4)	424(69.3)	443(67.4)	446(67.6)	204(64.4)	1517(67.5)
แม่เลี้ยง	26(4.0)	14(2.5)	18(4.5)	19(6.3)	77(4.0)	19(3.1)	10(1.5)	12(1.8)	8(2.5)	49(2.2)
พ่อเลี้ยง	32(5.0)	25(4.4)	23(5.8)	24(7.9)	104(5.4)	27(4.4)	32(4.9)	29(4.4)	19(6.0)	107(4.8)
พี่น้อง	121(18.8)	141(24.7)	103(26.0)	87(28.7)	452(23.6)	146(23.9)	165(25.1)	156(23.6)	95(30.0)	562(25.0)
ปู่/ย่า	113(17.5)	92(16.1)	54(13.6)	63(20.8)	322(16.8)	88(14.4)	75(11.4)	73(11.1)	39(12.3)	275(12.2)
ตา/ยาย	109(16.9)	93(16.3)	54(13.6)	64(21.1)	320(16.7)	92(15.0)	89(13.5)	80(12.1)	41(12.9)	302(13.4)
ญาติฝ่ายพ่อ	238(36.9)	215(37.7)	128(32.3)	123(40.6)	704(36.8)	267(43.6)	275(41.9)	246(37.3)	135(42.6)	923(41.1)
ญาติฝ่ายแม่	208(32.2)	197(34.6)	136(34.3)	113(37.3)	654(34.2)	232(37.9)	251(38.2)	237(35.9)	127(40.1)	847(37.7)
แฟน	32(5.0)	55(9.6)	44(11.1)	51(16.8)	182(9.5)	48(7.8)	118(18.0)	127(19.2)	115(36.3)	408(18.2)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	40(6.2)	30(5.3)	14(3.5)	22(7.3)	106(5.5)	31(5.1)	16(2.4)	21(3.2)	11(3.5)	79(3.5)
พ่อ	221(34.3)	215(37.7)	155(39.1)	131(43.2)	722(37.7)	232(37.9)	248(37.7)	277(42.0)	127(40.1)	884(39.4)
แม่เลี้ยง	8(1.2)	9(1.6)	1(0.3)	6(2.0)	24(1.3)	5(0.8)	3(0.5)	4(0.6)	5(1.6)	17(0.8)
พ่อเลี้ยง	20(3.1)	12(2.1)	10(2.5)	13(4.3)	55(2.9)	17(2.8)	16(2.4)	16(2.4)	12(3.8)	61(2.7)
พี่น้อง	55(8.5)	85(14.9)	51(12.9)	38(12.5)	229(12.0)	64(10.5)	77(11.7)	76(11.5)	43(13.6)	260(11.6)
ปู่/ย่า	65(10.1)	73(12.8)	32(8.1)	41(13.5)	211(11.0)	82(13.4)	55(8.4)	63(9.5)	17(5.4)	217(9.7)
ตา/ยาย	68(10.5)	82(14.4)	40(10.1)	47(15.5)	237(12.4)	73(11.9)	65(9.9)	68(10.3)	31(9.8)	237(10.6)
ญาติฝ่ายพ่อ	118(18.3)	117(20.5)	72(18.2)	75(24.8)	382(20.0)	147(24.0)	152(23.1)	152(23.0)	74(23.3)	525(23.4)
ญาติฝ่ายแม่	85(13.2)	103(18.1)	65(16.4)	69(22.8)	322(16.8)	135(22.1)	116(17.7)	127(19.2)	65(20.5)	443(19.7)
แฟน	7(1.1)	16(2.8)	14(3.5)	14(4.6)	51(2.7)	20(3.3)	69(10.5)	61(9.2)	51(16.1)	201(8.9)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	9(1.4)	4(0.7)	2(0.5)	6(2.0)	21(1.1)	2(0.3)	2(0.3)	4(0.6)	2(0.6)	10(0.4)
พ่อ	5(0.8)	6(1.1)	3(0.8)	3(1.0)	17(0.9)	3(0.5)	1(0.2)	2(0.3)	1(0.3)	7(0.3)
แม่เลี้ยง	4(0.6)	4(0.7)	0(0)	3(1.0)	11(0.6)	3(0.5)	0(0)	1(0.2)	0(0)	4(0.2)
พ่อเลี้ยง	4(0.6)	4(0.7)	0(0)	3(1.0)	11(0.6)	1(0.2)	0(0)	2(0.3)	0(0)	3(0.1)
พี่น้อง	8(1.2)	8(1.4)	3(0.8)	6(2.0)	25(1.3)	7(1.1)	8(1.2)	6(0.9)	3(0.9)	24(1.1)
ปู่/ย่า	10(1.6)	8(1.4)	1(0.3)	4(1.3)	23(1.2)	1(0.2)	1(0.2)	3(0.5)	0(0)	5(0.2)
ตา/ยาย	5(0.8)	9(1.6)	0(0)	3(1.0)	17(0.9)	2(0.3)	1(0.2)	2(0.3)	0(0)	5(0.2)
ญาติฝ่ายพ่อ	6(0.9)	8(1.4)	0(0)	4(1.3)	18(0.9)	8(1.3)	0(0)	2(0.3)	2(0.6)	12(0.5)
ญาติฝ่ายแม่	9(1.4)	8(1.4)	2(0.5)	5(1.7)	24(1.3)	2(0.3)	3(0.5)	2(0.3)	0(0)	7(0.3)
แฟน	4(0.6)	8(1.4)	2(0.5)	7(2.3)	21(1.1)	2(0.3)	5(0.8)	5(0.8)	9(2.8)	21(0.9)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 4.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	1117(73.6)	1018(71.3)	797(73.7)	536(65.4)	3468(71.6)	1104(80.8)	1128(79.4)	1331(82.1)	545(77.7)	4108(80.4)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	1106(72.9)	1016(71.0)	758(69.9)	527(64.2)	3407(70.2)	1103(80.6)	1105(77.8)	1284(78.9)	523(74.5)	4015(78.5)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม (ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)	986(65.0)	921(64.7)	711(65.8)	482(58.9)	3100(64.0)	963(70.4)	955(67.3)	1190(73.2)	459(65.8)	3567(69.8)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	1091(71.9)	1024(71.8)	800(74.1)	558(68.0)	3473(71.7)	1085(79.3)	1126(79.2)	1371(84.4)	564(80.7)	4146 (81.1)
e. ยานอนหลับ	1012(66.7)	938(65.7)	714(66.0)	512(62.4)	3176(65.5)	993(72.5)	976(68.8)	1199(73.8)	492(70.4)	3660(71.6)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	1114(73.4)	1090 (76.4)	869(80.4)	587(71.5)	3660(75.5)	1109(81.1)	1180(83.0)	1453(89.4)	596(85.3)	4338(84.8)
g. กัญชา	1163(76.8)	1120(78.4)	889(82.2)	613(74.7)	3785(78.1)	1176(86.0)	1232(86.7)	1480(91.0)	601(86.0)	4489(87.8)
h. ฝิ่น	1158(76.4)	1125(78.8)	892(82.5)	621(75.7)	3796(78.4)	1181(86.3)	1235(86.9)	1485(91.3)	605(86.6)	4506(88.1)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1165(76.8)	1114(78.1)	885(81.9)	615(75.2)	3779(78.0)	1163(85.0)	1221(85.9)	1496(92.0)	607(86.8)	4487(87.7)
j. ยาเค (เคตามีน)	1156(76.2)	1117(78.3)	886(82.0)	620(75.6)	3779(78.0)	1153(84.3)	1216(85.6)	1490(91.7)	609(87.1)	4468(87.4)
k. โคเคน	1149(75.7)	1112(78.0)	885(81.9)	620(75.6)	3766(77.7)	1139(83.3)	1215(85.5)	1486(91.5)	607(86.8)	4447(87.0)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1149(75.8)	1120(78.5)	894(82.7)	627(76.5)	3790(78.2)	1144(83.6)	1211(85.2)	1485(91.4)	608(87.0)	4448(87.0)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1136(74.9)	1105(77.5)	875(80.9)	620(75.6)	3736(77.1)	1138(83.2)	1209(85.1)	1463(90.1)	602(86.1)	4412(86.3)
n. ยาบ้า	1173(77.5)	1131(79.3)	901(83.3)	628(76.6)	3833(79.1)	1180(86.3)	1252(88.1)	1504(92.6)	612(87.4)	4548(88.9)
o. ไอซ์	1131(74.8)	1103(77.3)	879(81.4)	610(74.4)	3723(76.9)	1126(82.3)	1212(85.4)	1474(90.8)	607(86.8)	4419(86.5)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การร้องเรียนการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 4.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะร้องเรียน ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	943(63.2)	659(46.2)	443(41.0)	232(28.2)	2277(47.2)	888(64.9)	813(57.7)	907(55.8)	315(44.6)	2923(57.2)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	882(59.2)	550(38.6)	301(27.8)	164(19.9)	1897(39.4)	800(58.5)	597(42.3)	593(36.5)	216(30.6)	2206(43.2)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)	891(59.7)	699(49.1)	448(41.6)	282(34.3)	2320(48.2)	789(57.7)	730(51.8)	827(51.0)	307(43.6)	2653(52.0)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	938(62.8)	741(52.0)	497(46.2)	320(39.0)	2496(51.9)	861(63.0)	827(58.7)	925(56.9)	373(53.1)	2986(58.5)
e. ยานอนหลับ	790(52.9)	571(40.1)	375(34.9)	244(29.7)	1980(41.1)	624(45.6)	547 (38.8)	628(38.6)	250(35.5)	2049(40.1)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	1067(70.6)	920(64.7)	652(60.2)	390(47.3)	3029(62.6)	1007(73.1)	1026(72.5)	1232(75.5)	463(65.7)	3728(72.7)
g. กัญชา	1091(72.2)	927(65.1)	661(60.9)	384(46.7)	3063(63.2)	1048(76.1)	1035(73.2)	1248(76.5)	470(66.6)	3801(74.1)
h. ฝิ่น	1092(72.2)	934(65.6)	677(62.4)	414(50.2)	3117(64.3)	1050(76.3)	1039(73.5)	1260(77.3)	479(67.9)	3828(74.7)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1090(72.1)	931(65.4)	680(62.6)	418(50.7)	3119(64.4)	1040(75.6)	1035(73.2)	1259(77.2)	477(67.7)	3811(74.3)
j. ยาเค (เคตามีน)	1094(72.4)	939(66.0)	687(63.3)	423(51.3)	3143(64.9)	1034(75.1)	1042(73.7)	1264(77.5)	476(67.5)	3816(74.5)
k. โคเคน	1090 (72.1)	944(66.3)	693(63.9)	428(51.9)	3155(65.1)	1034(75.2)	1033(73.1)	1262(77.4)	477(67.7)	3806(74.3)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1099(72.7)	948(66.6)	690(63.6)	427(51.8)	3164(65.3)	1037(75.4)	1040(73.6)	1266(77.6)	480(68.1)	3823(74.6)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1090(72.1)	934(65.6)	687(63.3)	441(53.5)	3152(65.1)	1031(75.0)	1030(72.8)	1241(76.1)	480(68.1)	3782(73.8)
n. ยาบ้า	1112(73.6)	957(67.3)	704(64.8)	429(52.1)	3202(66.1)	1054(76.7)	1052(74.5)	1278 (78.4)	486(68.8)	3870(75.5)
o. ไอซ์	1058(71.9)	920(66.0)	654(62.3)	409(51.4)	3041(64.6)	993(74.7)	1007(72.8)	1214(76.3)	456(66.9)	3670(73.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 4.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	162(10.8)	106(7.4)	62(5.7)	32(3.9)	362(7.5)	87(6.4)	74(5.2)	80(4.9)	36(5.1)	277(5.4)
b. สุรา –เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	160(10.7)	103(7.2)	73(6.7)	35(4.2)	371(7.7)	102(7.5)	77(5.4)	79(4.8)	35(5.0)	293(5.7)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)	334(22.3)	299(21.0)	204(18.8)	147(17.8)	984(20.4)	257(18.9)	259(18.3)	243(14.9)	101(14.3)	860(16.8)
d. ยาากล่อมประสาท/ยาคลายเครียด	502(33.5)	490(34.5)	356(32.9)	298(36.2)	1646(34.1)	407(29.9)	438(31.0)	496(30.5)	213(30.2)	1554(30.4)
e. ยานอนหลับ	394(26.3)	323(22.7)	244(22.5)	206(25.0)	1167(24.2)	248(18.2)	242(17.1)	292(17.9)	118(16.7)	900(17.6)
f. กระเทียม หรือ 4X100	675(45.0)	726(51.1)	599(55.3)	414(50.2)	2414(50.0)	607(44.7)	708(50.1)	936(57.6)	343(48.7)	2594(50.8)
g. กัญชา	710(47.3)	727(51.1)	577(53.2)	413(50.1)	2427(50.2)	643(47.2)	715(50.6)	919(56.5)	342(48.4)	2619(51.3)
h. ฝิ่น	718(47.8)	763(53.7)	613(56.5)	472(57.3)	2566(53.1)	655(48.1)	733(51.8)	963(59.2)	366(51.8)	2717(53.2)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	717(47.8)	775(54.5)	635(58.6)	485(58.8)	2612(54.1)	627(46.0)	741(52.4)	953(58.6)	367(52.0)	2688(52.6)
j. ยาเค (เคตามีน)	714(47.6)	778(54.8)	644(59.4)	492(59.7)	2628(54.4)	637(46.8)	755(53.4)	971(59.8)	377(53.4)	2740(53.7)
k. โคเคน	712(47.5)	785(55.2)	652(60.2)	498(60.4)	2647(54.8)	635(46.6)	755(53.4)	978(60.3)	376(53.3)	2744(53.8)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	706(47.1)	767(54.0)	634(58.5)	485(58.9)	2592(53.7)	609(44.8)	738(52.3)	953(58.9)	359(50.9)	2659(52.2)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	569(38.0)	567(40.0)	473(43.7)	341(41.4)	1950(40.4)	475(34.9)	553(39.1)	707(43.5)	307(43.5)	2042(40.0)
n. ยาบ้า	699(46.7)	728(51.3)	591(54.5)	419(50.8)	2437(50.5)	618(45.5)	732(51.8)	891(54.9)	344(48.8)	2585(50.7)
o. ไอซ์	691(46.1)	770(54.2)	627(57.9)	471(57.2)	2559(53.0)	622(45.7)	734(51.9)	954(58.8)	365(51.7)	2675(52.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 4.23 นักเรียนคิดว่า การดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ประหม่า เกือบเงิน สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	423(27.8)	566(39.7)	522(48.0)	414(50.1)	1925(39.6)	405(29.3)	532(37.3)	731(44.7)	360(50.6)	2028(39.3)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	259(17.1)	411(28.7)	458(42.1)	349(42.3)	1477(30.4)	133(9.6)	332(23.3)	548(33.5)	272(38.3)	1285(24.9)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	266(17.5)	436(30.5)	420(38.6)	400(48.4)	1522(31.3)	180(13.0)	376(26.4)	496(30.3)	269(37.8)	1321(25.6)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	238(15.7)	398(27.8)	428(39.3)	405(49.0)	1469(30.2)	114(8.2)	294(20.6)	442(27.0)	260(36.6)	1110(21.5)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	298(19.6)	503(35.2)	486(44.7)	458(55.4)	1745(35.9)	161(11.6)	382(26.8)	566(34.6)	299(42.1)	1408(27.3)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	300(19.8)	523(36.6)	534(49.0)	477(57.7)	1834(37.7)	224(16.2)	385(27.0)	526(32.1)	258(36.3)	1393(27.0)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	228(15.0)	376(26.3)	393(36.5)	392(47.7)	1389(28.7)	172(12.4)	323(22.8)	462(28.3)	287(40.5)	1244(24.2)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	423(27.9)	699(48.9)	618(57.4)	594(72.3)	2334(48.2)	341(24.7)	629(44.3)	840(51.4)	409(57.8)	2219(43.2)
i. ช่วยให้มีอะไรจะทำ	307(20.3)	472(33.0)	407(37.8)	407(49.5)	1593(32.9)	180(13.0)	326(23.0)	415(25.4)	237(33.5)	1158(22.5)
j. ทำให้กินอาหารได้ร่อยมากขึ้น	248(16.4)	333(23.3)	277(25.7)	280(34.1)	1138(23.5)	139(10.1)	225(15.9)	309(18.9)	181(25.6)	854(16.6)
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	236(15.6)	341(23.9)	339(31.5)	346(42.1)	1262(26.1)	158(11.4)	259(18.3)	320(19.6)	165(23.3)	902(17.6)
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	169(11.1)	231(16.2)	245(22.8)	213(25.9)	858(17.7)	116(8.4)	212(15.0)	281(17.2)	151(21.4)	760(14.8)
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	158(10.4)	205(14.4)	211(19.6)	205(24.9)	779(16.1)	68(4.9)	147(10.4)	186(11.4)	124(17.5)	525(10.2)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	396(26.1)	594(41.6)	530(49.2)	510(62.0)	2030(41.9)	411(29.8)	546(38.5)	658(40.3)	287(40.6)	1902(37.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข้อมูลโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนตัวอย่างแยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

จังหวัด	จำนวนโรงเรียน	ม. 1 (n= 3493)		ม. 3 (n= 3463)		ม. 5 (n= 3225)		ปวช. 2 (n=2059)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. จังหวัดศรีสะเกษ	5 โรงเรียน	179	259	129	197	112	274	135	70	1355
2. จังหวัดชัยภูมิ	5 โรงเรียน	152	283	113	248	50	437	44	136	1463
3. จังหวัดหนองบัวลำภู	6 โรงเรียน	163	238	110	241	139	328	177	83	1479
4. จังหวัดเลย	5 โรงเรียน	181	205	179	225	115	228	32	153	1318
5. จังหวัดหนองคาย	5 โรงเรียน	156	183	253	372	79	171	101	102	1417
6. จังหวัดนครพนม	5 โรงเรียน	162	240	120	272	95	230	70	80	1269
7. จังหวัดมหาสารคาม	5 โรงเรียน	162	158	163	174	165	162	148	133	1265
8. จังหวัดร้อยเอ็ด	5 โรงเรียน	245	153	275	129	156	243	79	71	1351
9. จังหวัดกาฬสินธุ์	5 โรงเรียน	133	241	90	173	85	156	179	266	1323
รวม	46 โรงเรียน	1533	1960	1432	2031	996	2229	965	1094	12240

* ไม่ระบุเพศ 130 คน แบ่งเป็น ศรีสะเกษ 3 คน, ชัยภูมิ 8 คน, หนองบัวลำภู 8 คน, เลย 10 คน, หนองคาย 13 คน, นครพนม 66 คน, มหาสารคาม 9 คน, ร้อยเอ็ด 6 คน และกาฬสินธุ์ 7 คน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ศรีสะเกษวิทยาคาร	43	96	35	63	23	102	-	-	362
วัดมหาพุทธาราม	57	90	-	-	-	-	-	-	147
เทคนิคศรีสะเกษ	-	-	-	-	-	-	74	34	108
วิทยาลัยอาชีวะศรีสะเกษ	-	-	-	-	-	-	61	36	97
กันทวารมย์	79	73	94	134	89	172	-	-	641
รวมจังหวัดศรีสะเกษ	179	259	129	197	112	274	135	70	1355
สตรีชัยภูมิ	-	142	4	153	9	362	-	-	670
มารีย์อุปถัมภ์	96	80	26	14	-	-	-	-	216
วิทยาลัยเกษตรชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	9	9
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	44	127	171
นาयाงกลัด	56	61	83	81	41	75	-	-	397
รวมจังหวัดชัยภูมิ	152	282	113	248	50	438	44	136	1463
หนองบัวพิทยา	45	72	23	74	64	194	-	-	472
พิชัยบัณฑิตย์	34	48	8	21	8	9	-	-	128
อาชีวะหนองบัว	-	-	-	-	-	-	49	62	111
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัว	-	-	-	-	-	-	128	21	149

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ศรีบุญเรือง	51	82	42	84	53	94	-	-	406
ขามพิทยา	33	36	37	62	14	31	-	-	213
รวมจังหวัดหนองบัวลำภู	163	238	110	241	139	328	177	83	1479
เลยอนุกุล	54	49	43	62	49	76	-	-	333
นาอ้อ	64	72	68	80	26	64	-	-	374
เทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	31	56	87
วิทยาลัยอาชีวะเลย	-	-	-	-	-	-	1	97	98
ภูกระดึง	63	84	68	83	40	88	-	-	426
รวมจังหวัดเลย	181	205	179	225	115	228	32	153	1318
ปทุมเทพ	51	69	54	98	56	108	-	-	436
หนองคายวิทย์	66	84	152	213	15	47	-	-	577
เทคนิคหนองคาย	-	-	-	-	-	-	92	13	105
อาชีวะหนองคาย	-	-	-	-	-	-	9	89	98
นุ่งคล้า	39	30	47	61	8	16	-	-	201
รวมจังหวัดหนองคาย	156	183	253	372	79	171	101	102	1417
ปียมหาราชาลัย	91	110	53	141	68	157	-	-	620
อุเทนพัฒนา	71	130	67	131	27	73	-	-	499
วิทยาลัยเกษตรกรรมนครพนม	-	-	-	-	-	-	22	38	60
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม	-	-	-	-	-	-	30	40	70
คฤหบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	18	2	20
รวมจังหวัดนครพนม	162	240	120	272	95	230	70	80	1269
ผดุงนารี	80	75	137	140	75	149	-	-	656
เขียงยืนพิทยาคม	63	55	12	21	75	2	-	-	228
ชาญวิทยาและอรุณวิทยา	19	28	14	13	15	11	-	-	100
วิทยาลัยอาชีวศึกษา	-	-	-	-	-	-	9	131	140
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม	-	-	-	-	-	-	139	2	141
รวมจังหวัดมหาสารคาม	162	158	163	174	165	162	148	133	1265
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย	164	37	201	3	90	110	-	-	605
โพหนองพัฒนาวิทยา	81	116	74	126	66	133	-	-	596
ธีรธาดา	-	-	-	-	-	-	50	25	75
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	-	16	9	25
อาชีวร้อยเอ็ด	-	-	-	-	-	-	13	37	50
รวมจังหวัดร้อยเอ็ด	245	153	275	129	156	243	79	71	1351
อนุกุลนารี	46	104	45	89	46	107	-	-	437
ยางตลาดวิทยาคาร	87	137	45	84	39	49	-	-	441
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	-	-	146	146
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	-	149	-	149

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
พาณิชย์การกาฬสินธุ์	-	-	-	-	-	-	30	120	150
รวมจังหวัดกาฬสินธุ์	133	241	90	173	85	156	179	266	1323

*ไม่ระบุเพศ 130 คน กันทรารมย์ 3 คน, สตรีชัยภูมิ 5 คน, วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 2 คน, นายางกาด 1 คน, หนองบัวพิท = 4 คน, เทคนิคหนองบัว = 1 คน, ศรีบุญเรือง = 2 คน, ขามพิทยา = 1 คน, เลย์อนุกุล = 4 คน, อาชีวะเลย = 1 คน, ภูกระดึง = 5 คน, ปทุมเทพ 3 คน, หนองคายวิท 8 คน, เทคนิคหนองคาย 1 คน, บุ่งคล้า 1 คน, ปิยมหาราชาลัย 1 คน, อุเทนพัฒนา 65 คน, ผดุงนารี 2 คน, เชียงยืนพิทยาคม 1 คน, ชาญวิทยาและอรุณวิทยา 1 คน, วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 5 คน, ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 คน, โพนทองพัฒนาวิทยา 5 คน, อนุกุลนารี 7 คน

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดศรีสะเกษ :									
ในเมือง	100	186	35	63	23	102	135	70	714
ชนบท	79	73	94	134	89	172	-	-	641
ประเภท									
รัฐบาล	122	169	129	197	112	274	135	70	1208
เอกชน	57	90	-	-	-	-	-	-	147
สายการเรียน									
สามัญ	179	260	129	196	112	274	-	-	1150
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	135	70	205
จังหวัดชัยภูมิ:									
ในเมือง	96	222	30	167	9	362	44	136	1066
ชนบท	56	61	83	81	41	75	-	-	397
ประเภท									
รัฐบาล	56	203	87	234	50	437	44	136	1247
เอกชน	96	80	26	14	-	-	-	-	216
สายการเรียน									
สามัญ	152	282	113	248	50	438	-	-	1283
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	44	136	180

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

เขตที่ตั้ง	ม.1		ม.2		ม.3		ม.5		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดหนองบัวลำภู :									
ในเมือง	112	156	68	157	86	235	177	83	1074
ชนบท	51	82	42	84	53	94	-	-	406
ประเภท									
รัฐบาล	129	190	102	220	131	319	177	83	1351
เอกชน	34	48	8	21	8	9	-	-	128
สายการเรียน									
สามัญ	163	238	110	241	139	328	-	-	1219
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	177	83	260
จังหวัดเลย :									
ในเมือง	118	121	111	142	75	140	32	153	892
ชนบท	63	84	68	83	40	88	-	-	426
ประเภท									
รัฐบาล	181	205	179	225	115	228	32	153	1318
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายการเรียน									
สามัญ	181	205	179	225	115	228	-	-	1133
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	32	153	185
จังหวัดหนองคาย :									
ในเมือง	117	153	206	311	71	155	101	102	1216
ชนบท	39	30	47	61	8	16	-	-	201
ประเภท									
รัฐบาล	156	183	253	372	79	171	101	102	1417
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สายการเรียน									
สามัญ	156	183	253	372	79	171	-	-	1214
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	101	102	203
จังหวัดนครพนม :									
ในเมือง	91	110	53	141	68	157	70	80	770
ชนบท	71	130	67	131	27	73	-	-	499
ประเภท									
รัฐบาล	162	240	120	272	95	230	52	78	1249
เอกชน	-	-	-	-	-	-	18	2	20
สายการเรียน									
สามัญ	162	240	120	272	95	230	-	-	1119
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	70	80	150

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

เขตที่ตั้ง	ม.1		ม.2		ม.3		ม.5		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดมหาสารคาม:									
ในเมือง	99	103	151	153	90	160	148	133	1037
ชนบท	63	55	12	21	75	2	-	-	228
ประเภท									
รัฐบาล	143	130	149	161	150	151	148	133	1165
เอกชน	19	28	14	13	15	11	-	-	100
สายการเรียน									
สามัญ	162	158	163	174	165	162	-	-	984
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	148	133	281
จังหวัดร้อยเอ็ด :									
ในเมือง	164	37	201	3	90	110	79	71	755
ชนบท	81	116	74	126	66	133	-	-	596
ประเภท									
รัฐบาล	245	153	275	129	156	243	29	46	1276
เอกชน	-	-	-	-	-	-	50	25	75
สายการเรียน									
สามัญ	245	153	275	129	156	243	-	-	1201
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	79	71	150
จังหวัดกาฬสินธุ์									
ในเมือง	46	104	45	89	46	107	179	266	882
ชนบท	87	137	45	84	39	49	-	-	441
ประเภท									
รัฐบาล	133	241	90	173	85	156	149	146	1173
เอกชน	-	-	-	-	-	-	30	120	150
สายการเรียน									
สามัญ	133	241	90	173	85	156	-	-	878
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	179	266	445

ภาคผนวก 5.

สรุปผลการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตารางที่ 5.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม. 1 (n= 3510)	ม. 3 (n= 3487)	ม. 5 (n= 3305)	ปวช. 2 (n=2068)	รวม (n=12370)
อายุ : mean±sd	12.9±0.5	14.8±0.6	16.8±0.7	17.1±0.9	15.2±1.8
median (พิสัย)	13 (11-15)	15 (12-17)	17 (12-19)	17 (15-30)	15 (11-30)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(34)	(84)	(26)	(163)
รวม	3491	3453	3221	2042	12207
เพศ : ชาย (%)	1533 (43.9)	1432 (41.4)	996 (30.9)	965 (46.9)	4926 (40.2)
หญิง (%)	1960 (56.1)	2031 (58.6)	2229 (69.1)	1094 (53.1)	7314 (59.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(24)	(80)	(9)	(130)
รวม	3493 (100.0)	3463 (100.0)	3225 (100.0)	2059 (100.0)	12240 (100.0)
ศาสนา : พุทธ	3462 (99.0)	3431 (98.9)	3205 (98.9)	2038 (99.3)	12136 (99.0)
อิสลาม	3 (0.1)	12 (0.3)	11 (0.3)	3 (0.1)	29 (0.2)
คริสต์และอื่นๆ	33 (0.9)	27 (0.8)	24 (0.7)	12 (0.6)	96 (0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(17)	(65)	(15)	(109)
รวม	3498 (100.0)	3470 (100.0)	3240 (100.0)	2053 (100.0)	12261 (100.0)
สถานที่เกิด : ภาคอีสาน	3059 (91.5)	3064 (92.2)	2878 (93.5)	1844 (95.6)	10845 (92.9)
กรุงเทพ	156 (4.7)	148 (4.4)	120 (3.9)	40 (2.1)	464 (4.0)
ปริมณฑล	30 (0.9)	22 (0.7)	17 (0.6)	5 (0.3)	74 (0.6)
ภาคกลาง	41 (1.2)	45 (1.4)	27 (0.9)	19 (1.0)	132 (1.1)
ภาคเหนือ	39 (1.2)	33 (1.0)	29 (0.9)	14 (0.7)	115 (1.0)
ภาคใต้	13 (0.4)	11 (0.3)	6 (0.2)	4 (0.2)	34 (0.3)
ต่างประเทศ	5 (0.2)	2 (0.1)	-	2 (0.1)	9 (0.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(167)	(162)	(228)	(140)	(697)
รวม	3343 (100.0)	3325 (100.0)	3077 (100.0)	1928 (100.0)	11673 (100.0)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน* :					
ไทย	2099 (66.2)	1906 (59.6)	1930 (66.9)	100 (56.2)	6935 (62.9)
ไทยท้องถิ่น	2468 (78.2)	2588 (78.1)	2505 (81.9)	1512 (79.8)	9073 (79.4)
จีน	24 (1.0)	38 (1.3)	35 (1.4)	11 (0.7)	108 (1.2)
มลายู/ยาวี	3 (0.1)	6 (0.2)	6 (0.2)	3 (0.2)	18 (0.2)
สปป.ลาว	86 (3.4)	86 (3.0)	98 (4.0)	58 (3.8)	328 (3.5)
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	106 (3.0)	163 (4.7)	232 ()	104	603
จำนวนทั้งหมด	3510	3487	3305	2068	12370
* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา					
บ้านที่พัก :					
บ้าน/แฟลตของครอบครัว	3196 (91.0)	3228 (92.6)	2943 (89.0)	1400 (67.7)	10767 (87.0)
หอพักของโรงเรียน	20 (0.6)	31 (0.9)	21 (0.6)	97 (4.7)	169 (1.4)
หอพักนอกโรงเรียน	21 (0.6)	27 (0.8)	90 (2.8)	392 (19.1)	530 (4.4)
บ้านเช่า	124 (3.6)	67 (2.0)	90 (2.8)	134 (6.5)	415 (3.4)
อื่นๆ	98 (2.8)	87 (2.5)	78 (2.4)	26 (1.3)	289 (2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(51)	(47)	(83)	(19)	(200)
รวม	3459 (100.0)	3440 (100.0)	3222 (100.0)	2049 (100.0)	12170 (100.0)

ตารางที่ 5.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ		ม.1 (n = 3510)	ม. 3 (n = 3487)	ม. 5 (n = 3305)	ปวช.2 (n = 2068)	รวม (n = 12370)
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว		26 (0.8)	32 (0.9)	55 (1.7)	100 (4.9)	213 (1.8)
พ่อ แม่		2801 (80.7)	2812 (81.6)	2624 (81.3)	1236 (60.2)	9473 (77.6)
เพื่อน		13 (0.4)	25 (0.7)	77 (2.4)	436 (21.2)	551 (4.5)
ญาติพี่น้อง		496 (14.3)	456 (13.2)	371 (11.5)	241 (11.7)	1564 (12.8)
อื่นๆ		136 (3.9)	123 (3.6)	101 (3.1)	40 (2.0)	400 (3.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)		(38)	(39)	(77)	(15)	(169)
รวม		3472 (100.0)	3448 (100.0)	3228 (100.0)	2053 (100.0)	12201 (100.0)
ผลการเรียน: เกรตเฉลี่ย	mean±sd	3.3±0.6	3.0±0.6	2.9±0.6	2.9±0.6	3.0±0.6
	เกรต 0.1-1.0	8 (0.3)	11 (0.4)	6 (0.2)	13 (0.7)	38 (0.4)
	เกรต 1.1-2.0	107 (4.6)	260 (8.6)	164 (5.5)	108 (6.1)	639 (6.3)
	เกรต 2.1-3.0	650 (27.9)	1219 (40.4)	1491 (49.7)	834 (46.8)	4194 (41.4)
	เกรต 3.1-4.0	1566 (67.2)	1525 (50.6)	1338 (44.6)	827 (46.4)	5256 (51.9)
	ไม่ตอบ(จำนวน)	(1179)	(472)	(306)	(286)	(2243)
รวม		2331 (100.0)	3015 (100.0)	2999 (100.0)	1782 (100.0)	10127 (100.0)
ทำงานเพื่อหารายได้ : ไม่ทำ		2675 (77.8)	2546 (74.8)	2415 (75.7)	1468 (72.6)	9104 (75.5)
ทำ		761 (22.2)	860 (25.2)	777 (24.3)	554 (27.4)	2952 (24.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)		(74)	(81)	(113)	(46)	(314)
รวม		3436 (100.0)	3406 (100.0)	3192 (100.0)	2022 (100.0)	12056 (100.0)

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 5.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย/ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	550 (36.6)	571 (40.5)	391 (40.0)	380 (39.8)	1892 (39.1)	859 (44.3)	743 (37.3)	706 (32.2)	390 (35.9)	2698 (37.4)
มีเล็กน้อย	724 (48.1)	581 (41.3)	406 (41.5)	429 (45.0)	2140 (44.2)	778 (40.1)	845 (42.4)	1029 (46.9)	473 (43.6)	3125 (43.3)
มีปานกลาง	181 (12.0)	202 (14.4)	152 (15.5)	126 (13.2)	661 (13.6)	253 (13.0)	341 (17.1)	391 (17.8)	199 (18.3)	1184 (16.4)
มีปัญหามาก	49 (3.3)	54 (3.8)	29 (3.0)	19 (2.0)	151 (3.1)	51 (2.63)	65 (3.3)	69 (3.1)	24 (2.2)	209 (2.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(29)	(24)	(18)	(11)	(82)	(19)	(37)	(34)	(8)	(98)
รวม	1504 (100.0)	1408 (100.0)	978 (100.0)	954 (100.0)	4844 (100.0)	1941 (100.0)	1994 (100.0)	2195 (100.0)	1086 (100.0)	7216 (100.0)
การใช้ยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	1223 (81.2)	1066 (75.4)	596 (61.0)	559 (58.9)	3444 (71.1)	1520 (78.4)	1419 (71.3)	1352 (61.7)	595 (54.9)	4886 (67.8)
มีเล็กน้อย	200 (13.2)	232 (16.4)	264 (27.0)	277 (29.2)	973 (20.1)	344 (17.7)	442 (22.2)	624 (28.5)	333 (30.7)	1743 (24.2)
มีปานกลาง	61 (4.0)	82 (5.8)	81 (8.3)	88 (9.3)	312 (6.4)	60 (3.1)	110 (5.5)	158 (7.2)	126 (11.6)	454 (6.3)
มีปัญหามาก	22 (1.5)	33 (2.3)	36 (3.7)	25 (2.6)	116 (2.4)	16 (0.8)	20 (1.0)	58 (2.7)	30 (2.8)	124 (1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(19)	(19)	(16)	(81)	(20)	(40)	(37)	(10)	(107)
รวม	1506 (100.0)	1413 (100.0)	977 (100.0)	949 (100.0)	4845 (100.0)	1940 (100.0)	1991 (100.0)	2192 (100.0)	1084 (100.0)	7207 (100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	1441 (95.8)	1349 (95.5)	921 (94.4)	883 (92.8)	4594 (94.8)	1815 (93.2)	1890 (94.8)	2070 (94.4)	881 (81.1)	6656 (92.2)
มีเล็กน้อย	42 (2.8)	52 (3.7)	43 (4.4)	56 (5.9)	193 (4.0)	119 (6.1)	88 (4.4)	110 (5.0)	190 (17.5)	507 (7.0)
มีปานกลาง	11 (0.7)	3 (0.2)	6 (0.6)	8 (0.8)	28 (0.6)	6 (0.3)	4 (0.2)	7 (0.3)	13 (1.2)	30 (0.4)
มีปัญหามาก	11 (0.7)	8 (0.6)	6 (0.6)	5 (0.5)	30 (0.6)	7 (0.4)	11 (0.6)	6 (0.3)	2 (0.2)	26 (0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(20)	(20)	(13)	(81)	(13)	(38)	(36)	(8)	(95)
รวม	1505 (100.0)	1412 (100.0)	976 (100.0)	952 (100.0)	4845 (100.0)	1947 (100.0)	1993 (100.0)	2193 (100.0)	1086 (100.0)	7219 (100.0)
ข่มขืน กระทำชำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	1357 (90.3)	1274 (90.2)	844 (86.4)	804 (84.6)	4279 (88.4)	1754 (90.3)	1825 (91.8)	1944 (88.7)	885 (81.5)	6408 (88.8)
มีเล็กน้อย	123 (8.2)	97 (6.9)	115 (11.8)	117 (12.3)	452 (9.3)	156 (8.0)	146 (7.3)	208 (9.5)	151 (13.9)	661 (9.2)
มีปานกลาง	16 (1.1)	26 (1.8)	7 (0.7)	17 (1.8)	66 (1.4)	23 (1.2)	12 (0.6)	32 (1.5)	41 (3.8)	108 (1.5)
มีปัญหามาก	7 (0.5)	15 (1.1)	11 (1.1)	12 (1.3)	45 (0.9)	9 (0.5)	10 (0.5)	8 (0.4)	9 (0.8)	36 (0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(20)	(19)	(15)	(84)	(18)	(38)	(37)	(8)	(101)
รวม	1503 (100.0)	1412 (100.0)	977 (100.0)	950 (100.0)	4842 (100.0)	1942 (100.0)	1993 (100.0)	2192 (100.0)	1086 (100.0)	7213 (100.0)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	1051 (70.0)	808 (57.4)	423 (43.3)	280 (29.4)	2562 (52.9)	1240 (64.0)	1020 (51.1)	923 (42.1)	364 (33.5)	3547 (49.2)
มีเล็กน้อย	324 (21.6)	417 (29.6)	350 (35.8)	380 (40.0)	1471 (30.4)	495 (25.5)	672 (33.7)	787 (35.9)	374 (34.4)	2328 (32.3)
มีปานกลาง	100 (6.7)	143 (10.2)	151 (15.4)	219 (23.0)	613 (12.7)	151 (7.8)	229 (11.5)	348 (15.9)	233 (21.4)	961 (13.3)
มีปัญหามาก	26 (1.7)	41 (2.9)	54 (5.5)	72 (7.6)	193 (4.0)	52 (2.7)	74 (3.7)	133 (6.1)	116 (10.7)	375 (5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(32)	(23)	(18)	(14)	(87)	(22)	(36)	(38)	(7)	(103)
รวม	1501 (100.0)	1409 (100.0)	978 (100.0)	951 (100.0)	4839 (100.0)	1938 (100.0)	1995 (100.0)	2191 (100.0)	1087 (100.0)	7211 (100.0)

ตารางที่ 5.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	853 (56.8)	679 (48.1)	433 (44.3)	431 (45.2)	2396 (49.4)	900 (46.3)	674 (33.8)	640 (29.2)	372 (34.3)	2586 (35.8)
มีเล็กน้อย	447 (29.7)	483 (34.2)	353 (36.1)	367 (38.5)	1650 (34.1)	674 (34.7)	756 (38.0)	911 (41.5)	398 (36.6)	2739 (38.0)
มีปานกลาง	142 (9.4)	171 (12.1)	130 (13.3)	114 (12.0)	557 (11.5)	253 (13.0)	399 (20.0)	459 (20.9)	225 (20.7)	1336 (18.5)
มีปัญหามาก	61 (4.1)	79 (5.6)	61 (6.2)	41 (4.3)	242 (5.0)	115 (5.9)	162 (8.1)	185 (8.4)	91 (8.4)	553 (7.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(20)	(19)	(12)	(81)	(18)	(40)	(34)	(8)	(100)
รวม	1503 (100.0)	1412 (100.0)	977 (100.0)	953 (100.0)	4845 (100.0)	1942 (100.0)	1991 (100.0)	2195 (100.0)	1086 (100.0)	7214 (100.0)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	602 (40.1)	499 (35.5)	350 (35.9)	347 (36.4)	1798 (37.2)	683 (35.1)	513 (25.8)	455 (20.8)	284 (26.2)	1935 (26.9)
มีเล็กน้อย	610 (40.7)	567 (40.3)	368 (37.7)	407 (42.8)	1952 (40.4)	798 (41.0)	780 (39.2)	915 (41.8)	440 (40.5)	2933 (40.7)
มีปานกลาง	206 (13.7)	252 (17.9)	191 (19.6)	151 (15.9)	800 (16.6)	325 (16.7)	480 (24.1)	552 (25.2)	242 (22.3)	1599 (22.2)
มีปัญหามาก	82 (5.5)	88 (6.3)	67 (6.9)	47 (4.9)	284 (5.9)	138 (7.1)	215 (10.8)	265 (12.1)	120 (11.0)	738 (10.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(26)	(20)	(13)	(92)	(16)	(43)	(42)	(8)	(109)
รวม	1500 (100.0)	1406 (100.0)	976 (100.0)	952 (100.0)	4834 (100.0)	1944 (100.0)	1988 (100.0)	2187 (100.0)	1086 (100.0)	7205 (100.0)

ตารางที่ 5.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียน/เพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	1141 (77.5)	914 (67.7)	559 (59.1)	207 (22.0)	2821 (59.9)	1431 (77.1)	1173 (61.6)	1193 (55.8)	327 (30.8)	4124 (59.3)
41-60%	249 (16.9)	274 (20.3)	213 (22.5)	255 (27.2)	991 (20.1)	319 (17.2)	438 (23.0)	506 (23.7)	299 (28.2)	1562 (22.4)
>60 %	82 (5.6)	162 (12.0)	174 (18.4)	477 (50.8)	895 (19.0)	105 (5.7)	294 (15.4)	438 (20.5)	435 (41.0)	1272 (18.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(61)	(82)	(50)	(26)	(219)	(105)	(126)	(92)	(33)	(356)
รวม	1472 (100.0)	1350 (100.0)	946 (100.0)	939 (100.0)	4707 (100.0)	1855 (100.0)	1905 (100.0)	2137 (100.0)	1061 (100.0)	6958 (100.0)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	1354 (91.1)	993 (73.4)	562 (59.3)	316 (33.8)	3225 (68.3)	1745 (93.7)	1500 (78.7)	1483 (69.6)	547 (51.5)	5275 (75.8)
41-60%	72 (4.9)	206 (15.2)	180 (19.0)	236 (25.2)	694 (14.7)	74 (4.0)	244 (12.8)	326 (15.3)	284 (26.7)	928 (13.3)
>60 %	60 (4.0)	154 (11.4)	206 (21.7)	384 (41.0)	804 (17.0)	44 (2.4)	163 (8.6)	321 (15.1)	232 (21.8)	760 (10.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(47)	(79)	(48)	(29)	(203)	(97)	(124)	(99)	(31)	(351)
รวม	1486 (100.0)	1353 (100.0)	948 (100.0)	936 (100.0)	4723 (100.0)	1863 (100.0)	1907 (100.0)	2130 (100.0)	1063 (100.0)	6963 (100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1349 (90.7)	1163 (85.6)	788 (83.5)	591 (62.9)	3891 (82.3)	1687 (90.5)	1607 (84.4)	1761 (82.6)	696 (65.5)	5751 (82.6)
41-60%	96 (6.5)	140 (10.3)	100 (10.6)	218 (23.1)	554 (11.71)	123 (6.6)	183 (9.6)	240 (11.3)	233 (21.9)	779 (11.2)
>60 %	42 (2.8)	56 (4.1)	56 (5.9)	131 (13.9)	285 (6.0)	54 (2.9)	113 (5.9)	131 (6.1)	133 (12.5)	431 (6.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(46)	(73)	(52)	(25)	(196)	(96)	(128)	(97)	(32)	(353)
รวม	1487 (100.0)	1359 (100.0)	944 (100.0)	940 (100.0)	4730 (100.0)	1864 (100.0)	1903 (100.0)	2132 (100.0)	1062 (100.0)	6961 (100.0)

ตารางที่ 5.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	1391 (93.8)	1200 (88.3)	818 (86.2)	681 (72.6)	4090 (86.5)	1795 (96.1)	1743 (91.4)	1884 (88.1)	840 (79.3)	6262 (89.8)
41-60%	75 (5.1)	109 (8.0)	88 (9.3)	157 (16.7)	429 (9.1)	53 (2.8)	113 (5.9)	167 (7.8)	151 (14.26)	484 (6.9)
>60 %	17 (1.2)	50 (3.7)	43 (4.5)	100 (10.7)	210 (4.4)	20 (1.1)	51 (2.7)	87 (4.1)	68 (6.4)	226 (3.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(50)	(73)	(47)	(27)	(197)	(92)	(124)	(91)	(35)	(342)
รวม	1483 (100.0)	1359 (100.0)	949 (100.0)	938 (100.0)	4729 (100.0)	1868 (100.0)	1907 (100.0)	2138 (100.0)	1059 (100.0)	6972 (100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	1026 (69.2)	834 (61.1)	609 (64.2)	248 (26.4)	2717 (57.4)	1438 (77.0)	1290 (67.9)	1452 (68.0)	477 (45.0)	4657 (66.9)
41-60%	282 (19.0)	289 (21.1)	162 (17.1)	259 (27.6)	992 (21.0)	319 (17.1)	348 (18.3)	385 (18.0)	275 (25.9)	1327 (19.1)
>60 %	174 (11.7)	241 (17.7)	178 (18.8)	432 (46.0)	1025 (21.7)	111 (5.9)	261 (13.7)	299 (14.0)	309 (29.1)	980 (14.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(51)	(68)	(47)	(26)	(192)	(92)	(132)	(93)	(33)	(350)
รวม	1482 (100.0)	1364 (100.0)	949 (100.0)	939 (100.0)	4734 (100.0)	1868 (100.0)	1899 (100.0)	2136 (100.0)	1061 (100.0)	6964 (100.0)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	1346 (90.9)	1062 (78.8)	707 (75.5)	430 (46.9)	3545 (75.4)	1774 (95.3)	1628 (86.1)	1786 (84.6)	802 (76.2)	5990 (86.6)
41-60%	86 (5.8)	156 (11.6)	114 (12.2)	242 (25.8)	598 (12.7)	67 (3.6)	178 (9.4)	199 (9.4)	146 (13.9)	590 (8.5)
>60 %	49 (3.3)	130 (9.6)	115 (12.3)	265 (28.3)	559 (11.9)	21 (1.1)	85 (4.5)	126 (6.0)	104 (9.9)	336 (4.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(52)	(84)	(60)	(28)	(224)	(98)	(140)	(118)	(42)	(398)
รวม	1481 (100.0)	1348 (100.0)	936 (100.0)	937 (100.0)	4702 (100.0)	1862 (100.0)	1891 (100.0)	2111 (100.0)	1052 (100.0)	6916 (100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1412 (94.8)	1300 (95.4)	888 (93.7)	797 (85.0)	4397 (92.8)	1817 (97.1)	1837 (96.6)	2021 (94.7)	936 (88.3)	6611 (94.9)
41-60%	61 (4.1)	42 (3.1)	46 (4.9)	111 (11.8)	260 (5.5)	40 (2.1)	48 (2.5)	96 (4.5)	88 (8.3)	272 (3.9)
>60 %	17 (1.1)	20 (1.5)	14 (1.5)	30 (3.2)	81 (1.7)	15 (0.8)	16 (0.8)	18 (0.8)	36 (3.4)	85 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(43)	(70)	(48)	(27)	(188)	(88)	(130)	(94)	(34)	(346)
รวม	1490 (100.0)	1362 (100.0)	948 (100.0)	938 (100.0)	4738 (100.0)	1872 (100.0)	1901 (100.0)	2135 (100.0)	1060 (100.0)	6968 (100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	1436 (96.3)	1304 (95.6)	898 (94.8)	836 (89.0)	4474 (94.4)	1833 (97.9)	1856 (97.3)	2065 (96.6)	996 (94.1)	6750 (96.8)
41-60%	35 (2.4)	42 (3.1)	37 (3.9)	74 (7.9)	188 (4.0)	29 (1.6)	35 (1.8)	54 (2.5)	43 (4.1)	161 (2.3)
>60 %	20 (1.3)	18 (1.3)	12 (1.3)	29 (3.1)	79 (1.7)	10 (0.5)	17 (0.9)	18 (0.8)	20 (1.9)	65 (0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(68)	(49)	(26)	(185)	(88)	(123)	(92)	(35)	(338)
รวม	1491 (100.0)	1364 (100.0)	947 (100.0)	939 (100.0)	4741 (100.0)	1872 (100.0)	1908 (100.0)	2137 (100.0)	1059 (100.0)	6976 (100.0)

ตารางที่ 5.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	832 (55.2)	811 (57.4)	522 (53.2)	438 (46.1)	2603 (53.6)	1096 (56.5)	1185 (59.2)	1202 (54.8)	525 (48.7)	4008 (55.5)
ไม่ใช่	416 (27.6)	296 (21.0)	283 (28.8)	219 (23.0)	1214 (25.0)	570 (29.4)	555 (27.7)	741 (33.8)	318 (29.5)	2184 (30.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	260 (17.2)	306 (21.7)	177 (18.0)	294 (30.9)	1037 (21.4)	275 (14.2)	263 (13.1)	252 (11.5)	235 (21.8)	1025 (14.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(19)	(14)	(14)	(72)	(19)	(28)	(34)	(16)	(97)
รวม	1508 (100.0)	1413 (100.0)	982 (100.0)	851 (100.0)	4854 (100.0)	1941 (100.0)	2003 (100.0)	2195 (100.0)	1078 (100.0)	7217 (100.0)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	177 (11.7)	189 (13.4)	146 (14.8)	299 (31.5)	811 (16.7)	175 (9.0)	192 (9.6)	225 (10.2)	268 (24.8)	860 (11.9)
ไม่ใช่	1106 (73.1)	981 (69.4)	722 (73.4)	444 (46.7)	3253 (66.9)	1469 (75.6)	1523 (76.0)	1687 (76.7)	601 (55.6)	5280 (73.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	230 (15.2)	243 (17.2)	116 (11.8)	207 (21.8)	796 (16.4)	299 (15.4)	289 (14.4)	287 (13.1)	211 (19.5)	1086 (15.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(20)	(19)	(12)	(15)	(66)	(17)	(27)	(30)	(14)	(88)
รวม	1513 (100.0)	1413 (100.0)	984 (100.0)	950 (100.0)	860 (100.0)	1943 (100.0)	2004 (100.0)	2199 (100.0)	1080 (100.0)	7226 (100.0)
โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	181 (12.0)	215 (15.2)	196 (20.0)	350 (36.9)	942 (19.4)	204 (10.5)	270 (13.5)	372 (16.9)	327 (30.3)	1173 (16.3)
ไม่ใช่	1088 (72.1)	900 (63.8)	621 (63.4)	397 (41.9)	3006 (62.0)	1411 (72.7)	1372 (68.6)	1444 (65.8)	504 (46.7)	4731 (65.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	240 (15.9)	296 (21.0)	163 (16.6)	201 (21.2)	900 (18.6)	326 (16.8)	358 (17.9)	380 (17.3)	248 (23.0)	1312 (18.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(21)	(16)	(17)	(78)	(19)	(31)	(33)	(15)	(98)
รวม	1509 (100.0)	1411 (100.0)	980 (100.0)	948 (100.0)	4848 (100.0)	1941 (100.0)	2000 (100.0)	2196 (100.0)	1079 (100.0)	7216 (100.0)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	176 (11.7)	164 (11.7)	133 (13.5)	144 (15.2)	617 (12.7)	119 (6.1)	144 (7.2)	182 (8.3)	99 (9.2)	544 (7.5)
ไม่ใช่	1050 (69.7)	908 (64.5)	672 (68.4)	564 (59.5)	3194 (66.0)	1499 (77.2)	1561 (77.9)	1727 (78.9)	789 (72.9)	5576 (77.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	280 (18.6)	335 (23.8)	177 (18.0)	240 (25.3)	1032 (21.3)	324 (16.7)	298 (14.9)	280 (12.8)	194 (17.9)	1096 (15.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(25)	(14)	(17)	(83)	(18)	(28)	(40)	(12)	(98)
รวม	1506 (100.0)	1407 (100.0)	982 (100.0)	948 (100.0)	4843 (100.0)	1942 (100.0)	2003 (100.0)	2189 (100.0)	1082 (100.0)	7216 (100.0)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	1100 (73.0)	1025 (72.7)	716 (72.9)	668 (70.6)	3509 (72.4)	1580 (81.4)	1637 (81.8)	1791 (81.6)	827 (76.5)	5835 (80.9)
ไม่ใช่	190 (12.6)	157 (11.1)	125 (12.7)	104 (11.0)	576 (11.9)	124 (6.4)	140 (7.0)	164 (7.5)	90 (8.3)	518 (7.2)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	217 (14.4)	228 (16.2)	141 (14.4)	174 (18.4)	760 (15.7)	236 (12.2)	223 (11.2)	239 (10.9)	164 (15.2)	862 (12.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(22)	(14)	(19)	(81)	(20)	(31)	(35)	(13)	(99)
รวม	1507 (100.0)	1410 (100.0)	982 (100.0)	946 (100.0)	4845 (100.0)	1940 (100.0)	2000 (100.0)	2194 (100.0)	1081 (100.0)	7215 (100.0)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการให้สุราและสารเสพติด										
ใช่	930 (61.8)	941 (66.7)	722 (73.5)	612 (64.6)	3205 (66.2)	1228 (63.4)	1426 (71.4)	1613 (73.7)	736 (68.0)	5003 (69.4)
ไม่ใช่	263 (17.5)	179 (12.7)	121 (12.32)	128 (13.5)	691 (14.27)	235 (12.1)	227 (11.4)	197 (9.0)	104 (9.6)	763 (10.6)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	311 (20.7)	290 (20.6)	139 (14.2)	208 (21.9)	948 (19.6)	474 (24.5)	343 (17.2)	379 (17.3)	242 (22.4)	143 (20.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(29)	(22)	(14)	(17)	(82)	(23)	(35)	(40)	(12)	(110)
รวม	1504 (100.0)	1410 (100.0)	982 (100.0)	948 (100.0)	4844 (100.0)	1937 (100.0)	1996 (100.0)	2189 (100.0)	1082 (100.0)	7204 (100.0)

ตารางที่ 5.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	930 (61.7)	860 (61.0)	612 (62.3)	616 (64.8)	3018 (62.2)	1283 (66.2)	1376 (69.0)	1537 (70.1)	782 (72.4)	4978 (69.1)
ไม่ใช่	277 (18.4)	269 (19.1)	214 (21.8)	151 (15.9)	911 (18.8)	302 (15.6)	322 (16.2)	371 (16.9)	124 (11.5)	1119 (15.5)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	301 (20.0)	281 (19.9)	156 (15.9)	183 (19.3)	921 (19.0)	354 (18.3)	296 (14.8)	284 (13.0)	174 (16.1)	1108 (15.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(22)	(14)	(15)	(76)	(21)	(37)	(37)	(14)	(109)
รวม	1508 (100.0)	1410 (100.0)	982 (100.0)	950 (100.0)	4850 (100.0)	1939 (100.0)	1994 (100.0)	2192 (100.0)	1080 (100.0)	7205 (100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	967 (64.8)	864 (61.8)	568 (58.2)	564 (59.7)	2963 (61.6)	1309 (67.6)	1296 (64.9)	1404 (64.3)	691 (64.5)	4700 (65.4)
ไม่ใช่	175 (11.7)	208 (14.9)	177 (18.1)	165 (17.5)	725 (15.1)	153 (7.9)	219 (11.0)	283 (13.0)	143 (13.4)	798 (11.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	351 (23.5)	327 (23.4)	231 (23.7)	216 (22.9)	1125 (23.4)	475 (24.5)	481 (24.1)	498 (22.8)	237 (22.1)	1691 (23.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(40)	(33)	(20)	(20)	(113)	(23)	(35)	(44)	(23)	(125)
รวม	1493 (100.0)	1399 (100.0)	976 (100.0)	945 (100.0)	4813 (100.0)	1937 (100.0)	1996 (100.0)	2185 (100.0)	1071 (100.0)	7189 (100.0)

ตารางที่ 5.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของตนเอง										
ไม่เคยเลย	1,469 (96.6)	1,347 (95.1)	925 (93.2)	880 (92.2)	4,621 (94.6)	1,927 (98.5)	1,975 (98.1)	2,188 (99.1)	1,075 (99.0)	7,165 (98.6)
เคย 1 ครั้ง	27 (1.8)	39 (2.8)	37 (3.7)	50 (5.2)	153 (3.1)	20 (1.0)	30 (1.5)	13 (0.6)	9 (0.8)	72 (1.0)
เคย 2- 3 ครั้ง	25 (1.6)	30 (2.1)	30 (3.0)	24 (2.5)	109 (2.2)	9 (0.5)	9 (0.4)	7 (0.3)	2 (0.2)	27 (0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(16)	(4)	(11)	(43)	(4)	(17)	(21)	(8)	(50)
รวม	1,521 (100.0)	1,416 (100.0)	992 (100.0)	954 (100.0)	4,883 (100.0)	1,956 (100.0)	2,014 (100.0)	2,208 (100.0)	1,086 (100.0)	7,624 (100.0)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	1,457 (96.0)	1,322 (93.4)	905 (91.0)	877 (91.9)	4,561 (93.4)	1,927 (98.6)	1,966 (97.7)	2,168 (98.2)	1,069 (98.2)	7,130 (98.2)
เคย 1 ครั้ง	39 (2.6)	63 (4.4)	52 (5.2)	52 (5.4)	206 (4.2)	19 (1.0)	24 (1.2)	23 (1.0)	16 (1.5)	82 (1.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	22 (1.4)	30 (2.1)	37 (3.7)	25 (2.6)	114 (2.3)	9 (0.5)	22 (1.1)	17 (0.8)	3 (0.3)	51 (0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(17)	(2)	(11)	(45)	(5)	(19)	(21)	(6)	(51)
รวม	1,518 (100.0)	1,415 (100.0)	994 (100.0)	954 (100.0)	4,881 (100.0)	1,955 (100.0)	2,012 (100.0)	2,208 (100.0)	1,088 (100.0)	7,263 (100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรืออย่าทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนๆกำลังดื่มสุรากัน										
ไม่เคยเลย	1,413 (93.9)	1,202 (85.4)	783 (79.2)	565 (59.6)	3,963 (81.7)	1,864 (95.7)	1,856 (92.6)	1,998 (90.6)	876 (80.7)	6,594 (91.1)
เคย 1 ครั้ง	65 (4.3)	113 (8.0)	105 (10.6)	180 (19.0)	463 (9.6)	57 (2.9)	91 (4.5)	122 (5.5)	115 (10.6)	385 (5.3)
เคย 2- 3 ครั้ง	27 (1.8)	93 (6.6)	100 (10.1)	203 (21.4)	423 (8.7)	26 (1.3)	58 (2.9)	85 (3.9)	94 (8.7)	263 (3.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(24)	(8)	(17)	(77)	(13)	(26)	(24)	(9)	(72)
รวม	1,505 (100.0)	1,408 (100.0)	988 (100.0)	948 (100.0)	4,848 (100.0)	1,947 (100.0)	2,005 (100.0)	2,205 (100.0)	1,085 (100.0)	7,242 (100.0)

ตารางที่ 5.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามึนนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	1,443 (95.7)	1,309 (92.6)	896 (91.1)	868 (91.7)	4,516 (93.1)	1863 (95.6)	1838 (91.7)	2000 (91.0)	1025 (94.7)	6726 (93.1)
เคย 1 ครั้ง	48 (3.2)	83 (5.9)	55 (5.6)	59 (6.2)	245 (5.1)	64 (3.3)	130 (6.5)	141 (6.4)	43 (4.0)	378 (5.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	17 (1.1)	21 (1.5)	33 (3.4)	20 (2.1)	91 (1.9)	15 (0.8)	37 (1.8)	57 (2.6)	14 (1.3)	123 (1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(19)	(12)	(18)	(74)	(18)	(26)	(31)	(12)	(87)
รวม	1,508 (100.0)	1,413 (100.0)	984 (100.0)	947 (100.0)	4,852 (100.0)	1942 (100.0)	2005 (100.0)	2198 (100.0)	1082 (100.0)	7227 (100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(780)	(672)	(465)	(257)	(2174)	(1187)	(1267)	(1364)	(547)	(4365)
ไม่เคยเลย	676 (91.6)	643 (86.5)	409 (77.8)	547 (78.6)	2275 (84.2)	716 (94.3)	685 (92.7)	765 (91.2)	485 (89.2)	2651 (92.0)
เคย 1 ครั้ง	41 (5.6)	70 (9.4)	71 (13.5)	87 (12.5)	269 (10.0)	30 (4.0)	37 (5.0)	47 (5.6)	38 (7.0)	152 (5.3)
เคย 2- 3 ครั้ง	21 (2.8)	30 (4.0)	46 (8.8)	62 (8.9)	159 (5.9)	13 (1.7)	17 (2.3)	27 (3.2)	21 (3.9)	78 (2.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(17)	(5)	(12)	(69)	(14)	(25)	(26)	(3)	(68)
รวม	738 (100.0)	743 (100.0)	526 (100.0)	696 (100.0)	2703 (100.0)	759 (100.0)	739 (100.0)	839 (100.0)	544 (100.0)	2881 (100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(784)	(735)	(565)	(385)	(2469)	(1219)	(1408)	(1537)	(683)	(4847)
ไม่เคยเลย	679 (92.6)	575 (84.8)	332 (78.1)	434 (76.3)	2020 (84.0)	716 (98.4)	575 (96.6)	646 (97.3)	390 (95.6)	2327 (97.2)
เคย 1 ครั้ง	31 (4.2)	68 (10.0)	59 (13.9)	73 (12.8)	231 (9.6)	7 (1.0)	12 (2.0)	11 (1.7)	10 (2.4)	40 (1.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	23 (3.1)	35 (5.2)	34 (8)	62 (10.9)	154 (6.4)	5 (0.7)	8 (1.3)	7 (1.0)	8 (2.0)	28 (1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(19)	(6)	(11)	(52)	(13)	(28)	(28)	(3)	(72)
รวม	733 (100.0)	678 (100.0)	425 (110.0)	569 (100.0)	2405 (100.0)	728 (100.0)	595 (100.0)	664 (100.0)	408 (100.0)	2395 (100.0)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(788)	(737)	(517)	(303)	(2345)	(1206)	(1364)	(1454)	(637)	(4661)
ไม่เคยเลย	705 (96.8)	641 (94.5)	430 (90.5)	603 (92.8)	2379 (94.0)	735 (99.2)	632 (98.0)	734 (97.7)	443 (97.8)	2544 (98.2)
เคย 1 ครั้ง	17 (2.3)	28 (4.1)	32 (6.7)	40 (6.2)	117 (4.6)	3 (0.4)	9 (1.4)	11 (1.5)	8 (1.7)	31 (1.2)
เคย 2- 3 ครั้ง	6 (0.8)	9 (1.3)	13 (2.7)	7 (1.1)	35 (1.4)	3 (0.4)	4 (0.6)	6 (0.8)	2 (0.4)	15 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(17)	(4)	(12)	(50)	(13)	(22)	(24)	(4)	(63)
รวม	728 (100.0)	678 (100.0)	475 (100.0)	650 (100.0)	2531 (100.0)	741 (100.0)	645 (100.0)	751 (100.0)	453 (100.0)	2590 (100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(760)	(715)	(503)	(289)	(2267)	(1172)	(1327)	(1430)	(602)	(4531)
ไม่เคยเลย	748 (98.7)	679 (97.0)	470 (96.5)	642 (96.5)	2539 (97.3)	774 (99.7)	676 (99.1)	768 (99.0)	487 (99.8)	2705 (99.4)
เคย 1 ครั้ง	9 (1.2)	17 (2.4)	12 (2.5)	16 (2.4)	54 (2.1)	1 (0.1)	2 (0.3)	6 (0.7)	1 (0.2)	10 (0.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	1 (0.1)	4 (0.6)	5 (1.0)	7 (1.1)	17 (0.6)	1 (0.1)	4 (0.6)	2 (0.3)	0 (0.0)	7 (0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(17)	(6)	(11)	(49)	(12)	(22)	(23)	(4)	(61)
รวม	7588 (100.0)	700 (100.0)	487 (100.0)	665 (100.0)	2610 (100.0)	776 (100.0)	682 (100.0)	776 (100.0)	488 (100.0)	2722 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 5.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขี่/ซ้อนนั่งรถ										
(จำนวน)	(112)	(91)	(25)	(15)	(243)	(170)	(114)	(81)	(23)	(388)
ไม่เคยเลย	223 (17.1)	160 (13.0)	93 (10.1)	45 (5.2)	521 (12.0)	243 (14.4)	224 (12.3)	124 (6.0)	37 (3.7)	628 (9.6)
นานๆครั้ง	478 (36.6)	476 (38.5)	318 (34.6)	234 (26.8)	1506 (34.8)	753 (44.7)	848 (46.5)	810 (39.3)	267 (26.9)	2678 (40.8)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	605 (46.3)	599 (48.5)	507 (55.2)	593 (68.0)	2304 (53.2)	689 (40.9)	753 (41.3)	1126 (54.7)	689 (69.4)	3257 (49.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(115)	(106)	(53)	(78)	(352)	(105)	(92)	(88)	(78)	(363)
รวม	1306 (100.0)	1235 (100.0)	918 (100.0)	872 (100.0)	4331 (100.0)	1685 (100.0)	1825 (100.0)	2060 (100.0)	993 (100.0)	6563 (100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขี่/ซ้อนนั่งรถ										
(จำนวน)	(156)	(145)	(99)	(132)	(532)	(199)	(216)	(217)	(136)	(768)
ไม่เคยเลย	294 (23.7)	230 (19.6)	163 (19.4)	110 (14.8)	797 (19.9)	323 (19.5)	314 (18.4)	275 (14.4)	121 (14.1)	1033 (16.9)
นานๆครั้ง	439 (35.4)	417 (35.5)	292 (34.8)	249 (33.6)	1397 (35.0)	658 (39.8)	651 (38.1)	785 (41.1)	347 (40.4)	2441 (39.8)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	506 (40.8)	529 (45.0)	385 (45.8)	382 (51.6)	1802 (45.1)	673 (40.7)	744 (43.5)	849 (44.5)	392 (45.6)	2658 (43.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(138)	(111)	(57)	(92)	(398)	(107)	(106)	(103)	(98)	(414)
รวม	1239 (100.0)	1176 (100.0)	840 (100.0)	741 (100.0)	3996 (100.0)	1654 (100.0)	1709 (100.0)	1909 (100.0)	860 (100.0)	6132 (100.0)
ขี่จักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากเพิ่งดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	1266 (91.6)	1024 (79.9)	666 (71.0)	444 (50.9)	3396 (76.0)	1754 (96.2)	1738 (91.5)	1834 (87.9)	769 (77.7)	6095 (89.6)
นานๆครั้ง	83 (6.0)	199 (15.5)	208 (22.3)	339 (38.9)	829 (15.6)	52 (2.8)	130 (6.8)	222 (10.6)	187 (18.9)	591 (6.7)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	33 (2.4)	59 (4.6)	63 (6.8)	89 (10.2)	244 (5.5)	17 (0.9)	32 (1.7)	31 (1.5)	34 (3.4)	114 (1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(151)	(150)	(63)	(93)	(457)	(137)	(131)	(142)	(104)	(514)
รวม	1382 (100.0)	1282 (100.0)	933 (100.0)	872 (100.0)	4469 (100.0)	1823 (100.0)	1900 (100.0)	2087 (100.0)	990 (100.0)	6800 (100.0)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	1181 (85.5)	1020 (79.3)	720 (77.2)	612 (70.2)	3533 (79.0)	1725 (94.0)	1746 (91.8)	1885 (90.1)	891 (90.3)	6247 (91.6)
นานๆครั้ง	163 (11.8)	213 (16.6)	168 (18.0)	198 (22.7)	742 (16.6)	86 (4.7)	125 (6.6)	176 (8.4)	71 (7.2)	458 (6.7)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	38 (2.8)	53 (4.1)	44 (4.7)	62 (7.1)	197 (4.4)	25 (1.4)	31 (1.6)	31 (1.5)	25 (2.5)	112 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(146)	(64)	(93)	(454)	(124)	(129)	(137)	(107)	(497)
รวม	1382 (100.0)	1286 (100.0)	932 (100.0)	872 (100.0)	4472 (100.0)	1836 (100.0)	1902 (100.0)	2092 (100.0)	987 (100.0)	6817 (100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	1257 (90.9)	1120 (86.8)	814 (87.7)	690 (79.0)	3881 (86.7)	1797 (98.0)	1855 (97.1)	2068 (98.7)	959 (96.0)	6679 (97.7)
นานๆครั้ง	109 (7.9)	138 (10.7)	95 (10.2)	146 (16.7)	488 (10.9)	29 (1.6)	45 (2.4)	20 (1.0)	28 (2.8)	122 (1.8)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	17 (1.2)	33 (2.6)	19 (2.1)	38 (4.4)	107 (2.4)	8 (0.4)	10 (0.5)	7 (0.3)	13 (1.3)	38 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(150)	(141)	(68)	(91)	(450)	(126)	(121)	(134)	(94)	(475)
รวม	1383 (100.0)	1291 (100.0)	928 (100.0)	874 (100.0)	4476 (100.0)	1834 (100.0)	1910 (100.0)	2095 (100.0)	1000 (100.0)	6839 (100.0)

ตารางที่ 5.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	1015 (73.6)	898 (69.5)	692 (74.6)	549 (63.0)	3154 (70.6)	1657 (90.3)	1684 (88.0)	1890 (90.2)	864 (87.1)	6095 (89.2)
นานๆครั้ง	323 (22.4)	335 (25.9)	198 (21.3)	274 (31.5)	1130 (25.3)	155 (8.5)	202 (10.6)	182 (8.7)	114 (11.5)	653 (9.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	41 (3.0)	59 (4.6)	38 (4.1)	48 (5.5)	186 (4.2)	23 (1.2)	28 (1.5)	23 (1.1)	14 (1.4)	88 (1.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(154)	(140)	(68)	(94)	(456)	(125)	(117)	(134)	(102)	(478)
รวม	1379 (100.0)	1292 (100.0)	928 (100.0)	871 (100.0)	4470 (100.0)	1835 (100.0)	1914 (100.0)	2095 (100.0)	992 (100.0)	6836 (100.0)
ชกต่อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	1252 (90.6)	1159 (89.7)	832 (89.6)	711 (81.8)	3954 (88.4)	1797 (98.1)	1863 (97.4)	2045 (97.6)	950 (95.3)	6655 (97.3)
นานๆครั้ง	103 (7.4)	108 (8.4)	77 (8.3)	127 (14.6)	415 (9.3)	26 (1.4)	41 (2.1)	40 (1.9)	34 (3.4)	141 (2.1)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	27 (2.0)	25 (1.9)	20 (2.2)	31 (3.6)	103 (2.3)	9 (0.5)	9 (0.5)	10 (0.5)	13 (1.3)	41 (0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(151)	(140)	(67)	(96)	(454)	(128)	(118)	(134)	(97)	(477)
รวม	1382 (100.0)	1292 (100.0)	929 (100.0)	929 (100.0)	869 (100.0)	1832 (100.0)	1913 (100.0)	2095 (100.0)	997 (100.0)	6837 (100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(1003)	(775)	(446)	(402)	(2626)	(1520)	(1307)	(1190)	(389)	(4406)
ไม่เคยเลย	457 (91.0)	573 (92.3)	480 (89.9)	459 (84.1)	1969 (89.4)	414 (97.2)	667 (94.9)	952 (94.0)	632 (91.1)	2665 (94.0)
เคย	45 (9.0)	48 (7.7)	54 (10.1)	87 (15.9)	234 (10.6)	12 (2.8)	36 (5.1)	61 (6.0)	62 (8.9)	171 (6.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(28)	(36)	(16)	(17)	(97)	(14)	(21)	(26)	(11)	(72)
รวม	502 (100.0)	621 (100.0)	534 (100.0)	546 (100.0)	2203 (100.0)	426 (100.0)	703 (100.0)	1013 (100.0)	694 (100.0)	2836 (100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(1017)	(908)	(547)	(373)	(2845)	(1624)	(1632)	(1693)	(626)	(5575)
ไม่เคยถูกบังคับ	443 (92.9)	432 (90.6)	380 (90.7)	502 (88.7)	1757 (90.6)	307 (97.5)	338 (92.1)	454 (92.1)	417 (92.0)	1516 (93.1)
เคย	34 (7.1)	45 (9.4)	39 (9.3)	64 (11.3)	182 (9.4)	8 (2.5)	29 (7.9)	39 (7.9)	36 (8.0)	112 (6.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(39)	(47)	(30)	(26)	(142)	(21)	(32)	(43)	(15)	(111)
รวม	477 (100.0)	477 (100.0)	419 (100.0)	566 (100.0)	1939 (100.0)	315 (100.0)	367 (100.0)	493 (100.0)	453 (100.0)	1268 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขบขัน/ซน/นั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 5.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	1392 (92.1)	1210 (86.6)	808 (82.1)	751 (79.4)	4161 (86.0)	1779 (91.5)	1743 (86.9)	1822 (83.7)	882 (81.7)	6226 (86.1)
เคย	120 (7.9)	188 (13.4)	176 (17.9)	195 (20.6)	679 (14.0)	165 (8.5)	262 (13.1)	382 (17.3)	197 (18.3)	1006 (13.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(34)	(12)	(19)	(86)	(16)	(26)	(25)	(15)	(82)
รวม	1512 (100.0)	1398 (100.0)	984 (100.0)	946 (100.0)	4840 (100.0)	1944 (100.0)	2005 (100.0)	2204 (100.0)	1079 (100.0)	7232 (100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	1474 (97.4)	1329 (94.8)	934 (94.7)	892 (94.1)	4629 (95.4)	1899 (97.2)	1896 (94.3)	2082 (94.0)	1008 (93.1)	6885 (94.8)
เคย	40 (2.6)	73 (5.2)	52 (5.3)	56 (5.9)	221 (4.6)	54 (2.8)	114 (5.7)	132 (6.0)	75 (6.9)	375 (5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(30)	(10)	(17)	(76)	(7)	(21)	(15)	(11)	(54)
รวม	1514 (100.0)	1402 (100.0)	986 (100.0)	948 (100.0)	4850 (100.0)	1953 (100.0)	2010 (100.0)	2214 (100.0)	1083 (100.0)	7260 (100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	1464 (97.0)	1317 (94.0)	916 (93.1)	879 (93.41)	4576 (94.6)	1786 (96.6)	1863 (92.8)	2056 (93.1)	1014 (93.5)	6809 (94.0)
เคย	46 (3.1)	84 (6.0)	68 (6.9)	62 (6.6)	260 (5.4)	66 (3.4)	145 (7.2)	152 (6.9)	70 (6.5)	433 (6.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(23)	(31)	(12)	(24)	(90)	(18)	(23)	(21)	(10)	(72)
รวม	1510 (100.0)	1401 (100.0)	984 (100.0)	941 (100.0)	4836 (100.0)	1942 (100.0)	2008 (100.0)	2208 (100.0)	1084 (100.0)	7242 (100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	1463 (97.0)	1327 (95.3)	937 (95.4)	876 (93.7)	4603 (95.5)	1874 (96.3)	1865 (93.1)	2066 (93.9)	1009 (93.6)	6814 (94.3)
เคย	45 (3.0)	66 (4.7)	45 (4.6)	59 (6.3)	215 (4.5)	73 (3.8)	138 (6.9)	135 (6.1)	69 (6.4)	415 (5.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(25)	(39)	(14)	(30)	(108)	(13)	(28)	(28)	(16)	(85)
รวม	1508 (100.0)	1393 (100.0)	982 (100.0)	935 (100.0)	4818 (100.0)	1947 (100.0)	2003 (100.0)	2201 (100.0)	1078 (100.0)	7229 (100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	34 (75.6)	54 (81.8)	28 (62.2)	47 (79.7)	163 (75.8)	59 (80.8)	113 (81.9)	110 (81.5)	59 (85.5)	341 (82.2)
3-5 ครั้ง	7 (15.6)	6 (9.1)	6 (13.3)	6 (10.2)	25 (11.6)	9 (12.3)	13 (9.4)	18 (13.3)	9 (13.0)	49 (11.8)
> 5 ครั้ง	4 (8.9)	6 (9.1)	11 (24.4)	6 (10.2)	27 (12.6)	5 (6.9)	12 (8.7)	7 (5.2)	1 (1.5)	25 (6.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	45 (100.0)	66 (100.0)	45 (100.0)	59 (100.0)	215 (100.0)	73 (100.0)	138 (100.0)	135 (100.0)	69 (100.0)	415 (100.0)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	38 (84.4)	51 (77.3)	29 (64.4)	40 (67.8)	158 (73.5)	67 (91.8)	110 (79.7)	110 (81.5)	51 (73.9)	338 (81.5)
เคย	7 (15.6)	15 (22.7)	16 (35.6)	19 (32.2)	57 (26.5)	6 (8.2)	28 (20.3)	25 (18.5)	18 (26.1)	77 (18.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	45 (100.0)	66 (100.0)	45 (100.0)	59 (100.0)	215 (100.0)	73 (100.0)	138 (100.0)	135 (100.0)	69 (100.0)	415 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 5.8 พฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	1342 (94.6)	1198 (89.5)	769 (80.5)	562 (61.5)	3871 (83.7)	1672 (99.1)	1816 (96.4)	1981 (93.9)	775 (78.0)	6244 (93.6)
เคยมี	76 (5.4)	141 (10.5)	186 (19.5)	352 (38.5)	755 (16.3)	16 (1.0)	67 (3.6)	128 (6.1)	219 (22.0)	430 (6.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(115)	(93)	(41)	(51)	(300)	(272)	(148)	(120)	(100)	(640)
รวม	1418 (100.0)	1339 (100.0)	955 (100.0)	914 (100.0)	4626 (100.0)	1688 (100.0)	1883 (100.0)	2109 (100.0)	994 (100.0)	6674 (100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	12.4±2.0	13.8±1.6	14.6±2.0	15.2±1.7	14.6±1.9	11.8±2.2	13.4±2.5	15.7±1.4	16.1±1.2	15.4±1.9
median (พิสัย)	13 (5-15)	14 (7-16)	15 (6-18)	15 (7-20)	15 (5-20)	13 (7-13)	14 (5-16)	16 (6-18)	16 (11-20)	16 (5-20)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(29)	(14)	(25)	(50)	(118)	(8)	(5)	(14)	(23)	(50)
รวม	47	127	161	302	636	8	62	114	196	380
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	34 (47.9)	45 (32.6)	46 (25.4)	115 (33.5)	240 (32.7)	4 (30.8)	35 (53.9)	79 (64.8)	142 (66.7)	260 (63.0)
2 คน	10 (14.1)	34 (24.6)	43 (23.8)	60 (17.5)	147 (20.1)	1 (7.7)	7 (10.8)	24 (19.7)	31 (14.6)	63 (15.3)
3 คน	4 (5.6)	11 (8.0)	15 (8.3)	43 (12.5)	73 (10.0)	2 (15.4)	3 (4.6)	7 (5.7)	17 (8.0)	29 (7.0)
4 คน	5 (7.0)	8 (5.8)	12 (6.6)	14 (4.1)	39 (5.3)	0 (0.0)	3 (4.6)	4 (3.3)	4 (1.9)	11 (2.7)
5 คน	6 (8.5)	5 (3.6)	9 (5.0)	23 (6.7)	43 (5.9)	0 (0.0)	4 (6.2)	3 (2.5)	3 (1.4)	10 (2.4)
6 คน ขึ้นไป	12 (16.9)	35 (25.4)	56 (30.9)	88 (25.7)	191 (26.1)	6 (46.2)	13 (20.0)	5 (4.1)	16 (7.5)	40 (9.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(3)	(5)	(9)	(22)	(3)	(2)	(6)	(6)	(17)
รวม	71 (100.0)	138 (100.0)	181 (100.0)	343 (100.0)	733 (100.0)	13 (100.0)	65 (100.0)	122 (100.0)	213 (100.0)	413 (100.0)
ดื่มเหล้า/ใช้สารเสพติดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	59 (84.3)	99 (73.3)	114 (65.1)	232 (70.3)	504 (71.0)	8 (53.3)	47 (71.2)	96 (80.0)	190 (89.2)	341 (82.4)
เคย	11 (15.7)	36 (26.7)	61 (34.9)	98 (29.7)	206 (29.0)	7 (46.7)	19 (28.8)	24 (20.0)	23 (10.8)	73 (17.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(6)	(11)	(22)	(45)	(1)	(1)	(8)	(6)	(16)
รวม	70 (100.0)	135 (100.0)	175 (100.0)	330 (100.0)	710 (100.0)	15 (100.0)	66 (100.0)	120 (100.0)	213 (100.0)	414 (100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	14 (20.0)	19 (13.8)	34 (19.0)	51 (14.5)	118 (16.0)	5 (38.5)	13 (19.7)	24 (19.7)	40 (18.6)	82 (19.7)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	2 (2.9)	6 (4.4)	9 (5.0)	16 (4.6)	33 (4.5)	0 (0.0)	5 (7.6)	6 (4.9)	25 (11.6)	36 (8.7)
ถุงยางอนามัย	45 (64.3)	91 (65.9)	110 (61.5)	204 (58.1)	450 (61.0)	4 (30.8)	31 (47.0)	52 (42.6)	86 (40.0)	173 (41.6)
ยาฉีดคุมกำเนิด	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.6)	5 (1.4)	6 (0.8)	2 (15.4)	0 (0.0)	3 (2.5)	1 (0.5)	6 (1.4)
หลังภายนอก	1 (1.4)	14 (10.1)	17 (9.5)	44 (12.5)	76 (10.3)	2 (15.4)	10 (15.2)	28 (23.0)	47 (21.9)	87 (20.9)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	2 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (1.4)	7 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (5.7)	8 (3.7)	15 (3.6)
วิธีการอื่นๆ	2 (2.9)	4 (2.9)	0 (0.0)	4 (1.1)	10 (1.4)	0 (0.0)	4 (6.1)	1 (0.8)	2 (0.9)	7 (1.7)
ไม่แน่ใจ	4 (5.7)	4 (2.9)	8 (4.5)	22 (6.3)	38 (5.2)	0 (0.0)	3 (4.6)	1 (0.8)	6 (2.8)	10 (2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(3)	(7)	(1)	(17)	(3)	(1)	(6)	(4)	(14)
รวม	70 (100.0)	138 (100.0)	179 (100.0)	351 (100.0)	738 (100.0)	13 (100.0)	66 (100.0)	122 (100.0)	215 (100.0)	416 (100.0)

ตารางที่ 5.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง					
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	
การตั้งครรรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรรภ์*											
ไม่เคย	55(84.6)	118(95.2)	152(91.6)	276(88.8)	601(90.2)	10(83.3)	55(90.2)	109(93.2)	188(87.0)	362(89.2)	
1 ครั้ง	5(7.7)	3(2.4)	8(4.8)	26(8.4)	42(6.3)	0(0.0)	1(1.6)	8(6.8)	23(10.7)	32(7.9)	
≥2 ครั้ง	5(7.7)	3(2.4)	6(3.6)	9(2.9)	23(3.5)	2(16.7)	5(8.2)	0(0.0)	5(2.3)	12(3.0)	
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	(11)	(17)	(20)	(41)	(89)	(4)	(6)	(11)	(13)	(24)	
รวม	65(100.0)	124(100.0)	166(100.0)	311(100.0)	666(100.0)	12(100.0)	61(100.0)	117(100.0)	216(100.0)	406(100.0)	

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 5.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง					
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน											
ไม่เคย	486(34.3)	264(20.1)	140(15.2)	164(17.9)	1054(23.1)	355(19.7)	190(10.1)	150(7.2)	80(7.9)	775(11.4)	
เคย	828(58.5)	932(70.8)	742(80.4)	682(74.5)	3184(69.7)	1208(67.2)	1567(83.3)	1842(88.1)	863(85.5)	5480(80.8)	
ไม่แน่ใจ	102(7.2)	121(9.2)	41(4.4)	69(7.5)	333(7.3)	236(13.1)	124(6.6)	98(4.7)	66(6.5)	524(7.7)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(117)	(115)	(73)	(50)	(355)	(161)	(150)	(139)	(85)	(535)	
รวม	1416(100.0)	1317(100.0)	923(100.0)	915(100.0)	4571(100.0)	1799(100.0)	1881(100.0)	2090(100.0)	1009(100.0)	6779(100.0)	

พฤติกรรมกรรมการตีมสุรา

ตารางที่ 5.10 พฤติกรรมกรรมการตีมสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	1195(82.8)	814(62.0)	429(46.9)	214(24.9)	2652(58.5)	1718(91.3)	1523(79.1)	1471(70.5)	568(54.3)	5280(76.1)
เคยตีมสุรา	248 (17.2)	498 (38.0)	485 (53.1)	647 (75.2)	1878 (41.5)	164 (8.7)	403 (20.9)	615 (29.5)	478 (45.7)	1660 (23.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(90)	(120)	(82)	(104)	(396)	(78)	(105)	(143)	(48)	(374)
รวม	1443(100.0)	1312(100.0)	914(100.0)	861(100.0)	4530(100.0)	1882(100.0)	1926(100.0)	2086(100.0)	1046(100.0)	6940(100.0)
อายุเมื่อตีมสุราครั้งแรก										
mean±sd	11.6±1.7	13.0±2.0	14.3±2.0	14.3±1.8	13.6±2.1	11.8±1.5	13.4±1.7	15.0±1.5	15.3±1.5	14.4±1.9
median (พิสัย)	12 (5-15)	14 (4-16)	15 (3-18)	15 (4-19)	14 (3-19)	12 (5-14)	14 (1-17)	15 (7-19)	15 (7-20)	15 (1-20)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(35)	(42)	(43)	(52)	(172)	(22)	(23)	(46)	(33)	(124)
รวม	213	456	442	595	1706	142	380	569	445	1536
สถานที่ที่มักจะตีมสุรา*										
งานฉลอง/รื่นเริง	80 (41.0)	200 (43.8)	181 (40.2)	191 (31.6)	652 (38.2)	71 (50.7)	167 (45.0)	322 (55.4)	170 (37.9)	730 (47.4)
บ้าน	68 (34.9)	130 (28.5)	142 (31.6)	201 (33.2)	541 (31.7)	45 (32.1)	136 (36.7)	160 (27.5)	93 (20.7)	434 (28.2)
หอพัก	9 (4.6)	32 (7.0)	30 (6.7)	113 (18.7)	184 (10.8)	5 (3.6)	25 (6.7)	43 (7.4)	117 (26.1)	190 (12.3)
งานโรงเรียน	8 (4.1)	4 (0.9)	6 (1.3)	5 (0.8)	23 (1.4)	9 (6.4)	8 (2.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	19 (1.2)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีไม่ เกิน 500 เมตร	3 (1.5)	12 (2.6)	13 (2.9)	14 (2.3)	42 (2.5)	2 (1.4)	7 (1.9)	6 (1.0)	15 (3.3)	30 (2.0)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีเกิน 500 เมตร	7 (3.6)	29 (6.4)	38 (8.4)	33 (5.5)	107 (6.3)	2 (1.4)	10 (2.7)	23 (4.0)	44 (9.8)	79 (5.1)
ร้านน้ำชา	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.1)	-	-	-	-	-
สวนไโรนา	16 (8.2)	28 (6.1)	23 (5.1)	29 (4.8)	96 (5.6)	0 (0.0)	7 (1.9)	12 (2.1)	3 (0.7)	22 (1.4)
อื่นๆ	4 (2.1)	22 (4.8)	16 (3.6)	19 (3.1)	61 (3.6)	6 (4.3)	11 (3.0)	14 (2.4)	6 (1.3)	37 (2.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(53)	(41)	(35)	(42)	(171)	(24)	(32)	(34)	(29)	(119)
รวม	195 (100.0)	457 (100.0)	450 (100.0)	605 (100.0)	1707 (100.0)	140 (100.0)	371 (100.0)	581 (100.0)	449 (100.0)	1541 (100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยตีมสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการตีมครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	154 (62.9)	248 (50.4)	221 (45.8)	250 (39.1)	873 (47.0)	108 (66.3)	244 (61.0)	371 (61.2)	257 (54.1)	980 (59.6)
1-2 ครั้ง	52 (21.2)	150 (30.5)	139 (28.8)	184 (28.8)	525 (28.2)	34 (20.9)	93 (23.3)	147 (24.3)	129 (27.2)	403 (24.5)
3-5 ครั้ง	17 (6.9)	40 (8.1)	54 (11.2)	70 (11.0)	181 (9.7)	12 (7.4)	30 (7.5)	57 (9.4)	41 (8.6)	140 (8.5)
6-9 ครั้ง	8 (3.3)	12 (2.4)	20 (4.1)	38 (6.0)	78 (4.2)	1 (0.6)	16 (4.0)	7 (1.2)	16 (3.4)	40 (2.4)
10 ครั้ง ขึ้นไป	14 (5.7)	42 (8.5)	49 (10.1)	97 (15.2)	202 (10.9)	8 (4.9)	17 (4.3)	24 (4.0)	32 (6.7)	81 (4.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(6)	(2)	(8)	(19)	(1)	(3)	(9)	(3)	(16)
รวม	245 (100.0)	492 (100.0)	483 (100.0)	639 (100.0)	1859 (100.0)	163 (100.0)	400 (100.0)	606 (100.0)	475 (100.0)	1644 (100.0)

ตารางที่ 5.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	35 (27.3)	48 (14.8)	57 (15.0)	51 (10.0)	191 (14.2)	17 (23.0)	40 (15.8)	85 (18.2)	52 (15.0)	194 (17.0)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	31 (24.2)	59 (18.2)	65 (17.1)	72 (14.1)	227 (16.9)	15 (20.3)	56 (22.1)	108 (23.1)	65 (18.7)	244 (21.4)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	22 (17.2)	69 (21.2)	89 (23.4)	87 (17.0)	267 (19.8)	11 (14.9)	44 (17.3)	130 (27.8)	82 (23.6)	267 (23.4)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	40 (31.3)	149 (45.9)	170 (44.6)	302 (59.0)	661 (49.1)	31 (41.9)	114 (44.9)	144 (30.8)	148 (42.7)	437 (38.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(120)	(173)	(104)	(135)	(532)	(90)	(149)	(148)	(131)	(518)
รวม	128 (100.0)	325 (100.0)	381 (100.0)	512 (100.0)	1346 (100.0)	74 (100.0)	254 (100.0)	467 (100.0)	347 (100.0)	1142 (100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	31 (54.4)	114 (53.3)	121 (48.4)	113 (30.1)	379 (42.3)	26 (68.4)	89 (58.6)	157 (59.7)	119 (53.1)	391 (57.8)
3-5 ครั้ง	12 (21.1)	43 (20.1)	60 (24.0)	104 (27.7)	219 (24.4)	9 (23.7)	38 (25.0)	67 (25.5)	45 (20.1)	159 (23.5)
6-9 ครั้ง	7 (12.3)	17 (7.9)	30 (12.0)	46 (12.2)	100 (11.2)	2 (5.3)	10 (6.6)	24 (9.1)	27 (12.1)	63 (9.3)
10-19 ครั้ง	2 (3.5)	17 (7.9)	16 (6.4)	57 (15.2)	92 (10.3)	1 (2.6)	6 (4.0)	8 (3.0)	18 (8.0)	33 (4.9)
20 ครั้ง ขึ้นไป	5 (8.8)	23 (10.8)	23 (9.2)	56 (14.9)	107 (11.9)	0 (0.0)	9 (5.9)	7 (2.7)	15 (6.7)	31 (4.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(4)	(9)	(13)	(31)	(4)	(6)	(11)	(6)	(27)
รวม	57 (100.0)	214 (100.0)	250 (100.0)	376 (100.0)	897 (100.0)	38 (100.0)	152 (100.0)	263 (100.0)	224 (100.0)	677 (100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	22 (40.0)	90 (43.1)	74 (30.7)	120 (32.7)	306 (35.1)	22 (59.5)	62 (43.4)	103 (39.8)	81 (36.5)	268 (40.5)
3-5 หน่วย	21 (38.2)	52 (24.9)	81 (33.6)	123 (33.5)	277 (31.8)	11 (29.7)	41 (28.7)	82 (31.7)	76 (34.2)	210 (31.8)
6-8 หน่วย	6 (10.9)	30 (14.4)	24 (10.0)	28 (7.6)	88 (10.1)	1 (2.7)	20 (14.0)	30 (11.6)	16 (7.2)	67 (10.1)
9 หน่วย ขึ้นไป	6 (10.9)	37 (17.7)	62 (25.7)	96 (26.2)	201 (23.1)	3 (8.1)	20 (14.0)	44 (17.0)	49 (22.1)	116 (17.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(5)	(9)	(9)	(25)	(1)	(9)	(4)	(2)	(16)
รวม	55 (100.0)	209 (100.0)	241 (100.0)	367 (100.0)	872 (100.0)	37 (100.0)	143 (100.0)	259 (100.0)	222 (100.0)	661 (100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมาใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน +ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	26 (41.9)	74 (33.9)	84 (32.4)	76 (19.5)	260 (28.0)	23 (54.8)	75 (48.4)	116 (42.3)	81 (35.2)	295 (42.1)
1-2 ครั้ง	22 (35.5)	84 (38.5)	105 (40.5)	172 (44.2)	383 (41.3)	15 (35.7)	56 (36.1)	117 (42.7)	101 (43.9)	289 (41.2)
3-5 ครั้ง	8 (12.9)	34 (15.6)	26 (10.0)	62 (15.9)	130 (14.0)	1 (2.4)	14 (9.0)	28 (10.2)	34 (14.8)	77 (11.0)
6-9 ครั้ง	3 (4.8)	12 (5.5)	19 (7.3)	33 (8.5)	67 (7.2)	1 (2.4)	2 (1.3)	7 (2.6)	7 (3.0)	17 (2.4)
10-19 ครั้ง	0 (0.0)	6 (2.8)	19 (7.3)	23 (5.9)	48 (5.2)	1 (2.4)	2 (1.3)	6 (2.2)	3 (1.3)	12 (1.7)
20 ครั้ง ขึ้นไป	3 (4.8)	8 (3.7)	6 (2.3)	23 (5.9)	40 (4.3)	1 (2.4)	6 (3.9)	0 (0.0)	4 (1.7)	11 (1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
รวม	62 (100.0)	218 (100.0)	259 (100.0)	389 (100.0)	928 (100.0)	42 (100.0)	155 (100.0)	274 (100.0)	230 (100.0)	701 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 5.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	149 (10.0)	284 (20.6)	296 (30.5)	397 (42.0)	1126 (23.5)	87 (4.6)	233 (12.0)	383 (17.7)	248 (23.5)	951 (13.4)
ชื่อเองโดยใช้บัตรประจำตัวของ										
คนอื่น	64 (4.3)	83 (6.0)	89 (9.2)	161 (17.0)	397 (8.3)	21 (1.1)	47 (2.4)	66 (3.1)	61 (5.8)	195 (2.8)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	151 (10.1)	336 (24.4)	342 (35.3)	509 (53.9)	1338 (28.0)	145 (7.6)	243 (12.5)	363 (16.8)	315 (29.8)	1066 (15.1)
ชื่อเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตร										
ประจำตัว	134 (9.0)	287 (20.8)	293 (30.3)	461 (48.8)	1175 (24.6)	91 (4.8)	217 (11.2)	322 (14.9)	259 (24.5)	889 (12.6)
เอามาจากบ้าน										
(ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	99 (6.6)	140 (10.2)	141 (14.6)	186 (19.7)	566 (11.8)	73 (3.8)	131 (6.8)	204 (9.4)	116 (11.0)	524 (7.4)
ชื่อเองได้จากคนอื่นที่ได้มาจาก										
ร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน รัศมี										
ไม่เกิน 500 เมตร	83 (5.6)	170 (12.4)	200 (20.8)	306 (32.6)	759 (16.0)	66 (3.5)	123 (6.3)	192 (8.9)	171 (16.3)	552 (7.8)
เวลาเฉลี่ยในการ ซื้อ/หาสุรา										
mean±sd	16.1±14.1	13.8±12.6	15.0±13.0	15.5±13.1	15.1±13.2	19.1±15.0	15.2±11.0	15.8±12.1	15.4±10.2	16.2±12.3
median (พิสัย)	10 (0-90)	10 (0-90)	10 (0-90)	10 (0-90)	10 (0-90)	15 (0-90)	10 (0-60)	10 (0-90)	10 (0-60)	10 (0-90)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(922)	(892)	(482)	(370)	(2666)	(1207)	(1320)	(1052)	(665)	(4244)
รวม	611	540	514	595	2260	753	711	1177	429	3070

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมื่อดื่ม*										
ไม่เลย	174 (71.0)	311 (63.0)	257 (53.1)	227 (35.4)	969 (52.0)	124 (75.6)	259 (64.8)	357 (58.1)	241 (50.6)	981 (59.3)
เคย	71 (29.0)	183 (37.0)	227 (46.9)	415 (64.6)	896 (48.0)	40 (24.4)	141 (35.3)	258 (42.0)	235 (49.4)	674 (40.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(1)	(5)	(13)	(0)	(3)	(0)	(2)	(5)
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	484 (100.0)	642 (100.0)	1865 (100.0)	164 (100.0)	400 (100.0)	615 (100.0)	476 (100.0)	1655 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	33 (46.5)	66 (36.1)	91 (40.1)	142 (34.2)	332 (37.1)	25 (62.5)	81 (57.5)	136 (52.7)	108 (46.0)	350 (51.9)
2-3 ครั้ง	27 (38.0)	65 (35.5)	74 (32.6)	147 (35.4)	313 (34.9)	10 (25.0)	43 (30.5)	96 (37.2)	90 (38.3)	239 (35.5)
4 ครั้งขึ้นไป	11 (15.5)	52 (28.4)	62 (27.3)	126 (30.4)	251 (28.0)	5 (12.5)	17 (12.1)	26 (10.1)	37 (15.7)	85 (12.6)
รวม	71 (100.0)	183 (100.0)	227 (100.0)	415 (100.0)	896 (100.0)	40 (100.0)	141 (100.0)	258 (100.0)	235 (100.0)	674 (100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ตีเรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เลย	159 (64.9)	324 (65.6)	278 (57.7)	335 (51.9)	1096 (58.7)	107 (65.2)	292 (73.0)	394 (64.1)	294 (61.9)	1087 (65.7)
เคย	86 (35.1)	170 (34.4)	204 (42.3)	310 (48.1)	770 (41.3)	57 (34.8)	108 (27.0)	221 (35.9)	181 (38.1)	567 (34.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(3)	(2)	(12)	(0)	(3)	(0)	(3)	(6)
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	482 (100.0)	645 (100.0)	1866 (100.0)	164 (100.0)	400 (100.0)	615 (100.0)	475 (100.0)	1654 (100.0)

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	51 (59.3)	84 (49.4)	89 (43.6)	171 (55.2)	395 (51.3)	34 (59.7)	62 (57.4)	99 (44.8)	100 (55.3)	295 (52.0)
2-3 ครั้ง	20 (23.3)	53 (31.2)	78 (38.2)	103 (33.2)	254 (33.0)	17 (29.8)	37 (34.3)	80 (36.2)	52 (28.7)	186 (32.8)
4 ครั้งขึ้นไป	15 (17.4)	33 (19.4)	37 (18.1)	36 (11.6)	121 (15.7)	6 (10.5)	9 (8.3)	42 (19.0)	29 (16.0)	86 (15.2)
รวม	86 (100.0)	170 (100.0)	204 (100.0)	310 (100.0)	770 (100.0)	57 (100.0)	108 (100.0)	221 (100.0)	181 (100.0)	567 (100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เลย	208 (84.9)	401 (81.2)	375 (77.6)	516 (79.9)	1500 (80.3)	136 (82.9)	341 (85.0)	523 (85.3)	417 (87.8)	1417 (85.7)
เคย	37 (15.1)	93 (18.8)	108 (22.4)	130 (20.1)	368 (19.7)	28 (17.1)	60 (15.0)	90 (14.7)	58 (12.2)	236 (14.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(2)	(1)	(10)	(0)	(2)	(2)	(3)	(7)
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	646 (100.0)	1868 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	613 (100.0)	475 (100.0)	1653 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	17 (46.0)	59 (63.4)	61 (56.5)	83 (63.9)	220 (59.8)	14 (50.0)	31 (51.7)	52 (57.8)	36 (62.1)	133 (56.4)
2-3 ครั้ง	13 (35.1)	23 (24.7)	39 (36.1)	36 (27.7)	111 (30.2)	10 (35.7)	23 (38.3)	29 (32.2)	16 (27.6)	78 (33.1)
4 ครั้งขึ้นไป	7 (18.9)	11 (11.8)	8 (7.4)	11 (8.5)	37 (10.1)	4 (14.3)	6 (10.0)	9 (10.0)	6 (10.3)	25 (10.6)
รวม	37 (100.0)	93 (100.0)	108 (100.0)	130 (100.0)	368 (100.0)	28 (100.0)	60 (100.0)	90 (100.0)	58 (100.0)	236 (100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เลย	215 (88.1)	444 (89.7)	434 (89.7)	571 (88.5)	1664 (89.1)	152 (92.7)	368 (91.8)	570 (93.0)	447 (94.5)	1537 (93.1)
เคย	29 (11.9)	51 (10.3)	50 (10.3)	74 (11.5)	204 (10.9)	12 (7.3)	33 (8.2)	43 (7.0)	26 (5.5)	114 (6.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(3)	(1)	(2)	(10)	(0)	(2)	(2)	(5)	(9)
รวม	244 (100.0)	495 (100.0)	484 (100.0)	645 (100.0)	1868 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	613 (100.0)	473 (100.0)	1651 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	19 (65.5)	32 (62.8)	29 (58.0)	50 (67.6)	130 (63.7)	9 (75.0)	21 (63.6)	32 (74.4)	19 (73.1)	81 (71.1)
2-3 ครั้ง	6 (20.7)	14 (27.5)	14 (28.0)	17 (23.0)	51 (25.0)	2 (16.7)	8 (24.2)	5 (11.6)	5 (19.2)	20 (17.5)
4 ครั้งขึ้นไป	4 (13.8)	5 (9.8)	7 (14.0)	7 (9.5)	23 (11.3)	1 (8.3)	4 (12.1)	6 (14.0)	2 (7.7)	13 (11.4)
รวม	29 (100.0)	51 (100.0)	50 (100.0)	74 (100.0)	204 (100.0)	12 (100.0)	33 (100.0)	43 (100.0)	26 (100.0)	114 (100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เลย	153 (63.0)	324 (65.6)	334 (69.0)	417 (65.0)	1228 (65.9)	130 (79.3)	325 (81.3)	528 (86.0)	392 (82.7)	1375 (83.2)
เคย	90 (37.0)	170 (34.4)	150 (31.0)	225 (35.1)	635 (34.1)	34 (20.7)	75 (18.8)	86 (14.0)	82 (17.3)	277 (16.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(4)	(1)	(5)	(15)	(0)	(3)	(1)	(4)	(8)
รวม	243 (100.0)	494 (100.0)	484 (100.0)	642 (100.0)	1863 (100.0)	164 (100.0)	400 (100.0)	614 (100.0)	474 (100.0)	1652 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	49 (54.4)	87 (51.2)	61 (40.7)	119 (52.9)	316 (49.8)	18 (52.9)	49 (65.3)	57 (66.3)	43 (52.4)	167 (60.3)
2-3 ครั้ง	24 (26.7)	51 (30.0)	62 (41.3)	67 (29.8)	204 (32.1)	9 (26.5)	16 (21.3)	16 (18.6)	26 (31.7)	67 (24.2)
4 ครั้งขึ้นไป	17 (18.9)	32 (18.8)	27 (18.0)	39 (17.3)	115 (18.1)	7 (20.6)	10 (13.3)	13 (15.1)	13 (15.9)	43 (15.5)
รวม	90 (100.0)	170 (100.0)	150 (100.0)	225 (100.0)	635 (100.0)	34 (100.0)	75 (100.0)	86 (100.0)	82 (100.0)	277 (100.0)

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง					
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	
คลื่นไส้ อาเจียน*											
ไม่เลย	138 (56.6)	269 (54.3)	234 (48.4)	248 (38.6)	889 (47.7)	116 (70.7)	258 (64.3)	333 (54.2)	227 (47.8)	934 (56.5)	
เคย	106 (43.4)	226 (45.7)	250 (51.7)	394 (61.4)	976 (52.3)	48 (29.3)	143 (35.7)	281 (45.8)	248 (52.2)	720 (43.5)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(3)	(1)	(5)	(13)	(0)	(2)	(1)	(3)	(6)	
รวม	244 (100.0)	495 (100.0)	484 (100.0)	642 (100.0)	1865 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	614 (100.0)	475 (100.0)	1654 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	56 (52.8)	116 (51.3)	112 (44.8)	160 (40.6)	444 (45.5)	33 (68.8)	94 (65.7)	148 (52.7)	112 (45.2)	387 (53.8)	
2-3 ครั้ง	34 (32.1)	79 (35.0)	84 (33.6)	153 (38.8)	350 (35.9)	10 (20.8)	39 (27.3)	102 (36.3)	97 (39.1)	248 (34.4)	
4 ครั้งขึ้นไป	16 (15.1)	31 (13.7)	54 (21.6)	81 (20.6)	182 (18.7)	5 (10.4)	10 (7.0)	31 (11.0)	39 (15.7)	85 (11.8)	
รวม	106 (100.0)	226 (100.0)	250 (100.0)	394 (100.0)	976 (100.0)	48 (100.0)	143 (100.0)	281 (100.0)	248 (100.0)	720 (100.0)	
ขับซีรอก หลังดื่มสุรา*											
ไม่เลย	174 (71.3)	268 (54.3)	247 (51.1)	231 (36.0)	920 (49.4)	121 (74.2)	255 (63.6)	371 (60.5)	275 (57.9)	1022 (61.9)	
เคย	70 (28.7)	226 (45.8)	236 (48.9)	411 (64.0)	943 (50.6)	42 (25.8)	146 (36.4)	242 (39.5)	200 (42.1)	630 (38.1)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(2)	(5)	(15)	(1)	(2)	(2)	(3)	(8)	
รวม	244 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	642 (100.0)	1863 (100.0)	163 (100.0)	401 (100.0)	613 (100.0)	475 (100.0)	1652 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	28 (40.0)	103 (45.6)	90 (38.1)	138 (33.6)	359 (38.1)	23 (54.8)	78 (53.4)	107 (44.2)	87 (43.5)	295 (46.8)	
2-3 ครั้ง	19 (27.1)	58 (25.7)	80 (33.9)	146 (35.5)	303 (32.1)	11 (26.2)	44 (30.1)	81 (33.5)	64 (32.0)	200 (31.8)	
4 ครั้งขึ้นไป	23 (32.9)	65 (28.8)	66 (28.0)	127 (30.9)	281 (29.8)	8 (19.1)	24 (16.4)	54 (22.3)	49 (24.5)	135 (21.4)	
รวม	70 (100.0)	226 (100.0)	236 (100.0)	411 (100.0)	943 (100.0)	42 (100.0)	146 (100.0)	242 (100.0)	200 (100.0)	630 (100.0)	
ขาดเรียน*											
ไม่เลย	143 (58.6)	299 (60.4)	291 (60.4)	307 (47.6)	1040 (55.7)	94 (57.3)	274 (68.3)	400 (65.3)	261 (55.2)	1029 (62.3)	
เคย	101 (41.4)	196 (39.6)	191 (39.6)	338 (52.4)	826 (44.3)	70 (42.7)	127 (31.7)	213 (34.8)	212 (44.8)	622 (37.7)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(3)	(3)	(2)	(12)	(0)	(2)	(2)	(5)	(9)	
รวม	244 (100.0)	495 (100.0)	482 (100.0)	645 (100.0)	1866 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	613 (100.0)	473 (100.0)	1651 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	48 (47.5)	89 (45.4)	80 (41.9)	153 (45.3)	370 (44.8)	28 (40.0)	48 (37.8)	91 (42.7)	81 (38.2)	248 (39.9)	
2-3 ครั้ง	32 (31.7)	64 (32.7)	74 (38.7)	131 (38.8)	301 (36.4)	29 (41.4)	45 (35.4)	83 (39.0)	80 (37.7)	237 (38.1)	
4 ครั้งขึ้นไป	21 (20.8)	43 (21.9)	37 (19.4)	54 (16.0)	155 (18.8)	13 (18.6)	34 (26.8)	39 (18.3)	51 (24.1)	137 (22.0)	
รวม	101 (100.0)	196 (100.0)	191 (100.0)	338 (100.0)	826 (100.0)	70 (100.0)	127 (100.0)	213 (100.0)	212 (100.0)	622 (100.0)	
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*											
ไม่เลย	157 (64.3)	300 (60.7)	271 (56.1)	311 (48.4)	1039 (55.8)	106 (64.6)	249 (62.1)	364 (59.4)	281 (59.2)	1000 (60.5)	
เคย	87 (35.7)	194 (39.3)	212 (43.9)	331 (51.6)	824 (44.2)	58 (35.4)	152 (37.9)	249 (40.6)	194 (40.8)	653 (39.5)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(2)	(5)	(15)	(0)	(2)	(2)	(3)	(7)	
รวม	244 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	642 (100.0)	1863 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	613 (100.0)	475 (100.0)	1653 (100.0)	

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	54 (62.1)	97 (50.0)	94 (44.3)	151 (45.6)	396 (48.1)	31 (53.5)	82 (54.0)	133 (53.4)	103 (53.1)	349 (53.5)
2-3 ครั้ง	17 (19.5)	59 (30.4)	81 (38.2)	118 (35.7)	275 (33.4)	17 (29.3)	47 (30.9)	73 (29.3)	55 (28.4)	192 (29.4)
4 ครั้งขึ้นไป	16 (18.4)	38 (19.6)	37 (17.5)	62 (18.7)	153 (18.6)	10 (17.2)	23 (15.1)	43 (17.3)	36 (18.6)	112 (17.2)
รวม	87 (100.0)	194 (100.0)	212 (100.0)	331 (100.0)	824 (100.0)	58 (100.0)	152 (100.0)	249 (100.0)	194 (100.0)	653 (100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เลย	194 (79.5)	376 (76.3)	349 (72.6)	404 (62.8)	1323 (71.1)	133 (81.1)	316 (78.8)	489 (79.9)	362 (76.4)	1300 (78.7)
เคย	50 (20.5)	117 (23.7)	132 (27.4)	239 (37.2)	538 (28.9)	31 (18.9)	85 (21.2)	123 (20.1)	112 (23.6)	351 (21.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(4)	(4)	(17)	(0)	(2)	(3)	(4)	(9)
รวม	244 (100.0)	493 (100.0)	481 (100.0)	643 (100.0)	1861 (100.0)	164 (100.0)	401 (100.0)	612 (100.0)	474 (100.0)	1651 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	34 (68.0)	67 (57.3)	79 (59.9)	126 (52.7)	306 (56.9)	17 (54.8)	61 (71.8)	78 (63.4)	68 (60.7)	224 (63.8)
2-3 ครั้ง	12 (24.0)	33 (28.2)	38 (28.8)	76 (31.8)	159 (29.6)	8 (25.8)	19 (22.4)	32 (26.0)	23 (20.5)	82 (23.4)
4 ครั้งขึ้นไป	4 (8.0)	17 (14.5)	15 (11.4)	37 (15.5)	73 (13.6)	6 (19.4)	5 (5.9)	13 (10.6)	21 (18.8)	45 (12.8)
รวม	50 (100.0)	117 (100.0)	132 (100.0)	239 (100.0)	538 (100.0)	31 (100.0)	85 (100.0)	123 (100.0)	112 (100.0)	351 (100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	144 (59.0)	317 (64.3)	295 (61.1)	389 (60.8)	1145 (61.6)	91 (55.5)	260 (65.0)	419 (68.5)	310 (65.3)	1080 (65.4)
เคย	100 (41.0)	176 (35.7)	188 (38.9)	251 (39.2)	715 (38.4)	73 (44.5)	140 (35.0)	193 (31.5)	165 (34.7)	571 (34.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(2)	(7)	(18)	(0)	(3)	(3)	(3)	(9)
รวม	244 (100.0)	493 (100.0)	483 (100.0)	640 (100.0)	1860 (100.0)	164 (100.0)	400 (100.0)	612 (100.0)	475 (100.0)	1651 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	62 (62.0)	99 (56.3)	106 (56.4)	126 (50.2)	393 (55.0)	42 (57.5)	62 (44.3)	97 (50.3)	87 (52.7)	288 (50.4)
2-3 ครั้ง	20 (20.0)	46 (26.1)	57 (30.3)	92 (36.7)	215 (30.1)	12 (16.4)	54 (38.6)	68 (35.2)	61 (37.0)	195 (34.2)
4 ครั้งขึ้นไป	18 (18.0)	31 (17.6)	25 (13.3)	33 (13.2)	107 (15.0)	19 (26.0)	24 (17.1)	28 (14.5)	17 (10.3)	88 (15.4)
รวม	100 (100.0)	176 (100.0)	188 (100.0)	251 (100.0)	715 (100.0)	73 (100.0)	140 (100.0)	193 (100.0)	165 (100.0)	571 (100.0)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เลย	169 (69.3)	317 (64.2)	291 (60.4)	350 (54.3)	1127 (60.4)	112 (68.3)	260 (65.2)	368 (59.9)	282 (59.5)	1022 (61.9)
เคย	75 (30.7)	177 (35.8)	191 (39.6)	295 (45.7)	738 (39.6)	52 (31.7)	139 (34.8)	246 (40.1)	192 (40.5)	629 (38.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(3)	(2)	(13)	(0)	(4)	(1)	(4)	(9)
รวม	244 (100.0)	494 (100.0)	482 (100.0)	645 (100.0)	1865 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	474 (100.0)	1651 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	41 (54.7)	87 (49.2)	94 (49.2)	156 (52.9)	378 (51.2)	28 (53.9)	75 (54.0)	108 (43.9)	97 (50.5)	308 (49.0)
2-3 ครั้ง	21 (28.0)	61 (34.5)	59 (30.9)	103 (34.9)	244 (33.1)	15 (28.9)	47 (33.8)	93 (37.8)	66 (34.4)	221 (35.1)
4 ครั้งขึ้นไป	13 (17.3)	29 (16.4)	38 (19.9)	36 (12.2)	116 (15.7)	9 (17.3)	17 (12.2)	45 (18.3)	29 (15.1)	100 (15.9)
รวม	75 (100.0)	177 (100.0)	191 (100.0)	295 (100.0)	738 (100.0)	52 (100.0)	139 (100.0)	246 (100.0)	192 (100.0)	629 (100.0)

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการติ่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกจับเพราะขับขีรถขณะเมาสุรา*										
ไม่เคย	224 (91.8)	459 (93.1)	447 (92.6)	576 (89.6)	1706 (91.6)	154 (93.9)	381 (95.5)	594 (96.9)	460 (97.3)	1589 (96.4)
เคย	20 (8.2)	34 (6.9)	36 (7.5)	67 (10.4)	157 (8.4)	10 (6.1)	18 (4.5)	19 (3.1)	13 (2.8)	60 (3.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(2)	(4)	(15)	(0)	(4)	(2)	(5)	(11)
รวม	244 (100.0)	493 (100.0)	483 (100.0)	643 (100.0)	1863 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	613 (100.0)	473 (100.0)	1649 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	13 (65.0)	18 (52.9)	22 (61.1)	40 (59.7)	93 (59.2)	8 (80.0)	8 (44.4)	11 (57.9)	10 (76.9)	37 (61.7)
2-3 ครั้ง	5 (25.0)	9 (26.5)	8 (22.2)	19 (28.4)	41 (26.1)	2 (20.0)	8 (44.4)	7 (36.8)	3 (23.1)	20 (33.3)
4 ครั้งขึ้นไป	2 (10.0)	7 (20.6)	6 (16.7)	8 (11.9)	23 (14.7)	0 (0.0)	2 (11.1)	1 (5.3)	0 (0.0)	3 (5.0)
รวม	20 (100.0)	34 (100.0)	36 (100.0)	67 (100.0)	157 (100.0)	10 (100.0)	18 (100.0)	19 (100.0)	13 (100.0)	60 (100.0)
ถูกลวนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เคย	212 (86.9)	445 (90.1)	425 (88.2)	536 (83.2)	1618 (86.8)	150 (92.0)	367 (92.0)	571 (93.0)	444 (93.7)	1532 (92.9)
เคย	32 (13.1)	49 (9.9)	57 (11.8)	108 (16.8)	246 (13.2)	13 (8.0)	32 (8.0)	43 (7.0)	30 (6.3)	118 (7.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(3)	(3)	(14)	(1)	(4)	(1)	(4)	(10)
รวม	244 (100.0)	494 (100.0)	482 (100.0)	644 (100.0)	1864 (100.0)	163 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	474 (100.0)	1650 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	19 (59.4)	33 (67.4)	29 (50.9)	57 (52.8)	138 (56.1)	11 (84.6)	20 (62.5)	34 (79.1)	22 (73.3)	87 (73.7)
2-3 ครั้ง	9 (28.1)	7 (14.3)	13 (22.8)	28 (25.9)	57 (23.2)	2 (15.4)	8 (25.0)	6 (14.0)	6 (20.0)	22 (18.6)
4 ครั้งขึ้นไป	4 (12.5)	9 (18.4)	15 (26.3)	23 (21.3)	51 (20.7)	0 (0.0)	4 (12.5)	3 (7.0)	2 (6.7)	9 (7.6)
รวม	32 (100.0)	49 (100.0)	57 (100.0)	108 (100.0)	246 (100.0)	13 (100.0)	32 (100.0)	43 (100.0)	30 (100.0)	118 (100.0)
ลวนลามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เคย	212 (86.5)	438 (88.7)	412 (85.3)	537 (83.3)	1599 (85.7)	149 (91.4)	372 (93.2)	582 (94.8)	457 (96.2)	1560 (94.5)
เคย	33 (13.5)	56 (11.3)	71 (14.7)	108 (16.7)	268 (14.4)	14 (8.6)	27 (6.8)	32 (5.2)	18 (3.8)	91 (5.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(2)	(2)	(11)	(1)	(4)	(1)	(3)	(9)
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	645 (100.0)	1867 (100.0)	163 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	475 (100.0)	1651 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	21 (63.6)	21 (37.5)	39 (54.9)	63 (58.3)	144 (53.7)	11 (78.6)	16 (59.3)	24 (75.0)	14 (77.8)	65 (71.4)
2-3 ครั้ง	9 (27.3)	21 (37.5)	16 (22.5)	29 (26.9)	75 (28.0)	2 (14.3)	6 (22.2)	6 (18.8)	3 (16.7)	17 (18.7)
4 ครั้งขึ้นไป	3 (9.1)	14 (25.0)	16 (22.5)	16 (14.8)	49 (18.3)	1 (7.1)	5 (18.5)	2 (6.3)	1 (5.6)	9 (9.9)
รวม	33 (100.0)	56 (100.0)	71 (100.0)	108 (100.0)	268 (100.0)	14 (100.0)	27 (100.0)	32 (100.0)	18 (100.0)	91 (100.0)
พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เคย	191 (78.3)	378 (76.7)	337 (70.1)	368 (57.1)	1274 (68.4)	131 (80.4)	312 (78.2)	479 (78.1)	335 (70.5)	1257 (76.2)
เคย	53 (21.7)	115 (23.3)	144 (29.9)	276 (42.9)	588 (31.6)	32 (19.6)	87 (21.8)	134 (21.9)	140 (29.5)	393 (23.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(5)	(4)	(3)	(16)	(1)	(4)	(2)	(3)	(10)
รวม	244 (100.0)	493 (100.0)	481 (100.0)	644 (100.0)	1862 (100.0)	163 (100.0)	399 (100.0)	613 (100.0)	475 (100.0)	1650 (100.0)

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง					
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	32 (60.4)	57 (49.6)	57 (39.6)	135 (48.9)	281 (47.8)	21 (65.6)	54 (62.1)	60 (44.8)	68 (48.6)	203 (51.7)	
2-3 ครั้ง	12 (22.6)	26 (22.6)	47 (32.6)	76 (27.5)	161 (27.4)	5 (15.6)	23 (26.4)	42 (31.3)	36 (25.7)	106 (27.0)	
4 ครั้งขึ้นไป	9 (17.0)	32 (27.8)	40 (27.8)	65 (23.6)	146 (24.8)	6 (18.8)	10 (11.5)	32 (23.9)	36 (25.7)	84 (21.4)	
รวม	53 (100.0)	115 (100.0)	144 (100.0)	276 (100.0)	588 (100.0)	32 (100.0)	87 (100.0)	134 (100.0)	140 (100.0)	393 (100.0)	
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*											
ไม่เคย	224 (91.4)	470 (95.1)	454 (94.2)	591 (91.6)	1739 (93.2)	144 (87.8)	370 (92.7)	570 (93.0)	448 (94.5)	1532 (92.9)	
เคย	21 (8.6)	24 (4.9)	28 (5.8)	54 (8.4)	127 (6.8)	20 (12.2)	29 (7.3)	43 (7.0)	26 (5.5)	118 (7.2)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(3)	(2)	(12)	(0)	(4)	(2)	(4)	(10)	
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	482 (100.0)	645 (100.0)	1866 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	613 (100.0)	474 (100.0)	1650 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	9 (42.9)	16 (66.7)	16 (57.1)	36 (66.7)	77 (60.6)	12 (60.0)	19 (65.5)	28 (65.1)	21 (80.8)	80 (67.8)	
2-3 ครั้ง	6 (28.6)	4 (16.7)	9 (32.1)	15 (27.8)	34 (26.8)	5 (25.0)	7 (24.1)	12 (27.9)	3 (11.5)	27 (22.9)	
4 ครั้งขึ้นไป	6 (28.6)	4 (16.7)	3 (10.7)	3 (5.6)	16 (12.6)	3 (15.0)	3 (10.3)	3 (7.0)	2 (7.7)	11 (9.3)	
รวม	21 (100.0)	24 (100.0)	28 (100.0)	54 (100.0)	127 (100.0)	20 (100.0)	29 (100.0)	43 (100.0)	26 (100.0)	118 (100.0)	
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*											
ไม่เคย	214 (87.4)	466 (94.3)	454 (94.0)	599 (92.7)	1733 (92.8)	144 (87.8)	362 (90.7)	568 (92.5)	442 (93.1)	1516 (91.8)	
เคย	31 (12.7)	28 (5.7)	29 (6.0)	47 (7.3)	135 (7.2)	20 (12.2)	37 (9.3)	46 (7.5)	33 (7.0)	136 (8.2)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(2)	(1)	(10)	(0)	(4)	(1)	(3)	(8)	
รวม	245 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	646 (100.0)	1868 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	475 (100.0)	1652 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	15 (48.4)	17 (60.7)	17 (58.6)	32 (68.1)	81 (60.0)	13 (65.0)	22 (59.5)	31 (67.4)	20 (60.6)	86 (63.2)	
2-3 ครั้ง	9 (29.0)	3 (10.7)	10 (34.5)	11 (23.4)	33 (24.4)	3 (15.0)	9 (24.3)	12 (26.1)	11 (33.3)	35 (25.7)	
4 ครั้งขึ้นไป	7 (22.6)	8 (28.6)	2 (6.9)	4 (8.5)	21 (15.6)	4 (20.0)	6 (16.2)	3 (6.5)	2 (6.1)	15 (11.0)	
รวม	31 (100.0)	28 (100.0)	29 (100.0)	47 (100.0)	135 (100.0)	20 (100.0)	37 (100.0)	46 (100.0)	33 (100.0)	136 (100.0)	
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*											
ไม่เคย	163 (67.4)	353 (71.6)	332 (69.0)	387 (60.0)	1235 (66.4)	117 (71.3)	309 (77.4)	474 (77.2)	364 (77.3)	1264 (76.7)	
เคย	79 (32.6)	140 (28.4)	149 (31.0)	258 (40.0)	626 (33.6)	47 (28.7)	90 (22.6)	140 (22.8)	107 (22.7)	384 (23.3)	
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	(5)	(4)	(2)	(17)	(0)	(4)	(1)	(7)	(12)	
รวม	242 (100.0)	493 (100.0)	481 (100.0)	645 (100.0)	1861 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	471 (100.0)	1648 (100.0)	
จำนวนครั้ง**											
1 ครั้ง	35 (44.3)	83 (59.3)	93 (62.4)	150 (58.1)	361 (57.7)	26 (55.3)	47 (52.2)	75 (53.6)	63 (58.9)	211 (55.0)	
2-3 ครั้ง	26 (32.9)	35 (25.0)	42 (28.2)	88 (34.1)	191 (30.5)	11 (23.4)	35 (38.9)	59 (42.1)	42 (39.3)	147 (38.3)	
4 ครั้งขึ้นไป	18 (22.8)	22 (15.7)	14 (9.4)	20 (7.8)	74 (11.8)	10 (21.3)	8 (8.9)	6 (4.3)	2 (1.9)	26 (6.8)	
รวม	79 (100.0)	140 (100.0)	149 (100.0)	258 (100.0)	626 (100.0)	47 (100.0)	90 (100.0)	140 (100.0)	107 (100.0)	384 (100.0)	

ตารางที่ 5.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	218 (89.3)	461 (93.3)	448 (92.8)	588 (91.2)	1715 (91.9)	153 (93.3)	384 (96.2)	588 (95.8)	458 (96.4)	1583 (95.8)
เคย	26 (10.7)	33 (6.7)	35 (7.3)	57 (8.8)	151 (8.1)	11 (6.7)	15 (3.8)	26 (4.2)	17 (3.6)	69 (4.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(2)	(2)	(12)	(0)	(4)	(1)	(3)	(8)
รวม	244 (100.0)	494 (100.0)	483 (100.0)	645 (100.0)	1866 (100.0)	164 (100.0)	399 (100.0)	614 (100.0)	475 (100.0)	1652 (100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	19 (73.1)	19 (57.6)	20 (57.1)	41 (71.9)	99 (65.6)	9 (81.8)	11 (73.3)	22 (84.6)	12 (70.6)	54 (78.3)
2-3 ครั้ง	6 (23.1)	5 (15.2)	9 (25.7)	11 (19.3)	31 (20.5)	2 (18.2)	2 (13.3)	4 (15.4)	5 (29.4)	13 (18.8)
4 ครั้งขึ้นไป	1 (3.9)	9 (27.3)	6 (17.1)	5 (8.8)	21 (13.9)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.9)
รวม	26 (100.0)	33 (100.0)	35 (100.0)	57 (100.0)	151 (100.0)	11 (100.0)	15 (100.0)	26 (100.0)	17 (100.0)	69 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 5.13 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เลย	1221 (81.4)	1106 (79.6)	758 (77.8)	675 (71.5)	3760 (78.2)	1688 (88.2)	1719 (87.0)	1833 (84.4)	887 (82.3)	6127 (85.8)
เคย	279 (18.6)	283 (20.4)	216 (22.2)	269 (28.5)	1047 (21.8)	227 (11.9)	256 (13.0)	340 (15.7)	191 (17.7)	1014 (14.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(43)	(22)	(21)	(119)	(45)	(56)	(56)	(16)	(173)
รวม	1500 (100.0)	1389 (100.0)	974 (100.0)	944 (100.0)	4807 (100.0)	1915 (100.0)	1975 (100.0)	2173 (100.0)	1078 (100.0)	7141 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	170 (60.9)	154 (54.4)	128 (59.3)	148 (55.0)	600 (57.3)	153 (67.4)	164 (64.1)	207 (60.9)	118 (61.8)	642 (63.3)
2-3 ครั้ง	66 (23.7)	75 (26.5)	54 (25.0)	79 (29.4)	274 (26.2)	49 (21.6)	59 (23.1)	91 (26.8)	54 (28.3)	253 (25.0)
4 ครั้งขึ้นไป	43 (15.4)	54 (19.1)	34 (15.7)	42 (15.6)	173 (16.5)	25 (11.0)	33 (12.9)	42 (12.4)	19 (10.0)	119 (11.7)
รวม	279 (100.0)	283 (100.0)	216 (100.0)	269 (100.0)	1047 (100.0)	227 (100.0)	256 (100.0)	340 (100.0)	191 (100.0)	1014 (100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง										
ไม่เลย	1294 (86.2)	1125 (81.0)	769 (79.0)	680 (72.2)	3868 (80.5)	1785 (93.3)	1768 (89.5)	1921 (88.4)	918 (85.2)	6392 (89.5)
เคย	207 (13.8)	264 (19.0)	205 (21.1)	262 (27.8)	938 (19.5)	128 (6.7)	208 (10.5)	251 (11.6)	160 (14.8)	747 (10.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(32)	(43)	(22)	(23)	(120)	(47)	(55)	(57)	(16)	(175)
รวม	1501 (100.0)	1389 (100.0)	974 (100.0)	942 (100.0)	4806 (100.0)	1913 (100.0)	1976 (100.0)	2172 (100.0)	1078 (100.0)	7139 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	132 (63.8)	147 (55.7)	115 (56.1)	153 (58.4)	547 (58.3)	83 (64.8)	131 (63.0)	155 (61.8)	96 (60.0)	465 (62.3)
2-3 ครั้ง	46 (22.2)	74 (28.0)	61 (29.8)	74 (28.2)	255 (27.2)	31 (24.2)	59 (28.4)	68 (27.1)	52 (32.5)	210 (28.1)
4 ครั้งขึ้นไป	29 (14.0)	43 (16.3)	29 (14.2)	35 (13.4)	136 (14.5)	14 (10.9)	18 (8.7)	28 (11.2)	12 (7.5)	72 (9.6)
รวม	207 (100.0)	264 (100.0)	205 (100.0)	262 (100.0)	938 (100.0)	128 (100.0)	208 (100.0)	251 (100.0)	160 (100.0)	747 (100.0)

ตารางที่ 5.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตบตี ผลิต ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เคย	1310 (87.3)	1181 (85.1)	832 (85.5)	715 (76.0)	4038 (84.1)	1847 (96.5)	1871 (94.7)	2039 (93.8)	992 (92.0)	6749 (94.5)
เคย	190 (12.7)	207 (14.9)	141 (14.5)	226 (24.0)	764 (15.9)	67 (3.5)	104 (5.3)	134 (6.2)	86 (8.0)	391 (5.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(44)	(23)	(24)	(124)	(46)	(56)	(56)	(16)	(174)
รวม	1500 (100.0)	1388 (100.0)	973 (100.0)	941 (100.0)	4802 (100.0)	1914 (100.0)	1975 (100.0)	2173 (100.0)	1078 (100.0)	7140 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	102 (53.7)	121 (58.5)	84 (59.6)	119 (52.7)	426 (55.8)	40 (59.7)	61 (58.7)	82 (61.2)	47 (54.7)	230 (58.8)
2-3 ครั้ง	56 (29.5)	53 (25.6)	34 (24.1)	82 (36.3)	225 (29.5)	21 (31.3)	31 (29.8)	43 (32.1)	30 (34.9)	125 (32.0)
4 ครั้งขึ้นไป	32 (16.8)	33 (15.9)	23 (16.3)	25 (11.1)	113 (14.8)	6 (9.0)	12 (11.5)	9 (6.7)	9 (10.5)	36 (9.2)
รวม	190 (100.0)	207 (100.0)	141 (100.0)	226 (100.0)	764 (100.0)	67 (100.0)	104 (100.0)	134 (100.0)	86 (100.0)	391 (100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เคย	1434 (95.6)	1300 (93.7)	920 (94.9)	853 (90.7)	4507 (94.0)	1879 (98.3)	1918 (97.1)	2109 (97.0)	1032 (95.7)	6938 (97.2)
เคย	66 (4.4)	87 (6.3)	49 (5.1)	87 (9.3)	289 (6.0)	33 (1.7)	58 (2.9)	65 (3.0)	46 (4.3)	202 (2.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(45)	(27)	(25)	(130)	(48)	(55)	(55)	(16)	(174)
รวม	1500 (100.0)	1387 (100.0)	969 (100.0)	940 (100.0)	4796 (100.0)	1912 (100.0)	1976 (100.0)	2174 (100.0)	1078 (100.0)	7140 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	42 (63.6)	54 (62.1)	31 (63.3)	55 (63.2)	182 (63.0)	21 (63.6)	36 (62.1)	40 (61.5)	37 (80.4)	134 (66.3)
2-3 ครั้ง	16 (24.2)	18 (20.7)	12 (24.5)	24 (27.6)	70 (24.2)	10 (30.3)	18 (31.0)	13 (20.0)	8 (17.4)	49 (24.3)
4 ครั้งขึ้นไป	8 (12.1)	15 (17.2)	6 (12.2)	8 (9.2)	37 (12.8)	2 (6.1)	4 (6.9)	12 (18.5)	1 (2.2)	19 (9.4)
รวม	66 (100.0)	87 (100.0)	49 (100.0)	87 (100.0)	289 (100.0)	33 (100.0)	58 (100.0)	65 (100.0)	46 (100.0)	202 (100.0)
ต้องช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เคย	1362 (90.8)	1130 (81.5)	716 (73.6)	582 (62.0)	3790 (79.0)	1785 (93.4)	1659 (84.1)	1649 (75.9)	730 (67.8)	5823 (81.6)
เคย	138 (9.2)	256 (18.5)	257 (26.4)	357 (38.0)	1008 (21.0)	127 (6.6)	314 (15.9)	523 (24.1)	346 (32.2)	1310 (18.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(46)	(23)	(26)	(128)	(48)	(58)	(57)	(18)	(181)
รวม	1500 (100.0)	1386 (100.0)	973 (100.0)	939 (100.0)	4798 (100.0)	1912 (100.0)	1973 (100.0)	2172 (100.0)	1076 (100.0)	7133 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	85 (61.6)	131 (51.2)	130 (50.6)	191 (53.5)	537 (53.3)	79 (62.2)	194 (61.8)	262 (50.1)	164 (47.4)	699 (53.4)
2-3 ครั้ง	38 (27.5)	77 (30.1)	82 (31.9)	118 (33.1)	315 (31.3)	40 (31.5)	83 (26.4)	194 (37.1)	131 (37.9)	448 (34.2)
4 ครั้งขึ้นไป	15 (10.9)	48 (18.8)	45 (17.5)	48 (13.5)	156 (15.5)	8 (6.3)	37 (11.8)	67 (12.8)	51 (14.7)	163 (12.4)
รวม	138 (100.0)	256 (100.0)	257 (100.0)	357 (100.0)	1008 (100.0)	127 (100.0)	314 (100.0)	523 (100.0)	346 (100.0)	1310 (100.0)
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เคย	1249 (83.4)	1073 (77.3)	739 (75.9)	595 (63.2)	3656 (76.2)	1555 (81.4)	1566 (79.3)	1606 (73.9)	754 (70.1)	5481 (76.9)
เคย	249 (16.6)	315 (22.7)	235 (24.1)	346 (36.8)	1145 (23.9)	356 (18.6)	408 (20.7)	566 (26.1)	321 (29.9)	1651 (23.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(35)	(44)	(22)	(24)	(125)	(49)	(57)	(57)	(19)	(182)
รวม	1498 (100.0)	1388 (100.0)	974 (100.0)	941 (100.0)	4801 (100.0)	1911 (100.0)	1974 (100.0)	2172 (100.0)	1075 (100.0)	7132 (100.0)

ตารางที่ 5.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	132 (53.0)	142 (45.1)	103 (43.8)	174 (50.3)	551 (48.1)	194 (54.5)	198 (48.5)	236 (41.7)	148 (46.1)	776 (47.0)
2-3 ครั้ง	67 (26.9)	110 (34.9)	70 (29.8)	111 (32.1)	358 (31.3)	112 (31.5)	130 (31.9)	211 (37.3)	117 (36.5)	570 (34.5)
4 ครั้งขึ้นไป	50 (20.1)	63 (20.0)	62 (26.4)	61 (17.6)	236 (20.6)	50 (14.0)	80 (19.6)	119 (21.0)	56 (17.5)	305 (18.5)
รวม	249 (100.0)	315 (100.0)	235 (100.0)	346 (100.0)	1145 (100.0)	356 (100.0)	408 (100.0)	566 (100.0)	321 (100.0)	1651 (100.0)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยไม่ต้องการ										
ไม่เคย	1347 (89.8)	1171 (84.3)	801 (82.2)	717 (76.4)	4036 (84.0)	1789 (93.6)	1728 (87.5)	1771 (81.6)	803 (74.9)	6091 (85.5)
เคย	153 (10.2)	218 (15.7)	174 (17.9)	222 (23.6)	767 (16.0)	122 (6.4)	246 (12.5)	399 (18.4)	269 (25.1)	1036 (14.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(33)	(43)	(21)	(26)	(123)	(49)	(57)	(59)	(22)	(187)
รวม	1500 (100.0)	1389 (100.0)	975 (100.0)	939 (100.0)	4803 (100.0)	1911 (100.0)	1974 (100.0)	2170 (100.0)	1072 (100.0)	7127 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	86 (56.2)	93 (42.7)	83 (47.7)	84 (37.8)	346 (45.1)	67 (54.9)	118 (48.0)	162 (40.6)	104 (38.7)	451 (43.5)
2-3 ครั้ง	30 (19.6)	67 (30.7)	48 (27.6)	70 (31.5)	215 (28.0)	33 (27.1)	72 (29.3)	148 (37.1)	99 (36.8)	352 (34.0)
4 ครั้งขึ้นไป	37 (24.2)	58 (26.6)	43 (24.7)	68 (30.6)	206 (26.9)	22 (18.0)	56 (22.8)	89 (22.3)	66 (24.5)	233 (22.5)
รวม	153 (100.0)	218 (100.0)	174 (100.0)	222 (100.0)	767 (100.0)	122 (100.0)	246 (100.0)	399 (100.0)	269 (100.0)	1036 (100.0)
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เคย	1446 (96.5)	1310 (94.3)	914 (93.9)	848 (90.0)	4518 (94.1)	1891 (98.9)	1935 (98.0)	2132 (98.1)	1043 (97.4)	7001 (98.2)
เคย	53 (3.5)	79 (5.7)	59 (6.1)	94 (10.0)	285 (5.9)	21 (1.1)	39 (2.0)	42 (1.9)	28 (2.6)	130 (1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(43)	(23)	(23)	(123)	(48)	(57)	(55)	(23)	(183)
รวม	1499 (100.0)	1389 (100.0)	973 (100.0)	942 (100.0)	4803 (100.0)	1912 (100.0)	1974 (100.0)	2174 (100.0)	1071 (100.0)	7131 (100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	23 (43.4)	47 (59.5)	32 (54.2)	48 (51.1)	150 (52.6)	12 (57.1)	19 (48.7)	24 (57.1)	20 (71.4)	75 (57.7)
2-3 ครั้ง	16 (30.2)	15 (19.0)	12 (20.3)	24 (25.5)	67 (23.5)	7 (33.3)	12 (30.8)	12 (28.6)	6 (21.4)	37 (28.5)
4 ครั้งขึ้นไป	14 (26.4)	17 (21.5)	15 (25.4)	22 (23.4)	68 (23.9)	2 (9.5)	8 (20.5)	6 (14.3)	2 (7.1)	18 (13.9)
รวม	53 (100.0)	79 (100.0)	59 (100.0)	94 (100.0)	285 (100.0)	21 (100.0)	39 (100.0)	42 (100.0)	28 (100.0)	130 (100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีประสบการณ์นั้นๆ

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 5.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	332 (29.4)	284 (26.8)	187 (24.0)	139 (19.6)	942 (25.6)	422 (28.2)	362 (22.4)	371 (19.8)	110 (12.8)	1265 (21.7)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา เครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใด ชนิดหนึ่ง	797 (70.6)	776 (73.2)	592 (76.0)	569 (80.4)	2734 (74.4)	1074 (71.8)	1253 (77.6)	1501 (80.2)	747 (87.2)	4575 (78.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(404)	(372)	(217)	(257)	(1250)	(464)	(416)	(357)	(237)	(1474)
รวม	1129 (100.0)	1060 (100.0)	779 (100.0)	708 (100.0)	3676 (100.0)	1496 (100.0)	1615 (100.0)	1872 (100.0)	857 (100.0)	5840 (100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	680 (98.8)	684 (99.1)	552 (98.9)	515 (97.7)	2431 (98.7)	922 (99.0)	1148 (99.3)	1396 (98.3)	697 (98.7)	4163 (98.8)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	114 (28.3)	74 (20.6)	54 (18.9)	65 (25.9)	307 (23.6)	147 (25.3)	137 (20.5)	180 (25.0)	72 (25.1)	536 (23.8)
5-9 ครั้ง	43 (10.7)	39 (10.9)	24 (8.4)	22 (8.8)	128 (9.9)	86 (14.8)	84 (12.6)	98 (13.6)	45 (15.7)	313 (13.9)
≥10 ครั้ง	101 (25.1)	71 (19.8)	64 (22.4)	53 (21.1)	289 (22.3)	92 (15.9)	117 (17.5)	154 (21.4)	51 (17.8)	414 (18.4)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	140 (34.7)	164 (45.7)	138 (48.3)	103 (41.0)	545 (42.0)	245 (42.2)	318 (47.6)	273 (38.0)	116 (40.4)	952 (42.2)
จำไม่ได้	5 (1.2)	11 (3.1)	6 (2.1)	8 (3.2)	30 (2.3)	10 (1.7)	12 (1.8)	14 (2.0)	3 (1.1)	39 (1.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(277)	(325)	(266)	(264)	(1132)	(342)	(480)	(677)	(410)	(1909)
รวม	403 (100.0)	359 (100.0)	286 (100.0)	251 (100.0)	1299 (100.0)	580 (100.0)	668 (100.0)	719 (100.0)	287 (100.0)	2254 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	404 (71.1)	418 (71.0)	405 (81.7)	316 (72.6)	1543 (73.9)	538 (67.6)	766 (73.4)	1001 (80.9)	469 (74.7)	2774 (74.9)
เบียร์	448 (82.1)	494 (85.8)	432 (89.8)	378 (85.1)	1752 (85.6)	657 (86.2)	925 (88.9)	1124 (92.1)	555 (87.5)	3261 (89.2)
Spy/ไวน์	249 (47.8)	291 (50.8)	257 (53.8)	199 (48.1)	996 (50.2)	378 (52.9)	614 (60.1)	780 (68.1)	349 (56.1)	2121 (60.6)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	77 (15.0)	106 (18.8)	95 (20.0)	81 (20.2)	359 (18.4)	97 (14.6)	222 (22.0)	282 (26.0)	111 (18.0)	712 (21.1)
อื่นๆ	8 (1.6)	1 (0.2)	2 (0.4)	3 (0.8)	14 (0.7)	3 (0.5)	1 (0.1)	3 (0.3)	4 (0.7)	11 (0.3)
วิทยุ										
เคยเห็น*	345 (72.0)	273 (51.8)	181 (47.0)	267 (78.3)	1066 (61.6)	354 (66.0)	407 (50.1)	418 (47.5)	305 (70.0)	1484 (55.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	76 (46.1)	41 (37.6)	20 (26.7)	52 (45.6)	189 (40.8)	90 (45.5)	79 (37.8)	67 (37.4)	39 (35.8)	275 (39.6)
5-9 ครั้ง	11 (6.7)	13 (11.9)	6 (8.0)	7 (6.1)	37 (8.0)	18 (9.1)	22 (10.5)	20 (11.2)	9 (8.3)	69 (9.9)
≥10 ครั้ง	31 (18.8)	13 (11.9)	11 (14.7)	15 (13.2)	70 (15.1)	5 (2.5)	18 (8.6)	26 (14.5)	18 (16.5)	67 (9.6)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	44 (26.7)	39 (35.8)	37 (49.3)	40 (35.1)	160 (34.6)	80 (40.4)	88 (42.1)	60 (33.5)	43 (39.5)	271 (39.0)
จำไม่ได้	3 (1.8)	3 (2.8)	1 (1.3)	0 (0.0)	7 (1.5)	5 (2.5)	2 (1.0)	6 (3.4)	0 (0.0)	13 (1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(180)	(164)	(106)	(153)	(603)	(156)	(198)	(239)	(196)	(789)
รวม	165 (100.0)	109 (100.0)	75 (100.0)	114 (100.0)	463 (100.0)	198 (100.0)	209 (100.0)	179 (100.0)	109 (100.0)	695 (100.0)

ตารางที่ 5.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	133 (56.1)	121 (61.7)	85 (64.4)	119 (60.7)	458 (60.2)	152 (57.4)	211 (64.5)	241 (69.9)	162 (65.1)	766 (64.6)
เบียร์	147 (62.6)	140 (72.9)	107 (81.1)	144 (70.6)	538 (70.5)	172 (65.4)	250 (76.2)	272 (82.4)	186 (73.8)	880 (75.0)
Spy/ไวน์	60 (26.4)	76 (39.4)	40 (30.3)	63 (32.6)	239 (32.1)	69 (27.9)	143 (44.8)	144 (44.6)	76 (30.4)	432 (37.9)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	27 (12.0)	27 (14.4)	19 (14.4)	34 (18.1)	107 (14.6)	26 (10.6)	74 (23.2)	64 (20.3)	33 (13.3)	197 (17.5)
อื่นๆ	3 (0.5)	1 (0.1)	3 (0.3)	4 (0.7)	11 (0.3)	4 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	5 (0.7)
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	480 (85.6)	465 (77.9)	359 (76.1)	388 (89.8)	1692 (82.1)	598 (83.6)	730 (75.2)	838 (75.0)	463 (85.9)	2629 (78.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	106 (41.6)	83 (38.1)	42 (25.5)	62 (36.5)	293 (36.3)	150 (42.5)	132 (35.0)	163 (42.0)	63 (37.1)	508 (39.4)
5-9 ครั้ง	31 (12.2)	26 (11.9)	21 (12.7)	24 (14.1)	102 (12.6)	37 (10.5)	36 (9.6)	43 (11.1)	23 (13.5)	139 (10.8)
≥10 ครั้ง	42 (16.5)	26 (11.9)	17 (10.3)	24 (14.1)	109 (13.5)	37 (10.5)	35 (9.3)	44 (11.3)	20 (11.8)	136 (10.6)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	72 (28.2)	76 (34.9)	81 (49.1)	57 (33.5)	286 (35.4)	122 (34.6)	164 (43.5)	129 (33.3)	61 (35.9)	476 (37.0)
จำไม่ได้	4 (1.6)	7 (3.2)	4 (2.4)	3 (1.8)	18 (2.2)	7 (2.0)	10 (2.7)	9 (2.3)	3 (1.8)	29 (2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(225)	(247)	(194)	(218)	(884)	(245)	(353)	(450)	(293)	(1341)
รวม	255 (100.0)	218 (100.0)	165 (100.0)	170 (100.0)	808 (100.0)	353 (100.0)	377 (100.0)	388 (100.0)	170 (100.0)	1288 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	204 (57.0)	215 (60.1)	220 (75.3)	200 (65.4)	839 (63.9)	281 (60.8)	383 (60.9)	499 (72.4)	259 (64.9)	1422 (65.3)
เบียร์	261 (72.5)	280 (78.7)	233 (80.9)	240 (78.4)	1014 (77.4)	337 (74.4)	510 (81.3)	599 (86.6)	302 (76.1)	1748 (80.6)
Spy/ไวน์	127 (36.8)	161 (44.7)	148 (51.8)	154 (52.7)	590 (46.0)	189 (44.1)	333 (53.5)	398 (60.3)	195 (48.9)	1115 (52.8)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	46 (13.6)	60 (17.1)	55 (19.3)	52 (18.6)	213 (17.0)	50 (12.4)	114 (18.5)	129 (20.8)	56 (14.2)	349 (17.2)
อื่นๆ	3 (0.9)	1 (0.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	6 (0.5)	5 (1.3)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	6 (0.3)
นิตยสาร										
เคยเห็น*	365 (74.0)	336 (60.4)	253 (60.0)	266 (78.2)	1220 (67.4)	420 (70.0)	547 (61.9)	643 (63.4)	345 (75.3)	1955 (66.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	87 (50.3)	50 (37.3)	31 (29.3)	44 (41.1)	212 (40.8)	114 (45.4)	112 (39.7)	103 (38.4)	52 (43.7)	381 (41.4)
5-9 ครั้ง	15 (8.7)	14 (10.5)	13 (12.3)	10 (9.4)	52 (10.0)	19 (7.6)	28 (9.9)	28 (10.5)	10 (8.4)	85 (9.2)
≥10 ครั้ง	18 (10.4)	16 (11.9)	9 (8.5)	11 (10.3)	54 (10.4)	15 (6.0)	25 (8.9)	29 (10.8)	13 (10.9)	82 (8.9)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	50 (28.9)	52 (38.8)	49 (46.2)	38 (35.5)	189 (36.4)	97 (38.7)	112 (39.7)	102 (38.1)	42 (35.3)	353 (38.4)
จำไม่ได้	3 (1.7)	2 (1.5)	4 (3.8)	4 (3.7)	13 (2.5)	6 (2.4)	5 (1.8)	6 (2.2)	2 (1.7)	19 (2.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(192)	(202)	(147)	(159)	(700)	(169)	(265)	(375)	(226)	(1035)
รวม	173 (100.0)	134 (100.0)	106 (100.0)	107 (100.0)	520 (100.0)	251 (100.0)	282 (100.0)	268 (100.0)	119 (100.0)	920 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	126 (49.8)	137 (55.0)	141 (71.9)	112 (57.4)	516 (57.8)	160 (49.5)	275 (60.8)	353 (67.8)	173 (60.1)	961 (60.7)
เบียร์	173 (68.1)	178 (71.8)	147 (78.2)	127 (64.8)	625 (70.5)	202 (63.9)	332 (74.1)	413 (78.5)	202 (69.4)	1149 (72.7)

ตารางที่ 5.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
Spy/ไวน์	98 (40.3)	116 (47.0)	103 (54.5)	102 (52.9)	419 (48.1)	162 (52.3)	285 (63.8)	340 (67.6)	163 (56.4)	950 (61.3)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	30 (12.6)	48 (19.8)	46 (24.5)	37 (20.4)	161 (19.0)	41 (14.0)	100 (22.6)	96 (20.6)	38 (13.2)	275 (18.4)
อื่นๆ	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	1 (0.4)	3 (0.2)
แผ่นป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	489 (85.0)	447 (76.0)	351 (74.8)	395 (90.0)	1682 (81.2)	587 (82.6)	688 (73.4)	792 (72.4)	452 (85.0)	2519 (76.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	105 (41.3)	68 (34.2)	52 (32.1)	62 (35.4)	287 (36.3)	141 (40.6)	126 (33.9)	124 (35.0)	69 (42.3)	460 (37.2)
5-9 ครั้ง	31 (12.2)	28 (14.1)	13 (8.0)	22 (12.6)	94 (11.9)	41 (11.8)	44 (11.8)	39 (11.0)	11 (6.8)	135 (10.9)
≥10 ครั้ง	42 (16.5)	22 (11.1)	17 (10.5)	24 (13.7)	105 (13.3)	24 (6.9)	40 (10.8)	58 (16.4)	14 (8.6)	136 (11.0)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	73 (28.7)	76 (38.2)	77 (47.5)	62 (35.4)	288 (36.5)	132 (38.0)	156 (41.9)	124 (35.0)	66 (40.5)	478 (38.7)
จำไม่ได้	3 (1.2)	5 (2.5)	3 (1.9)	5 (2.9)	16 (2.0)	9 (2.6)	6 (1.6)	9 (2.5)	3 (1.8)	27 (2.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(235)	(248)	(189)	(220)	(892)	(240)	(317)	(438)	(289)	(1284)
84)รวม	254 (100.0)	199 (100.0)	162 (100.0)	175 (100.0)	790 (100.0)	347 (100.0)	372 (100.0)	354 (100.0)	163 (100.0)	1236 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น* (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	120 (42.9)	139 (50.6)	121 (63.4)	145 (58.7)	525 (52.9)	210 (54.4)	274 (55.9)	312 (63.0)	155 (54.8)	951 (57.5)
เบียร์	281 (76.8)	287 (80.2)	248 (85.5)	265 (83.9)	1081 (81.3)	364 (79.1)	502 (85.1)	562 (88.2)	339 (87.4)	1767 (85.2)
Spy/ไวน์	128 (36.7)	161 (46.0)	130 (45.5)	121 (41.3)	540 (42.3)	179 (41.5)	290 (49.5)	354 (57.8)	161 (42.3)	984 (49.0)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	44 (12.8)	58 (16.7)	44 (15.6)	47 (16.7)	193 (15.4)	53 (12.9)	104 (18.0)	116 (20.0)	48 (12.6)	321 (16.5)
อื่นๆ	3 (0.9)	2 (0.6)	2 (0.7)	2 (0.7)	9 (0.7)	3 (0.7)	3 (0.5)	1 (0.2)	3 (0.8)	10 (0.5)
แผ่นปลิว										
เคยเห็น*	264 (59.1)	239 (47.1)	139 (38.2)	186 (66.9)	828 (51.9)	311 (59.2)	311 (40.2)	291 (35.1)	218 (57.7)	1131 (45.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	51 (49.5)	38 (45.2)	20 (37.0)	31 (43.1)	140 (44.7)	71 (44.7)	59 (40.1)	50 (44.6)	26 (32.9)	206 (41.5)
5-9 ครั้ง	7 (6.8)	9 (10.7)	4 (7.4)	8 (11.1)	28 (9.0)	11 (6.9)	9 (6.1)	9 (8.0)	13 (16.5)	42 (8.5)
≥10 ครั้ง	9 (8.7)	15 (17.9)	4 (7.4)	9 (12.5)	37 (11.8)	8 (5.0)	20 (13.6)	12 (10.7)	8 (10.1)	48 (9.7)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	34 (33.0)	22 (26.2)	25 (46.3)	24 (33.3)	105 (33.6)	67 (42.1)	57 (38.8)	40 (35.7)	30 (38.0)	194 (39.0)
จำไม่ได้	2 (1.9)	0 (0.0)	1 (1.9)	0 (0.0)	3 (1.0)	2 (1.3)	2 (1.4)	1 (0.9)	2 (2.5)	7 (1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(161)	(155)	(85)	(114)	(515)	(152)	(164)	(179)	(139)	(634)
รวม	103 (100.0)	84 (100.0)	54 (100.0)	72 (100.0)	313 (100.0)	159 (100.0)	147 (100.0)	112 (100.0)	79 (100.0)	497 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น* (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	93 (53.1)	87 (54.7)	62 (64.6)	74 (57.8)	316 (56.6)	127 (55.7)	170 (68.3)	156 (69.3)	111 (64.9)	564 (64.6)
เบียร์	101 (58.7)	120 (74.1)	78 (81.3)	88 (65.2)	387 (68.5)	132 (59.7)	183 (74.7)	188 (81.4)	122 (70.5)	625 (71.8)
Spy/ไวน์	61 (36.5)	77 (49.4)	46 (47.9)	50 (39.1)	234 (42.8)	90 (41.9)	124 (51.0)	120 (52.6)	81 (47.1)	415 (48.4)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	25 (15.6)	38 (24.5)	18 (18.8)	26 (20.8)	107 (20.0)	32 (15.8)	65 (27.0)	46 (21.9)	30 (17.5)	173 (21.0)
อื่นๆ	2 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	3 (0.6)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.2)	3 (0.4)

ตารางที่ 5.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ผ่านปิดประกาศ										
เคยเห็น*	303 (66.2)	259 (50.2)	157 (42.4)	234 (74.3)	953 (57.4)	308 (59.2)	317 (40.9)	328 (38.5)	234 (61.3)	1187 (46.9)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	56 (44.1)	48 (46.6)	19 (29.2)	35 (38.5)	158 (40.9)	73 (43.7)	55 (37.2)	51 (40.8)	25 (30.9)	204 (39.2)
5-9 ครั้ง	14 (11.0)	10 (9.7)	7 (10.8)	3 (3.3)	34 (8.8)	7 (4.2)	12 (8.1)	9 (7.2)	8 (9.9)	36 (6.9)
≥10 ครั้ง	14 (11.0)	10 (9.7)	7 (10.8)	16 (17.6)	47 (12.2)	15 (9.0)	13 (8.8)	17 (13.6)	12 (14.8)	57 (10.9)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	38 (29.9)	34 (33.0)	31 (47.7)	34 (37.4)	137 (35.5)	69 (41.3)	65 (43.9)	46 (36.8)	34 (42.0)	214 (41.1)
จำไม่ได้	5 (3.9)	1 (1.0)	1 (1.5)	3 (3.3)	10 (2.6)	3 (1.8)	3 (2.0)	2 (1.6)	2 (2.5)	10 (1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(176)	(156)	(92)	(143)	(567)	(141)	(169)	(203)	(153)	(666)
รวม	127 (100.0)	103 (100.0)	65 (100.0)	91 (100.0)	386 (100.0)	167 (100.0)	148 (100.0)	125 (100.0)	81 (100.0)	521 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	124 (59.3)	117 (64.6)	83 (71.6)	115 (70.6)	439 (65.6)	125 (53.7)	171 (67.6)	187 (72.8)	131 (70.4)	614 (66.1)
เบียร์	133 (64.9)	129 (71.7)	87 (77.0)	116 (69.5)	465 (69.9)	150 (65.8)	195 (78.3)	219 (83.0)	149 (78.8)	713 (76.7)
Spy/ไวน์	81 (40.1)	84 (46.9)	50 (44.3)	72 (45.0)	287 (43.9)	74 (33.3)	130 (52.9)	137 (55.0)	82 (44.6)	423 (47.0)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	37 (18.5)	38 (21.2)	21 (18.6)	29 (18.8)	125 (19.4)	30 (13.7)	79 (32.1)	60 (25.4)	32 (17.3)	201 (22.7)
อื่นๆ	4 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (0.6)	2 (0.9)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.4)
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	402 (77.6)	393 (69.2)	273 (63.9)	300 (82.9)	1368 (73.0)	518 (76.2)	587 (64.8)	664 (65.4)	386 (78.5)	2155 (69.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	86 (43.7)	45 (27.0)	29 (22.8)	49 (38.9)	209 (33.9)	121 (38.9)	86 (30.9)	96 (31.7)	29 (23.4)	332 (32.7)
5-9 ครั้ง	18 (9.1)	19 (11.4)	11 (8.7)	10 (7.9)	58 (9.4)	33 (10.6)	24 (8.6)	25 (8.3)	20 (16.1)	102 (10.0)
≥10 ครั้ง	33 (16.8)	23 (13.8)	22 (17.3)	24 (19.1)	102 (16.5)	28 (9.0)	40 (14.4)	60 (19.8)	23 (18.6)	151 (14.9)
บางครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลายครั้ง	58 (29.4)	73 (43.7)	64 (50.4)	42 (33.3)	237 (38.4)	124 (39.9)	123 (44.2)	114 (37.6)	50 (40.3)	411 (40.5)
จำไม่ได้	2 (1.0)	7 (4.2)	1 (0.8)	1 (0.8)	11 (1.8)	5 (1.6)	5 (1.8)	8 (2.6)	2 (1.6)	20 (2.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(205)	(226)	(146)	(174)	(751)	(207)	(309)	(361)	(262)	(1139)
รวม	197 (100.0)	167 (100.0)	127 (100.0)	126 (100.0)	617 (100.0)	311 (100.0)	278 (100.0)	303 (100.0)	124 (100.0)	1016 (100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	174 (59.4)	211 (70.1)	174 (77.7)	160 (71.1)	719 (68.9)	284 (68.9)	359 (72.4)	444 (78.6)	238 (74.4)	1325 (73.9)
เบียร์	213 (74.2)	238 (79.6)	190 (86.4)	161 (72.5)	802 (78.0)	284 (71.9)	413 (82.8)	470 (84.1)	268 (83.2)	1435 (80.9)
Spy/ไวน์	147 (51.9)	177 (59.4)	142 (64.6)	127 (57.0)	593 (57.9)	231 (58.8)	339 (68.8)	421 (76.1)	221 (69.1)	1212 (68.9)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	56 (20.2)	92 (31.6)	64 (29.4)	70 (33.3)	282 (28.3)	93 (25.2)	165 (33.9)	217 (41.9)	82 (26.0)	557 (33.0)
อื่นๆ	6 (2.3)	4 (1.4)	1 (0.5)	2 (1.0)	13 (1.3)	3 (0.9)	1 (0.2)	4 (0.8)	2 (0.6)	10 (0.6)

ตารางที่ 5.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเห็น/ได้ยินโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น)*										
16.00-20.00 น.	287 (40.5)	213 (30.8)	117 (21.1)	136 (26.4)	753 (30.5)	396 (41.4)	375 (33.1)	374 (26.6)	221 (32.1)	1366 (32.7)
20.00-24.00 น.	220 (31.0)	251 (36.3)	214 (38.6)	187 (36.3)	872 (35.3)	318 (33.3)	437 (38.6)	593 (42.1)	250 (36.3)	1598 (38.2)
24.00-04.00 น.	100 (14.1)	159 (23.0)	184 (33.2)	139 (27.0)	582 (23.6)	96 (10.0)	209 (18.5)	339 (24.1)	148 (21.5)	792 (18.9)
04.00-08.00 น.	7 (1.0)	6 (0.9)	5 (0.9)	6 (1.2)	24 (1.0)	11 (1.2)	7 (0.6)	6 (0.4)	6 (0.9)	30 (0.7)
08.00-12.00 น.	40 (5.6)	30 (4.3)	16 (2.9)	28 (5.4)	114 (4.6)	74 (7.7)	44 (3.9)	41 (2.9)	25 (3.6)	184 (4.4)
12.00-16.00 น.	55 (7.76)	33 (4.77)	18 (3.25)	19 (3.69)	125 (5.06)	61 (6.38)	60 (5.30)	55 (3.91)	38 (5.52)	214 (5.11)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(88)	(84)	(38)	(54)	(264)	(118)	(121)	(93)	(58)	(390)
รวม	709 (100.0)	692 (100.0)	554 (100.0)	515 (100.0)	2470 (100.0)	956 (100.0)	1132 (100.0)	1408 (100.0)	688 (100.0)	4184 (100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	411 (56.4)	398 (55.5)	238 (41.5)	241 (45.5)	1288 (50.5)	570 (56.9)	678 (57.4)	658 (45.6)	328 (46.7)	2234 (51.6)
จำได้	318 (43.6)	319 (44.5)	335 (58.5)	289 (54.5)	1261 (49.5)	432 (43.1)	504 (42.6)	786 (54.4)	374 (53.3)	2096 (48.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(68)	(59)	(19)	(39)	(185)	(72)	(70)	(57)	(44)	(243)
รวม	729 (100.0)	717 (100.0)	573 (100.0)	530 (100.0)	2549 (100.0)	1002 (100.0)	1182 (100.0)	1444 (100.0)	702 (100.0)	4330 (100.0)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง	ช้าง
อันดับ2	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	รีเจนท์	ลิโอ	รีเจนท์
อันดับ3	เบียร์อาชา	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	ลิโอ	รีเจนท์	ลิโอ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	ลิโอ	Spy Wine Cooler/ Bacardi	Heineken	รีเจนท์	Spy Wine Cooler/ Bacardi
อันดับ2	ช้าง	Spy Wine Cooler/ Bacardi	Heineken	รีเจนท์	รีเจนท์	Spy Wine Cooler/ Bacardi	ลิโอ	Spy Wine Cooler/ Bacardi	ลิโอ	ลิโอ
อันดับ3	เบียร์อาชา	รีเจนท์	Johnny Walker	Johnny Walker	Johnny Walker	ช้าง	รีเจนท์	รีเจนท์	สิงห์	รีเจนท์

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ

ประสบการณ์การใช้สารเสพติด สารเสพติดที่รู้จักและเคยเห็นของจริง

ตารางที่ 5.15 ชนิดของสิ่งเสพติดที่รู้จัก และเคยเห็นของจริง (ไม่รวมบุหรี่ และสุรา) (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชนิดสารเสพติดที่รู้จักมากที่สุด	3 อันดับแรก (ไม่รวมสุรา บุหรี่)									
อันดับ 1	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
อันดับ 2	กัญชา	กัญชา	กัญชา	ยาบ้า	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ยาอี/ยาเลิฟ	ฝิ่น	ฝิ่น	ฝิ่น	ยาอี/ยาเลิฟ	ยาอี/ยาเลิฟ	ฝิ่น	ฝิ่น	สารระเหย	ฝิ่น
ชนิดสารเสพติดที่เคยเห็นของจริงมากที่สุด	3 อันดับแรก									
อันดับ 1	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	กัญชา	สารระเหย	สารระเหย	สารระเหย	สารระเหย	สารระเหย
อันดับ 2	สารระเหย	สารระเหย	ยาบ้า	ยาบ้า	สารระเหย	ยานอนหลับ/ยานอนหลับ/ โดมิกูม	โดมิกูม	กัญชา	กัญชา	กัญชา
อันดับ 3	ยาบ้า	ยาบ้า	สารระเหย	สารระเหย	ยาบ้า	กัญชา	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า	ยาบ้า
สถานที่ที่เคยเห็นสารเสพติดครั้งสุดท้าย	ยาบ้า : สถานที่ 3 อันดับแรก									
อันดับ 1	คนขายสารเสพติด	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	ที่ทำงาน	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด
อันดับ 2	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	เพื่อนใช้	คนขายสารเสพติด	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	ร้านค้าทั่วไป	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป
อันดับ 3	นิทรรศการ/การนิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	แสดงต่าง ๆ	ร้านค้าทั่วไป	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	ตำรวจ	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้
กัญชา : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	คนขายสารเสพติด	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	เพื่อนใช้	ที่ทำงาน	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ	คนขายสารเสพติด	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ
อันดับ 2	ร้านค้าทั่วไป	ตำรวจ	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด	เพื่อนใช้	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ	ร้านค้าทั่วไป	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป
อันดับ 3	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	เพื่อนใช้/ ใช้เอง	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้	ที่ทำงาน	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	เพื่อนใช้	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด
กระท่อม : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	-	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	เพื่อนใช้	คนขายสารเสพติด	คนขายสารเสพติด	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	-	คนขายสารเสพติด
อันดับ 2	-	คนขายสารเสพติด	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	-	ร้านค้าทั่วไป	ใช้เอง	แถวบ้านมีชาย/ นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	มีคนใช้	-	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้
อันดับ 3	-	ร้านขายยา	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	-	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	ที่ทำงาน	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	-	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ
สารระเหย : สถานที่ 3 อันดับแรก										
อันดับ 1	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	คนขายสารเสพติด	ร้านค้าทั่วไป	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้	คนขายสารเสพติด
อันดับ 2	ที่ทำงาน	ร้านขายยา	เพื่อนใช้	ที่ทำงาน	เพื่อนใช้	ร้านค้าทั่วไป	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	นิทรรศการ/การ แสดงต่าง ๆ	ร้านค้าทั่วไป
อันดับ 3	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	แถวบ้านมีชาย/ มีคนใช้	ร้านค้าทั่วไป	เพื่อนใช้	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	ญาติ/คนใน ครัวเรือนใช้	เพื่อนใช้	เพื่อนใช้	ร้านค้าทั่วไป	นิทรรศการ/ การแสดงต่าง ๆ

ตารางที่ 5.16 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	129 (8.7)	282 (20.7)	211 (22.5)	399 (43.0)	1021 (21.7)	26 (1.4)	70 (3.6)	99 (4.7)	113 (10.8)	308 (4.4)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดรม	46 (3.1)	39 (2.9)	44 (4.7)	55 (5.9)	184 (3.9)	21 (1.1)	27 (1.4)	45 (2.1)	28 (2.7)	121 (1.7)
c. ยาแก้ไอผสมประสาท/ยาคลายเครียด	15 (1.0)	29 (2.1)	27 (2.9)	25 (2.7)	96 (2.0)	18 (0.9)	18 (0.9)	53 (2.5)	18 (1.7)	107 (1.5)
d. ยานอนหลับ	66 (4.4)	81 (6.0)	56 (6.0)	59 (6.4)	262 (5.6)	76 (4.0)	121 (6.2)	179 (8.4)	100 (9.6)	476 (6.8)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	27 (1.8)	52 (3.8)	58 (6.2)	81 (8.7)	218 (4.6)	5 (0.3)	7 (0.4)	6 (0.3)	5 (0.5)	23 (0.3)
f. กัญชา	39 (2.6)	71 (5.2)	111 (11.8)	189 (20.3)	410 (8.7)	5 (0.3)	13 (0.7)	12 (0.6)	26 (2.5)	56 (0.8)
g. ฝิ่น	21 (1.4)	16 (1.2)	16 (1.7)	22 (2.4)	75 (1.6)	2 (0.1)	6 (0.3)	2 (0.1)	3 (0.3)	13 (0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	16 (1.1)	13 (1.0)	17 (1.8)	21 (2.3)	67 (1.4)	3 (0.2)	6 (0.3)	5 (0.2)	1 (0.1)	15 (0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	10 (0.7)	15 (1.1)	10 (1.1)	13 (1.4)	48 (1.0)	3 (0.2)	5 (0.3)	4 (0.2)	0 (0.0)	12 (0.2)
j. โคเคน	14 (0.9)	12 (0.9)	10 (1.1)	10 (1.1)	46 (1.0)	2 (0.1)	6 (0.3)	2 (0.1)	0 (0.0)	10 (0.1)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	7 (0.5)	16 (1.2)	11 (1.2)	15 (1.6)	49 (1.0)	3 (0.2)	6 (0.3)	4 (0.2)	2 (0.2)	15 (0.2)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	10 (0.7)	24 (1.8)	30 (3.2)	53 (5.7)	117 (2.5)	16 (0.8)	10 (0.5)	8 (0.4)	4 (0.4)	38 (0.5)
m. ยาบ้า	9 (0.6)	25 (1.9)	31 (3.3)	80 (8.6)	145 (3.1)	2 (0.1)	8 (0.4)	10 (0.5)	14 (1.3)	34 (0.5)
n. ไอซ์	13 (0.9)	12 (0.9)	13 (1.4)	24 (2.6)	62 (1.3)	2 (0.1)	6 (0.3)	5 (0.2)	2 (0.2)	15 (0.2)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 5.17 ชนิดของสิ่งเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	116 (8.0)	242 (18.3)	190 (20.8)	351 (39.8)	899 (19.6)	30 (1.6)	63 (3.2)	88 (4.2)	113 (10.9)	294 (4.2)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดรม	43 (3.0)	55 (4.1)	37 (4.1)	56 (6.3)	191 (4.2)	20 (1.1)	35 (1.8)	34 (1.6)	27 (2.6)	116 (1.7)
c. ยาแก้ไอผสมประสาท/ยาคลายเครียด	20 (1.4)	24 (1.8)	23 (2.5)	29 (3.3)	96 (2.1)	19 (1.0)	20 (1.0)	43 (2.1)	14 (1.4)	96 (1.4)
d. ยานอนหลับ	61 (4.2)	56 (4.2)	50 (5.5)	54 (6.1)	221 (4.8)	65 (3.5)	99 (5.1)	131 (6.2)	78 (7.5)	373 (5.4)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	30 (2.1)	46 (3.5)	34 (3.8)	70 (7.8)	180 (3.9)	4 (0.2)	8 (0.4)	5 (0.2)	4 (0.4)	21 (0.3)
f. กัญชา	31 (2.1)	67 (5.0)	90 (9.9)	159 (17.8)	347 (7.6)	7 (0.4)	11 (0.6)	10 (0.5)	17 (1.6)	45 (0.7)
g. ฝิ่น	19 (1.3)	14 (1.1)	15 (1.7)	26 (2.9)	74 (1.6)	3 (0.2)	4 (0.2)	3 (0.1)	0 (0.0)	10 (0.1)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	18 (1.2)	11 (0.8)	17 (1.9)	23 (2.6)	69 (1.5)	4 (0.2)	7 (0.4)	5 (0.2)	0 (0.0)	16 (0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	16 (1.1)	11 (0.8)	16 (1.8)	15 (1.7)	58 (1.3)	5 (0.3)	5 (0.3)	5 (0.2)	0 (0.0)	15 (0.2)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	15 (1.0)	11 (0.8)	17 (1.9)	17 (1.9)	60 (1.3)	4 (0.2)	5 (0.3)	5 (0.2)	0 (0.0)	14 (0.2)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	24 (1.7)	23 (1.7)	31 (3.4)	42 (4.7)	120 (2.6)	19 (1.0)	7 (0.4)	6 (0.3)	3 (0.3)	35 (0.5)
l. ยาบ้า	15 (1.0)	22 (1.7)	34 (3.8)	65 (7.3)	136 (3.0)	4 (0.2)	7 (0.4)	6 (0.3)	7 (0.7)	24 (0.3)
m. ไอซ์	15 (1.0)	9 (0.7)	16 (1.8)	22 (2.5)	62 (1.4)	5 (0.3)	6 (0.3)	4 (0.2)	2 (0.2)	17 (0.2)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 5.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสิ่งเสพติด	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	34 (29.3)	85 (35.1)	69 (36.3)	140 (39.9)	328 (36.5)	10 (33.3)	22 (34.9)	26 (29.6)	38 (33.6)	96 (32.7)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	9 (20.9)	13 (23.6)	12 (32.4)	8 (14.3)	42 (22.0)	9 (45.0)	10 (28.6)	5 (14.7)	3 (11.1)	27 (23.3)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	2 (10.0)	5 (20.8)	5 (21.7)	3 (10.3)	15 (15.6)	8 (42.1)	6 (30.0)	9 (20.9)	3 (21.4)	26 (27.1)
d. ยานอนหลับ	15 (24.6)	12 (21.4)	10 (20.0)	11 (20.4)	48 (21.7)	23 (35.4)	28 (28.3)	24 (18.3)	15 (19.2)	90 (24.1)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	2 (6.7)	10 (21.7)	7 (20.6)	15 (21.4)	34 (18.9)	2 (50.0)	2 (25.0)	0 (0)	2 (50.0)	6 (28.6)
f. กัญชา	2 (6.5)	12 (17.9)	18 (20.0)	43 (27.0)	75 (21.6)	2 (28.6)	2 (18.2)	2 (20.0)	10 (58.8)	16 (35.6)
g. มึน	0 (0.0)	2 (14.3)	3 (20.0)	7 (26.9)	12 (16.2)	1 (33.3)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (20.0)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0 (0.0)	1 (9.1)	4 (23.5)	4 (17.4)	9 (13.0)	1 (25.0)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (18.8)
i. ยาเค (เคตามีน)	0 (0.0)	1 (9.1)	3 (18.8)	2 (13.3)	6 (10.3)	1 (20.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0 (0.0)	1 (9.1)	4 (23.5)	3 (17.7)	8 (13.3)	1 (25.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (21.4)
k. สารระเหย (ทินเนอร์) กาว เบนซิน)	2 (8.3)	4 (17.4)	8 (25.8)	8 (19.1)	22 (18.3)	5 (26.3)	3 (42.9)	0 (0.0)	1 (33.3)	9 (25.7)
l. ยาบ้า	1 (6.7)	4 (18.2)	6 (17.7)	20 (30.8)	31 (22.8)	1 (25.0)	4 (57.1)	1 (16.7)	6 (85.7)	12 (50.0)
m. ไอซ์	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (31.3)	5 (22.7)	10 (16.1)	2 (40.0)	2 (33.3)	0 (0.0)	2 (100.0)	6 (35.3)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สิ่งเสพติด

ตารางที่ 5.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	569 (62.6)	539 (65.4)	453 (70.5)	387 (68.3)	1948 (66.2)	842 (65.2)	944 (66.5)	1070 (65.3)	445 (57.6)	3301 (64.5)
มี	340 (37.4)	285 (34.6)	190 (29.6)	180 (31.8)	995 (33.8)	449 (34.8)	475 (33.5)	568 (34.7)	328 (42.4)	1820 (35.5)
ไม่ระบุ(จำนวน)	(624)	(608)	(353)	(398)	(1983)	(669)	(612)	(591)	(321)	(2193)
รวม	909 (100.0)	824 (100.0)	643 (100.0)	567 (100.0)	2943 (100.0)	1291 (100.0)	1419 (100.0)	1638 (100.0)	773 (100.0)	5121 (100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
แม่	59 (17.4)	52 (18.3)	30 (15.8)	27 (15.0)	168 (16.9)	70 (15.6)	83 (17.5)	72 (12.7)	46 (14.0)	271 (14.9)
พ่อ	175 (51.5)	152 (53.3)	123 (64.7)	87 (48.3)	537 (54.0)	219 (48.8)	249 (52.4)	281 (49.5)	189 (57.6)	938 (51.5)
พี่น้อง	56 (16.5)	56 (19.7)	44 (23.2)	40 (22.2)	196 (19.7)	65 (14.5)	94 (19.8)	112 (19.7)	86 (26.2)	357 (19.6)
ปู่/ย่า	51 (15.0)	49 (17.2)	25 (13.2)	27 (15.0)	152 (15.3)	38 (8.5)	44 (9.3)	37 (6.5)	27 (8.2)	146 (8.0)
ตา/ยาย	57 (16.8)	44 (15.4)	29 (15.3)	18 (10.0)	148 (14.9)	45 (10.0)	57 (12.0)	52 (9.2)	43 (13.1)	197 (10.8)
ญาติฝ่ายพ่อ	100 (29.4)	96 (33.7)	67 (35.3)	53 (29.4)	316 (31.8)	135 (30.1)	159 (33.5)	159 (28.0)	118 (36.0)	571 (31.4)
ญาติฝ่ายแม่	92 (27.1)	87 (30.5)	63 (33.2)	50 (27.8)	292 (29.4)	122 (27.2)	144 (30.3)	143 (25.2)	101 (30.8)	510 (28.0)
แฟน	27 (7.9)	26 (9.1)	12 (6.3)	22 (12.2)	87 (8.7)	22 (4.9)	69 (14.5)	86 (15.1)	88 (26.8)	265 (14.6)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	8 (2.4)	11 (3.9)	2 (1.1)	4 (2.2)	25 (2.5)	6 (1.3)	10 (2.1)	3 (0.5)	6 (1.8)	25 (1.4)
พ่อ	134 (39.4)	96 (33.7)	94 (49.5)	54 (30.0)	378 (38.0)	151 (33.6)	204 (43.0)	206 (36.3)	163 (49.7)	724 (39.8)
พี่น้อง	33 (9.7)	28 (9.8)	21 (11.1)	19 (10.6)	101 (10.2)	51 (11.4)	46 (9.7)	67 (11.8)	53 (16.2)	217 (11.9)
ปู่/ย่า	32 (9.4)	35 (12.3)	19 (10.0)	10 (5.6)	96 (9.7)	37 (8.2)	34 (7.2)	30 (5.3)	17 (5.2)	118 (6.5)
ตา/ยาย	36 (10.6)	36 (12.6)	28 (14.7)	13 (7.2)	113 (11.4)	47 (10.5)	40 (8.4)	40 (7.0)	21 (6.4)	148 (8.1)
ญาติฝ่ายพ่อ	63 (18.5)	60 (21.1)	50 (26.3)	29 (16.1)	202 (20.3)	73 (16.3)	113 (23.8)	106 (18.7)	70 (21.3)	362 (19.9)
ญาติฝ่ายแม่	46 (13.5)	50 (17.5)	39 (20.5)	26 (14.4)	161 (16.2)	65 (14.5)	86 (18.1)	83 (14.6)	58 (17.7)	292 (16.0)
แฟน	5 (1.5)	9 (3.2)	2 (1.1)	6 (3.3)	22 (2.2)	11 (2.5)	37 (7.8)	55 (9.7)	43 (13.1)	146 (8.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	6 (1.8)	1 (0.4)	1 (0.5)	2 (1.1)	10 (1.0)	4 (0.9)	3 (0.6)	0 (0.0)	2 (0.6)	9 (0.5)
พ่อ	7 (2.1)	5 (1.8)	1 (0.5)	4 (2.2)	17 (1.7)	1 (0.2)	3 (0.6)	1 (0.2)	5 (1.5)	10 (0.6)
พี่น้อง	7 (2.1)	4 (1.4)	6 (3.2)	4 (2.2)	21 (2.1)	6 (1.3)	6 (1.3)	7 (1.2)	3 (0.9)	22 (1.2)
ปู่/ย่า	4 (1.2)	2 (0.7)	0 (0.0)	3 (1.7)	9 (0.9)	3 (0.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	3 (0.9)	8 (0.4)
ตา/ยาย	5 (1.5)	2 (0.7)	0 (0.0)	5 (2.8)	12 (1.2)	3 (0.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.3)	6 (0.3)
ญาติฝ่ายพ่อ	4 (1.2)	3 (1.1)	0 (0.0)	3 (1.7)	10 (1.0)	6 (1.3)	4 (0.8)	3 (0.5)	2 (0.6)	15 (0.8)
ญาติฝ่ายแม่	7 (2.1)	1 (0.4)	0 (0.0)	3 (1.7)	11 (1.1)	4 (0.9)	8 (1.7)	1 (0.2)	1 (0.3)	14 (0.8)
แฟน	7 (2.1)	3 (1.1)	1 (0.5)	3 (1.7)	14 (1.4)	4 (0.9)	10 (2.1)	10 (1.8)	7 (2.1)	31 (1.7)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า บุคคลในครอบครัวมีปัญหา จากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 5.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	960 (66.0)	881 (65.8)	672 (71.7)	623 (68.3)	3136(67.6)	1463 (77.5)	1537 (78.5)	1711 (80.3)	790 (75.0)	5501 (78.3)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	977 (67.2)	865 (64.6)	648 (69.1)	629 (69.0)	3119 (67.2)	1466 (77.7)	1532 (78.2)	1646 (77.2)	778 (73.7)	5422 (77.1)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม (ไม่ได้กินเป็นยารักษาโรค)	881 (60.6)	802 (59.8)	606 (64.7)	540 (59.2)	2829 (60.9)	1314 (69.8)	1393 (71.1)	1474 (69.2)	690 (65.7)	4871 (69.4)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	976 (67.1)	875 (65.3)	678 (72.7)	619 (68.3)	3148 (67.9)	1471 (78.0)	1569 (80.1)	1766 (83.0)	818 (77.8)	5624 (80.1)
e. ยานอนหลับ	880 (60.6)	797 (59.4)	622 (66.7)	557 (61.1)	2856 (61.6)	1323 (70.3)	1411 (72.0)	1531 (71.9)	720 (68.4)	4985 (71.0)
f. กระเทียม หรือ 4X100	991 (68.2)	916 (68.4)	727 (77.8)	643 (70.7)	3277 (70.6)	1494 (79.3)	1650 (84.1)	1873 (87.9)	871 (82.7)	5888 (83.8)
g. กัญชา	1028 (70.7)	938 (70.1)	733 (78.5)	657 (72.2)	3356 (72.4)	1566 (83.1)	1670 (85.2)	1899 (89.1)	877 (83.3)	6012 (85.5)
h. ฝิ่น	1020 (70.2)	945 (70.5)	744 (79.6)	661 (72.6)	3370 (72.7)	1554 (82.5)	1680 (85.7)	1897 (89.0)	890 (84.5)	6021 (85.7)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1033 (71.1)	943 (70.4)	741 (79.3)	658 (72.4)	3375 (72.8)	1558 (82.7)	1678 (85.6)	1901 (89.2)	892 (84.7)	6029 (85.8)
j. ยาเค (เคตามีน)	1023 (70.4)	943 (70.4)	746 (79.9)	660 (72.7)	3372 (72.8)	1540 (81.7)	1681 (85.7)	1895 (88.9)	884 (84.0)	6000 (85.4)
k. โคเคน	1015 (69.9)	949 (70.8)	748 (80.3)	660 (72.5)	3372 (72.7)	1532 (81.3)	1666 (85.0)	1890 (88.7)	884 (84.0)	5972 (85.0)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1023 (70.5)	948 (70.8)	755 (80.8)	663 (72.9)	3389 (73.1)	1539 (81.7)	1670 (85.3)	1902 (89.3)	883 (83.9)	5994 (85.3)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1015 (69.9)	948 (70.8)	739 (79.0)	661 (72.6)	3363 (72.5)	1544 (82.0)	1654 (84.5)	1884 (88.4)	884 (84.0)	5966 (84.9)
n. ยาบ้า	1034 (71.2)	963 (71.9)	754 (80.6)	681 (74.8)	3432 (74.0)	1588 (84.3)	1699 (86.7)	1926 (90.4)	901 (85.7)	6114 (87.0)
o. ไอซ์	1006 (69.3)	934 (69.7)	733 (78.4)	654 (71.8)	3327 (71.8)	1525 (80.9)	1648 (84.1)	1883 (88.5)	872 (83.0)	5928 (84.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 5.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจ ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. นูห์รี	896 (62.1)	692 (51.8)	442(47.3)	282(31.2)	2312 (50.0)	1331 (70.9)	1221 (62.6)	1235(58.0)	522 (49.4)	4309 (61.5)
b. สุรา –เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	854 (59.2)	571 (42.8)	336(36.1)	209(23.1)	1970 (42.7)	1249 (66.5)	988 (50.7)	910(42.8)	324 (30.7)	3471 (49.5)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม(ไม่ได้กินเป็น ยารักษาโรค)	851 (59.1)	673 (50.4)	425(45.8)	297(33.0)	2246 (48.8)	1205 (64.2)	1072 (55.1)	1066(50.2)	453 (43.0)	3796 (54.2)
d. ยาแก้ลมประสาท/ยาคลายเครียด	918 (63.7)	726 (54.3)	476(51.1)	331(36.7)	2451 (53.2)	1282 (68.3)	1199 (61.6)	1249(58.7)	589 (55.9)	4319 (61.7)
e. ยานอนหลับ	762 (52.9)	605 (45.4)	372(40.0)	246(27.3)	1985 (43.1)	992 (52.9)	857 (44.0)	814(38.3)	363 (34.4)	3026 (43.2)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	1036 (70.9)	869 (64.8)	572(61.4)	410(45.1)	2887 (62.2)	1469 (78.2)	1435 (73.6)	1589(74.8)	720 (68.3)	5213 (74.4)
g. กัญชา	1075 (73.5)	895 (66.8)	584(62.5)	401(44.1)	2955 (63.6)	1521 (81.0)	1470 (75.4)	1640(77.2)	741 (70.4)	5372 (76.7)
h. ฝิ่น	1078 (73.8)	906 (67.6)	617 (66.0)	466 (51.4)	3067 (66.1)	1522 (81.0)	1475 (75.7)	1658 (78.1)	751 (71.3)	5406 (77.2)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	1082 (74.1)	924 (69.0)	627 (67.1)	476 (52.4)	3109 (66.9)	1527 (81.3)	1477 (75.8)	1667 (78.5)	756 (71.7)	5427 (77.5)
j. ยาเค (เคตามีน)	1078 (73.8)	922 (68.8)	625 (66.8)	482 (53.1)	3107 (66.9)	1501 (79.9)	1480 (75.9)	1671 (78.7)	757 (71.8)	5409 (77.2)
k. โคเคน	1079 (73.9)	923 (68.8)	622 (66.5)	489 (53.9)	3113 (67.0)	1499 (79.8)	1483 (76.1)	1669 (78.6)	762 (72.3)	5413 (77.3)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	1086 (74.4)	917 (68.4)	622 (66.5)	497 (54.7)	3122 (67.2)	1506 (80.2)	1487 (76.3)	1666 (78.4)	756 (71.7)	5415 (77.3)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	1074 (73.6)	926 (69.1)	624 (66.8)	506 (55.7)	3130 (67.4)	1494 (79.6)	1476 (75.7)	1651 (77.7)	752 (71.4)	5373 (76.7)
n. ยาบ้า	1106 (75.9)	937 (69.9)	633 (67.7)	491 (54.1)	3167 (68.2)	1544(82.2)	1503 (77.1)	1678 (79.0)	769 (73.0)	5494 (78.4)
o. ไอซ์	1033 (74.5)	900 (68.7)	601 (65.9)	462 (53.2)	2996 (66.9)	1460 (80.0)	1459 (75.9)	1620 (78.4)	736 (71.7)	5275 (77.1)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 5.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	140 (9.7)	86 (6.4)	58 (6.2)	65 (7.2)	349 (7.6)	183 (9.9)	119 (6.2)	113 (5.4)	52 (5.0)	467 (6.7)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	153(10.6)	94 (7.0)	60 (6.4)	72 (7.9)	379 (8.2)	182 (9.8)	126 (6.5)	110 (5.2)	60 (5.7)	478 (6.9)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำชาดลม(ไม่ได้กินเป็น ยารักษาโรค)	287 (19.9)	251 (18.8)	188 (20.1)	173 (19.1)	899 (19.4)	409 (22.1)	349 (18.1)	328 (15.6)	165 (15.8)	1251 (18.0)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	446 (30.9)	445 (33.3)	350 (37.5)	326 (36.0)	1567 (33.9)	639 (34.5)	646 (33.5)	730 (34.7)	396 (37.9)	2411 (34.8)
e. ยานอนหลับ	362 (25.1)	324 (24.3)	242 (25.9)	233 (25.7)	1161 (25.1)	417 (22.5)	414 (21.5)	364 (17.3)	218 (20.9)	1413 (20.4)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	638 (44.2)	631 (47.2)	543 (58.1)	452 (49.9)	2264 (49.0)	930 (50.1)	948 (49.3)	1211 (57.5)	557 (53.3)	3646 (52.6)
g. กัญชา	662 (45.8)	641 (48.0)	533 (57.0)	435 (47.9)	2271 (49.1)	952 (51.3)	949 (49.3)	1190 (56.5)	552 (52.8)	3643 (52.5)
h. ฝิ่น	699 (48.4)	688 (51.4)	604 (64.5)	514 (56.6)	2505 (54.1)	986 (53.1)	990 (51.4)	1279 (60.7)	603 (57.7)	3858 (55.6)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	697 (48.3)	705 (52.7)	621 (66.4)	538 (59.3)	2561 (55.4)	969 (52.2)	1016 (52.7)	1318 (62.6)	622 (59.5)	3925 (56.6)
j. ยาเค (เคตามีน)	705 (48.8)	720 (53.8)	636 (68.0)	538 (59.4)	2599 (56.2)	968 (52.2)	1027 (53.3)	1328 (63.0)	632 (60.4)	3955 (57.0)
k. โคเคน	711 (49.2)	709 (53.0)	632 (67.5)	542 (59.8)	2594 (56.1)	979 (52.8)	1022 (53.1)	1325 (62.9)	633 (60.6)	3959 (57.1)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	704 (48.7)	688 (51.5)	627 (67.1)	526 (58.0)	2545 (55.1)	950 (51.3)	992 (51.5)	1272 (60.4)	612 (58.5)	3826 (55.2)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	571 (39.6)	560 (41.9)	489 (52.2)	399 (44.0)	2019 (43.7)	779 (42.0)	828 (43.0)	1015 (48.2)	513 (49.0)	3135 (45.2)
n. ยาบ้า	688 (47.6)	684 (51.1)	588 (62.9)	487 (53.8)	2447 (52.9)	945 (50.9)	970 (50.3)	1262 (60.0)	582 (55.6)	3759 (54.2)
o. ไอซ์	684 (47.5)	708 (53.0)	622 (66.5)	528 (58.3)	2542 (55.0)	930 (50.2)	985 (51.3)	1295 (61.6)	625 (59.9)	3835 (55.4)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 5.23 นักเรียนคิดว่าการดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ประหม่า เกือบเงิน สร้าง ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	415 (28.8)	539 (40.2)	408 (43.4)	469 (51.2)	1831 (39.5)	537 (28.4)	642 (32.6)	899 (42.0)	418 (39.3)	2496 (35.3)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	264 (18.3)	382 (28.5)	353 (37.4)	381 (41.5)	1380 (29.7)	215 (11.4)	336 (17.1)	581 (27.1)	274 (25.8)	1406 (19.9)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือ ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	299 (20.8)	405 (30.2)	346 (36.7)	422 (46.0)	1472 (31.7)	248 (13.1)	362 (18.4)	552 (25.7)	305 (28.7)	1467 (20.8)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	266 (18.5)	410 (30.5)	349 (37.0)	451 (49.2)	1476 (31.8)	193 (10.2)	305 (15.5)	477 (22.3)	270 (25.4)	1245 (17.6)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	303 (21.0)	445 (33.2)	404 (42.9)	502 (54.7)	1654 (35.7)	257 (13.6)	396 (20.1)	640 (29.8)	338 (31.9)	1631 (23.1)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	322 (22.4)	492 (36.6)	418 (44.3)	540 (58.8)	1772 (38.2)	297 (15.7)	446 (22.7)	668 (31.1)	332 (31.2)	1743 (24.7)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	255 (17.4)	409 (30.5)	329 (34.7)	422 (46.2)	1415 (30.3)	262 (13.8)	337 (17.2)	534 (24.9)	307 (29.0)	1440 (20.4)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	404 (27.5)	632 (47.1)	525 (55.4)	662 (72.3)	2223 (47.6)	445 (23.5)	749 (38.3)	1026 (47.8)	562 (53.1)	2782 (39.4)
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	304 (20.7)	442 (33.0)	344 (36.4)	431 (47.2)	1521 (32.6)	252 (13.3)	402 (20.5)	461 (21.5)	273 (25.8)	1388 (19.7)
j. ทำให้กินอาหารได้อร่อยมากขึ้น	264 (18.0)	404 (30.2)	321 (33.9)	354 (38.8)	1343 (28.8)	221 (11.6)	275 (14.0)	398 (18.5)	212 (20.0)	1106 (15.7)
k. ทำให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่ขึ้น	262 (17.9)	414 (30.9)	311 (32.9)	364 (39.8)	1351 (29.0)	245 (12.9)	315 (16.1)	355 (16.5)	186 (17.6)	1101 (15.6)
l. ทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่ขึ้น	221 (15.1)	305 (22.8)	262 (27.7)	265 (29.1)	1053 (22.6)	212 (11.2)	262 (13.4)	314 (14.6)	162 (15.3)	950 (13.5)
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	205 (14.0)	291 (21.7)	232 (24.6)	242 (26.5)	970 (20.8)	156 (8.2)	161 (8.2)	224 (10.5)	131 (12.4)	672 (9.5)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมี เพศสัมพันธ์	428 (29.2)	585 (43.7)	466 (49.3)	545 (59.6)	2024 (43.4)	544 (28.7)	687 (35.1)	904 (42.2)	373 (35.2)	2508 (35.5)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข้อมูลโรงเรียนภาคใต้

จำนวนตัวอย่างแยกตามจังหวัดและระดับชั้นเรียน

จังหวัด	จำนวนโรงเรียน	ม. 1 (n=2146)		ม. 3 (n=2209)		ม. 5 (n=1742)		ปวช. 2 (n=1363)		รวม (คน)
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1. จังหวัดนราธิวาส	4 โรงเรียน	91	144	56	122	29	50	105	54	651
2. จังหวัดระนอง	5 โรงเรียน	130	163	100	196	74	128	73	87	951
3. จังหวัดตรัง	5 โรงเรียน	111	226	133	244	104	237	80	102	1237
4. จังหวัดชุมพร	5 โรงเรียน	150	169	168	206	111	175	32	107	1118
5. จังหวัดสุราษฎร์	7 โรงเรียน	191	172	159	206	104	288	117	92	1329
6. จังหวัดพังงา	5 โรงเรียน	126	152	111	151	110	118	131	26	925
7. จังหวัดสตูล	5 โรงเรียน	146	175	157	200	67	147	283	74	1249
รวม	36 โรงเรียน	945	1,201	884	1,325	599	1,143	821	542	7460

* ไม่ระบุเพศ 19 คน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
นิรันดรวิทยา	57	75	23	55	20	21	-	-	251
ร่วมเกล้านราธิวาส	27	56	11	13	4	14	-	-	125
เจริญวิทยานุสรณ์	7	13	22	54	5	15	-	-	116
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส	-	-	-	-	-	-	105	54	159
รวมจังหวัดนราธิวาส	91	144	56	122	29	50	105	54	651
ดำรงศาสตร์วิทยา	21	34	15	35	15	30	-	-	150
ปากจั่นวิทยา	43	45	35	67	1	8	-	-	199
สตรีระนอง	66	84	50	94	58	90	-	-	442
วิทยาลัยการอาชีพกระบี่	-	-	-	-	-	-	46	54	100
ระนองเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	27	33	60
รวมจังหวัดระนอง	130	163	100	196	74	128	73	87	951
บูรณะรำลึกตรัง	38	95	46	87	46	86	-	-	398
จุฬารัตน์ราชวิทยาลัยตรัง	16	58	39	73	13	77	-	-	276
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์	57	73	48	84	45	74	-	-	381
วิทยาลัยเทคนิคตรัง	-	-	-	-	-	-	75	96	171
เทคนิคพาณิชยการสยาม	-	-	-	-	-	-	5	6	11
รวมจังหวัดตรัง	111	226	133	244	104	237	80	102	1237

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามแยกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

โรงเรียน	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
ปากน้ำชุมพรวิทยา	48	31	51	53	14	18	-	-	215
ศรีรามภัย	57	75	64	87	49	88	-	-	420
ท่าแซะรัชดาภิเษก	45	63	53	66	48	69	-	-	344
รักรวมบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	22	102	124
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	-	-	-	-	-	-	10	5	15
รวมจังหวัดชุมพร	150	169	168	206	111	175	32	107	1118
สุราษฎร์พิทยา	74	63	44	89	32	100	-	-	402
ดอนสักผดุงวิทย์	62	61	41	64	17	30	-	-	275
พันศึกษา	21	9	11	9	9	6	-	-	65
เทพมิตรศึกษา	34	39	63	44	28	76	-	-	284
พูนพิณพิทยาคม	-	-	-	-	18	76	-	-	94
วิทยาลัยการอาชีพไชยา	-	-	-	-	-	-	60	44	104
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	-	-	-	-	-	-	57	48	105
รวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	191	172	159	206	104	288	117	92	1329
ท้ายเหมืองวิทยา	39	42	42	57	36	61	-	-	277
กะปงพิทยาคม	51	51	24	38	18	15	-	-	197
दिบุกพังงาวิทยายน	36	59	45	56	56	42	-	-	294
วิทยาลัยเทคนิคพังงา	-	-	-	-	-	-	96	2	98
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง	-	-	-	-	-	-	35	24	59
รวมจังหวัดพังงา	126	152	111	151	110	118	131	26	925
พิมานพิทยาสรรค์	41	58	39	60	23	77	-	-	298
ทุ่งหัววัววิทย์	55	80	56	66	13	30	-	-	300
อรุณศาสนวิทยามูลนิธิ	50	37	62	74	31	40	-	-	294
วิทยาลัยเทคนิคสตูล	-	-	-	-	-	-	218	38	256
วิทยาลัยการอาชีพพลวง	-	-	-	-	-	-	65	36	101
รวมจังหวัดสตูล	146	175	157	200	67	147	283	74	1249

* ไม่ระบุเพศ 19 คน

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดนราธิวาส :									
ในเขต	57	75	23	55	20	21	105	54	410
นอกเขต	34	69	33	67	9	29	-	-	241
ประเภท									
รัฐบาล	27	56	11	13	4	14	105	54	284
เอกชน	64	88	45	109	25	36	-	-	367
สายการเรียน									
สามัญ	91	144	56	122	29	50	-	-	492
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	105	54	159
จังหวัดระนอง:									
ในเขต	66	84	50	94	58	90	27	33	502
นอกเขต	64	79	50	102	16	38	46	54	449
ประเภท									
รัฐบาล	109	129	85	161	59	98	46	54	741
เอกชน	21	34	15	35	15	30	27	33	210
สายการเรียน									
สามัญ	130	163	100	196	74	128	-	-	791
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	73	87	160
จังหวัดตรัง :									
ในเขต	54	153	85	160	59	163	80	102	856
นอกเขต	57	73	48	84	45	74	-	-	381
ประเภท									
รัฐบาล	73	131	87	157	58	151	75	96	828
เอกชน	38	95	46	87	46	86	5	6	409
สายการเรียน									
สามัญ	111	226	133	244	104	237	-	-	1055
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	80	102	182
จังหวัดชุมพร									
ในเขต	105	106	115	140	63	106	22	102	759
นอกเขต	45	63	53	66	48	69	10	5	359
ประเภท									
รัฐบาล	150	169	168	206	111	175	10	5	994
เอกชน	-	-	-	-	-	-	22	102	124
สายการเรียน									
สามัญ	150	169	168	206	111	175	-	-	979
อาชีพ	-	-	-	-	-	-	32	107	139

เขตที่ตั้ง ประเภทโรงเรียนและจำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจังหวัด ชั้นปีและเพศ (ต่อ)

เขตที่ตั้ง	ม. 1		ม. 3		ม. 5		ปวช. 2		รวม
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี :									
ในเขต	170	163	148	197	77	206	-	-	961
นอกเขต	21	9	11	9	27	82	117	92	368
ประเภท									
รัฐบาล	136	124	85	153	67	206	117	92	980
เอกชน	55	48	74	53	37	82	-	-	349
สายการเรียน									
สามัญ	191	172	159	206	104	288	-	-	1120
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	117	92	209
จังหวัดพังงา :									
ในเขต	36	59	45	56	56	42	96	2	392
นอกเขต	90	93	66	95	54	76	35	24	533
ประเภท									
รัฐบาล	126	152	111	151	110	118	131	26	925
เอกชน	-	-	-	-	-	-	-	-	0
สายการเรียน									
สามัญ	126	152	111	151	110	118	-	-	768
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	131	26	157
จังหวัดสตูล:									
ในเขต	41	58	39	60	23	77	218	38	554
นอกเขต	105	117	118	140	44	70	65	36	695
ประเภท									
รัฐบาล	96	138	95	126	36	107	283	74	955
เอกชน	50	37	62	74	31	40	-	-	294
สายการเรียน									
สามัญ	146	175	157	200	67	147	-	-	892
อาชีวะ	-	-	-	-	-	-	283	74	357

ภาคผนวก 6.
สรุปผลการศึกษาของภาคใต้

ตารางที่ 6.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ)

ลักษณะ	ม.1 (n=2147)	ม. 3 (n=2211)	ม. 5 (n=1746)	ปวช.2 (n=1375)	รวม (n=7479)
อายุ : mean±sd	12.9±0.6	14.8±0.6	16.9±0.6	17.3±0.9	15.2±1.9
median (พิสัย)	13(11-17)	15(12-18)	17(13-21)	17(13-24)	15(11-24)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(3)	(5)	(2)	(15)
รวม	2142	2208	1741	1373	7464
เพศ : ชาย (%)	945(44.0)	884(40.0)	599(34.4)	821(60.2)	3249(43.6)
หญิง (%)	1201(56.0)	1325(60.0)	1143(65.6)	542(39.8)	4211(56.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(2)	(4)	(12)	(19)
รวม	2146(100.0)	2209(100.0)	1742(100.0)	1363(100.0)	7460(100.0)
ศาสนา : พุทธ	1618(75.6)	1669(75.5)	1408(80.6)	999(72.9)	5694(76.2)
อิสลาม	515(24.0)	523(23.6)	316(18.1)	361(26.3)	1,715(23.0)
คริสต์และอื่นๆ	8(0.4)	19(0.9)	22(1.3)	11(0.8)	60(0.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(6)	-	-	(4)	(10)
รวม	2141(100.0)	2211(100.0)	1746(100.0)	1371(100.0)	7469(100.0)
สถานที่เกิด : ภาคใต้	1998(95.5)	2,084(94.9)	1633(93.9)	1296(96.0)	7011(95.0)
กรุงเทพ	28(1.3)	23(1.0)	19(1.1)	4(0.3)	74(1.0)
ปริมณฑล	1(0.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.0)
ภาคกลาง	40(1.9)	68(3.1)	59(3.4)	27(2.0)	194(2.6)
ภาคเหนือ	9(0.4)	5(0.2)	10(0.6)	8(0.6)	32(0.4)
ภาคอีสาน	16(0.8)	17(0.8)	18(1.0)	15(1.1)	66(0.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(55)	(14)	(7)	(25)	(101)
รวม	2092(100.0)	2197(100.0)	1739(100.0)	1350(100.0)	7378(100.0)
ภาษาที่ใช้ในครัวเรือน* :					
ไทย	1589(74.1)	1641(74.8)	1394(79.9)	977(71.3)	5601(75.2)
ไทยท้องถิ่น	1015(47.3)	1132(51.6)	987(56.6)	656(47.9)	3790(50.9)
จีน	29(1.4)	24(1.1)	39(2.2)	14(1.0)	106(1.4)
มลายู/ยาวี	227(10.6)	194(8.8)	88(5.1)	109(8.0)	618(8.3)
สปป.ลาว	3(0.1)	4(0.2)	7(0.4)	4(0.3)	18(0.2)
อื่นๆ เช่น อังกฤษ เขมร พม่า	34(1.6)	46(2.1)	43(2.5)	31(2.3)	154(2.1)
จำนวนทั้งหมด	2147	2211	1746	1375	7479
* ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ภาษา					
บ้านที่พัก :					
บ้านแฟลตของครอบครัว	1755(82.4)	1851(84.0)	1433(82.3)	1060(77.3)	6099(81.9)
หอพักของโรงเรียน	174(8.2)	178(8.1)	136(7.8)	78(5.7)	566(7.6)
หอพักนอกโรงเรียน	30(1.4)	34(1.5)	49(2.8)	108(7.9)	221(3.0)
บ้านเช่า	130(6.1)	102(4.6)	93(5.3)	112(8.2)	437(5.9)
อื่นๆ	42(1.9)	38(1.7)	30(1.7)	13(1.0)	123(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(8)	(5)	(4)	(33)
รวม	2131(100.0)	2203(99.9)	1741(99.9)	1371(100.1)	7446(100.0)

ตารางที่ 6.1 ลักษณะทั่วไปของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปี (ร้อยละ) (ต่อ)

ลักษณะ	ม.1 (n=2147)	ม. 3 (n=2211)	ม. 5 (n=1746)	ปวช.2 (n=1375)	รวม (n=7479)
พักอยู่กับ : อยู่คนเดียว	14(0.7)	20(0.9)	24(1.4)	49(3.6)	107(1.4)
พ่อแม่	1721(80.8)	1818(82.4)	1355(77.8)	1001(73.0)	5895(79.2)
เพื่อน	153(7.2)	167(7.6)	169(9.7)	205(14.9)	694(9.3)
ญาติพี่น้อง	196(9.2)	161(7.3)	168(9.6)	107(7.8)	632(8.5)
อื่นๆ	46(2.2)	39(1.8)	25(1.4)	10(0.7)	120(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(6)	(5)	(3)	(31)
รวม	2130(100.1)	2205(100.0)	1741(99.9)	1372(100.0)	7448(100.0)
ผลการเรียน: เกรตเฉลี่ย	mean±sd	2.4±1.4	2.6±1.1	2.7±0.7	2.6±1.0
เกรต 0.1-1.0	360(23.5)	197(9.9)	53(3.1)	22(1.7)	360(23.5)
เกรต 1.1-2.0	59(3.9)	236(11.8)	156(9.3)	152(11.8)	59(3.9)
เกรต 2.1-3.0	433(28.3)	765(38.3)	916(54.3)	775(60.2)	433(28.3)
เกรต 3.1-4.0	678(44.3)	800(40.0)	561(33.3)	338(26.3)	678(44.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(617)	(213)	(60)	(88)	(978)
รวม	1530(100.0)	1998(100.0)	1686(100.0)	1287(100.0)	6501(100.0)
ทำงานเพื่อหารายได้ : ไม่ทำ	1556(74.4)	1634(75.0)	1316(75.9)	856(63.0)	5362(72.8)
ทำ	536(25.6)	544(25.0)	417(24.1)	502(37.0)	1999(27.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(55)	(33)	(13)	(17)	(118)
รวม	2092(100.0)	2178(100.0)	1733(100.0)	1358(100.0)	7361(100.0)

ความคิดเห็นต่อบรรทัดฐาน สิ่งแวดล้อม นโยบาย และระเบียบของโรงเรียน

ตารางที่ 6.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การทำร้ายร่างกาย/ถูกทำร้าย /ทำร้ายคนอื่น										
ไม่มีปัญหาเลย	340(36.4)	363(41.3)	215(36.2)	369(45.5)	1287(40.0)	479(40.4)	486(37.2)	360(31.6)	186(34.4)	1511(36.2)
มีเล็กน้อย	400(42.9)	355(40.4)	262(44.1)	334(41.2)	1351(42.0)	483(40.7)	548(42.0)	501(44.0)	255(47.1)	1787(42.9)
มีปานกลาง	150(16.1)	136(15.5)	83(14.0)	91(11.2)	460(14.3)	194(16.4)	233(17.9)	213(18.7)	85(15.7)	725(17.4)
มีปัญหามาก	43(4.6)	25(2.8)	34(5.7)	17(2.1)	119(3.7)	30(2.5)	38(2.9)	64(5.6)	15(2.8)	147(3.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(5)	(5)	(10)	(32)	(15)	(20)	(5)	(1)	(41)
รวม	933(100.0)	879(100.0)	594(100.0)	811(100.0)	3217(100.0)	1186(100.0)	1305(100.0)	1138(100.0)	541(100.0)	4170(100.0)
การใช้ยาเสพติด (ยกเว้นบุหรี่/เหล้า)										
ไม่มีปัญหาเลย	727(78.2)	581(66.3)	348(58.5)	408(50.5)	2064(64.3)	832(70.5)	792(60.4)	602(53.0)	259(48.1)	2485(59.7)
มีเล็กน้อย	137(14.7)	222(25.3)	156(26.2)	266(32.9)	781(24.3)	249(21.1)	391(29.8)	392(34.5)	160(29.7)	1192(28.6)
มีปานกลาง	48(5.2)	53(6.1)	62(10.4)	101(12.5)	264(8.2)	80(6.8)	101(7.7)	88(7.8)	94(17.4)	363(8.7)
มีปัญหามาก	18(1.9)	20(2.3)	29(4.9)	33(4.1)	100(3.1)	19(1.6)	27(2.1)	53(4.7)	26(4.8)	125(3.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(8)	(4)	(13)	(40)	(21)	(14)	(8)	(3)	(46)
รวม	930(100.0)	876(100.0)	595(100.0)	808(100.0)	3209(100.0)	1180(100.0)	1311(100.0)	1135(100.0)	539(100.0)	4165(100.0)
การฆ่าตัวตาย										
ไม่มีปัญหาเลย	890(95.6)	841(95.8)	555(93.4)	760(93.7)	3046(94.8)	1102(93.1)	1213(92.5)	1032(90.9)	483(89.3)	3830(91.8)
มีเล็กน้อย	30(3.2)	26(3.0)	28(4.7)	32(4.0)	116(3.6)	69(5.8)	95(7.3)	95(8.4)	51(9.4)	310(7.4)
มีปานกลาง	1(0.1)	7(0.8)	4(0.7)	7(0.9)	19(0.6)	6(0.5)	1(0.1)	7(0.6)	3(0.6)	17(0.4)
มีปัญหามาก	10(1.1)	4(0.5)	7(1.2)	12(1.5)	33(1.0)	7(0.6)	2(0.2)	2(0.2)	4(0.7)	15(0.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(6)	(5)	(10)	(35)	(17)	(14)	(7)	(1)	(39)
รวม	931(100.0)	878(100.0)	594(100.0)	811(100.0)	3214(100.0)	1184(100.0)	1311(100.0)	1136(100.0)	541(100.0)	4172(100.0)
ข่มขืน กระทำซ้ำเรา										
ไม่มีปัญหาเลย	836(89.6)	788(89.8)	520(87.5)	658(81.1)	2802(87.1)	1041(88.1)	1168(89.2)	997(87.6)	451(83.4)	3657(87.7)
มีเล็กน้อย	74(7.9)	70(8.0)	52(8.8)	111(13.7)	307(9.6)	117(9.9)	128(9.8)	119(10.5)	66(12.2)	430(10.3)
มีปานกลาง	11(1.2)	16(1.8)	11(1.9)	28(3.5)	66(2.1)	19(1.6)	6(0.5)	15(1.3)	18(3.3)	58(1.4)
มีปัญหามาก	12(1.3)	4(0.5)	11(1.9)	14(1.7)	41(1.3)	5(0.4)	7(0.5)	7(0.6)	6(1.1)	25(0.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(6)	(5)	(10)	(33)	(19)	(16)	(5)	(1)	(41)
รวม	933(100.0)	878(100.0)	594(100.0)	811(100.0)	3216(100.0)	1182(100.0)	1309(100.0)	1138(100.0)	541(100.0)	4170(100.0)
ดื่มสุร่าอย่างหนัก										
ไม่มีปัญหาเลย	691(74.5)	613(69.9)	360(60.5)	342(42.2)	2006(62.5)	835(70.7)	886(67.6)	689(60.5)	244(45.3)	2654(63.7)
มีเล็กน้อย	183(19.7)	182(20.8)	166(27.9)	292(36.0)	823(25.6)	272(23.0)	300(22.9)	309(27.2)	166(30.8)	1047(25.1)
มีปานกลาง	43(4.6)	69(7.9)	42(7.1)	130(16.0)	284(8.8)	64(5.4)	102(7.8)	100(8.8)	83(15.4)	349(8.4)
มีปัญหามาก	11(1.2)	13(1.5)	27(4.5)	47(5.8)	98(3.1)	10(0.9)	22(1.7)	40(3.5)	46(8.5)	118(2.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(7)	(4)	(10)	(38)	(20)	(15)	(5)	(3)	(43)
รวม	928(100.0)	877(100.0)	595(100.0)	811(100.0)	3211(100.0)	1181(100.0)	1310(100.0)	1138(100.0)	539(100.0)	4168(100.0)

ตารางที่ 6.2 นักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ยกพวกตีกัน										
ไม่มีปัญหาเลย	484(52.0)	397(45.2)	227(38.2)	374(46.1)	1482(46.1)	507(42.8)	540(41.2)	382(33.5)	170(31.6)	1599(38.3)
มีเล็กน้อย	264(28.4)	280(31.9)	205(34.5)	296(36.5)	1045(32.5)	426(36.0)	404(30.8)	384(33.7)	244(45.4)	1458(35.0)
มีปานกลาง	131(14.1)	134(15.3)	111(18.7)	106(13.1)	482(15.0)	181(15.3)	230(17.6)	222(19.5)	89(16.5)	722(17.3)
มีปัญหามาก	52(5.6)	67(7.6)	52(8.7)	35(4.3)	206(6.4)	70(5.9)	136(10.4)	151(13.3)	35(6.5)	392(9.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(6)	(4)	(10)	(34)	(17)	(15)	(4)	(4)	(40)
รวม	931(100.0)	878(100.0)	595(100.0)	811(100.0)	3215(100.0)	1184(100.0)	1310(100.0)	1139(100.0)	538(100.0)	4171(100.0)
ทะเลาะวิวาท										
ไม่มีปัญหาเลย	312(33.4)	276(31.4)	144(24.2)	275(33.9)	1007(31.3)	324(27.4)	291(22.2)	208(18.3)	100(18.5)	923(22.1)
มีเล็กน้อย	355(38.1)	360(41.0)	249(41.9)	350(43.2)	1314(40.9)	491(41.5)	546(41.7)	469(41.2)	272(50.4)	1778(42.6)
มีปานกลาง	198(21.2)	163(18.6)	136(22.9)	136(16.8)	633(19.7)	266(22.5)	280(21.4)	280(24.6)	114(21.1)	940(22.5)
มีปัญหามาก	68(7.3)	79(9.0)	65(10.9)	50(6.2)	262(8.2)	102(8.6)	194(14.8)	182(16.0)	54(10.0)	532(12.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(6)	(5)	(10)	(33)	(18)	(14)	(4)	(2)	(38)
รวม	933(100.0)	878(100.0)	594(100.0)	811(100.0)	3216(100.0)	1183(100.0)	1311(100.0)	1139(100.0)	540(100.0)	4173(100.0)

ตารางที่ 6.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียน/เพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุรา										
0-40 %	786(84.8)	757(86.5)	486(81.8)	362(44.9)	2391(74.7)	1052(89.7)	1064(81.5)	879(77.2)	294(54.8)	3289(79.2)
41-60%	98(10.6)	76(8.7)	55(9.3)	249(30.9)	478(14.9)	84(7.2)	155(11.9)	167(14.7)	134(25.0)	540(13.0)
>60 %	43(4.6)	42(4.8)	53(8.9)	196(24.3)	334(10.4)	37(3.2)	86(6.6)	92(8.1)	109(20.3)	324(7.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(18)	(9)	(5)	(14)	(46)	(28)	(20)	(5)	(5)	(58)
รวม	927(100.0)	875(100.0)	594(100.0)	807(100.0)	3203(100.0)	1173(100.0)	1305(100.0)	1138(100.0)	537(100.0)	4153(100.0)
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุรา										
0-40 %	858(92.9)	760(86.9)	472(79.7)	404(50.1)	2494(78.0)	1130(96.5)	1189(91.1)	977(85.8)	371(68.8)	3667(88.3)
41-60%	39(4.2)	64(7.3)	68(11.5)	186(23.1)	357(11.2)	26(2.2)	73(5.6)	97(8.5)	91(16.9)	287(6.9)
>60 %	27(2.9)	51(5.8)	52(8.8)	216(26.8)	346(10.8)	15(1.3)	43(3.3)	65(5.7)	77(14.3)	200(4.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(9)	(7)	(15)	(52)	(30)	(20)	(4)	(3)	(57)
รวม	924(100.0)	875(100.0)	592(100.0)	806(100.0)	3197(100.0)	1171(100.0)	1305(100.0)	1139(100.0)	539(100.0)	4154(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ดื่มสุราจนเป็นปัญหา										
0-40 %	858(92.5)	830(94.6)	558(93.9)	591(73.1)	2837(88.5)	1125(95.9)	1235(94.5)	1067(93.4)	415(77.3)	3842(92.4)
41-60%	37(4.0)	33(3.8)	24(4.0)	134(16.6)	228(7.1)	38(3.2)	46(3.5)	53(4.6)	65(12.1)	202(4.9)
>60 %	33(3.6)	14(1.6)	12(2.0)	83(10.3)	142(4.4)	10(0.9)	26(2.0)	22(1.9)	57(10.6)	115(2.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(7)	(5)	(13)	(42)	(28)	(18)	(1)	(5)	(52)
รวม	928(100.0)	877(100.0)	594(100.0)	808(100.0)	3207(100.0)	1173(100.0)	1307(100.0)	1142(100.0)	537(100.0)	4159(100.0)

ตารางที่ 6.3 อัตรานักเรียนในโรงเรียนเพื่อน ที่นักเรียนคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เพื่อนที่รู้จักดื่มสุราคงเป็นปัญหา										
0-40 %	885(95.5)	831(95.1)	557(93.9)	616(76.2)	2889(90.2)	1150(98.2)	1261(96.8)	1090(95.5)	451(83.7)	3952(95.1)
41-60%	21(2.3)	29(3.3)	22(3.7)	117(14.5)	189(5.9)	15(1.3)	25(1.9)	34(3.0)	42(7.8)	116(2.8)
>60 %	21(2.3)	14(1.6)	14(2.4)	75(9.3)	124(3.9)	6(0.5)	17(1.3)	17(1.5)	46(8.5)	86(2.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(18)	(10)	(6)	(13)	(47)	(30)	(22)	(2)	(3)	(57)
รวม	927(100.0)	874(100.0)	593(100.0)	808(100.0)	3202(100.0)	1171(100.0)	1303(100.0)	1141(100.0)	539(100.0)	4154(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่สูบบุหรี่										
0-40 %	683(73.8)	668(76.3)	450(76.0)	266(33.0)	2067(64.6)	993(84.7)	977(74.8)	820(71.9)	251(46.6)	3041(73.1)
41-60%	138(14.9)	125(14.3)	77(13.0)	188(23.4)	528(16.5)	115(9.8)	170(13.0)	171(15.0)	130(24.1)	586(14.1)
>60 %	105(11.3)	83(9.5)	65(11.0)	351(43.6)	604(18.9)	64(5.5)	159(12.2)	150(13.2)	158(29.3)	531(12.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(8)	(7)	(16)	(50)	(29)	(19)	(2)	(3)	(53)
รวม	926(100.0)	876(100.0)	592(100.0)	805(100.0)	3199(100.0)	1172(100.0)	1306(100.0)	1141(100.0)	539(100.0)	4158(100.0)
เพื่อนที่รู้จักสูบบุหรี่										
0-40 %	842(90.9)	729(83.0)	478(80.7)	353(43.7)	2402(75.0)	1115(95.6)	1167(89.4)	964(84.6)	376(70.0)	3622(87.3)
41-60%	55(5.9)	91(10.4)	66(11.2)	179(22.2)	391(12.2)	32(2.7)	88(6.7)	107(9.4)	82(15.3)	309(7.5)
>60 %	29(3.1)	58(6.6)	48(8.1)	275(34.1)	410(12.8)	19(1.6)	50(3.8)	68(6.0)	79(14.7)	216(5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(6)	(7)	(14)	(46)	(35)	(20)	(4)	(5)	(64)
รวม	926(100.0)	878(100.0)	592(100.0)	807(100.0)	3203(100.0)	1166(100.0)	1305(100.0)	1139(100.0)	537(100.0)	4147(100.0)
นักเรียนในโรงเรียนที่ใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	896(97.0)	839(95.9)	573(96.6)	637(78.7)	2945(92.0)	1151(98.3)	1238(94.8)	1087(95.4)	456(84.6)	3932(94.6)
41-60%	21(2.3)	16(1.8)	14(2.4)	115(14.2)	166(5.2)	12(1.0)	45(3.5)	40(3.5)	50(9.3)	147(3.5)
>60 %	7(0.8)	20(2.3)	6(1.0)	57(7.1)	90(2.8)	8(0.7)	23(1.8)	13(1.1)	33(6.1)	77(1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(9)	(6)	(12)	(48)	(30)	(19)	(3)	(3)	(55)
รวม	924(100.0)	875(100.0)	593(100.0)	809(100.0)	3201(100.0)	1171(100.0)	1306(100.0)	1140(100.0)	539(100.0)	4156(100.0)
เพื่อนที่รู้จักใช้สารเสพติดอื่นๆ (ไม่รวมบุหรี่/สุรา)										
0-40 %	895(96.7)	834(95.1)	571(96.1)	657(81.2)	2957(92.2)	1160(98.9)	1259(96.5)	1104(96.8)	480(89.2)	4003(96.3)
41-60%	27(2.9)	17(1.9)	12(2.0)	93(11.5)	149(4.7)	9(0.8)	36(2.8)	28(2.5)	30(5.6)	103(2.5)
>60 %	4(0.4)	26(3.0)	11(1.9)	59(7.3)	100(3.1)	4(0.3)	10(0.8)	9(0.8)	28(5.2)	51(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(7)	(5)	(12)	(43)	(28)	(20)	(2)	(4)	(54)
รวม	926(100.0)	877(100.0)	594(100.0)	809(100.0)	3206(100.0)	1173(100.0)	1305(100.0)	1141(100.0)	538(100.0)	4157(100.0)

ตารางที่ 6.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
โรงเรียนไม่ส่งเสริมและพยายามหาทางป้องกันนักเรียนทุกคนไม่ให้ดื่มสุรา										
ใช่	543(58.0)	512(58.1)	314(52.6)	362(44.3)	1731(53.5)	704(58.9)	770(58.3)	654(57.5)	300(55.6)	2428(57.9)
ไม่ใช่	252(26.9)	217(24.6)	188(31.5)	226(27.6)	883(27.3)	357(29.9)	413(31.3)	380(33.4)	178(33.0)	1328(31.7)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	141(15.1)	153(17.4)	95(15.9)	230(28.1)	619(19.2)	134(11.2)	137(10.4)	103(9.1)	62(11.5)	436(10.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(2)	(2)	(3)	(16)	(6)	(5)	(6)	(2)	(19)
รวม	936(100.0)	882(100.0)	597(100.0)	818(100.0)	3233(100.0)	1195(100.0)	1320(100.0)	1137(100.0)	540(100.0)	4192(100.0)
โรงเรียนยอมให้ดื่มสุราได้ แต่พยายามไม่ให้เด็กดื่มจนเมาหรือเป็นปัญหา										
ใช่	84(9.0)	66(7.5)	54(9.1)	189(23.1)	393(12.2)	61(5.1)	62(4.7)	56(4.9)	90(16.6)	269(6.4)
ไม่ใช่	756(80.8)	695(79.0)	478(80.1)	470(57.5)	2399(74.3)	991(83.0)	1152(87.1)	1001(87.9)	384(71.0)	3528(84.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	96(10.3)	119(13.5)	65(10.9)	158(19.3)	438(13.6)	142(11.9)	108(8.2)	82(7.2)	67(12.4)	399(9.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(4)	(2)	(4)	(19)	(7)	(3)	(4)	(1)	(15)
รวม	936(100.0)	880(100.0)	597(100.0)	817(100.0)	3230(100.0)	1194(100.0)	1322(100.0)	1139(100.0)	541(100.0)	4196(100.0)
โรงเรียนแนะนำให้ให้นักเรียนดื่มสุราแบบปลอดภัย										
ใช่	70(7.5)	85(9.7)	81(13.6)	265(32.4)	501(15.5)	63(5.3)	102(7.7)	108(9.5)	130(24.0)	403(9.6)
ไม่ใช่	747(79.9)	662(75.2)	436(73.0)	374(45.8)	2219(68.7)	964(80.8)	1059(80.2)	883(77.7)	308(56.9)	3214(76.7)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	118(12.6)	133(15.1)	80(13.4)	178(21.8)	509(15.8)	166(13.9)	159(12.1)	145(12.8)	103(19.0)	573(13.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(4)	(2)	(4)	(20)	(8)	(5)	(7)	(1)	(21)
รวม	935(100.0)	880(100.0)	597(100.0)	817(100.0)	3229(100.0)	1193(100.0)	1320(100.0)	1136(100.0)	541(100.0)	4190(100.0)
โรงเรียนไม่ค่อยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการป้องกันการดื่มสุราของนักเรียน										
ใช่	95(10.2)	113(12.8)	86(14.5)	142(17.4)	436(13.5)	67(5.6)	85(6.4)	89(7.8)	45(8.3)	286(6.8)
ไม่ใช่	698(74.6)	602(68.4)	405(68.1)	470(57.5)	2175(67.4)	961(80.6)	1059(80.2)	889(78.3)	411(76.1)	3320(79.3)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	143(15.3)	165(18.8)	104(17.5)	206(25.2)	618(19.1)	164(13.8)	176(13.3)	158(13.9)	84(15.6)	582(13.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(9)	(4)	(4)	(3)	(20)	(9)	(5)	(7)	(2)	(23)
รวม	936(100.0)	880(100.0)	595(100.0)	818(100.0)	3229(100.0)	1192(100.0)	1320(100.0)	1136(100.0)	540(100.0)	4188(100.0)
โรงเรียนมีนโยบายป้องกัน แก้ไขปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติด										
ใช่	723(77.3)	673(76.5)	443(74.5)	568(69.4)	2407(74.6)	969(81.4)	1094(83.1)	913(80.4)	409(75.7)	3385(80.9)
ไม่ใช่	87(9.3)	91(10.3)	65(10.9)	95(11.6)	338(10.5)	88(7.4)	74(5.6)	102(9.0)	61(11.3)	325(7.8)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	125(13.4)	116(13.2)	87(14.6)	155(19.0)	483(15.0)	134(11.3)	148(11.3)	120(10.6)	70(13.0)	472(11.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(10)	(4)	(4)	(3)	(21)	(10)	(9)	(8)	(2)	(29)
รวม	935(100.0)	880(100.0)	595(100.0)	818(100.0)	3228(100.0)	1191(100.0)	1316(100.0)	1135(100.0)	540(100.0)	4182(100.0)
โรงเรียนมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้สุราและสารเสพติด										
ใช่	629(67.6)	605(68.9)	461(77.2)	539(66.1)	2234(69.3)	769(64.9)	959(72.9)	878(77.5)	376(69.5)	2982(71.4)
ไม่ใช่	144(15.5)	120(13.7)	55(9.2)	113(13.9)	432(13.4)	192(16.2)	130(9.9)	107(9.4)	68(12.6)	497(11.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	158(17.0)	153(17.4)	81(13.6)	164(20.1)	556(17.3)	224(18.9)	226(17.2)	148(13.1)	97(17.9)	695(16.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(6)	(2)	(5)	(27)	(16)	(10)	(10)	(1)	(37)
รวม	931(100.0)	878(100.0)	597(100.0)	816(100.0)	3222(100.0)	1185(100.0)	1315(100.0)	1133(100.0)	541(100.0)	4174(100.0)

ตารางที่ 6.4 ความคิดเห็นต่อนโยบาย ระเบียบของโรงเรียน (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
นักเรียนเองมักจะเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันสุราและสารเสพติดในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ										
ใช่	526(56.3)	437(49.7)	320(53.6)	436(53.3)	1719(53.2)	688(57.9)	746(56.7)	623(54.8)	331(61.3)	2388(57.1)
ไม่ใช่	235(25.2)	259(29.4)	169(28.3)	208(25.4)	871(27.0)	271(22.8)	316(24.0)	335(29.5)	129(23.9)	1051(25.1)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	173(18.5)	184(20.9)	108(18.1)	174(21.3)	639(19.8)	230(19.3)	254(19.3)	178(15.7)	80(14.8)	742(17.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(11)	(4)	(2)	(3)	(20)	(12)	(9)	(7)	(2)	(30)
รวม	934(100.0)	880(100.0)	597(100.0)	818(100.0)	3229(100.0)	1189(100.0)	1316(100.0)	1136(100.0)	540(100.0)	4181(100.0)
โรงเรียนห้ามครู ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนดื่มสุราโดยเด็ดขาดในบริเวณโรงเรียน										
ใช่	659(71.2)	573(65.3)	378(63.4)	528(64.8)	2138(66.5)	839(70.9)	901(68.6)	736(64.8)	384(71.4)	2860(68.6)
ไม่ใช่	81(8.8)	124(14.1)	99(16.6)	121(14.9)	425(13.2)	83(7.0)	150(11.4)	186(16.4)	77(14.3)	496(11.9)
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ	186(20.1)	181(20.6)	119(20.0)	166(20.4)	652(20.3)	261(22.1)	262(20.0)	214(18.8)	77(14.3)	814(19.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(19)	(6)	(3)	(6)	(34)	(18)	(12)	(7)	(4)	(41)
รวม	926(100.0)	878(100.0)	596(100.0)	815(100.0)	3215(100.0)	1183(100.0)	1313(100.0)	1136(100.0)	538(100.0)	4170(100.0)

ตารางที่ 6.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในห้องเรียนของนักเรียนเอง										
ไม่เคยเลย	905(96.6)	819(92.8)	547(91.6)	718(87.6)	2989(92.3)	1184(99.1)	1298(98.3)	1114(97.5)	518(95.6)	4114(97.9)
เคย 1 ครั้ง	18(1.9)	43(4.9)	32(5.4)	63(7.7)	156(4.8)	8(0.7)	14(1.1)	20(1.8)	16(3.0)	58(1.4)
เคย 2- 3 ครั้ง	14(1.5)	21(2.4)	18(3.0)	39(4.8)	92(2.8)	3(0.3)	9(0.7)	9(0.8)	8(1.5)	29(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(1)	(2)	(1)	(12)	(6)	(4)	(0)	(0)	(10)
รวม	937(100.0)	883(100.0)	597(100.0)	820(100.0)	3237(100.0)	1195(100.0)	1321(100.0)	1143(100.0)	542(100.0)	4201(100.0)
ถูกตรวจค้นว่ามี สุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดขณะกำลังอยู่ในบริเวณโรงเรียน										
ไม่เคยเลย	898(95.8)	812(92.0)	545(91.3)	711(86.8)	2966(91.7)	1169(97.8)	1280(97.0)	1110(97.4)	516(95.2)	4075(97.1)
เคย 1 ครั้ง	24(2.6)	44(5.0)	34(5.7)	64(7.8)	166(5.1)	20(1.7)	22(1.7)	15(1.3)	15(2.8)	72(1.7)
เคย 2- 3 ครั้ง	15(1.6)	27(3.1)	18(3.0)	44(5.4)	104(3.2)	6(0.5)	17(1.3)	15(1.3)	11(2.0)	49(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(8)	(1)	(2)	(2)	(13)	(6)	(6)	(3)	(0)	(15)
รวม	937(100.0)	883(100.0)	597(100.0)	819(100.0)	3236(100.0)	1195(100.0)	1319(100.0)	1140(100.0)	542(100.0)	4196(100.0)
นักเรียนหรือเพื่อนในกลุ่มถูกขอร้องให้เบียดเบียนหรือทำอะไรที่เป็นการรบกวนคนอื่นในขณะที่นักเรียนหรือเพื่อนกำลังดื่มสุรานั้น										
ไม่เคยเลย	889(96.2)	808(92.1)	537(90.3)	584(71.6)	2818(87.7)	1162(97.7)	1277(97.1)	1096(96.1)	491(90.6)	4026(96.2)
เคย 1 ครั้ง	23(2.5)	48(5.5)	32(5.4)	128(15.7)	231(7.2)	20(1.7)	25(1.9)	25(2.2)	34(6.3)	104(2.5)
เคย 2- 3 ครั้ง	12(1.3)	21(2.4)	26(4.4)	104(12.8)	163(5.1)	7(0.6)	13(1.0)	20(1.8)	17(3.1)	57(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(21)	(7)	(4)	(5)	(37)	(12)	(10)	(2)	(0)	(24)
รวม	924(100.0)	877(100.0)	595(100.0)	816(100.0)	3212(100.0)	1189(100.0)	1315(100.0)	1141(100.0)	542(100.0)	4187(100.0)

ตารางที่ 6.5 นักเรียนที่เคยเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุรา บุหรี่ สารเสพติด (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ขณะที่นักเรียนกำลังอยู่ในงานรื่นเริงในโรงเรียน งานนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากพบว่ามีนักเรียนดื่มสุรา										
ไม่เคยเลย	886(95.0)	819(93.1)	561(94.6)	752(92.2)	3018(93.7)	1153(96.7)	1246(94.5)	1064(93.4)	518(95.6)	3981(95.0)
เคย 1 ครั้ง	41(4.4)	47(5.3)	20(3.4)	38(4.7)	146(4.5)	32(2.7)	59(4.5)	51(4.5)	21(3.9)	163(3.9)
เคย 2- 3 ครั้ง	6(0.6)	14(1.6)	12(2.0)	26(3.2)	58(1.8)	7(0.6)	14(1.1)	24(2.1)	3(0.6)	48(1.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(4)	(6)	(5)	(27)	(9)	(6)	(4)	(0)	(19)
รวม	933(100.0)	880(100.0)	593(100.0)	816(100.0)	3222(100.0)	1192(100.0)	1319(100.0)	1139(100.0)	542(100.0)	4192(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการดื่มสุรา*										
ไม่ดื่มสุรา(จำนวน)	(562)	(513)	(321)	(289)	(1,685)	(833)	(954)	(851)	(336)	(2,974)
ไม่เคยเลย	349(94.1)	311(84.1)	225(82.4)	394(74.6)	1279(82.9)	358(98.6)	352(95.7)	281(96.9)	181(87.9)	1172(95.5)
เคย 1 ครั้ง	8(2.2)	39(10.5)	29(10.6)	78(14.8)	154(10.0)	3(0.8)	10(2.7)	4(1.4)	19(9.2)	36(2.9)
เคย 2- 3 ครั้ง	14(3.8)	20(5.4)	19(7.0)	56(10.6)	109(7.1)	2(0.6)	6(1.6)	5(1.7)	6(2.9)	19(1.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(12)	(1)	(5)	(4)	(22)	(5)	(3)	(2)	(0)	(10)
รวม	371(100.0)	370(100.0)	273(100.0)	528(100.0)	1542(100.0)	363(100.0)	368(100.0)	290(100.0)	206(100.0)	1227(100.0)
นักเรียนถูกตักเตือนเรื่องการสูบบุหรี่*										
ไม่สูบบุหรี่(จำนวน)	(555)	(487)	(350)	(323)	(1,715)	(843)	(985)	(908)	(367)	(3,103)
ไม่เคยเลย	340(90.4)	290(73.2)	181(74.2)	324(65.7)	1135(75.2)	344(98.0)	324(96.4)	219(94.4)	152(87.9)	1039(95.2)
เคย 1 ครั้ง	24(6.4)	65(16.4)	35(14.3)	98(19.9)	222(14.7)	5(1.4)	9(2.7)	6(2.6)	13(7.5)	33(3.0)
เคย 2- 3 ครั้ง	12(3.2)	41(10.4)	28(11.5)	71(14.4)	152(10.1)	2(0.6)	3(0.9)	7(3.0)	8(4.6)	20(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(1)	(5)	(5)	(25)	(7)	(4)	(3)	(2)	(16)
รวม	376(100.0)	396(100.0)	244(100.0)	493(100.0)	1509(100.0)	351(100.0)	336(100.0)	232(100.0)	173(100.0)	1092(100.0)
นักเรียนถูกปรับหรือลงโทษแบบอื่นๆ เพราะว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(543)	(484)	(334)	(302)	(1,663)	(834)	(966)	(884)	(344)	(3,028)
ไม่เคยเลย	374(96.4)	351(88.2)	241(92.3)	441(85.5)	1407(90.0)	356(98.9)	347(97.5)	250(97.3)	179(90.9)	1132(96.8)
เคย 1 ครั้ง	9(2.3)	36(9.1)	12(4.6)	51(9.9)	108(6.9)	3(0.8)	8(2.3)	4(1.6)	15(7.6)	30(2.6)
เคย 2- 3 ครั้ง	5(1.3)	11(2.8)	8(3.1)	24(4.7)	48(3.1)	1(0.3)	1(0.3)	3(1.2)	3(1.5)	8(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(2)	(4)	(3)	(23)	(7)	(3)	(2)	(1)	(13)
รวม	388(100.0)	398(100.0)	261(100.0)	516(100.0)	1563(100.0)	360(100.0)	356(100.0)	257(100.0)	197(100.0)	1170(100.0)
นักเรียนถูกส่งต่อไปรับการบำบัดเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด*										
ไม่ดื่มสุรา/สูบบุหรี่/ใช้สารเสพติด(จำนวน)	(527)	(461)	(336)	(287)	(1,611)	(819)	(951)	(867)	(344)	(2,981)
ไม่เคยเลย	396(98.3)	395(95.0)	246(95.0)	491(92.6)	1528(95.0)	372(99.5)	364(98.4)	272(99.3)	189(95.5)	1197(98.4)
เคย 1 ครั้ง	3(0.7)	14(3.4)	7(2.7)	33(6.2)	57(3.5)	1(0.3)	4(1.1)	1(0.4)	7(3.5)	13(1.1)
เคย 2- 3 ครั้ง	4(1.0)	7(1.7)	6(2.3)	6(1.1)	23(1.4)	1(0.3)	2(0.5)	1(0.4)	2(1.0)	6(0.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(7)	(4)	(4)	(30)	(8)	(4)	(2)	(0)	(14)
รวม	403(100.0)	416(100.0)	259(100.0)	530(100.0)	1608(100.0)	374(100.0)	370(100.0)	274(100.0)	198(100.0)	1216(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน

ตารางที่ 6.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
สวมหมวกกันน็อค เวลาที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(59)	(51)	(25)	(31)	(166)	(124)	(91)	(61)	(13)	(289)
ไม่เคยเลย	205(24.3)	159(19.8)	81(14.9)	97(13.0)	542(18.4)	278(26.8)	255(21.1)	119(11.3)	61(12.1)	713(18.7)
นานๆครั้ง	394(46.7)	339(42.1)	169(31.0)	333(44.5)	1235(42.0)	486(46.9)	594(49.3)	413(39.0)	256(50.8)	1749(46.0)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	245(29.0)	307(38.1)	295(54.1)	319(42.6)	1166(39.6)	273(26.3)	357(29.6)	526(49.7)	187(37.1)	1343(35.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(28)	(29)	(41)	(140)	(40)	(28)	(24)	(25)	(117)
รวม	844(100.0)	805(100.0)	545(100.0)	749(100.0)	2943(100.0)	1037(100.0)	1206(100.0)	1058(100.0)	504(100.0)	3805(100.0)
คาดเข็มขัดนิรภัย เวลาที่ขับรถหรือนั่งในรถยนต์ด้านหน้าข้างคนขับ*										
ไม่ได้ขับขี่/ซ้อน/นั่งรถ										
(จำนวน)	(90)	(98)	(57)	(104)	(349)	(99)	(114)	(115)	(62)	(390)
ไม่เคยเลย	236(29.0)	266(35.2)	148(28.9)	203(30.3)	853(31.0)	305(28.8)	356(30.2)	246(24.6)	158(34.9)	1065(28.8)
นานๆครั้ง	340(41.8)	288(38.2)	191(37.2)	286(42.6)	1105(40.2)	460(43.4)	526(44.6)	435(43.4)	188(41.5)	1609(43.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	237(29.2)	201(26.6)	174(33.9)	182(27.1)	794(28.9)	295(27.8)	298(25.3)	321(32.0)	107(23.6)	1021(27.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(31)	(29)	(46)	(148)	(42)	(31)	(26)	(27)	(126)
รวม	813(100.0)	755(100.0)	513(100.0)	671(100.0)	2752(100.0)	1060(100.0)	1180(100.0)	1002(100.0)	453(100.0)	3695(100.0)
ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะอื่น หลังจากที่พักดื่มสุรามา										
ไม่เคยเลย	850(95.9)	742(88.4)	448(79.3)	434(56.4)	2474(80.9)	1132(99.0)	1241(96.6)	1038(93.9)	455(89.7)	3866(95.7)
นานๆครั้ง	27(3.1)	68(8.1)	102(18.1)	280(36.4)	477(15.6)	7(0.6)	42(3.3)	56(5.1)	42(8.3)	147(3.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	9(1.0)	29(3.5)	15(2.7)	56(7.3)	109(3.6)	5(0.4)	2(0.2)	11(1.0)	10(2.0)	28(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(59)	(45)	(34)	(51)	(189)	(57)	(40)	(38)	(35)	(170)
รวม	886(100.0)	839(100.0)	565(100.0)	770(100.0)	3060(100.0)	1144(100.0)	1285(100.0)	1105(100.0)	507(100.0)	4041(100.0)
พกพา มีด ปืน หรือไม้กระบอง หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อใช้เป็นอาวุธ										
ไม่เคยเลย	779(87.0)	676(79.6)	441(77.6)	514(66.4)	2410(78.1)	1095(95.1)	1206(93.1)	1006(90.5)	445(86.7)	3752(92.1)
นานๆครั้ง	97(10.8)	127(15.0)	103(18.1)	198(25.6)	525(17.0)	50(4.3)	76(5.9)	82(7.4)	59(11.5)	267(6.6)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	19(2.1)	46(5.4)	24(4.2)	62(8.0)	151(4.9)	7(0.6)	13(1.0)	24(2.2)	9(1.8)	53(1.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(50)	(35)	(31)	(47)	(163)	(49)	(30)	(31)	(29)	(139)
รวม	895(100.0)	849(100.0)	568(100.0)	774(100.0)	3086(100.0)	1152(100.0)	1295(100.0)	1112(100.0)	513(100.0)	4072(100.0)
ถูกข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ เช่นมีด ปืน หรือไม้กระบอง หรืออาวุธอื่นๆ										
ไม่เคยเลย	850(95.3)	773(91.5)	509(89.6)	640(83.0)	2772(90.1)	1140(99.0)	1277(98.6)	1100(98.7)	492(96.3)	4009(98.5)
นานๆครั้ง	37(4.2)	58(6.9)	52(9.2)	106(13.8)	253(8.2)	10(0.9)	15(1.2)	12(1.1)	14(2.7)	51(1.3)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	5(0.6)	14(1.7)	7(1.2)	25(3.2)	51(1.7)	1(0.1)	3(0.2)	3(0.3)	5(1.0)	12(0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(53)	(39)	(31)	(50)	(173)	(50)	(30)	(28)	(31)	(139)
รวม	892(100.0)	845(100.0)	568(100.0)	771(100.0)	3076(100.0)	1151(100.0)	1295(100.0)	1115(100.0)	511(100.0)	4072(100.0)

ตารางที่ 6.6 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรมเสี่ยง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ชกต้อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่น โดยไม่ได้รับบาดเจ็บ										
ไม่เคยเลย	649(72.4)	591(70.2)	404(71.5)	489(63.3)	2133(69.3)	1027(89.5)	1137(88.3)	985(88.6)	427(83.2)	3576(88.1)
นานๆครั้ง	228(25.5)	214(25.4)	141(25.0)	242(31.3)	825(26.8)	112(9.8)	142(11.0)	112(10.1)	76(14.8)	442(10.9)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	19(2.1)	37(4.4)	20(3.5)	42(5.4)	118(3.8)	9(0.8)	9(0.7)	15(1.4)	10(2.0)	43(1.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(49)	(42)	(34)	(48)	(173)	(53)	(37)	(31)	(29)	(150)
รวม	896(100.0)	842(100.0)	565(100.0)	773(100.0)	3076(100.0)	1148(100.0)	1288(100.0)	1112(100.0)	513(100.0)	4061(100.0)
ชกต้อย ตบตี ต่อสู้ทะเลาะวิวาทกับคนอื่นจนได้รับบาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแลรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาล										
ไม่เคยเลย	853(95.4)	757(89.6)	512(90.3)	640(83.0)	2762(89.8)	1127(98.1)	1267(98.5)	1082(97.1)	487(94.9)	3963(97.5)
นานๆครั้ง	33(3.7)	71(8.4)	46(8.1)	105(13.6)	255(8.3)	21(1.8)	18(1.4)	29(2.6)	22(4.3)	90(2.2)
บ่อยๆ / ทุกครั้ง	8(0.9)	17(2.0)	9(1.6)	26(3.4)	60(2.0)	1(0.1)	2(0.2)	3(0.3)	4(0.8)	10(0.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(51)	(39)	(32)	(50)	(172)	(52)	(38)	(29)	(29)	(148)
รวม	894(100.0)	845(100.0)	567(100.0)	771(100.0)	3077(100.0)	1149(100.0)	1287(100.0)	1114(100.0)	513(100.0)	4063(100.0)
ถูกแฟนตบตีหรือทำร้ายร่างกายโดยตั้งใจ**										
ยังไม่มีแฟน	(651)	(455)	(291)	(292)	(1,689)	(952)	(923)	(613)	(175)	(2,663)
ไม่เคยเลย	256(92.1)	363(87.1)	260(87.0)	463(88.7)	1342(88.5)	236(97.9)	367(92.7)	487(92.6)	341(93.2)	1431(93.6)
เคย	22(7.9)	54(13.0)	39(13.0)	59(11.3)	174(11.5)	5(2.1)	29(7.3)	39(7.4)	25(6.8)	98(6.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(12)	(9)	(7)	(44)	(8)	(6)	(4)	(1)	(19)
รวม	278(100.0)	417(100.0)	299(100.0)	522(100.0)	1516(100.0)	241(100.0)	396(100.0)	526(100.0)	366(100.0)	1529(100.0)
ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจ***										
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	(675)	(539)	(372)	(309)	(1,895)	(990)	(1,104)	(897)	(295)	(3,286)
ไม่เคยถูกบังคับ	236(95.9)	290(88.7)	192(88.9)	449(89.8)	1167(90.5)	194(98.0)	204(96.2)	224(94.9)	222(91.0)	844(94.8)
เคย	10(4.1)	37(11.3)	24(11.1)	51(10.2)	122(9.5)	4(2.0)	8(3.8)	12(5.1)	22(9.0)	46(5.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(24)	(18)	(11)	(12)	(65)	(13)	(9)	(10)	(3)	(35)
รวม	246(100.0)	327(100.0)	216(100.0)	500(100.0)	1289(100.0)	198(100.0)	212(100.0)	236(100.0)	244(100.0)	890(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยขบขี้/ช้อน/นั่งรถ **ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่มีแฟน ***ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย

ตารางที่ 6.7 นักเรียนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าและการพยายามฆ่าตัวตาย ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
เคยรู้สึกซึมเศร้า หมดหวัง หมดอาลัยในชีวิตเกือบทุกวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน จนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ										
ไม่เคย	876(94.3)	803(91.9)	489(82.7)	710(87.1)	2878(89.7)	1120(94.0)	1192(90.3)	977(86.0)	462(85.2)	3751(89.5)
เคย	53(5.7)	71(8.1)	102(17.3)	105(12.9)	331(10.3)	72(6.0)	128(9.7)	159(14.0)	80(14.8)	439(10.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(16)	(10)	(8)	(6)	(40)	(9)	(5)	(7)	(0)	(21)
รวม	929(100.0)	874(100.0)	591(100.0)	815(100.0)	3209(100.0)	1192(100.0)	1320(100.0)	1136(100.0)	542(100.0)	4190(100.0)
เคยคิดจะฆ่าตัวตายอย่างจริงจัง										
ไม่เคย	911(98.0)	840(95.9)	566(95.3)	782(95.6)	3099(96.3)	1175(98.4)	1267(96.0)	1089(95.7)	509(93.9)	4040(96.3)
เคย	19(2.0)	36(4.1)	28(4.7)	36(4.4)	119(3.7)	19(1.6)	53(4.0)	49(4.3)	33(6.1)	154(3.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(15)	(8)	(5)	(3)	(31)	(7)	(5)	(5)	(0)	(17)
รวม	930(100.0)	876(100.0)	594(100.0)	818(100.0)	3218(100.0)	1194(100.0)	1320(100.0)	1138(100.0)	542(100.0)	4194(100.0)
เคยวางแผนวิธีการที่จะฆ่าตัวตาย										
ไม่เคย	915(98.2)	834(95.4)	559(94.3)	788(96.7)	3096(96.3)	1155(97.2)	1248(94.8)	1077(94.9)	502(93.0)	3982(95.3)
เคย	17(1.8)	40(4.6)	34(5.7)	27(3.3)	118(3.7)	33(2.8)	69(5.2)	58(5.1)	38(7.0)	198(4.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(13)	(10)	(6)	(6)	(35)	(13)	(8)	(8)	(2)	(31)
รวม	932(100.0)	874(100.0)	593(100.0)	815(100.0)	3214(100.0)	1188(100.0)	1317(100.0)	1135(100.0)	540(100.0)	4180(100.0)
การพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ										
ไม่เคย	902(97.2)	846(96.7)	573(96.5)	771(94.5)	3092(96.2)	1165(97.7)	1265(95.8)	1083(95.4)	499(92.2)	4012(95.8)
เคย	26(2.8)	29(3.3)	21(3.5)	45(5.5)	121(3.8)	28(2.4)	56(4.2)	52(4.6)	42(7.8)	178(4.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(17)	(9)	(5)	(5)	(36)	(8)	(4)	(8)	(1)	(21)
รวม	928(100.0)	875(100.0)	594(100.0)	816(100.0)	3213(100.0)	1193(100.0)	1321(100.0)	1135(100.0)	541(100.0)	4190(100.0)
จำนวนครั้งที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ*										
1-2 ครั้ง	21(80.8)	24(82.8)	12(57.1)	34(75.6)	91(75.2)	22(78.6)	47(83.9)	43(82.7)	38(90.5)	150(84.3)
3-5 ครั้ง	0(0.0)	1(3.5)	3(14.3)	3(6.7)	7(5.8)	4(14.3)	6(10.7)	5(9.6)	2(4.8)	17(9.6)
> 5 ครั้ง	5(19.2)	4(13.8)	6(28.6)	8(17.8)	23(19.0)	2(7.1)	3(5.4)	4(7.7)	2(4.8)	11(6.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	26(100.0)	29(100.0)	21(100.0)	45(100.0)	121(100.0)	28(100.0)	56(100.0)	52(100.0)	42(100.0)	178(100.0)
เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ จนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์*										
ไม่เคย	19(73.1)	20(69.0)	13(61.9)	22(48.9)	74(61.2)	26(92.9)	43(76.8)	43(82.7)	30(71.4)	142(79.8)
เคย	7(26.9)	9(31.0)	8(38.1)	23(51.1)	47(38.8)	2(7.1)	13(23.2)	9(17.3)	12(28.6)	36(20.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	26(100.0)	29(100.0)	21(100.0)	45(100.0)	121(100.0)	28(100.0)	56(100.0)	52(100.0)	42(100.0)	178(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายจริงๆ

พฤติกรรมกรรมการมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 6.8 พฤติกรรมกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การมีเพศสัมพันธ์										
ไม่เคยมี	879(96.8)	769(89.4)	502(85.8)	500(62.4)	2650(84.0)	1109(99.8)	1271(98.2)	1056(94.5)	401(75.8)	3837(94.7)
เคยมี	29(3.2)	91(10.6)	83(14.2)	301(37.6)	504(16.0)	2(0.2)	23(1.8)	61(5.5)	128(24.2)	214(5.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(37)	(24)	(14)	(20)	(95)	(90)	(31)	(26)	(13)	(160)
รวม	908(100.0)	860(100.0)	585(100.0)	801(100.0)	3154(100.0)	1111(100.0)	1294(100.0)	1117(100.0)	529(100.0)	4051(100.0)
อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก										
mean±sd	11.9±1.6	13.3±2.3	14.6±2.0	14.9±2.0	14.4±2.2	-	14.3±0.6	15.6±1.4	16.3±1.1	15.9±1.3
median (พิสัย)	12(8-14)	14(5-16)	15(8-18)	15(6-20)	15 (5-20)	-	14(13-15)	16(10-18)	16(13-19)	16 (10-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(14)	(19)	(7)	(59)	(99)	(2)	(4)	(7)	(10)	(23)
รวม	15	72	76	242	405	0	19	54	118	191
จำนวนคนที่นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย*										
1 คน	16(57.1)	22(25.0)	28(34.2)	91(30.7)	157(31.8)	2(100.0)	11(47.8)	42(70.0)	86(68.3)	141(66.8)
2 คน	1(3.6)	19(21.6)	8(9.8)	50(16.9)	78(15.8)	0(0.0)	6(26.1)	8(13.3)	22(17.5)	36(17.1)
3 คน	1(3.6)	13(14.8)	5(6.1)	35(11.8)	54(10.9)	0(0.0)	0(0.0)	4(6.7)	8(6.4)	12(5.7)
4 คน	1(3.6)	7(8.0)	8(9.8)	22(7.4)	38(7.7)	0(0.0)	5(21.7)	5(8.3)	7(5.6)	17(8.1)
5 คน	1(3.6)	6(6.8)	4(4.9)	20(6.8)	31(6.3)	-	-	-	-	-
6 คน ขึ้นไป	8(28.6)	21(23.9)	29(35.4)	78(26.4)	136(27.5)	0(0.0)	5(21.7)	5(8.3)	7(5.6)	17(8.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(3)	(1)	(5)	(10)	(0)	(0)	(1)	(2)	(3)
รวม	28(100.0)	88(100.0)	82(100.0)	296(100.0)	494(100.0)	2(100.0)	23(100.0)	60(100.0)	126(100.0)	211(100.0)
ดื่มเหล้า/ใช้สารฯ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย*										
ไม่เคย	20(83.3)	69(77.5)	55(70.5)	215(76.0)	359(75.7)	2(100.0)	18(81.8)	54(93.1)	115(91.3)	189(90.9)
เคย	4(16.7)	20(22.5)	23(29.5)	68(24.0)	115(24.3)	0(0.0)	4(18.2)	4(6.9)	11(8.7)	19(9.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(5)	(2)	(5)	(18)	(30)	(0)	(1)	(3)	(2)	(6)
รวม	24(100.0)	89(100.0)	78(100.0)	283(100.0)	474(100.0)	2(100.0)	22(100.0)	58(100.0)	126(100.0)	208(100.0)
วิธีการคุมกำเนิดที่นักเรียน หรือคู่ของนักเรียนเคยใช้*										
ไม่ใช้วิธีการใดๆ	11(40.7)	11(12.1)	16(19.3)	64(21.6)	102(20.5)	0(0.0)	3(13.0)	20(32.8)	29(22.7)	52(24.4)
ยาเม็ดคุมกำเนิด	1(3.7)	6(6.6)	3(3.6)	8(2.7)	18(3.6)	0(0.0)	1(4.4)	0(0.0)	15(11.7)	16(7.5)
ถุงยางอนามัย	8(29.6)	45(49.5)	46(55.4)	171(57.8)	270(54.3)	1(100.0)	10(43.5)	21(34.4)	45(35.2)	77(36.2)
ยาฉีดคุมกำเนิด	1(3.7)	1(1.1)	1(1.2)	0(0.0)	3(0.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.6)	2(0.9)
หลังภายนอก	1(3.7)	18(19.8)	8(9.6)	33(11.2)	60(12.1)	0(0.0)	9(39.1)	15(24.6)	31(24.2)	55(25.8)
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน	1(3.7)	0(0.0)	2(2.4)	10(3.4)	13(2.6)	0(0.0)	0(0.0)	5(8.2)	3(2.3)	8(3.8)
วิธีการอื่นๆ	1(3.7)	1(1.1)	1(1.2)	3(1.0)	6(1.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(2.3)	3(1.4)
ไม่แน่ใจ	3(11.1)	9(9.9)	6(7.2)	7(2.4)	25(5.0)	-	-	-	-	-
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(0)	(0)	(5)	(7)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
รวม	27(100.0)	91(100.0)	83(100.0)	296(100.0)	497(100.0)	1(100.0)	23(100.0)	61(100.0)	128(100.0)	213(100.0)

ตารางที่ 6.8 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การตั้งครรรภ์หรือทำให้คนอื่นตั้งครรรภ์*										
ไม่เคย	19(86.4)	71(91.0)	64(88.9)	234(87.3)	388(88.2)	1(100.0)	17(89.5)	51(91.1)	117(93.6)	186(92.5)
1 ครั้ง	1(4.6)	2(2.6)	3(4.2)	19(7.1)	25(5.7)	0(0.0)	2(10.5)	3(5.4)	5(4.0)	10(5.0)
≥2 ครั้ง	2(9.1)	5(6.4)	5(6.9)	15(5.6)	27(6.1)	0(0.0)	0(0.0)	2(3.6)	3(2.4)	5(2.5)
ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ (จำนวน)	(7)	(13)	(11)	(33)	(64)	(1)	(4)	(5)	(3)	(13)
รวม	22(100.0)	78(100.0)	72(100.0)	268(100.0)	440(100.0)	1(100.0)	19(100.0)	56(100.0)	125(100.0)	201(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์

ตารางที่ 6.9 การสอนเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
การได้รับคำสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียน										
ไม่เคย	262(29.0)	170(20.1)	60(10.4)	169(21.4)	661(21.2)	235(20.5)	124(9.5)	81(7.3)	83(15.8)	523(12.8)
เคย	562(62.2)	605(71.5)	492(85.4)	544(68.8)	2203(70.7)	786(68.6)	1098(84.1)	970(87.4)	411(78.4)	3265(79.9)
ไม่แน่ใจ	79(8.8)	71(8.4)	24(4.2)	78(9.9)	252(8.1)	125(10.9)	83(6.4)	59(5.3)	30(5.7)	297(7.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(42)	(38)	(23)	(30)	(133)	(55)	(20)	(33)	(18)	(126)
รวม	903(100.0)	846(100.0)	576(100.0)	791(100.0)	3116(100.0)	1146(100.0)	1305(100.0)	1110(100.0)	524(100.0)	4085(100.0)

พฤติกรรมกรรมการดื่มสุรา

ตารางที่ 6.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	752(82.6)	588(67.7)	310(52.1)	284(34.9)	1934(60.6)	1109(93.8)	1096(83.2)	819(71.7)	342(63.3)	3366(80.5)
เคยดื่มสุรา	159(17.5)	281(32.3)	285(47.9)	531(65.2)	1256(39.4)	73(6.2)	221(16.8)	323(28.3)	198(36.7)	815(19.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(34)	(15)	(4)	(6)	(59)	(19)	(8)	(1)	(2)	(30)
รวม	911(100.0)	869(100.0)	595(100.0)	815(100.0)	3190(100.0)	1182(100.0)	1317(100.0)	1142(100.0)	540(100.0)	4181(100.0)
อายุเมื่อดื่มสุราครั้งแรก										
mean±sd	10.9±1.8	12.4±2.2	13.8±2.4	14.2±1.9	13.3±2.4	11.1±1.8	12.9±1.9	14.4±2.1	15.3±1.5	13.9±2.2
median (พิสัย)	11(6-15)	13(3-15)	15(5-18)	15(6-18)	14 (3-18)	12(3-14)	13(4-15)	15(5-18)	15(10-19)	14(3-19)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(50)	(46)	(33)	(86)	(215)	(16)	(34)	(37)	(25)	(112)
รวม	109	235	252	446	704	57	188	286	173	704
สถานที่ที่มักจะดื่มสุรา*										
งานฉลอง/รื่นเริง	47(38.8)	104(43.3)	130(49.2)	185(38.2)	466(42.0)	27(42.2)	110(54.5)	132(42.3)	79(43.4)	348(45.8)
บ้าน	50(41.3)	83(34.6)	76(28.8)	128(26.5)	337(30.4)	27(42.2)	63(31.2)	112(35.9)	40(22.0)	242(31.8)
หอพัก	3(2.5)	6(2.5)	10(3.8)	71(14.7)	90(8.1)	1(1.6)	4(2.0)	22(7.1)	23(12.6)	50(6.6)
งานโรงเรียน	4(3.3)	6(2.5)	3(1.1)	7(1.5)	20(1.8)	2(3.1)	9(4.5)	5(1.6)	2(1.1)	18(2.4)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีไม่ เกิน 500 เมตร	2(1.7)	11(4.6)	10(3.8)	18(3.7)	41(3.7)	1(1.6)	2(1.0)	6(1.9)	9(5.0)	18(2.4)
ร้านค้า ร้านอาหาร รอบ บริเวณโรงเรียน รัศมีเกิน 500 เมตร	9(7.4)	17(7.1)	21(8.0)	47(9.7)	94(8.5)	2(3.1)	5(2.5)	26(8.3)	21(11.5)	54(7.1)
ร้านน้ำชา	0(0.0)	2(0.8)	3(1.1)	6(1.2)	11(1.0)	2(3.1)	1(0.5)	2(0.6)	2(1.1)	7(0.9)
สวน/ไร่นา	3(2.5)	3(1.3)	5(1.9)	12(2.5)	23(2.1)	0(0.0)	1(0.5)	2(0.6)	1(0.6)	4(0.5)
อื่นๆ	3(2.5)	8(3.3)	6(2.3)	10(2.1)	27(2.4)	2(3.1)	7(3.5)	5(1.6)	5(2.8)	19(2.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(38)	(41)	(21)	(47)	(147)	(9)	(19)	(11)	(16)	(55)
รวม	121(100.0)	240(100.0)	264(100.0)	484(100.0)	1109(100.0)	64(100.0)	202(100.0)	312(100.0)	182(100.0)	760(100.0)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เคยดื่มสุรา 5 หน่วยขึ้นไปภายในการดื่มครั้งเดียว*										
ไม่เคยเลย	107(69.0)	132(47.3)	151(53.6)	210(40.0)	600(48.4)	50(69.4)	144(65.2)	229(72.0)	87(44.6)	510(63.3)
1-2 ครั้ง	29(18.7)	84(30.1)	72(25.5)	162(30.9)	347(28.0)	16(22.2)	61(27.6)	74(23.3)	84(43.1)	235(29.2)
3-5 ครั้ง	8(5.2)	30(10.8)	35(12.4)	77(14.7)	150(12.1)	4(5.6)	9(4.1)	7(2.2)	15(7.7)	35(4.3)
6-9 ครั้ง	3(1.9)	8(2.9)	3(1.1)	34(6.5)	48(3.9)	1(1.4)	2(0.9)	5(1.6)	3(1.5)	11(1.4)
10 ครั้ง ขึ้นไป	8(5.2)	25(9.0)	21(7.5)	42(8.0)	96(7.7)	1(1.4)	5(2.3)	3(0.9)	6(3.1)	15(1.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(2)	(3)	(6)	(15)	(1)	(0)	(5)	(3)	(9)
รวม	155(100.0)	279(100.0)	282(100.0)	525(100.0)	1241(100.0)	72(100.0)	221(100.0)	318(100.0)	195(100.0)	806(100.0)

ตารางที่ 6.10 พฤติกรรมการดื่มสุรา (ร้อยละ) (ต่อ)

พฤติกรรม	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ครั้งสุดท้ายที่ดื่มสุรา*										
>12 เดือนที่ผ่านมา	26(38.2)	38(19.8)	36(17.1)	48(11.9)	148(17.0)	9(27.3)	25(18.9)	53(25.7)	14(10.0)	101(19.8)
>30 วัน แต่ภายใน 12 เดือนนี้	13(19.1)	36(18.8)	40(19.0)	56(13.9)	145(16.6)	2(6.1)	31(23.5)	55(26.7)	17(12.1)	105(20.6)
>1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วันนี้	11(16.2)	37(19.3)	54(25.6)	82(20.4)	184(21.1)	10(30.3)	33(25.0)	59(28.6)	25(17.9)	127(24.9)
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา	18(26.5)	81(42.2)	81(38.4)	216(53.7)	396(45.4)	12(36.4)	43(32.6)	39(18.9)	84(60.0)	178(34.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(91)	(89)	(74)	(129)	(383)	(40)	(89)	(117)	(58)	(304)
รวม	68(100.0)	192(100.0)	211(100.0)	402(100.0)	873(100.0)	33(100.0)	132(100.0)	206(100.0)	140(100.0)	511(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่า ดื่มครั้งสุดท้าย มากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน+ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
1-2 ครั้ง	15(57.7)	59(51.8)	76(58.9)	124(43.7)	274(49.6)	14(70.0)	57(79.2)	74(79.6)	71(70.3)	216(75.5)
3-5 ครั้ง	6(23.1)	22(19.3)	23(17.8)	67(23.6)	118(21.3)	5(25.0)	6(8.3)	12(12.9)	18(17.8)	41(14.3)
6-9 ครั้ง	1(3.9)	10(8.8)	8(6.2)	38(13.4)	57(10.3)	0(0.0)	8(11.1)	3(3.2)	7(6.9)	18(6.3)
10-19 ครั้ง	2(7.7)	9(7.9)	7(5.4)	32(11.3)	50(9.0)	1(5.0)	0(0.0)	2(2.2)	3(3.0)	6(2.1)
20 ครั้ง ขึ้นไป	2(7.7)	14(12.3)	15(11.6)	23(8.1)	54(9.8)	0(0.0)	1(1.4)	2(2.2)	2(2.0)	5(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(6)	(14)	(27)	(2)	(4)	(5)	(8)	(19)
รวม	26(100.0)	114(100.0)	129(100.0)	284(100.0)	553(100.0)	20(100.0)	72(100.0)	93(100.0)	101(100.0)	286(100.0)
จำนวนหน่วยที่ดื่มสุราในแต่ละครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา (คิดร้อยละจากจำนวนผู้ตอบ จำนวนครั้งที่ดื่มสุราใน 30 วันที่ผ่านมา)										
1-2 หน่วย	16(64.0)	52(46.0)	39(31.0)	80(28.6)	187(34.4)	11(55.0)	35(51.5)	40(43.5)	57(57.0)	143(51.1)
3-5 หน่วย	9(36.0)	34(30.1)	48(38.1)	104(37.1)	195(35.9)	8(40.0)	26(38.2)	33(35.9)	27(27.0)	94(33.6)
6-8 หน่วย	0(0.0)	11(9.7)	14(11.1)	41(14.6)	66(12.1)	1(5.0)	2(2.9)	9(9.8)	8(8.0)	20(7.1)
9 หน่วย ขึ้นไป	0(0.0)	16(14.2)	25(19.8)	55(19.6)	96(17.7)	0(0.0)	5(7.4)	10(10.9)	8(8.0)	23(8.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(1)	(3)	(4)	(9)	(0)	(4)	(1)	(1)	(6)
รวม	25(100.0)	113(100.0)	126(100.0)	280(100.0)	544(100.0)	20(100.0)	68(100.0)	92(100.0)	100(100.0)	280(100.0)
จำนวนครั้งที่ดื่มสุราจนเมา ใน 30 วันที่ผ่านมา** (คิดร้อยละจากจำนวนที่ตอบว่าดื่มครั้งสุดท้ายมากกว่า 1 สัปดาห์ แต่ภายใน 30 วัน +ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา)										
ไม่เคยเลย	12(42.9)	50(42.4)	72(53.7)	91(30.5)	225(38.9)	16(72.7)	45(59.2)	57(58.2)	49(45.0)	167(54.8)
1-2 ครั้ง	12(42.9)	40(33.9)	40(29.9)	131(44.0)	223(38.6)	6(27.3)	26(34.2)	36(36.7)	50(45.9)	118(38.7)
3-5 ครั้ง	2(7.1)	14(11.9)	15(11.2)	41(13.8)	72(12.5)	0(0.0)	4(5.3)	4(4.1)	7(6.4)	15(4.9)
6-9 ครั้ง	1(3.6)	3(2.5)	2(1.5)	18(6.0)	24(4.2)	0(0.0)	1(1.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.3)
10-19 ครั้ง	1(3.5)	4(3.4)	0(0.0)	8(2.7)	13(2.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(1.8)	2(0.7)
20 ครั้ง ขึ้นไป	0(0.0)	7(5.9)	5(3.7)	9(3.0)	21(3.6)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.0)	1(0.9)	2(0.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(1)	(0)	(1)	(0)	(2)	-	-	-	-	-
รวม	28(100.0)	118(100.0)	134(100.0)	298(100.0)	578(100.0)	22(100.0)	76(100.0)	98(100.0)	109(100.0)	305(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุราใน 30 วัน

ตารางที่ 6.11 แหล่งที่เคยได้สุรา ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

แหล่ง	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ได้จากคนอื่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี	58(6.4)	117(13.5)	122(20.5)	293(36.0)	590(18.5)	36(3.1)	91(7.0)	125(11.0)	115(21.5)	367(8.9)
ตัวเองโดยใช้บัตรประจำตัวของ										
คนอื่น	22(2.4)	38(4.4)	38(6.4)	123(15.1)	221(6.9)	8(0.7)	10(0.8)	15(1.3)	25(4.7)	58(1.4)
ได้จากคนอื่นที่อายุมากกว่า 20 ปี	69(7.6)	155(17.9)	176(29.6)	351(43.1)	751(23.6)	38(3.3)	102(7.8)	146(12.9)	143(26.6)	429(10.4)
ตัวเองโดยผู้ขายไม่ตรวจบัตร										
ประจำตัว	41(4.5)	97(11.2)	124(20.9)	322(39.5)	584(18.3)	37(3.2)	77(5.9)	94(8.3)	85(15.9)	293(7.1)
เอามาจากบ้าน										
(ของ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง)	44(4.9)	57(6.6)	76(12.8)	143(17.6)	320(10.1)	30(2.6)	61(4.7)	82(7.2)	45(8.4)	218(5.3)
ตัวเอง/ได้จากคนอื่นที่ได้มาจาก										
ร้านค้ารอบบริเวณโรงเรียน										
รัศมีไม่เกิน 500 เมตร	31(3.4)	77(8.9)	77(12.9)	219(26.9)	404(12.7)	25(2.1)	33(2.5)	55(4.9)	58(10.8)	171(4.1)
เวลาเฉลี่ยในการซื้อ/หาสุรา										
mean±sd	4.4±9.3	7.4±11.8	9.4±11.1	11.9±11.7	8.0±11.3	4.3±9.2	6.0±9.9	9.7±13.1	9.2±11.6	7.1±11.3
median (พิสัย)	0(0-90)	0(0-60)	5(0-60)	10(0-60)	5(0-90)	0(0-60)	0(0-60)	5(0-90)	5(0-60)	0(0-90)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(458)	(343)	(233)	(409)	(1443)	(633)	(654)	(452)	(287)	(2026)
รวม	487	541	366	412	1806	568	671	691	255	2185

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
อาการเมาค้าง*										
ไม่เลย	140(89.2)	191(68.7)	200(70.4)	261(49.3)	792(63.5)	57(79.2)	175(79.2)	255(79.0)	120(60.6)	607(74.6)
เคย	17(10.8)	87(31.3)	84(29.6)	268(50.7)	456(36.5)	15(20.8)	46(20.8)	68(21.1)	78(39.4)	207(25.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
รวม	157(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1248(100.0)	72(100.0)	221(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	814(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	11(64.7)	54(62.1)	49(58.3)	132(49.3)	246(54.0)	14(93.3)	32(69.6)	46(67.7)	54(69.2)	146(70.5)
2-3 ครั้ง	5(29.4)	14(16.1)	16(19.1)	92(34.3)	127(27.9)	1(6.7)	14(30.4)	21(30.9)	21(26.9)	57(27.5)
4 ครั้งขึ้นไป	1(5.9)	19(21.8)	19(22.6)	44(16.4)	83(18.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(1.5)	3(3.9)	4(1.9)
รวม	17(100.0)	87(100.0)	84(100.0)	268(100.0)	456(100.0)	15(100.0)	46(100.0)	68(100.0)	78(100.0)	207(100.0)
ทำข้อสอบหรืองานสำคัญได้ไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน*										
ไม่เลย	115(73.7)	188(67.6)	183(64.4)	329(62.2)	815(65.4)	56(77.8)	176(80.0)	245(76.1)	127(64.1)	604(74.4)
เคย	41(26.3)	90(32.4)	101(35.6)	200(37.8)	432(34.6)	16(22.2)	44(20.0)	77(23.9)	71(35.9)	208(25.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(1)	(0)	(3)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	322(100.0)	198(100.0)	812(100.0)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	25(61.0)	55(61.1)	39(38.6)	124(62.0)	243(56.3)	10(62.5)	23(52.3)	38(49.4)	48(67.6)	119(57.2)
2-3 ครั้ง	13(31.7)	22(24.4)	44(43.6)	61(30.5)	140(32.4)	3(18.8)	15(34.1)	28(36.4)	20(28.2)	66(31.7)
4 ครั้งขึ้นไป	3(7.3)	13(14.4)	18(17.8)	15(7.5)	49(11.3)	3(18.8)	6(13.6)	11(14.3)	3(4.2)	23(11.1)
รวม	41(100.0)	90(100.0)	101(100.0)	200(100.0)	432(100.0)	16(100.0)	44(100.0)	77(100.0)	71(100.0)	208(100.0)
มีปัญหาเกี่ยวกับตำรวจ ครู หรือผู้ใหญ่คนอื่น*										
ไม่เคย	126(80.3)	207(74.5)	218(76.8)	403(76.2)	954(76.4)	63(87.5)	194(88.2)	286(88.5)	155(78.3)	698(85.9)
เคย	31(19.8)	71(25.5)	66(23.2)	126(23.8)	294(23.6)	9(12.5)	26(11.8)	37(11.5)	43(21.7)	115(14.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	157(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1248(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	17(54.8)	38(53.5)	42(63.6)	76(60.3)	173(58.8)	4(44.4)	15(57.7)	23(62.2)	29(67.4)	71(61.7)
2-3 ครั้ง	8(25.8)	20(28.2)	16(24.2)	36(28.6)	80(27.2)	3(33.3)	5(19.2)	10(27.0)	11(25.6)	29(25.2)
4 ครั้งขึ้นไป	6(19.4)	13(18.3)	8(12.1)	14(11.1)	41(14.0)	2(22.2)	6(23.1)	4(10.8)	3(7.0)	15(13.0)
รวม	31(100.0)	71(100.0)	66(100.0)	126(100.0)	294(100.0)	9(100.0)	26(100.0)	37(100.0)	43(100.0)	115(100.0)
ทำของเสียหาย หรือเพลิงไหม้*										
ไม่เคย	139(88.5)	241(86.7)	245(86.3)	465(87.9)	1090(87.3)	68(94.4)	204(92.7)	306(94.7)	182(91.9)	760(93.5)
เคย	18(11.5)	37(13.3)	39(13.7)	64(12.1)	158(12.7)	4(5.6)	16(7.3)	17(5.3)	16(8.1)	53(6.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	157(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1248(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	13(72.2)	22(59.5)	21(53.9)	39(60.9)	95(60.1)	2(50.0)	14(87.5)	9(52.9)	12(75.0)	37(69.8)
2-3 ครั้ง	3(16.7)	10(27.0)	12(30.8)	19(29.7)	44(27.9)	0(0.0)	2(12.5)	6(35.3)	4(25.0)	12(22.6)
4 ครั้งขึ้นไป	2(11.1)	5(13.5)	6(15.4)	6(9.4)	19(12.0)	2(50.0)	0(0.0)	2(11.8)	0(0.0)	4(7.6)
รวม	18(100.0)	37(100.0)	39(100.0)	64(100.0)	158(100.0)	4(100.0)	16(100.0)	17(100.0)	16(100.0)	53(100.0)
ทะเลาะวิวาทต่อสู้ทำร้ายร่างกาย*										
ไม่เคย	113(72.0)	190(68.4)	211(74.3)	365(69.0)	879(70.4)	60(83.3)	187(85.4)	278(86.1)	158(79.8)	683(84.1)
เคย	44(28.0)	88(31.7)	73(25.7)	164(31.0)	369(29.6)	12(16.7)	32(14.6)	45(13.9)	40(20.2)	129(15.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	157(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1248(100.0)	72(100.0)	219(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	812(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	20(45.5)	35(39.8)	39(53.4)	103(62.8)	197(53.4)	10(83.3)	21(65.6)	31(68.9)	26(65.0)	88(68.2)
2-3 ครั้ง	18(40.9)	33(37.5)	21(28.8)	44(26.8)	116(31.4)	2(16.7)	10(31.3)	11(24.4)	10(25.0)	33(25.6)
4 ครั้งขึ้นไป	6(13.6)	20(22.7)	13(17.8)	17(10.4)	56(15.2)	0(0.0)	1(3.1)	3(6.7)	4(10.0)	8(6.2)
รวม	44(100.0)	88(100.0)	73(100.0)	164(100.0)	369(100.0)	12(100.0)	32(100.0)	45(100.0)	40(100.0)	129(100.0)
คลื่นได้ อาเจียน*										
ไม่เคย	116(73.9)	163(58.6)	171(60.2)	231(43.7)	681(54.6)	55(76.4)	152(69.1)	216(66.9)	95(48.0)	518(63.7)
เคย	41(26.1)	115(41.4)	113(39.8)	298(56.3)	567(45.4)	17(23.6)	68(30.9)	107(33.1)	103(52.0)	295(36.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(3)	(1)	(2)	(8)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	157(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1248(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	26(63.4)	55(47.8)	66(58.4)	165(55.4)	312(55.0)	11(64.7)	41(60.3)	70(65.4)	64(62.1)	186(63.1)
2-3 ครั้ง	10(24.4)	40(34.8)	31(27.4)	99(33.2)	180(31.8)	5(29.4)	23(33.8)	33(30.8)	30(29.1)	91(30.9)
4 ครั้งขึ้นไป	5(12.2)	20(17.4)	16(14.2)	34(11.4)	75(13.2)	1(5.9)	4(5.9)	4(3.7)	9(8.7)	18(6.1)
รวม	41(100.0)	115(100.0)	113(100.0)	298(100.0)	567(100.0)	17(100.0)	68(100.0)	107(100.0)	103(100.0)	295(100.0)
ขับซักรถ หลังดื่มสุรา*										
ไม่เคย	129(82.7)	185(66.6)	180(63.4)	237(44.8)	731(58.6)	69(95.8)	189(85.9)	268(83.0)	132(66.7)	658(80.9)
เคย	27(17.3)	93(33.5)	104(36.6)	292(55.2)	516(41.4)	3(4.2)	31(14.1)	55(17.0)	66(33.3)	155(19.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	18(66.7)	33(35.5)	47(45.2)	144(49.3)	242(46.9)	1(33.3)	17(54.8)	32(58.2)	39(59.1)	89(57.4)
2-3 ครั้ง	8(29.6)	37(39.8)	34(32.7)	98(33.6)	177(34.3)	2(66.7)	11(35.5)	17(30.9)	14(21.2)	44(28.4)
4 ครั้งขึ้นไป	1(3.7)	23(24.7)	23(22.1)	50(17.1)	97(18.8)	0(0.0)	3(9.7)	6(10.9)	13(19.7)	22(14.2)
รวม	27(100.0)	93(100.0)	104(100.0)	292(100.0)	516(100.0)	3(100.0)	31(100.0)	55(100.0)	66(100.0)	155(100.0)
ขาดเรียน*										
ไม่เคย	108(68.8)	184(66.4)	204(71.8)	276(52.2)	772(61.9)	57(79.2)	170(77.3)	264(81.7)	109(55.1)	600(73.8)
เคย	49(31.2)	93(33.6)	80(28.2)	253(47.8)	475(38.1)	15(20.8)	50(22.7)	59(18.3)	89(45.0)	213(26.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(2)	(4)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	157(100.0)	277(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	25(51.0)	36(38.7)	40(50.0)	125(49.4)	226(47.6)	9(60.0)	23(46.0)	20(33.9)	42(47.2)	94(44.1)
2-3 ครั้ง	20(40.8)	28(30.1)	23(28.8)	90(35.6)	161(33.9)	4(26.7)	24(48.0)	22(37.3)	31(34.8)	81(38.0)
4 ครั้งขึ้นไป	4(8.2)	29(31.2)	17(21.3)	38(15.0)	88(18.5)	2(13.3)	3(6.0)	17(28.8)	16(18.0)	38(17.8)
รวม	49(100.0)	93(100.0)	80(100.0)	253(100.0)	475(100.0)	15(100.0)	50(100.0)	59(100.0)	89(100.0)	213(100.0)
ถูกตำหนิต่อว่าจากคนรู้จัก*										
ไม่เคย	114(73.1)	182(65.5)	188(66.2)	324(61.7)	808(65.0)	58(80.6)	147(67.1)	231(71.5)	111(56.1)	547(67.4)
เคย	42(26.9)	96(34.5)	96(33.8)	201(38.3)	435(35.0)	14(19.4)	72(32.9)	92(28.5)	87(43.9)	265(32.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(6)	(13)	(1)	(2)	(0)	(0)	(3)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	525(100.0)	1243(100.0)	72(100.0)	219(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	812(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	26(61.9)	47(49.0)	50(52.1)	110(54.7)	233(53.6)	9(64.3)	44(61.1)	48(52.2)	54(62.1)	155(58.5)
2-3 ครั้ง	10(23.8)	33(34.4)	32(33.3)	69(34.3)	144(33.1)	3(21.4)	21(29.2)	26(28.3)	23(26.4)	73(27.6)
4 ครั้งขึ้นไป	6(14.3)	16(16.7)	14(14.6)	22(11.0)	58(13.3)	2(14.3)	7(9.7)	18(19.6)	10(11.5)	37(14.0)
รวม	42(100.0)	96(100.0)	96(100.0)	201(100.0)	435(100.0)	14(100.0)	72(100.0)	92(100.0)	87(100.0)	265(100.0)
คิดว่าตนเองน่าจะมีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
ไม่เคย	139(89.1)	225(80.9)	228(80.3)	401(76.0)	993(79.7)	70(97.2)	204(92.7)	304(94.1)	152(76.8)	730(89.8)
เคย	17(10.9)	53(19.1)	56(19.7)	127(24.1)	253(20.3)	2(2.8)	16(7.3)	19(5.9)	46(23.2)	83(10.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(3)	(10)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	528(100.0)	1246(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการตีตราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	12(70.6)	34(64.2)	33(58.9)	89(70.1)	168(66.4)	2(100.0)	14(87.5)	13(68.4)	26(56.5)	55(66.3)
2-3 ครั้ง	4(23.5)	10(18.9)	13(23.2)	30(23.6)	57(22.5)	0(0.0)	2(12.5)	6(31.6)	17(37.0)	25(30.1)
4 ครั้งขึ้นไป	1(5.9)	9(17.0)	10(17.9)	8(6.3)	28(11.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(6.5)	3(3.6)
รวม	17(100.0)	53(100.0)	56(100.0)	127(100.0)	253(100.0)	2(100.0)	16(100.0)	19(100.0)	46(100.0)	83(100.0)
ทำของสำคัญหรือเงินหาย*										
ไม่เลย	109(69.9)	190(68.4)	215(75.7)	361(68.4)	875(70.2)	60(83.3)	177(80.5)	261(80.8)	119(60.1)	617(75.9)
เคย	47(30.1)	88(31.7)	69(24.3)	167(31.6)	371(29.8)	12(16.7)	43(19.6)	62(19.2)	79(39.9)	196(24.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(3)	(10)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	528(100.0)	1246(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	27(57.5)	47(53.4)	34(49.3)	104(62.3)	212(57.1)	6(50.0)	21(48.8)	34(54.8)	44(55.7)	105(53.6)
2-3 ครั้ง	15(31.9)	25(28.4)	24(34.8)	48(28.7)	112(30.2)	4(33.3)	13(30.2)	22(35.5)	30(38.0)	69(35.2)
4 ครั้งขึ้นไป	5(10.6)	16(18.2)	11(15.9)	15(9.0)	47(12.7)	2(16.7)	9(20.9)	6(9.7)	5(6.3)	22(11.2)
รวม	47(100.0)	88(100.0)	69(100.0)	167(100.0)	371(100.0)	12(100.0)	43(100.0)	62(100.0)	79(100.0)	196(100.0)
ทำบางอย่างที่ทำให้รู้สึกเสียใจในภายหลัง*										
ไม่เลย	123(79.4)	199(71.8)	212(74.7)	347(65.8)	881(70.9)	56(77.8)	167(75.9)	244(75.5)	110(55.6)	577(71.0)
เคย	32(20.7)	78(28.2)	72(25.4)	180(34.2)	362(29.1)	16(22.2)	53(24.1)	79(24.5)	88(44.4)	236(29.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(4)	(4)	(1)	(4)	(13)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	155(100.0)	277(100.0)	284(100.0)	527(100.0)	1243(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	15(46.9)	40(51.3)	37(51.4)	105(58.3)	197(54.4)	9(56.3)	30(56.6)	41(51.9)	54(61.4)	134(56.8)
2-3 ครั้ง	10(31.3)	24(30.8)	24(33.3)	57(31.7)	115(31.8)	4(25.0)	13(24.5)	28(35.4)	26(29.6)	71(30.1)
4 ครั้งขึ้นไป	7(21.9)	14(18.0)	11(15.3)	18(10.0)	50(13.8)	3(18.8)	10(18.9)	10(12.7)	8(9.1)	31(13.1)
รวม	32(100.0)	78(100.0)	72(100.0)	180(100.0)	362(100.0)	16(100.0)	53(100.0)	79(100.0)	88(100.0)	236(100.0)
ถูกจับเพราะขโมยทรัพย์สินมาสุรา*										
ไม่เลย	144(92.3)	251(90.3)	266(93.7)	457(86.4)	1118(89.7)	70(97.2)	215(97.7)	315(97.5)	180(90.9)	780(95.9)
เคย	12(7.7)	27(9.7)	18(6.3)	72(13.6)	129(10.3)	2(2.8)	5(2.3)	8(2.5)	18(9.1)	33(4.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	5(41.7)	8(29.6)	9(50.0)	44(61.1)	66(51.2)	1(50.0)	3(60.0)	7(87.5)	12(66.7)	23(69.7)
2-3 ครั้ง	6(50.0)	10(37.0)	4(22.2)	18(25.0)	38(29.5)	1(50.0)	2(40.0)	0(0.0)	4(22.2)	7(21.2)
4 ครั้งขึ้นไป	1(8.3)	9(33.3)	5(27.8)	10(13.9)	25(19.4)	0(0.0)	0(0.0)	1(12.5)	2(11.1)	3(9.1)
รวม	12(100.0)	27(100.0)	18(100.0)	72(100.0)	129(100.0)	2(100.0)	5(100.0)	8(100.0)	18(100.0)	33(100.0)
ถูกลวนลามหรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ*										
ไม่เลย	146(93.6)	246(88.8)	259(91.2)	451(85.3)	1102(88.4)	71(98.6)	215(97.7)	318(98.5)	183(92.4)	787(96.8)
เคย	10(6.4)	31(11.2)	25(8.8)	78(14.7)	144(11.6)	1(1.4)	5(2.3)	5(1.6)	15(7.6)	26(3.2)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(4)	(1)	(2)	(10)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	277(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1246(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4(40.0)	10(32.3)	12(48.0)	48(61.5)	74(51.4)	0(0.0)	4(80.0)	4(80.0)	6(40.0)	14(53.9)
2-3 ครั้ง	6(60.0)	9(29.0)	7(28.0)	13(16.7)	35(24.3)	0(0.0)	1(20.0)	1(20.0)	7(46.7)	9(34.6)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0.0)	12(38.7)	6(24.0)	17(21.8)	35(24.3)	1(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(13.3)	3(11.5)
รวม	10(100.0)	31(100.0)	25(100.0)	78(100.0)	144(100.0)	1(100.0)	5(100.0)	5(100.0)	15(100.0)	26(100.0)
ลงนามหรือเอาเปรียบทางเพศกับผู้อื่น*										
ไม่เคย	146(93.6)	244(87.8)	258(90.9)	448(84.7)	1096(87.9)	69(95.8)	213(96.8)	313(96.9)	177(89.4)	772(95.0)
เคย	10(6.4)	34(12.2)	26(9.2)	81(15.3)	151(12.1)	3(4.2)	7(3.2)	10(3.1)	21(10.6)	41(5.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(80.0)	10(29.4)	16(61.5)	46(56.8)	80(53.0)	2(66.7)	5(71.4)	5(50.0)	11(52.4)	23(56.1)
2-3 ครั้ง	1(10.0)	10(29.4)	6(23.1)	23(28.4)	40(26.5)	0(0.0)	0(0.0)	3(30.0)	6(28.6)	9(22.0)
4 ครั้งขึ้นไป	1(10.0)	14(41.2)	4(15.4)	12(14.8)	31(20.5)	1(33.3)	2(28.6)	2(20.0)	4(19.1)	9(22.0)
รวม	10(100.0)	34(100.0)	26(100.0)	81(100.0)	151(100.0)	3(100.0)	7(100.0)	10(100.0)	21(100.0)	41(100.0)
พยายามที่จะเลิกดื่มแต่ไม่สำเร็จ*										
ไม่เคย	144(92.3)	221(79.5)	230(81.3)	351(66.5)	946(76.0)	66(91.7)	199(90.5)	301(93.8)	164(83.7)	730(90.2)
เคย	12(7.7)	57(20.5)	53(18.7)	177(33.5)	299(24.0)	6(8.3)	21(9.6)	20(6.2)	32(16.3)	79(9.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(2)	(3)	(11)	(1)	(1)	(2)	(2)	(6)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	283(100.0)	528(100.0)	1245(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	321(100.0)	196(100.0)	809(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(66.7)	25(43.9)	33(62.3)	96(54.2)	162(54.2)	4(66.7)	13(61.9)	8(40.0)	15(46.9)	40(50.6)
2-3 ครั้ง	3(25.0)	13(22.8)	6(11.3)	57(32.2)	79(26.4)	0(0.0)	4(19.1)	6(30.0)	13(40.6)	23(29.1)
4 ครั้งขึ้นไป	1(8.3)	19(33.3)	14(26.4)	24(13.6)	58(19.4)	2(33.3)	4(19.1)	6(30.0)	4(12.5)	16(20.3)
รวม	12(100.0)	57(100.0)	53(100.0)	177(100.0)	299(100.0)	6(100.0)	21(100.0)	20(100.0)	32(100.0)	79(100.0)
คิดอยากฆ่าตัวตายอย่างรุนแรง*										
ไม่เคย	148(94.9)	256(92.1)	268(94.4)	477(90.2)	1149(92.1)	69(97.2)	211(95.9)	313(97.2)	178(89.9)	771(95.1)
เคย	8(5.1)	22(7.9)	16(5.6)	52(9.8)	98(7.9)	2(2.8)	9(4.1)	9(2.8)	20(10.1)	40(4.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(2)	(1)	(1)	(0)	(4)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	71(100.0)	220(100.0)	322(100.0)	198(100.0)	811(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	4(50.0)	12(54.6)	6(37.5)	32(61.5)	54(55.1)	2(100.0)	7(77.8)	7(77.8)	13(65.0)	29(72.5)
2-3 ครั้ง	3(37.5)	3(13.6)	4(25.0)	12(23.1)	22(22.5)	0(0.0)	1(11.1)	1(11.1)	6(30.0)	8(20.0)
4 ครั้งขึ้นไป	1(12.5)	7(31.8)	6(37.5)	8(15.4)	22(22.5)	0(0.0)	1(11.1)	1(11.1)	1(5.0)	3(7.5)
รวม	8(100.0)	22(100.0)	16(100.0)	52(100.0)	98(100.0)	2(100.0)	9(100.0)	9(100.0)	20(100.0)	40(100.0)
พยายามที่จะฆ่าตัวตาย*										
ไม่เคย	145(93.0)	249(89.6)	267(94.0)	478(90.4)	1139(91.3)	70(97.2)	211(95.9)	312(96.6)	176(88.9)	769(94.6)
เคย	11(7.1)	29(10.4)	17(6.0)	51(9.6)	108(8.7)	2(2.8)	9(4.1)	11(3.4)	22(11.1)	44(5.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)

ตารางที่ 6.12 ประสบการณ์ต่างๆ เนื่องจากการดื่มสุราของตนเองใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	9(81.8)	12(41.4)	6(35.3)	33(64.7)	60(55.6)	2(100.0)	8(88.9)	9(81.8)	16(72.7)	35(79.6)
2-3 ครั้ง	2(18.2)	11(37.9)	3(17.7)	12(23.5)	28(25.9)	0(0.0)	1(11.1)	2(18.2)	6(27.3)	9(20.5)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0.0)	6(20.7)	8(47.1)	6(11.8)	20(18.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
รวม	11(100.0)	29(100.0)	17(100.0)	51(100.0)	108(100.0)	2(100.0)	9(100.0)	11(100.0)	22(100.0)	44(100.0)
บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุ*										
ไม่เลย	127(81.4)	202(72.7)	223(78.8)	365(69.0)	917(73.6)	63(87.5)	190(86.4)	284(87.9)	145(73.6)	682(84.0)
เคย	29(18.6)	76(27.3)	60(21.2)	164(31.0)	329(26.4)	9(12.5)	30(13.6)	39(12.1)	52(26.4)	130(16.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(2)	(2)	(10)	(1)	(1)	(0)	(1)	(3)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	283(100.0)	529(100.0)	1246(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	197(100.0)	812(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	21(72.4)	38(50.0)	40(66.7)	97(59.2)	196(59.6)	5(55.6)	16(53.3)	30(76.9)	27(51.9)	78(60.0)
2-3 ครั้ง	7(24.1)	23(30.3)	11(18.3)	53(32.3)	94(28.6)	2(22.2)	9(30.0)	6(15.4)	23(44.2)	40(30.8)
4 ครั้งขึ้นไป	1(3.5)	15(19.7)	9(15.0)	14(8.5)	39(11.9)	2(22.2)	5(16.7)	3(7.7)	2(3.9)	12(9.2)
รวม	29(100.0)	76(100.0)	60(100.0)	164(100.0)	329(100.0)	9(100.0)	30(100.0)	39(100.0)	52(100.0)	130(100.0)
ต้องไปรับการรักษาเนื่องจากเมาสุรา*										
ไม่เลย	146(93.6)	253(91.0)	266(93.7)	475(89.8)	1140(91.4)	72(100.0)	217(98.6)	321(99.4)	184(92.9)	794(97.7)
เคย	10(6.4)	25(9.0)	18(6.3)	54(10.2)	107(8.6)	0(0.0)	3(1.4)	2(0.6)	14(7.1)	19(2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(3)	(3)	(1)	(2)	(9)	(1)	(1)	(0)	(0)	(2)
รวม	156(100.0)	278(100.0)	284(100.0)	529(100.0)	1247(100.0)	72(100.0)	220(100.0)	323(100.0)	198(100.0)	813(100.0)
จำนวนครั้ง**										
1 ครั้ง	8(80.0)	12(48.0)	11(61.1)	34(63.0)	65(60.8)	0(0.0)	1(33.3)	2(100.0)	8(57.1)	11(57.9)
2-3 ครั้ง	2(20.0)	4(16.0)	2(11.1)	14(25.9)	22(20.6)	0(0.0)	2(66.7)	0(0.0)	4(28.6)	6(31.6)
4 ครั้งขึ้นไป	0(0.0)	9(36.0)	5(27.8)	6(11.1)	20(18.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(14.3)	2(10.5)
รวม	10(100.0)	25(100.0)	18(100.0)	54(100.0)	107(100.0)	0(0.0)	3(100.0)	2(100.0)	14(100.0)	19(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยดื่มสุรา

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีอาการ หรือ ประสบการณ์นั้นๆ

ตารางที่ 6.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุรานักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกรังแก/ดูถูก/ตำหนิ ต่อว่า										
ไม่เลย	801(87.2)	756(86.2)	501(84.3)	666(81.9)	2724(85.1)	1064(90.4)	1184(89.9)	1029(90.4)	466(86.3)	3743(89.7)
เคย	118(12.8)	121(13.8)	93(15.7)	147(18.1)	479(15.0)	113(9.6)	133(10.1)	109(9.6)	74(13.7)	429(10.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(7)	(5)	(8)	(46)	(24)	(8)	(5)	(2)	(39)
รวม	919(100.0)	877(100.0)	594(100.0)	813(100.0)	3203(100.0)	1177(100.0)	1317(100.0)	1138(100.0)	540(100.0)	4172(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	73(61.9)	88(72.7)	61(65.6)	108(73.5)	330(68.9)	66(58.4)	68(51.1)	64(58.7)	50(67.6)	248(57.8)
2-3 ครั้ง	25(21.2)	20(16.5)	19(20.4)	32(21.8)	96(20.0)	26(23.0)	40(30.1)	32(29.4)	18(24.3)	116(27.0)
4 ครั้งขึ้นไป	20(17.0)	13(10.7)	13(14.0)	7(4.8)	53(11.1)	21(18.6)	25(18.8)	13(11.9)	6(8.1)	65(15.2)
รวม	118(100.0)	121(100.0)	93(100.0)	147(100.0)	479(100.0)	113(100.0)	133(100.0)	109(100.0)	74(100.0)	429(100.0)
ทะเลาะวิวาท ได้เถียงอย่างรุนแรง										
ไม่เลย	827(90.0)	746(85.1)	501(84.3)	651(80.1)	2725(85.1)	1111(94.2)	1221(92.7)	1043(91.7)	471(87.2)	3846(92.1)
เคย	92(10.0)	131(14.9)	93(15.7)	162(19.9)	478(14.9)	69(5.9)	96(7.3)	95(8.4)	69(12.8)	329(7.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(7)	(5)	(8)	(46)	(21)	(8)	(5)	(2)	(36)
รวม	919(100.0)	877(100.0)	594(100.0)	813(100.0)	3203(100.0)	1180(100.0)	1317(100.0)	1138(100.0)	540(100.0)	4175(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	60(65.2)	80(61.1)	52(55.9)	106(65.4)	298(62.3)	48(69.6)	57(59.4)	61(64.2)	46(66.7)	212(64.4)
2-3 ครั้ง	23(25.0)	31(23.7)	29(31.2)	41(25.3)	124(25.9)	16(23.2)	35(36.5)	28(29.5)	19(27.5)	98(29.8)
4 ครั้งขึ้นไป	9(9.8)	20(15.3)	12(12.9)	15(9.3)	56(11.7)	5(7.3)	4(4.2)	6(6.3)	4(5.8)	19(5.8)
รวม	92(100.0)	131(100.0)	93(100.0)	162(100.0)	478(100.0)	69(100.0)	96(100.0)	95(100.0)	69(100.0)	329(100.0)
ถูกตบตี ผลัก ทำร้ายร่างกาย ต่อสู้										
ไม่เลย	831(90.4)	783(89.3)	535(90.2)	690(84.9)	2839(88.7)	1143(96.9)	1258(95.6)	1092(96.0)	497(92.0)	3990(95.6)
เคย	88(9.6)	94(10.7)	58(9.8)	123(15.1)	363(11.3)	37(3.1)	58(4.4)	45(4.0)	43(8.0)	183(4.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(7)	(6)	(8)	(47)	(21)	(9)	(6)	(2)	(38)
รวม	919(100.0)	877(100.0)	593(100.0)	813(100.0)	3202(100.0)	1180(100.0)	1316(100.0)	1137(100.0)	540(100.0)	4173(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	63(71.6)	58(61.7)	37(63.8)	78(63.4)	236(65.0)	27(73.0)	44(75.9)	32(71.1)	28(65.1)	131(71.6)
2-3 ครั้ง	17(19.3)	23(24.5)	14(24.1)	30(24.4)	84(23.1)	7(18.9)	11(19.0)	9(20.0)	9(20.9)	36(19.7)
4 ครั้งขึ้นไป	8(9.1)	13(13.8)	7(12.1)	15(12.2)	43(11.9)	3(8.1)	3(5.2)	4(8.9)	6(14.0)	16(8.7)
รวม	88(100.0)	94(100.0)	58(100.0)	123(100.0)	363(100.0)	37(100.0)	58(100.0)	45(100.0)	43(100.0)	183(100.0)
ข้าวของเสียหาย หรือเพลิงไหม้										
ไม่เลย	900(97.9)	815(93.1)	566(95.3)	749(92.1)	3030(94.7)	1159(98.2)	1287(97.7)	1112(97.7)	512(95.0)	4070(97.5)
เคย	19(2.1)	60(6.9)	28(4.7)	64(7.9)	171(5.3)	21(1.8)	30(2.3)	26(2.3)	27(5.0)	104(2.5)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(26)	(9)	(5)	(8)	(48)	(21)	(8)	(5)	(3)	(37)
รวม	919(100.0)	875(100.0)	594(100.0)	813(100.0)	3201(100.0)	1180(100.0)	1317(100.0)	1138(100.0)	539(100.0)	4174(100.0)

ตารางที่ 6.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการติ่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	14(73.7)	40(66.7)	17(60.7)	47(73.4)	118(69.0)	12(57.1)	20(66.7)	17(65.4)	16(59.3)	65(62.5)
2-3 ครั้ง	2(10.5)	11(18.3)	6(21.4)	14(21.9)	33(19.3)	4(19.1)	7(23.3)	9(34.6)	9(33.3)	29(27.9)
4 ครั้งขึ้นไป	3(15.8)	9(15.0)	5(17.9)	3(4.7)	20(11.7)	5(23.8)	3(10.0)	0(0.0)	2(7.4)	10(9.6)
รวม	19(100.0)	60(100.0)	28(100.0)	64(100.0)	171(100.0)	21(100.0)	30(100.0)	26(100.0)	27(100.0)	104(100.0)
ต้องช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นซึ่งเมาสุรา										
ไม่เคย	878(95.6)	769(87.7)	497(84.0)	592(72.7)	2736(85.5)	1152(97.7)	1229(93.5)	1024(90.0)	427(79.2)	3832(91.9)
เคย	40(4.4)	108(12.3)	95(16.1)	222(27.3)	465(14.5)	27(2.3)	86(6.5)	114(10.0)	112(20.8)	339(8.1)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(7)	(7)	(7)	(48)	(22)	(10)	(5)	(3)	(40)
รวม	918(100.0)	877(100.0)	592(100.0)	814(100.0)	3201(100.0)	1179(100.0)	1315(100.0)	1138(100.0)	539(100.0)	4171(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	27(67.5)	61(56.5)	47(49.5)	137(61.7)	272(58.5)	19(70.4)	55(64.0)	72(63.2)	62(55.4)	208(61.4)
2-3 ครั้ง	8(20.0)	36(33.3)	30(31.6)	51(23.0)	125(26.9)	3(11.1)	28(32.6)	40(35.1)	41(36.6)	112(33.0)
4 ครั้งขึ้นไป	5(12.5)	11(10.2)	18(19.0)	34(15.3)	68(14.6)	5(18.5)	3(3.5)	2(1.8)	9(8.0)	19(5.6)
รวม	40(100.0)	108(100.0)	95(100.0)	222(100.0)	465(100.0)	27(100.0)	86(100.0)	114(100.0)	112(100.0)	339(100.0)
ถูกรบกวนระหว่างอ่าน/เรียนหนังสือ หรือเวลานอน										
ไม่เคย	806(87.8)	731(83.5)	487(82.0)	644(79.2)	2668(83.4)	1037(87.9)	1110(84.4)	972(85.5)	398(73.7)	3517(84.3)
เคย	112(12.2)	145(16.6)	107(18.0)	169(20.8)	533(16.7)	143(12.1)	206(15.7)	165(14.5)	142(26.3)	656(15.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(8)	(5)	(8)	(48)	(21)	(9)	(6)	(2)	(38)
รวม	918(100.0)	876(100.0)	594(100.0)	813(100.0)	3201(100.0)	1180(100.0)	1316(100.0)	1137(100.0)	540(100.0)	4173(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	49(43.8)	76(52.4)	45(42.1)	96(56.8)	266(49.9)	73(51.1)	109(52.9)	81(49.1)	75(52.8)	338(51.5)
2-3 ครั้ง	36(32.1)	41(28.3)	39(36.5)	50(29.6)	166(31.1)	54(37.8)	63(30.6)	50(30.3)	47(33.1)	214(32.6)
4 ครั้งขึ้นไป	27(24.1)	28(19.3)	23(21.5)	23(13.6)	101(19.0)	16(11.2)	34(16.5)	34(20.6)	20(14.1)	104(15.9)
รวม	112(100.0)	145(100.0)	107(100.0)	169(100.0)	533(100.0)	143(100.0)	206(100.0)	165(100.0)	142(100.0)	656(100.0)
ถูกจับหรือเกี่ยวพาราสิโดยที่ไม่ต้องการ										
ไม่เคย	863(94.3)	796(90.9)	525(88.4)	690(84.8)	2874(89.8)	1108(94.1)	1219(92.7)	1041(91.5)	437(80.9)	3805(91.2)
เคย	52(5.7)	80(9.1)	69(11.6)	124(15.2)	325(10.2)	70(5.9)	96(7.3)	97(8.5)	103(19.1)	366(8.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(30)	(8)	(5)	(7)	(50)	(23)	(10)	(5)	(2)	(40)
รวม	915(100.0)	876(100.0)	594(100.0)	814(100.0)	3199(100.0)	1178(100.0)	1315(100.0)	1138(100.0)	540(100.0)	4171(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	31(59.6)	36(45.0)	36(52.2)	66(53.2)	169(52.0)	43(61.4)	37(38.5)	42(43.3)	38(36.9)	160(43.7)
2-3 ครั้ง	13(25.0)	22(27.5)	13(18.8)	39(31.5)	87(26.8)	13(18.6)	38(39.6)	35(36.1)	41(39.8)	127(34.7)
4 ครั้งขึ้นไป	8(15.4)	22(27.5)	20(29.0)	19(15.3)	69(21.2)	14(20.0)	21(21.9)	20(20.6)	24(23.3)	79(21.6)
รวม	52(100.0)	80(100.0)	69(100.0)	124(100.0)	325(100.0)	70(100.0)	96(100.0)	97(100.0)	103(100.0)	366(100.0)

ตารางที่ 6.13 ประสบการณ์ต่างๆเนื่องจากการดื่มสุราของนักเรียนคนอื่นใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ) (ต่อ)

ประสบการณ์	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ถูกลวนลาม หรือข่มขืน										
ไม่เลย	902(98.3)	838(95.7)	567(95.5)	760(93.4)	3067(95.8)	1168(99.0)	1301(98.9)	1124(98.9)	521(96.5)	4114(98.6)
เคย	16(1.7)	38(4.3)	27(4.6)	54(6.6)	135(4.2)	12(1.0)	15(1.1)	13(1.1)	19(3.5)	59(1.4)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(27)	(8)	(5)	(7)	(47)	(21)	(9)	(6)	(2)	(38)
รวม	918(100.0)	876(100.0)	594(100.0)	814(100.0)	3202(100.0)	1180(100.0)	1316(100.0)	1137(100.0)	540(100.0)	4173(100.0)
จำนวนครั้ง*										
1 ครั้ง	11(68.8)	17(44.7)	14(51.9)	28(51.9)	70(51.9)	7(58.3)	10(66.7)	9(69.2)	12(63.2)	38(64.4)
2-3 ครั้ง	2(12.5)	5(13.2)	5(18.5)	18(33.3)	30(22.2)	1(8.3)	4(26.7)	3(23.1)	4(21.1)	12(20.3)
4 ครั้งขึ้นไป	3(18.8)	16(42.1)	8(29.6)	8(14.8)	35(25.9)	4(33.3)	1(6.7)	1(7.7)	3(15.8)	9(15.3)
รวม	16(100.0)	38(100.0)	27(100.0)	54(100.0)	135(100.0)	12(100.0)	15(100.0)	13(100.0)	19(100.0)	59(100.0)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่าเคยมีประสบการณ์นั้นๆ

ทัศนคติต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ตารางที่ 6.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ไม่เคย	263(31.9)	232(28.1)	104(18.1)	173(22.5)	772(25.8)	276(25.4)	263(21.3)	124(11.2)	49(10.3)	712(18.2)
เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา เครื่องดื่มฯ จากสื่อชนิดใด ชนิดหนึ่ง	562(68.1)	593(71.9)	471(81.9)	597(77.5)	2223(74.2)	809(74.6)	973(78.7)	982(88.8)	429(89.8)	3193(81.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(120)	(59)	(24)	(51)	(254)	(116)	(89)	(37)	(64)	(306)
รวม	825(100.0)	825(100.0)	575(100.0)	770(100.0)	2995(100.0)	1085(100.0)	1236(100.0)	1106(100.0)	478(100.0)	3905(100.0)
ชนิดของสื่อ และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยิน โฆษณา ใน 24 ชั่วโมง*										
โทรทัศน์										
เคยเห็น*	552(98.9)	583(98.7)	465(98.9)	583(99.2)	2183(98.9)	800(99.1)	966(99.6)	978(99.7)	423(99.1)	3167(99.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	65(21.5)	108(32.1)	59(23.0)	85(31.8)	317(27.2)	171(31.3)	203(34.6)	172(30.6)	86(36.9)	632(32.8)
5-9 ครั้ง	52(17.2)	47(14.0)	48(18.7)	36(13.5)	183(15.7)	95(17.4)	77(13.1)	74(13.1)	29(12.5)	275(14.3)
≥10 ครั้ง	74(24.4)	77(22.9)	62(24.1)	67(25.1)	280(24.1)	114(20.8)	100(17.1)	101(17.9)	39(16.7)	354(18.4)
บางครั้ง	4(1.3)	2(0.6)	0(0.0)	0(0.0)	6(0.5)	1(0.2)	0(0.0)	1(0.2)	3(1.3)	5(0.3)
หลายครั้ง	99(32.7)	97(28.8)	88(34.2)	68(25.5)	352(30.2)	147(26.9)	192(32.8)	201(35.7)	72(30.9)	612(31.7)
จำไม่ได้	9(3.0)	6(1.8)	0(0.0)	11(4.1)	26(2.2)	19(3.5)	14(2.4)	14(2.5)	4(1.7)	51(2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(249)	(246)	(208)	(316)	(1,019)	(253)	(380)	(415)	(190)	(1,238)
รวม	303(100.0)	337(100.0)	257(100.0)	267(100.0)	1164(100.0)	547(100.0)	586(100.0)	563(100.0)	233(100.0)	1929(100.0)
ประเภทเครื่องดื่มฯ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล้า	365(69.9)	381(69.0)	361(83.0)	366(72.6)	1473(73.2)	558(73.2)	668(72.9)	756(80.8)	282(72.5)	2264(75.4)
เบียร์	437(83.6)	443(80.3)	392(90.1)	426(84.5)	1698(84.3)	653(85.7)	808(88.2)	842(90.0)	336(86.4)	2639(87.9)
Spy/ไวน์	268(51.2)	268(48.6)	250(57.5)	212(42.1)	998(49.6)	438(57.5)	588(64.2)	621(66.4)	233(59.9)	1880(62.6)
เหล้าผสมพร้อมดื่ม	55(10.5)	68(12.3)	64(14.7)	50(9.9)	237(11.8)	85(11.2)	153(16.7)	177(18.9)	39(10.0)	454(15.1)
วิทยุ										
เคยเห็น*	213(39.9)	225(38.7)	151(32.3)	269(49.8)	858(40.4)	264(34.4)	294(30.7)	298(30.7)	187(45.7)	1043(33.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	41(41.8)	55(46.6)	30(36.6)	44(47.3)	170(43.5)	98(62.8)	66(39.1)	54(34.8)	55(59.8)	273(47.7)
5-9 ครั้ง	11(11.2)	18(15.3)	11(13.4)	15(16.1)	55(14.1)	10(6.4)	22(13.0)	17(11.0)	6(6.5)	55(9.6)
≥10 ครั้ง	18(18.4)	15(12.7)	16(19.5)	12(12.9)	61(15.6)	10(6.4)	17(10.1)	15(9.7)	7(7.6)	49(8.6)
บางครั้ง	1(1.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(2.2)	3(0.8)	2(1.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.4)
หลายครั้ง	20(20.4)	29(24.6)	25(30.5)	18(19.4)	92(23.5)	33(21.2)	61(36.1)	66(42.6)	23(25.0)	183(32.0)
จำไม่ได้	7(7.1)	1(0.9)	0(0.0)	2(2.2)	10(2.6)	3(1.9)	3(1.8)	3(1.9)	1(1.1)	10(1.8)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(115)	(107)	(69)	(176)	(467)	(108)	(125)	(143)	(95)	(471)
รวม	98(100.0)	118(100.0)	82(100.0)	93(100.0)	391(100.0)	156(100.0)	169(100.0)	155(100.0)	92(100.0)	572(100.0)

ตารางที่ 6.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	101(52.3)	122(61.6)	80(63.0)	112(55.7)	415(57.7)	149(64.0)	168(64.6)	169(60.8)	98(59.8)	584(62.5)
เบียร์	114(59.1)	132(66.7)	90(70.9)	117(58.2)	453(63.0)	163(70.0)	187(71.9)	196(70.5)	101(61.6)	647(69.2)
Spy/ไวน์	43(22.3)	59(29.8)	50(39.4)	38(18.9)	190(26.4)	76(32.6)	105(40.4)	88(31.7)	54(32.9)	323(34.6)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	11(5.7)	25(12.6)	15(11.8)	8(4.0)	59(8.2)	17(7.3)	31(11.9)	36(13.0)	14(8.5)	98(10.5)
หนังสือพิมพ์										
เคยเห็น*	386(71.5)	396(67.4)	335(71.3)	452(78.6)	1569(72.2)	522(67.0)	668(69.0)	681(69.6)	314(75.3)	2185(69.5)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	78(41.9)	87(44.4)	74(42.8)	90(50.6)	329(44.9)	170(52.2)	193(50.3)	148(41.9)	86(52.8)	597(48.7)
5-9 ครั้ง	17(9.1)	23(11.7)	17(9.8)	23(12.9)	80(10.9)	40(12.3)	46(12.0)	31(8.8)	16(9.8)	133(10.9)
≥10 ครั้ง	35(18.8)	29(14.8)	27(15.6)	21(11.8)	112(15.3)	22(6.8)	37(9.6)	42(11.9)	17(10.4)	118(9.6)
บางครั้ง	4(2.2)	2(1.0)	0(0.0)	2(1.1)	8(1.1)	9(2.8)	2(0.5)	4(1.1)	5(3.1)	20(1.6)
หลายครั้ง	44(23.7)	50(25.5)	55(31.8)	34(19.1)	183(25.0)	73(22.4)	92(24.0)	121(34.3)	36(22.1)	322(26.3)
จำไม่ได้	8(4.3)	5(2.6)	0(0.0)	8(4.5)	21(2.9)	12(3.7)	14(3.7)	7(2.0)	3(1.8)	36(2.9)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(200)	(200)	(162)	(274)	(836)	(196)	(284)	(328)	(151)	(959)
รวม	186(100.0)	196(100.0)	173(100.0)	178(100.0)	733(100.0)	326(100.0)	384(100.0)	353(100.0)	163(100.0)	1226(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	199(55.0)	223(62.3)	223(71.3)	247(67.7)	892(63.8)	304(63.2)	373(61.4)	447(69.3)	168(61.3)	1292(64.3)
เบียร์	244(67.4)	251(70.1)	250(79.9)	261(71.5)	1006(72.0)	367(76.3)	482(79.3)	539(83.6)	206(75.2)	1594(79.4)
Spy/ไวน์	126(34.8)	155(43.3)	139(44.4)	120(32.9)	540(38.6)	197(41.0)	285(46.9)	304(47.1)	119(43.4)	905(45.1)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	21(5.8)	40(11.1)	30(9.6)	23(6.3)	114(8.2)	38(7.9)	77(12.7)	89(13.8)	26(9.5)	230(11.5)
นิตยสาร										
เคยเห็น*	240(44.9)	268(46.5)	213(45.4)	304(54.5)	1025(48.0)	323(42.0)	456(47.3)	473(48.6)	225(55.0)	1477(47.4)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	52(47.7)	75(56.4)	39(39.4)	58(56.9)	224(50.6)	86(50.6)	117(48.2)	92(38.2)	56(54.4)	351(46.4)
5-9 ครั้ง	9(8.3)	18(13.5)	15(15.2)	11(10.8)	53(12.0)	17(10.0)	32(13.2)	27(11.2)	12(11.7)	88(11.6)
≥10 ครั้ง	18(16.5)	12(9.0)	12(12.1)	13(12.8)	55(12.4)	6(3.5)	19(7.8)	28(11.6)	7(6.8)	60(7.9)
บางครั้ง	1(0.9)	0(0.0)	0(0.0)	2(2.0)	3(0.7)	8(4.7)	2(0.8)	1(0.4)	5(4.9)	16(2.1)
หลายครั้ง	20(18.4)	27(20.3)	33(33.3)	12(11.8)	92(20.8)	45(26.5)	67(27.6)	88(36.5)	22(21.4)	222(29.3)
จำไม่ได้	9(8.3)	1(0.8)	0(0.0)	6(5.9)	16(3.6)	8(4.7)	6(2.5)	5(2.1)	1(1.0)	20(2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(131)	(135)	(114)	(202)	(582)	(153)	(213)	(232)	(122)	(720)
รวม	109(100.0)	133(100.0)	99(100.0)	102(100.0)	443(100.0)	170(100.0)	243(100.0)	241(100.0)	103(100.0)	757(100.0)

ตารางที่ 6.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็นได้ขึ้นโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	87(39.7)	133(55.2)	128(69.2)	128(54.0)	476(54.0)	157(55.3)	240(59.3)	274(62.3)	113(59.2)	784(59.4)
เบียร์	134(61.2)	150(62.2)	129(69.4)	157(66.2)	570(64.6)	194(68.3)	285(70.4)	329(74.8)	129(67.5)	937(71.0)
Spy/ไวน์	94(42.9)	98(40.7)	92(49.5)	86(36.3)	370(41.9)	151(53.2)	240(59.3)	253(57.5)	104(54.5)	748(56.7)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	17(7.8)	32(13.2)	29(15.6)	15(6.3)	93(10.5)	26(9.2)	72(17.8)	83(18.9)	21(11.0)	202(15.3)
แผ่นป้ายโฆษณา										
เคยเห็น*	341(63.6)	354(60.3)	284(60.7)	365(64.8)	1344(62.4)	453(58.5)	531(55.2)	526(54.1)	262(63.3)	1772(56.7)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	58(36.7)	89(50.6)	57(40.7)	66(50.0)	270(44.6)	137(50.7)	143(50.4)	111(41.3)	77(57.5)	468(48.9)
5-9 ครั้ง	27(17.1)	25(14.2)	13(9.3)	15(11.4)	80(13.2)	35(13.0)	28(9.9)	25(9.3)	11(8.2)	99(10.3)
≥10 ครั้ง	24(15.2)	22(12.5)	23(16.4)	18(13.6)	87(14.4)	17(6.3)	33(11.6)	24(8.9)	12(9.0)	86(9.0)
บางครั้ง	4(2.5)	3(1.7)	0(0.0)	1(0.8)	8(1.3)	8(3.0)	2(0.7)	2(0.7)	5(3.7)	17(1.8)
หลายครั้ง	38(24.1)	33(18.8)	46(32.9)	25(18.9)	142(23.4)	65(24.1)	74(26.1)	96(35.7)	27(20.2)	262(27.4)
จำไม่ได้	7(4.4)	4(2.3)	1(0.7)	7(5.3)	19(3.1)	8(3.0)	4(1.4)	11(4.1)	2(1.5)	25(2.6)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(183)	(178)	(144)	(233)	(738)	(183)	(247)	(257)	(128)	(815)
รวม	158(100.0)	176(100.0)	140(100.0)	132(100.0)	606(100.0)	270(100.0)	284(100.0)	269(100.0)	134(100.0)	957(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	156(50.2)	192(59.8)	180(69.8)	175(61.2)	703(59.8)	259(62.4)	303(62.4)	337(67.5)	143(63.0)	1042(64.0)
เบียร์	219(70.4)	235(73.2)	205(79.5)	207(72.4)	866(73.6)	315(75.9)	398(81.9)	423(84.8)	185(81.1)	1321(81.1)
Spy/ไวน์	97(31.2)	126(39.3)	107(41.5)	90(31.5)	420(35.7)	192(46.3)	237(48.8)	241(48.3)	95(41.7)	765(47.0)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	22(7.1)	39(12.2)	34(13.2)	17(5.9)	112(9.5)	38(9.2)	69(14.2)	81(16.2)	18(7.9)	206(12.7)
แผ่นปลิว										
เคยเห็น*	166(31.3)	182(31.5)	103(22.0)	222(40.8)	673(31.8)	174(22.8)	213(22.2)	188(19.4)	140(34.4)	715(23.1)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	29(55.8)	33(43.4)	19(44.2)	41(61.2)	122(51.3)	58(63.0)	46(42.6)	35(39.3)	41(67.2)	180(51.4)
5-9 ครั้ง	6(11.5)	13(17.1)	3(7.0)	4(6.0)	26(10.9)	6(6.5)	6(5.6)	8(9.0)	5(8.2)	25(7.1)
≥10 ครั้ง	6(11.5)	9(11.8)	9(20.9)	8(11.9)	32(13.5)	2(2.2)	10(9.3)	5(5.6)	1(1.6)	18(5.1)
บางครั้ง	1(1.9)	1(1.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(0.8)	1(1.1)	1(0.9)	0(0.0)	5(8.2)	7(2.0)
หลายครั้ง	6(11.5)	20(26.3)	12(27.9)	8(11.9)	46(19.3)	21(22.8)	44(40.7)	39(43.8)	8(13.1)	112(32.0)
จำไม่ได้	4(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	6(9.0)	10(4.2)	4(4.4)	1(0.9)	2(2.3)	1(1.6)	8(2.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(114)	(106)	(60)	(155)	(435)	(82)	(105)	(99)	(79)	(365)
รวม	52(100.0)	76(100.0)	43(100.0)	67(100.0)	238(100.0)	92(100.0)	108(100.0)	89(100.0)	61(100.0)	350(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
เหล่านี้	71(50.0)	87(54.0)	55(64.7)	81(49.7)	294(53.4)	84(56.8)	119(66.1)	116(67.1)	61(54.5)	380(62.0)
เบียร์	75(52.8)	102(63.4)	50(58.8)	101(62.0)	328(59.5)	86(58.1)	125(69.4)	128(74.0)	70(62.5)	409(66.7)
Spy/ไวน์	37(26.1)	52(32.3)	33(38.8)	54(33.1)	176(31.9)	56(37.8)	98(54.4)	96(55.5)	47(42.0)	297(48.5)
เหล่านี้ผสมพร้อมดื่ม	8(5.6)	23(14.3)	13(15.3)	6(3.7)	50(9.1)	10(6.8)	30(16.7)	36(20.8)	10(8.9)	86(14.0)

ตารางที่ 6.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องตีพิมพ์แอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
แผ่นปิดประกาศ										
เคยเห็น*	189(35.8)	188(32.6)	121(25.9)	246(45.3)	744(35.2)	190(25.0)	229(23.8)	221(22.8)	152(37.4)	792(25.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	35(54.7)	41(47.7)	20(40.0)	51(66.2)	147(53.1)	67(60.4)	55(46.2)	36(35.0)	44(62.9)	202(50.1)
5-9 ครั้ง	6(9.4)	13(15.1)	5(10.0)	5(6.5)	29(10.5)	6(5.4)	7(5.9)	11(10.7)	5(7.1)	29(7.2)
≥10 ครั้ง	10(15.6)	10(11.6)	9(18.0)	6(7.8)	35(12.6)	5(4.5)	13(10.9)	8(7.8)	3(4.3)	29(7.2)
บางครั้ง	1(1.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.4)	2(1.8)	0(0.0)	1(1.0)	5(7.1)	8(2.0)
หลายครั้ง	10(15.6)	22(25.6)	16(32.0)	11(14.3)	59(21.3)	28(25.2)	43(36.1)	44(42.7)	12(17.1)	127(31.5)
จำไม่ได้	2(3.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(5.2)	6(2.2)	3(2.7)	1(0.8)	3(2.9)	1(1.4)	8(2.0)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(125)	(102)	(71)	(169)	(467)	(79)	(110)	(118)	(82)	(389)
รวม	64(100.0)	86(100.0)	50(100.0)	77(100.0)	277(100.0)	111(100.0)	119(100.0)	103(100.0)	70(100.0)	403(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
हेल้า	72(44.7)	103(62.4)	76(74.5)	119(62.6)	370(59.9)	99(60.7)	131(67.2)	145(71.8)	78(62.4)	453(66.1)
เบียร์	100(62.1)	102(61.8)	69(67.7)	118(62.1)	389(62.9)	110(67.5)	147(75.4)	156(77.2)	84(67.2)	497(72.6)
Spy/ไวน์	50(31.1)	60(36.4)	37(36.3)	53(27.9)	200(32.4)	73(44.8)	105(53.9)	100(49.5)	55(44.4)	333(48.7)
हेล้าผสมพร้อมดื่ม	11(6.8)	28(17.0)	16(15.8)	10(5.3)	65(10.5)	16(9.8)	35(18.0)	34(16.8)	12(9.7)	97(14.2)
สื่ออินเทอร์เน็ต										
เคยเห็น*	302(55.5)	319(55.2)	254(54.2)	343(61.3)	1218(56.6)	399(51.4)	489(51.0)	522(53.5)	263(63.7)	1673(53.6)
จำนวนครั้งที่เห็น**										
<5 ครั้ง	57(38.8)	53(37.3)	40(32.8)	59(52.2)	209(39.9)	136(54.4)	109(41.4)	87(33.2)	64(50.0)	396(43.9)
5-9 ครั้ง	18(12.2)	16(11.3)	13(10.7)	9(8.0)	56(10.7)	29(11.6)	32(12.2)	30(11.5)	15(11.7)	106(11.7)
≥10 ครั้ง	27(18.4)	27(19.0)	26(21.3)	18(15.9)	98(18.7)	20(8.0)	33(12.6)	38(14.5)	15(11.7)	106(11.7)
บางครั้ง	0(0.0)	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.2)	7(2.8)	1(0.4)	3(1.2)	3(2.3)	14(1.6)
หลายครั้ง	38(25.9)	42(29.6)	42(34.4)	21(18.6)	143(27.3)	49(19.6)	79(30.0)	95(36.3)	28(21.9)	251(27.8)
จำไม่ได้	7(4.8)	3(2.1)	1(0.8)	6(5.3)	17(3.2)	9(3.6)	9(3.4)	9(3.4)	3(2.3)	30(3.3)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(155)	(177)	(132)	(230)	(694)	(149)	(226)	(260)	(135)	(770)
รวม	147(100.0)	142(100.0)	122(100.0)	113(100.0)	524(100.0)	250(100.0)	263(100.0)	262(100.0)	128(100.0)	903(100.0)
ประเภทเครื่องตีพิมพ์ ที่เห็น** (ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท)										
हेล้า	163(59.1)	202(70.9)	174(76.3)	168(63.9)	707(67.2)	237(65.3)	320(72.9)	383(77.4)	158(69.6)	1098(72.1)
เบียร์	190(68.8)	214(75.1)	188(82.5)	187(71.1)	779(74.1)	258(71.1)	341(77.7)	413(83.4)	180(79.3)	1192(78.2)
Spy/ไวน์	133(48.2)	161(56.5)	142(62.3)	115(43.7)	551(52.4)	230(63.4)	298(67.9)	359(72.5)	158(69.6)	1045(68.6)
हेล้าผสมพร้อมดื่ม	39(14.1)	71(24.9)	59(25.9)	24(9.1)	193(18.4)	70(19.3)	112(25.5)	162(32.7)	38(16.7)	382(25.1)

ตารางที่ 6.14 ชนิดของสื่อและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณา (ร้อยละ) (ต่อ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเห็น/ได้ยินโฆษณาทงวิทยุ/โทรทัศน์ (รวมถึงการโฆษณาผ่านการถ่ายทอดกีฬาหรือกิจกรรมอื่น)*										
16.00-20.00 น.	154(31.5)	151(28.9)	94(21.3)	152(27.4)	551(27.5)	195(27.3)	246(27.6)	201(22.1)	144(36.0)	786(27.0)
20.00-24.00 น.	211(43.2)	225(43.1)	209(47.3)	207(37.4)	852(42.5)	354(49.6)	404(45.2)	444(48.8)	146(36.5)	1348(46.2)
24.00-04.00 น.	58(11.9)	109(20.9)	108(24.4)	111(20.0)	386(19.2)	85(11.9)	143(16.0)	189(20.8)	61(15.3)	478(16.4)
04.00-08.00 น.	10(2.0)	7(1.3)	5(1.1)	15(2.7)	37(1.8)	12(1.7)	10(1.1)	5(0.6)	7(1.8)	34(1.2)
08.00-12.00 น.	24(4.9)	13(2.5)	9(2.0)	47(8.5)	93(4.6)	34(4.8)	29(3.3)	22(2.4)	19(4.8)	104(3.6)
12.00-16.00 น.	32(6.5)	17(3.3)	17(3.9)	22(4.0)	88(4.4)	34(4.8)	61(6.8)	48(5.3)	23(5.8)	166(5.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(73)	(71)	(29)	(43)	(216)	(95)	(80)	(73)	(29)	(277)
รวม	489(100.0)	522(100.0)	442(100.0)	554(100.0)	2007(100.0)	714(100.0)	893(100.0)	909(100.0)	400(100.0)	2916(100.0)
จำชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์*										
จำไม่ได้	230(44.3)	273(48.9)	196(43.4)	307(54.8)	1006(48.2)	413(55.2)	462(49.3)	342(35.8)	224(55.0)	1441(47.3)
จำได้	289(55.7)	285(51.1)	256(56.6)	253(45.2)	1083(51.8)	335(44.8)	475(50.7)	613(64.2)	183(45.0)	1606(52.7)
ไม่ตอบ(จำนวน)	(43)	(35)	(19)	(37)	(134)	(61)	(36)	(27)	(22)	(146)
รวม	519(100.0)	558(100.0)	452(100.0)	560(100.0)	2089(100.0)	748(100.0)	937(100.0)	955(100.0)	407(100.0)	3047(100.0)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จดจำหรือชอบโฆษณา 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง
อันดับ2	สิงห์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	สิงห์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์
อันดับ3	รีเจนท์	สิงห์	สิงห์	สิงห์	สิงห์	รีเจนท์	สิงห์	สิงห์	สิงห์	สิงห์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยากลองหรืออยากดื่ม 3 ยี่ห้อแรก										
อันดับ1	Spy wine cooler/Bacardi	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	รีเจนท์	Spy wine cooler/Bacardi	Spy wine cooler/Bacardi	Spy wine cooler/Bacardi	รีเจนท์	Spy wine cooler/Bacardi
อันดับ2	ซ้าง	Spy wine cooler/Bacardi	ซ้าง	ซ้าง	ซ้าง	ไวน์	รีเจนท์	รีเจนท์	Spy wine cooler/Bacardi	รีเจนท์
อันดับ3	ไวน์	ซ้าง	Heineken และ Johnie Walker	ลีโอ	Spy wine cooler/Bacardi	รีเจนท์ และ ซ้าง	สิงห์ และ ซ้าง	Heineken	ซ้าง	ซ้าง

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง

**ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยเห็น/ได้ยินโฆษณาจากสื่อชนิดนั้นๆ

ตารางที่ 6.16 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ในชีวิต (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	64(7.0)	165(19.0)	154(26.0)	356(44.0)	739(23.2)	17(1.5)	59(4.5)	68(6.0)	58(10.8)	202(4.9)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดลัม	15(1.7)	62(7.1)	58(9.8)	156(19.4)	291(9.2)	7(0.6)	30(2.3)	20(1.8)	41(7.6)	98(2.4)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	4(0.4)	16(1.8)	19(3.2)	42(5.2)	81(2.6)	5(0.4)	10(0.8)	22(1.9)	14(2.6)	51(1.2)
d. ยานอนหลับ	18(2.0)	48(5.5)	38(6.4)	57(7.1)	161(5.1)	28(2.4)	65(5.0)	65(5.7)	44(8.2)	202(4.9)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	30(3.3)	81(9.3)	73(12.3)	174(21.6)	358(11.3)	5(0.4)	11(0.8)	20(1.8)	34(6.3)	70(1.7)
f. กัญชา	10(1.1)	58(6.7)	47(7.9)	160(19.9)	275(8.7)	2(0.2)	9(0.7)	15(1.3)	19(3.5)	45(1.1)
g. ฟีน	3(0.3)	18(2.1)	14(2.4)	18(2.2)	53(1.7)	0(0.0)	2(0.2)	0(0.0)	4(0.7)	6(0.1)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	4(0.4)	15(1.7)	11(1.9)	22(2.7)	52(1.6)	0(0.0)	3(0.2)	2(0.2)	4(0.7)	9(0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	3(0.3)	10(1.2)	11(1.9)	11(1.4)	35(1.1)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	3(0.6)	4(0.1)
j. โคเคน	4(0.4)	11(1.3)	10(1.7)	11(1.4)	36(1.1)	0(0.0)	1(0.1)	0(0.0)	3(0.6)	4(0.1)
k. ผงขาว/เฮโรอีน	3(0.3)	15(1.7)	12(2.0)	16(2.0)	46(1.5)	0(0.0)	2(0.2)	1(0.1)	4(0.7)	7(0.2)
l. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	5(0.6)	28(3.2)	16(2.7)	24(3.0)	73(2.3)	2(0.2)	6(0.5)	2(0.2)	7(1.3)	17(0.4)
m. ยาบ้า	2(0.2)	18(2.1)	26(4.4)	59(7.3)	105(3.3)	0(0.0)	4(0.3)	7(0.6)	8(1.5)	19(0.5)
n. ไอซ์	2(0.2)	15(1.7)	18(3.0)	29(3.6)	64(2.0)	0(0.0)	5(0.4)	3(0.3)	6(1.1)	14(0.3)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 6.17 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	60(6.7)	152(17.6)	125(21.4)	309(39.5)	646(20.7)	14(1.2)	57(4.4)	55(4.9)	59(11.2)	185(4.5)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัลดลัม	11(1.2)	40(4.6)	43(7.4)	150(19.0)	244(7.8)	9(0.8)	26(2.0)	22(1.9)	39(7.4)	96(2.3)
c. ยากล่อมประสาท/ยากลายเครียด	3(0.3)	12(1.4)	12(2.1)	41(5.2)	68(2.2)	5(0.4)	7(0.5)	17(1.5)	10(1.9)	39(0.9)
d. ยานอนหลับ	17(1.9)	32(3.7)	31(5.3)	55(7.0)	135(4.3)	23(2.0)	53(4.1)	59(5.2)	37(7.0)	172(4.2)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	23(2.6)	66(7.6)	46(7.9)	134(16.9)	269(8.6)	4(0.3)	14(1.1)	17(1.5)	23(4.4)	58(1.4)
f. กัญชา	8(0.9)	45(5.2)	40(6.8)	137(17.3)	230(7.3)	2(0.2)	9(0.7)	11(1.0)	17(3.2)	39(0.9)
g. ฟีน	1(0.1)	9(1.0)	7(1.2)	24(3.1)	41(1.3)	1(0.1)	2(0.2)	0(0.0)	4(0.8)	7(0.2)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	1(0.1)	5(0.6)	7(1.2)	22(2.8)	35(1.1)	0(0.0)	4(0.3)	2(0.2)	3(0.6)	9(0.2)
i. ยาเค (เคตามีน)	2(0.2)	8(0.9)	5(0.9)	19(2.4)	34(0.0)	0(0.0)	2(0.2)	0(0.0)	2(0.4)	4(0.1)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	2(0.2)	9(1.0)	6(1.0)	21(2.7)	(0.0)	0(0.0)	2(0.2)	1(0.1)	2(0.4)	5(0.1)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	4(0.5)	13(1.5)	10(1.7)	27(3.4)	(0.0)	1(0.1)	7(0.5)	3(0.3)	7(1.3)	18(0.4)
l. ยาบ้า	1(0.1)	14(1.6)	16(2.7)	49(6.2)	(0.0)	0(0.0)	4(0.3)	4(0.4)	5(1.0)	13(0.3)
m. ไอซ์	1(0.1)	8(0.9)	8(1.4)	32(4.1)	(0.0)	0(0.0)	2(0.2)	2(0.2)	6(1.1)	10(0.2)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 6.18 ชนิดของสารเสพติดที่เคยใช้ใน 30 วันที่ผ่านมา (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	21(47.7)	53(46.9)	58(61.7)	142(70.7)	60.62(60.6)	4(33.3)	6(12.8)	13(27.1)	17(42.5)	40(27.2)
b. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	5(71.4)	10(45.5)	15(51.7)	30(39.0)	60(44.4)	3(42.9)	5(25.0)	3(17.7)	9(42.9)	20(30.8)
c. ยาแก้ปวดประสาท/ยากลายเครีียด	0(0.0)	4(66.7)	7(63.6)	4(23.5)	15(40.5)	1(25.0)	1(25.0)	4(30.8)	1(25.0)	7(28.0)
d. ยานอนหลับ	5(35.7)	7(29.2)	9(34.6)	8(44.4)	29(35.4)	7(38.9)	12(31.6)	12(23.5)	8(34.8)	39(30.0)
e. กระท่อม หรือสารผสมกระท่อม เช่น 4X100	7(43.8)	24(51.1)	13(44.8)	28(38.4)	72(43.6)	1(33.3)	0(0.0)	4(26.7)	4(44.4)	9(25.0)
f. กัญชา	1(14.3)	11(39.3)	16(53.3)	37(55.2)	65(49.2)	0(0.0)	1(14.3)	0(0.0)	3(33.3)	4(14.3)
g. ฝิ่น	0(0.0)	3(60.0)	3(50.0)	1(20.0)	7(41.2)	0(0.0)	0(0.0)	-	1(50.0)	1(25.0)
h. ยาอี/ยาเลิฟ	0(0.0)	3(100.0)	3(60.0)	2(40.0)	8(57.1)	-	0(0.0)	0(0.0)	2(100.0)	2(28.6)
i. ยาเค (เคตามีน)	0(0.0)	3(75.0)	3(75.0)	2(50.0)	8(0.0)	-	0(0.0)	-	1(100.0)	1(50.0)
j. ผงขาว/เฮโรอีน	0(0.0)	3(50.0)	3(75.0)	4(80.0)	(0.0)	-	-	-	1(50.0)	1(50.0)
k. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	0(0.0)	7(77.8)	6(75.0)	3(42.9)	(0.0)	1(100.0)	1(33.3)	0(0.0)	4(66.7)	6(46.2)
l. ยาบ้า	0(0.0)	6(75.0)	8(66.7)	13(56.5)	(0.0)	-	0(0.0)	0(0.0)	1(33.3)	1(11.1)
m. ไอซ์	0(0.0)	4(100.0)	3(60.0)	4(30.8)	(0.0)	-	0(0.0)	1(50.0)	2(66.7)	3(50.0)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่เคยใช้ใน 12 เดือน (ในตารางที่ 17)

ประวัติบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

ตารางที่ 6.19 ประวัติบุคคลในครอบครัวที่เคยมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติด (ร้อยละ)

	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
บุคคลในครอบครัวมีปัญหาจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด										
ไม่มี	424(60.5)	480(66.9)	334(64.0)	412(66.8)	1650(64.5)	602(60.1)	753(65.7)	662(63.9)	288(62.1)	2305(63.2)
มี	277(39.5)	238(33.2)	188(36.0)	205(33.2)	908(35.5)	400(39.9)	394(34.4)	374(36.1)	176(37.9)	1344(36.8)
ไม่ระบุ(จำนวน)	(244)	(166)	(77)	(204)	(691)	(199)	(178)	(107)	(78)	(562)
รวม	701(100.0)	718(100.0)	522(100.0)	617(100.0)	2558(100.0)	1002(100.0)	1147(100.0)	1036(100.0)	464(100.0)	3649(100.0)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา*										
แม่	13(38.2)	10(32.3)	7(50.0)	25(56.8)	401(401.0)	22(45.8)	15(51.7)	16(57.1)	16(72.7)	69(54.3)
พ่อ	112(57.7)	109(59.6)	85(60.3)	95(59.0)	401(59.1)	177(60.8)	179(59.3)	181(60.7)	84(63.6)	621(60.7)
แม่เลี้ยง	2(14.3)	8(34.8)	5(55.6)	17(63.0)	32(43.8)	5(29.4)	3(14.3)	2(12.5)	2(13.3)	12(17.4)
พ่อเลี้ยง	5(27.8)	6(24.0)	2(22.2)	21(60.0)	34(39.1)	10(37.0)	8(21.1)	12(42.9)	10(43.5)	40(34.5)
พี่น้อง	19(39.6)	31(48.4)	29(54.7)	44(51.8)	123(49.2)	29(40.9)	45(50.6)	56(59.0)	36(73.5)	166(54.6)
ปู่/ย่า	28(43.8)	24(50.0)	18(62.1)	34(54.0)	104(51.0)	32(40.5)	21(36.8)	13(34.2)	12(50.0)	78(39.4)
ตา/ยาย	33(52.4)	24(46.2)	11(52.4)	25(44.6)	93(48.4)	29(43.9)	28(45.9)	19(47.5)	14(48.3)	90(45.9)
ญาติฝ่ายพ่อ	80(63.0)	65(69.9)	60(73.2)	60(63.2)	265(66.8)	117(64.6)	130(68.1)	117(69.6)	62(79.5)	426(68.9)
ญาติฝ่ายแม่	56(55.5)	56(62.2)	46(64.8)	58(64.4)	216(60.0)	98(64.1)	102(62.6)	114(72.6)	50(72.5)	364(67.2)
แฟน	14(51.9)	7(29.2)	4(66.7)	22(61.1)	47(50.5)	14(42.4)	34(65.4)	44(68.8)	35(60.3)	127(61.4)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการสูบบุหรี่*										
แม่	11(32.4)	12(38.7)	6(40.0)	18(41.9)	494(494.0)	12(25.0)	9(31.0)	9(32.1)	3(13.6)	33(26.0)
พ่อ	137(70.6)	131(71.6)	106(75.2)	120(74.5)	494(72.8)	225(77.3)	242(80.1)	228(76.5)	104(78.8)	799(78.1)
แม่เลี้ยง	1(7.1)	5(21.7)	0(0.0)	8(29.6)	14(19.2)	1(5.9)	1(4.8)	0(0.0)	4(26.7)	6(8.7)
พ่อเลี้ยง	3(16.7)	9(36.0)	1(11.1)	18(51.4)	31(35.6)	15(55.6)	13(34.2)	8(28.6)	7(30.4)	43(37.1)
พี่น้อง	29(60.4)	43(67.2)	42(79.3)	58(68.2)	172(68.8)	43(60.6)	67(75.3)	70(73.7)	34(69.4)	214(70.4)
ปู่/ย่า	42(65.6)	26(54.2)	18(62.1)	32(50.8)	118(57.8)	44(55.7)	34(59.7)	26(68.4)	15(62.5)	119(60.1)
ตา/ยาย	35(55.6)	25(48.1)	15(71.4)	31(55.4)	106(55.2)	33(50.0)	33(54.1)	29(72.5)	18(62.1)	113(57.7)
ญาติฝ่ายพ่อ	90(70.9)	63(67.7)	63(76.8)	64(67.4)	280(70.5)	127(70.2)	151(79.1)	142(84.5)	59(75.6)	479(77.5)
ญาติฝ่ายแม่	66(65.4)	58(64.4)	54(76.1)	60(66.7)	238(60.0)	102(66.7)	129(79.1)	128(81.5)	49(71.0)	408(75.3)
แฟน	7(25.9)	10(41.7)	3(50.0)	14(38.9)	34(36.6)	16(48.5)	32(61.5)	50(78.1)	40(69.0)	138(66.7)
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหาจากการใช้สิ่งเสพติด*										
แม่	3(8.8)	3(9.7)	1(7.1)	5(11.6)	18(18.0)	1(2.1)	2(6.9)	3(10.7)	1(4.6)	7(5.5)
พ่อ	7(3.6)	2(1.1)	0(0.0)	9(5.6)	18(2.7)	2(0.7)	7(2.3)	3(1.0)	1(0.8)	13(1.3)
แม่เลี้ยง	2(14.3)	3(13.0)	0(0.0)	3(11.1)	8(11.0)	0(0.0)	1(4.8)	1(6.3)	2(13.3)	4(5.8)
พ่อเลี้ยง	1(5.6)	3(12.0)	1(11.1)	3(8.6)	8(9.2)	1(3.7)	1(2.6)	2(7.1)	1(4.4)	5(4.3)
พี่น้อง	5(10.2)	3(4.7)	2(3.8)	15(17.7)	25(10.0)	1(1.4)	7(7.9)	10(10.5)	0(0.0)	18(5.9)
ปู่/ย่า	3(4.7)	3(6.3)	0(0.0)	3(4.8)	9(4.4)	1(1.3)	2(3.5)	0(0.0)	1(4.2)	4(2.0)
ตา/ยาย	4(6.4)	4(7.7)	2(9.5)	2(3.6)	12(6.3)	2(3.0)	1(1.6)	1(2.5)	0(0.0)	4(2.0)
ญาติฝ่ายพ่อ	4(3.2)	6(6.5)	2(2.4)	4(4.2)	16(4.0)	3(1.7)	2(1.1)	2(1.2)	3(3.9)	10(1.6)
ญาติฝ่ายแม่	4(4.0)	6(6.7)	2(2.8)	2(2.2)	14(0.0)	2(1.3)	3(1.8)	3(1.9)	3(4.4)	11(2.0)
แฟน	6(22.2)	4(16.7)	1(16.7)	3(8.3)	14(15.1)	2(6.1)	10(19.2)	9(14.1)	3(5.2)	24(11.6)

*ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนที่ตอบว่า มีบุคคลในครอบครัวที่มีปัญหา จากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือ ใช้สิ่งเสพติด

ทัศนคติต่อการใช้สารเสพติด

ก. ผลเสียต่อสุขภาพที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 6.20 นักเรียนคิดว่าการใช้สารต่อไปนี้เพียงหนึ่งหรือสองครั้งจะมีผลเสียต่อสุขภาพ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	622(70.0)	600(69.0)	410(69.9)	523(65.5)	2155(68.6)	939(80.3)	1016(77.3)	859(75.4)	402(76.3)	3216(77.5)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	663(74.5)	607(69.9)	409(69.6)	550(68.8)	2229(70.9)	954(81.5)	1034(78.6)	866(76.0)	425(80.3)	3279(78.9)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	614(69.1)	614(70.7)	428(72.8)	529(66.4)	2185(69.5)	883(75.5)	987(75.1)	879(77.2)	409(77.3)	3158(76.0)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	644(72.4)	653(75.1)	443(75.3)	566(70.9)	2306(73.3)	960(82.1)	1086(82.6)	936(82.2)	439(83.0)	3421(82.4)
e. ยานอนหลับ	595(66.9)	606(69.7)	390(66.3)	530(66.5)	2121(67.5)	858(73.3)	936(71.2)	782(68.6)	380(71.8)	2956(71.2)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	659(74.1)	661(76.0)	459(78.1)	562(70.4)	2341(74.4)	980(83.7)	1087(82.7)	956(83.9)	429(81.1)	3452(83.1)
g. กัญชา	688(77.3)	690(79.4)	486(82.7)	590(73.9)	2454(78.0)	1025(87.5)	1144(87.1)	1004(88.1)	456(86.2)	3629(87.4)
h. ฝิ่น	691(77.6)	692(79.6)	486(82.7)	590(74.0)	2459(78.2)	1026(87.6)	1151(87.5)	1015(89.0)	460(87.0)	3652(87.9)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	694(78.0)	692(79.6)	493(83.8)	600(75.2)	2479(78.8)	1027(87.7)	1152(87.6)	1025(89.9)	461(87.2)	3665(88.2)
j. ยาเค (เคตามีน)	691(77.6)	697(80.2)	481(81.8)	602(75.4)	2471(78.6)	1014(86.6)	1150(87.5)	1023(89.7)	459(86.8)	3646(87.8)
k. โคเคน	691(77.6)	696(80.1)	485(82.5)	596(74.7)	2468(78.5)	1013(86.5)	1149(87.4)	1023(89.7)	460(87.0)	3645(87.7)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	691(77.6)	702(80.8)	485(82.5)	602(75.5)	2480(78.9)	1019(87.0)	1152(87.7)	1026(90.0)	457(86.4)	3654(88.0)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	682(76.6)	686(78.9)	478(81.3)	605(75.8)	2451(77.9)	997(85.1)	1120(85.2)	1004(88.1)	452(85.4)	3573(86.0)
n. ยาบ้า	702(78.9)	712(81.9)	494(84.0)	610(76.5)	2518(80.1)	1042(89.0)	1179(89.7)	1029(90.3)	467(88.3)	3717(89.5)
o. ไอซ์	675(75.9)	688(79.2)	481(81.8)	592(74.3)	2436(77.5)	999(85.3)	1138(86.6)	1011(88.7)	460(87.0)	3608(86.9)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ข. การรังเกียจการใช้สารเสพติด

ตารางที่ 6.21 นักเรียนคิดว่าเพื่อนจะรังเกียจ ถ้านักเรียนใช้สารเสพติดต่อไปนี้ แม้เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	504(58.2)	431(49.9)	243(41.4)	201(25.3)	1379(44.3)	794(68.2)	746(56.9)	576(50.8)	229(43.2)	2345(56.6)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	529(61.1)	435(50.4)	225(38.3)	223(28.1)	1412(45.4)	784(67.3)	703(53.6)	488(43.0)	203(38.3)	2178(52.6)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	542(62.7)	476(55.2)	294(50.1)	262(33.0)	1574(50.6)	782(67.2)	748(57.1)	610(53.8)	258(48.7)	2398(57.9)
d. ยาแก้ปวดประสาท/ยาคลายเครียด	548(63.3)	484(56.1)	298(50.8)	300(37.8)	1630(52.4)	817(70.2)	782(59.6)	631(55.6)	289(54.5)	2519(60.8)
e. ยานอนหลับ	467(53.9)	414(47.9)	232(39.5)	246(31.0)	1359(43.7)	630(54.1)	525(40.0)	412(36.3)	198(37.4)	1765(42.6)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	592(67.9)	483(55.7)	317(54.0)	256(32.2)	1648(52.8)	875(74.9)	853(65.0)	727(63.9)	272(51.1)	2727(65.7)
g. กล้วยชา	627(71.7)	547(63.0)	379(64.6)	297(37.4)	1850(59.2)	936(80.1)	945(72.0)	822(72.2)	345(64.9)	3048(73.4)
h. ฝิ่น	636(72.8)	566(65.2)	386(65.8)	363(45.7)	1951(62.5)	947(81.0)	968(73.8)	851(74.8)	361(67.9)	3127(75.3)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	637(72.9)	575(66.2)	388(66.1)	364(45.8)	1964(62.9)	960(82.1)	978(74.5)	851(74.9)	365(68.6)	3154(76.0)
j. ยาเค (เคตามีน)	634(72.5)	573(66.1)	395(67.3)	372(46.9)	1974(63.2)	966(82.6)	978(74.5)	863(75.9)	369(69.4)	3176(76.5)
k. โคเคน	636(72.8)	578(66.7)	394(67.1)	375(47.2)	1983(63.5)	958(82.0)	979(74.6)	867(76.3)	372(69.9)	3176(76.5)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	639(73.1)	577(66.5)	397(67.6)	378(47.6)	1991(63.7)	957(81.9)	980(74.7)	870(76.5)	367(69.0)	3174(76.5)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	632(72.3)	561(64.6)	397(67.6)	375(47.2)	1965(62.9)	937(80.2)	959(73.2)	856(75.3)	359(67.5)	3111(75.0)
n. ยาบ้า	647(74.0)	576(66.4)	401(68.4)	372(46.8)	1996(63.9)	969(83.0)	1001(76.3)	874(76.9)	370(69.6)	3214(77.5)
o. ไอซ์	625(72.0)	562(65.2)	388(67.1)	353(45.3)	1928(62.4)	949(81.7)	960(74.1)	842(74.9)	361(68.1)	3112(75.7)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ค. ความยากง่ายในการแสวงหาสารเสพติด

ตารางที่ 6.22 นักเรียนคิดว่าน่าจะหาสารเสพติดต่อไปนี้ได้ยาก หากนักเรียนต้องการใช้ (ร้อยละ)

ชนิดสาร	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. บุหรี่	69(7.9)	64(7.4)	23(3.9)	29(3.6)	185(5.9)	74(6.4)	41(3.1)	38(3.4)	12(2.3)	165(4.0)
b. สุรา – เบียร์/ไวน์/เหล้า/สาโท	109(12.5)	89(10.3)	26(4.5)	38(4.8)	262(8.4)	140(12.0)	86(6.6)	58(5.1)	16(3.0)	300(7.3)
c. ยาแก้ไอผสมน้ำอัดลม	216(24.7)	182(21.0)	91(15.5)	125(15.7)	614(19.7)	273(23.5)	190(14.5)	175(15.4)	65(12.2)	703(17.0)
d. ยาแก้ลมประสาท/ยาคลายเครียด	307(35.3)	314(36.2)	196(33.5)	220(27.7)	1037(33.3)	452(38.9)	416(31.8)	354(31.2)	162(30.6)	1384(33.5)
e. ยานอนหลับ	194(22.2)	224(25.8)	125(21.3)	139(17.5)	682(21.8)	218(18.8)	180(13.8)	172(15.2)	74(13.9)	644(15.6)
f. กระพ้อม หรือ 4X100	247(28.3)	272(31.4)	175(29.9)	161(20.3)	855(27.4)	361(31.1)	362(27.7)	322(28.4)	99(18.6)	1144(27.7)
g. กัญชา	384(43.9)	386(44.5)	283(48.3)	253(31.8)	1306(41.8)	572(49.2)	586(44.8)	525(46.3)	207(39.0)	1890(45.7)
h. ฝิ่น	456(52.2)	493(56.8)	391(66.7)	417(52.4)	1757(56.2)	642(55.3)	739(56.5)	668(58.9)	304(57.3)	2353(56.9)
i. ยาอี/ยาเลิฟ	454(52.0)	523(60.3)	387(66.0)	419(52.6)	1783(57.1)	654(56.3)	751(57.4)	702(61.9)	293(55.2)	2400(58.0)
j. ยาเค (เคตามีน)	461(52.8)	529(60.9)	400(68.3)	428(53.8)	1818(58.2)	659(56.8)	759(58.0)	716(63.1)	308(58.1)	2442(59.1)
k. โคเคน	463(53.0)	533(61.4)	402(68.6)	430(54.0)	1828(58.5)	650(55.9)	764(58.4)	726(64.0)	306(57.6)	2446(59.1)
l. ผงขาว/เฮโรอีน	455(52.1)	524(60.4)	391(66.7)	425(53.4)	1795(57.5)	631(54.4)	735(56.2)	694(61.2)	290(54.6)	2350(56.8)
m. สารระเหย (ทินเนอร์ กาว เบนซิน)	337(38.6)	396(45.6)	264(45.1)	317(39.8)	1314(42.1)	480(41.3)	483(37.0)	477(42.0)	208(39.2)	1648(39.9)
n. ยาบ้า	449(51.4)	514(59.3)	366(62.5)	377(47.4)	1706(54.6)	640(55.1)	726(55.5)	665(58.6)	279(52.5)	2310(55.9)
o. ไอซ์	437(50.0)	520(59.9)	376(64.2)	401(50.4)	1734(55.5)	637(54.9)	729(55.7)	693(61.1)	287(54.1)	2346(56.8)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

ตารางที่ 6.23 นักเรียนคิดว่า การดื่มสุราอาจทำให้เกิดผลต่อไปนี้ (ร้อยละ)

ผลจากการดื่มสุรา	นักเรียนชาย					นักเรียนหญิง				
	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม	ม. 1	ม. 3	ม. 5	ปวช. 2	รวม
a. ไม่ประหม่า เกือบเงิน สร้าง ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้	228(26.2)	277(32.1)	234(39.7)	363(45.4)	1102(35.3)	234(20.1)	374(28.6)	373(32.8)	193(35.9)	1174(28.3)
b. ช่วยทำให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น	120(13.8)	181(21.0)	172(29.2)	271(33.9)	744(23.8)	73(6.3)	148(11.3)	202(17.7)	87(16.2)	510(12.3)
c. ทำให้จัดการกับความเครียดหรือ ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น	132(15.2)	196(22.7)	188(31.9)	327(40.9)	843(27.0)	103(8.8)	203(15.5)	213(18.7)	146(27.2)	665(16.0)
d. ช่วยให้คบเพื่อนได้ง่ายขึ้น	125(14.4)	183(21.2)	190(32.2)	327(40.9)	825(26.4)	81(6.9)	152(11.6)	157(13.8)	101(18.8)	491(11.8)
e. ช่วยทำให้คนมีเรื่องที่จะคุยกันได้	141(16.2)	214(24.9)	210(35.6)	366(45.8)	931(29.8)	95(8.2)	207(15.8)	249(21.9)	138(25.7)	689(16.6)
f. ทำให้เพื่อนผู้ชายสนิทกันได้เร็วขึ้น	154(17.7)	246(28.5)	236(40.0)	389(48.6)	1025(32.8)	148(12.7)	274(20.9)	297(26.1)	173(32.2)	892(21.5)
g. ทำให้เพื่อนผู้หญิงสนิทกันได้เร็วขึ้น	105(12.1)	166(19.2)	156(26.3)	299(37.3)	726(23.2)	81(7.0)	168(12.9)	168(14.9)	117(21.9)	534(12.9)
h. ทำให้คนสนุกสนานมากขึ้น	193(22.2)	301(34.8)	306(51.6)	462(57.6)	1262(40.3)	186(16.0)	401(30.7)	424(37.6)	233(43.6)	1244(30.1)
i. ช่วยให้คนมีอะไรจะทำ	129(14.8)	202(23.4)	203(34.2)	319(39.8)	853(27.3)	101(8.7)	219(16.8)	193(17.1)	114(21.4)	627(15.2)
j. ทำให้กินอาหารได้อร่อยมากขึ้น	121(13.9)	183(21.2)	142(24.0)	253(31.6)	699(22.3)	77(6.6)	156(12.0)	151(13.4)	88(16.5)	472(11.4)
k. ทำให้ผู้หญิงเซ็กซี่ขึ้น	127(14.6)	197(22.8)	161(27.2)	286(35.7)	771(24.6)	101(8.7)	173(13.3)	153(13.6)	102(19.1)	529(12.8)
l. ทำให้ผู้ชายเซ็กซี่ขึ้น	91(10.5)	139(16.1)	112(18.9)	243(30.3)	585(18.7)	77(6.6)	136(10.4)	132(11.7)	83(15.5)	428(10.4)
m. ทำให้ฉันทูเซ็กซี่ขึ้น	87(10.0)	142(16.4)	107(18.1)	222(27.7)	558(17.8)	50(4.3)	97(7.4)	78(6.9)	65(12.2)	290(7.0)
n. ช่วยสร้างโอกาสในการมีเพศสัมพันธ์	223(25.6)	288(33.4)	291(49.2)	383(47.8)	1185(37.9)	866(74.7)	841(64.6)	679(60.1)	360(67.4)	2746(66.6)

ร้อยละคิดจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่ตอบ (ไม่รวม missing)

